





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3618/A Vol. 4






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3618/A Vol. 4




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3618/A Vol. 4





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3618/A Vol. 4



DEBACQ LIBRARY









A. xviii. p

3618⁽⁴⁾
A





42599

EPITOMES

Omnium Galeni

PERGAMENI OPERA

RAM VNIVERSAM ILLIUS
VIRI DOCTRINAM,
& methodū, quā accuratissime continētis,

SECTIO TERTIA.

PER ANDREAM LACVNAM SECO-

biensem, Doctorem Medicum, atq; ex sacro mi-

litum Sancti Petri apud Vrbem collegio,

Auratum Equitem, summa fide

atq; studio collecta.

CAVTVM EST PONTIFICIA, CAESAREA, ET

Christianissimi Regis, Augustissimiq; Senatus Veneti

authoritate & decreto, ne quis impunē hoc

opus aut cudat, aut ab alio excusum,

quā à Hieronymo Scoto,

exponat venale.


Venetiis apud Hieronymum Scotum.

I S 4 S

3 4 5 2

ILLVSTRISSIMO, ET CLEMENTIS-
 simo Principi, Cosmo Medices, Tuscorum Duci
 Optimo & Maximo, Andreas Lacuna,
 Secobiensis, Doctor Medicus,
 Miles Sancti Petri.

S. P. D.



VMANI CORPO-
 ris fabricam ciuitati opti-
 me institutæ esse similem,
 Diuinus ille Plato profes-
 sus est, Clementissime Prin-
 ceps, neq; id iniuria. Nam
 si constitutionem utriusq;
 dispensationemq; accura-
 te expendamus, nihil pla-

ne reperiemus in ciuitate, quod longè cumulatius abso-
 lutiusq; humano etiam non insit corpori. Etenim fortis-
 sima quæq; ciuitas, solet esse ualido cincta muro, quo in-
 cursiones hostium atq; insultus arceantur. Vice muri cu-
 iusdam est corpori etiam extima cutis, quæ tuetur ip-
 sum ab iniurijs extrinsecis. Ciuitatem qui uolunt inex-
 pugnabilem reddere, minimeq; insidijs obnoxiam, so-
 lent semper optimi duces unam tantum illi portam am-
 plam relinquere, excipiendis commeatibus peruiam:
 plures autem ueluti canales & aquæductus, ad illius
 expurganda excrementa. Similiter etiã Natura os uni-

✱ ij

cum corpori humano indidit, per quod nimirum ingre-
derentur quidem omnia quæ ad partes eius alendas per-
tinent: sermo autem elideretur, instruendis animis ho-
minum pietate & doctrina, maxime necessarius: ac præ-
terea uarios meatus, per quos excernerentur quæ non
erant futura ex usu. Optima quæq; ciuitas, præsertim si
duratura sit, unico tantum, sed Prudentissimo, Iustissi-
mo, & Clementissimo debet esse Principi subdita: quan-
doquidem Polyarchia semper fuit seditioni opportuna:
Princeps autem ipse, à ciuium commercio abstractus, à
fidisq; stipatoribus custoditus, in sublimiori fortiori-
q; urbis parte, se continere: ut illinc, ueluti ex quadam spe-
cula, uniuersos ciues suos contueri, et si qua coniuratio
oriatur, eam facile restringere possit. Non aliter, dubio
procul, ratio ipsa in homine, quæ reliquarum omnium
facultatum est imperatrix, in cerebro, sublimiori cor-
poris parte, ueluti in arce quadam consistens, membris
uniuersis sibi subditis imperat, eisq; uiuendi leges im-
ponit. Eius autem stipatores, ac ueluti incorrupti qui-
dam satellites, sensus exteriores existunt: qui nunquam
non facientes excubias, explorantesq; singula, quæ aut
rationi ipsi, aut cuiuspiam subiectorum illi membrorum,
obesse aliqua ex parte possint, quicquid tandem perce-
perint, ætutum sensui communi renunciant: qui ceu dux
quidam, ipsi rationi coniunctus, illis præfectus est. Iam
uerò ut Principibus adsunt nonnulli Viri à secretis, qui
eos in expediendis negotijs magna sollicitudine liberat:

sic adest Rationi Memoria, uuiuersa quæ illi occurrunt, si alicuius ponderis sint, quæ fidelissimè asseruans: eaq; dum occasio postulat, subito, ueluti ex promptuario quodam, suppeditans. Solent habere Principes & pace & bello, milites quosdam sacramentarios, tum ad repellendas iniurias extrinsecas: tum ad continēdos in obsequio & fide ipsos animos ciuium. Non secus profectò Diuinus ille Architectus noster, Rationi uim irascibilem, à Platone θυμοειδῆν uocatam, adiūxit: ut si quando ratio immeritò ab aliquo infestaretur, confestim hæc excandescens, illi ferret manus auxiliatrices, omnemq; uim propulsaret. Collocauit autem Natura hanc ipsam, qua irascimur, facultatem, in corde: ut media exquisitè esset inter Rationem atq; Cupiditates, quæ in iecinore sitæ, atq; illinc uarias excursions facientes, admodum seditiosæ existunt, Rationiq; plurimū negotij facessunt. Quocirca inter ipsas & uim irascibilem, Natura etiam uallum quoddam firmissimum, diaphragma nempe, interiecit, ne uidelicet imparatam illæ iracundiam opprimerent, insurgentesq; postea contra Rationem, arcem illius expugnarent. Reperiuntur in ciuitate opificia hominum uaria: quum alij, gratia exempli, conficiant panes: alij culinariam exerceant: alij retrimēta omnia expurgent: alij deniq; diuersas merces per totam urbem in communem usum traducant. An non etiam in corpore humano uenter cibos concoquit, hepar sanguinem gignit, melancholicum succum expurgat liē, uesica uri-

nam, uenæ per uniuersum corporis habitum (ueluti ba-
iuli quidam) sanguinem copiosissimum riuant, arteriæ
uitalem spiritum, ac breuiter, nervi animalem, qui au-
thor est motus & sensus? Corporis itaq; nostri harmo-
nia ciuitatis optimam refert constitutionem: imò uerò
Respublicæ, ciuitatesq; uniuersæ, ad exemplum corpo-
ris humani sunt conditæ: quum arti Natura ipsa tem-
pore & dignitate antecellat. Quemadmodum igitur si
in aliqua ciuitate princeps quidem, ut par est, domine-
tur: ciues autem omnes, militesq; eius decretis audiant:
atq; unusquisq; opifex suo recte fungatur munere, salus
Reipublicæ constat: labefactatur uerò, si contraria ac-
cidant: sic etiam quādiu in nostro corpusculo Ratio ipsa
gesserit habenas imperij: affectus autem omnes atq; cu-
piditates obtemperauerint: singulæq; particulæ pro di-
gnitate sua munia exercuerint: nec interim praua ali-
menta ingerantur: tandiu certè integra sanitate corpo-
ris, animiq; perfruemur. Si uerò aut Ratio ipsa in con-
siliū admittat cupiditates: aut irascibilis facultas in
unum cum his aduersus Rationem conspiret: aut ex or-
ganis quæ usui communi inferuiunt, unum, plura, uel
omnia, prauè suas obeant functiones: uel deniq; materiæ
unde particulæ aluntur sint cachochymæ: pro concursu
harum causarum necessum est, aut mentis, aut corporis,
aut utriusq;, morbum contrahamus. Atq; ita sanè ua-
ria in corpore morborum genera oriuntur, dissoluta ui-
delicet, alterataq; uarijs modis habitudine illa & tem-

perie, quam inter se mutuò uniuersa membra, dum naturali ordini responderent, tuebantur. Quorum uniuersa curatio eadem adhibetur methodo, qua curari solent etiam morbi Reipub. Quippe ut in hac peccata leuiora nunc uinculis, nunc uirgis, nunc exilio, nunc succisa auricula coercētur: in grauiora autem laqueo, securi, flamma, atq; feruenti oleo, acerbissimè animaduertitur: sic exiguos quidem affectus corporis, leuiusculis quibusdam præsijs, ut puta purgatione, atq; interdum sola tenui uictus ratione, curamus: contumaces uerò, immedicabilesq; (cuiusmodi tum sphaceli, tum cæcri existunt) ferro, cauterioq; ne in sanas partes grassentur, exterminamus. Cæterum quemadmodum ad stabiliendam Rempub. plectendosq; facinorosos homines, leges fuerunt inuenta: sic ad cōseruandam temperiem corporis, rescindendosq; morbos, è cœlo delapsa nobis est MEDICINA. Quo munere nullum hætenus mortaliūne generi à Deo ipso datum est maius: nec (si Galeno credendum sit) dabitur unquam. At uerò quum hanc ipsam artem, atq; industriam medendi, olim sola experientia constantem, Hippocrates primus omnium methodo tradidisset: reliquisset tamen incultam, imperfectamq;: postea superueniens Galenus, multis illam modis excoluit, eiq; extremum ornatum addidit. Qui quum ob illam quidem admirandam doctrinam, ac sermonis fecunditatem, qua planè refertus est, magno exciperetur omnium ferè studiosorum applausu: ob prolixitatem autem immensam

(quæ in tanta uitæ breuitate est exosa) nonnulli à lectio-
ne illius abhorrent: equidem ut ad uotū omnes eo frue-
rentur, uniuersa Viri illius opera in breuiusculā quan-
dam periochen, uerū a modum succulentam, ea fide &
diligentia contraxi, ut ex ijs quæ iuuare lectores pote-
rant, nihil prorsus omiserim: multa autem quæ deprauā-
ta & peruersa in codicibus tam Latinis, q̃ Græcis, erāt,
accuratissimè restituerim. Ex quibus nostris lucubratio-
nibus placuit sub splendore Excellentie Tuæ, Illustris-
sime Princeps, partem maximam ædere, nempe quadra-
ginta commentarios Galeni, qui in se omnes differentias
morborum, atq; eorum curādorū generales methodos
continent: utiq; sperans fore, ut quum ipse inter omnes
Italiae Principes optimorum ingeniorum sis promotor
& altor, eisq; semper ceu propitium quoddam sydus af-
fulgeas, uel ex sola tui nominis præfatione, studiosi om-
nes ad eorum lectionem inflammarentur. Adeo si quidem
Tuam Celsitudinem, quum ob alias planè regias uirtu-
tes, tum uel maxime ob ardentissimum istum sapientiæ
amorem, quo semper accensa est, docti omnes ubiq; loco-
rum suspiciunt, colunt, & uenerantur, ut se non minus
debere tibi, quàm ipsis Musis, uniuersi uno ore pronun-
cient: qua (ut ego reor) opinione minime hallucinantur.
Siquidem non modò studiosi, sed artes etiam, atq; scien-
tiæ uniuersæ, si non maiorem, at certè non minorem ijs
gratiam debent, qui sua munificentia fouendo ipsas, ut
subinde crescerent, summumq; suæ dignitatis fastigium

attingerent, effecerunt: quàm illis, quorum industria pri-
mum inuenta, ac in usus hominum æditæ sunt. In maxi-
mam itaq; sibi foelicitatem ascribunt omnia bonarum li-
terarum studia, q; hisce turbulentis calamitosisq; tempo-
ribus, dum Italia penè uniuersa uarijs æstuat disidijs,
uersaturq; in asiduo strepitu armorum: dum optima
quæq; instituta infirmis titubant pedibus: dum uirtus,
pudorq; exulat omnis: nacta sint Clementissimum & Se-
renissimum Principem, qui explosa undiq; ea in suos si-
nus excipiat, exceptaq; aduersus iniurias omneis tuea-
tur. Haud ab re igitur Illustrissimus & Reuerendiss. D.
D. Franciscus à Bouadilla & Mendoza, Sanctæ Ro-
manæ Ecclesiæ Senator uigilantissimus, meusq; Patro-
nus unicus, necnon Illustrissimus & Sapientiss. D. D.
Ioannes Furtadus à Mendoza, apud Venetos Orator
Cæsareus, Vterq; Celsitudini T. addictissimus, nunquam
desinunt heroicas istas tui animi dotes magnificis enco-
mijs efferre: Florentiamq; tuam istam florentissimam ur-
bem, nimium foelicem uocare, q; obtigerit illi Princeps
Iustissimus, Clemētissimus, Sapientiaq; simul & pietate
integerrimus. Ergo si, Illustrissime Heros, hasce nostras
uigilias tuo patrocínio dignaberis, ego quidem uidebor
haud lusisse meam operā: Galenus autem, ad pristinam
dignitatem quam gerebat olim, dum in summa esset au-
thoritate apud priscos Impatores, deesse sibi nihil pror-
sus existimabit: quin potius hærens apud. C. T. auctam

plurimis modis beatitudinem suam arbitrabitur. Vae
le. Venetijs, ex ædibus Illustrissimi Viri, D. D. Ioan
nis Furtadi à Medozza, in hac Republica Cæsarei Ora
toris longè Dignissimi. IIII. Idus Aprilis.

M. D. XLVIII.

INDEX COMMENTARIO

rum Galeni, qui in hac tertia sectione habentur: nominaque Doctissimorum Virorum, quorum sumus usi uersionibus, dum Epitomen conderemus.



E DIFFERENTIIS
Morborum liber. I. Guilielmo Copo Basiliensi & Thoma Linacro interpretibus.

De causis morborum, lib. I. Guilielmo Copo & Thoma Linacro interpretibus.

De sympt. diff. lib. I. Guilielmo Copo & Thoma Linacro interpretibus.

De symptomatum causis lib. III. Guilielmo Copo & Thoma Linacro interpretibus.

De causis procatarcticis lib. I. ex antiqua restituta uersione.

De plenitudine lib. I. Victore Trincaue
lio interprete. 68

De atra bile liber. I. Augustino Ricco Lu
cenci interprete. 27

De tumoribus præter naturam, lib. I. Au
gustino Ricco interprete. 67

De tremore, palpitatione, cōuulsione &
rigore, liber. I. Dominico Montesauro
interprete. p. 90.

De morborum temporibus, lib. I. Ioanne
Guinterio Andernaco interprete. p. 101

De totius morbi temporibns, lib. I. Ioan
ne Guint. And. interprete. 106.

De locis affectis, lib. VI. Guilielmo Copo
Basilienfi interprete. 110

De differentiis febrium liber. II. Nicolao
Leoniceno interprete. 111

De Marasmo lib. I. Victore Trincauelio
interprete. 117

Contra eos qui de typis scripserunt, lib. I.
Victore Trincauelio interprete. 118

De typis lib. I. Augustino Ricco interpr. 119

Ars medicinalis, Nicolao Leoniceno in-
terprete. 260.

De Methodo medendi lib. XIII. Tho-
ma Linacro interprete. 210.

De arte curatiua ad Glauconem, liber. II.
Nicolao Leoniceno interprete. 509.

De uenæ sectione aduersus Erasistratum
lib. I. Iosepho Tectandro interprete. 56.

De uenæ sec. aduersus Erasistrataeos Ro-
mæ degentes, lib. I. Iosepho Tectan-
dro interprete. 566.

De curandi ratione per uenæ sectionem,
lib. I. Theodorico Gerardo interprete. 569.


De hirudinibus, reuulsione, cucurbitu-
la & scarificatione, lib. I. Theodorico
Gerardo, interprete. 586.

De purgantium medicamentorum facul-
tatibus, lib. I. Ioanne Guinterio Ander-
naco interprete. 589.

Quos purgare, quando, & qualibus me-
dicamentis oporteat, lib. I. Ioāne Guin-
terio Andernaco interprete. 591.

De ptisana, liber. I. Augustino Ricco in-
terprete. 602


Consilium puero comitali morbo labo-
ranti, Augustino Ricco interprete. 606



G A L E N I P E R G A

M E N I D E D I F F E R E N T I I S

M O R B O R V M , L I B E R V N V S .



N I V E R S I T V N C

Capitulum 2.

se sanos existimant, quum optimè ad vitæ functiones ministerio particularū vtūtur. At eam partem ægro-
tare arbitrātur, cuius ope-
ratio sit læsa. Quum igitur
sanitas inuestiganda sit, aut
in ipsis operationibus, aut
in fabrica instrumentorū:

Sanitas in quibus inuestiganda.

manifestum utriq; est, mor-
bum esse, vel operationis, vel structuræ oblationem.
Cæterum sanitas non operationis actu, sed aptitudine
potius est definienda. Sanitas itaq; moderatio quædam
existit: morbus autem, utpote, sanitati cōtrarius, in im-
moderatione eorum consistit, quorum sanitas est mo-
deratio. At verò, quum animalium corpora magis &
minus suscipiant, pati q; & alterascere possint (id quod
fieri non posset, si ex elemento constarent vnico, aut
ex atomis nulli alterationi obnoxiiis) tot nimirum ge-
nera morborum simplicium contrahent, quot sunt
elementa ex quibus constantur. Etenim compositio &
formatio triplex reperitur i corpore. Prima quidem,
similarium particularū est: vt arteriæ, venæ, ossis, ner-
ui, cartilaginis, ligamenti, membranæ, & carnis: secū-
da autem, instrumentalium: vt cerebri, cordis, & confi-
milium: tertia deniq; totius corporis. Corpus siquidē,
ex instrumentalibus cōstat: instrumentales autem par-
tes, ex similaribus: illæ deniq; ex simplicissimis elemē-

Morbus est uel operationis, uel structuræ oblatio.

Sanitas definitur aptitudine operationis, moderatioq; existit.

Morbus quorū immoderatio dicatur.

Morborū simplicium genera tot sūt, quot simplicia elementa.

Cōpositio corporis nostri est triplex.

3.

Tomus. III.

A a a

4.

tis constituuntur. Porro si elementa constituamus impassibilia esse (ut nonnulli autumant) duobus tantum morbis particulæ similes prementur: meatuum videlicet astrictione, & eorundem relaxatione. Fruentur autem sanitate absoluta, dum eorum elementorum constructio fuerit comoderata. At si nostri corporis elementa

Elementa corporis nostri mutuo inter se patiuntur, ac tota per tota miscentur.

Elementa primaria sunt quatuor.

Sanitas et morbus unde exoriantur.

Similium particularum simplices morbi, quatuor.

Dissimilium partium morbi, quatuor generibus continentur.

Instrumenta prima sunt quæ ex similibus partibus, unius functionis gratia sunt constituta.

Instrumenta secunda quæ.

mutuo inter se patiantur, & tota per tota implicentur (id quod inconcussè est tenendum) totidem simplices morbi dicendi sunt, quot primaria elementa censent. Primaria autem elementa sunt quatuor, calidum scilicet, frigidum, humidum, siccum: ex quibus moderatè confusis, oritur sanitas: immoderatè verò, ægrotudo. Erunt itaque similiarum particularum simplices morbi quatuor numero: caliditas videlicet, frigiditas, humiditas, atque siccitas, ubi earum qualitatum singulæ, naturæ modum excesserint. At morbi partium instrumentalium, tum illis qui ex impatibilibus constare corpora dicuntur: tum nobis, qui ex elementis affectioni subiectis, ea constari arbitramur, prorsus existunt communes. Sunt autem eorum genera quatuor. Primum enim est, ubi forma conueniens membro fuerit vitata: secundum, ubi in numero reperitur vitium: ut si quid desit, quod haberi erat opportunum: aut redudat aliquid minimè necessarium. Tertium genus consistit in organi magnitudine, ubi aliquid impensius adustum sit, aut similiter diminutum. At quartum genus refertur depravatæ compositioni: quæ fieri solet aut naturali positu variato, aut mutata partis copula. Porro prima instrumenta dicuntur, quæ quum assentur ex particulis similibus, unius operationis gratia sunt constituta: ut musculus, atque vena. At quæ rursus ex his constantur, ut digitus, atque hoc magis pes, instrumenta secunda dicuntur. Væ utrisque instrumentis erunt ipsi morbi còes. Aliud autem genus morbi, præter iam dicta, nullum est reperire, quod sit proprium vel simplicibus, vel compositis partibus. Est

D I F. M O R B. L I B.

tamen vnus morbus communis corporibus similari-
bus iuxta & dissimilaribus, nempe vnitatis diuor-
tium. Ad reliquas tamen simplicium morborum in par-
tibus similaribus differentias examinandas nos conuer-
tamur. Igitur impatibilium elementorū authores, duas
in similaribus corporibus ægritudines statuebant: nem-
pe aut astrictionem, aut relaxationem meatuum: qua-
rum singulæ, in alias rursus differentias secantur. Astri-
ctio siquidem fit, quum aut totum corpus simul cōtra-
hitur: aut soli obstruuntur meatus: relaxatio autem, vbi
vniuersum corpus simul i omnem partem laxatur: aut
soli aperiuntur meatus. Similiter iuxta opinionem se-
cundā, morborum partium similarium duplex differen-
tia nobis oritur. Nam interdum quidem solis qualitati-
bus alterantur: interdum autem, cum humorum afflu-
xu qui sanè secundus modus, tumorem conspicuū ex-
citāt. Cæterum vna & item altera harum differentia-
rum, varias differētiās sortitur. Vt autem ad partium
instrumentalium (quarū sanè imbecillitas vel ob mea-
tuum ametriam, vel ob intēperiem nascitur) discutiē-
dos morbos nos cōuertamus, Totius instrumenti fun-
ctio tunc p̄cipuē vitiabitur, vbi pars ipsa, quæ functio-
nis ē causa, ægrotarit. Quāq̄ & reliquarum partium,
illi inserviētiū, vehementiores affectus, actionem
ipsam impediunt. Oblæsiones igitur quæ omnino pro-
pria ratione, immediateq; operationem totius organi
offendunt, aut saltem impediunt, ægritudines sunt pu-
tandæ. At si minimè id per seipsas moliantur, sed ea so-
lū ratione, q̄ primi instrumenti efficiunt operationi,
causæ morborum sunt, non itē morbi. Dupliciter autē
solet vnusquisq; morbus contingere in partibus instru-
mentalibus. Nam aut sequitur alios morbosos affectus:
aut contrahitur à prima generatione. Porrò vbi pars
aliqua in tumorem attollitur, atq; iccirco meatus illius
occluduntur, si quidem talis particula nullam habeat

3
Solutio conti-
nui est morbus
cōmuns tam
similaribus, q̄
dissimilaribus
partibus.
5
Similariū par-
tium morbi, se-
cundū cōstitū-
tes impatibilia
elemēta, astri-
ctio et laxatio.

Similariū par-
ticularum sin-
guli morbi sūt
duplices: quā-
tenus aut solis
q̄litatibus, aut
accedente hu-
morū affluxu,
afficiunt.
6

Instrumenti fun-
ctio quando vi-
tiatur.

Affectus pri-
mario lædēs
functionē, sunt
morbi.

Causæ morbo-
rū quæ dicēde.

Instrumentalis
morbus dupli-
citer accidit.
7

Morbus in for-
matione.

Functionis læ-
sio, nō morbus
sed passio aut
symptoma vo-
catur.

Causa morbi
quæ sit dicēda.

8. Morbus in nu-
mero duplex:
cuius utraque
differentia bi-
fariā scinditur.

9. Gurgulio præ-
cisus perturbat
uocē pectusq;
& pulmonem
refrigerat.

propriam operationem, obstructio ipsa meatuum dice-
tur morbus dūtaxat: tumor verò nequaquā, sed obstru-
ctionis causa. Cæterum si affecta pars aliqd̄ munus pro-
prium obtineat, hac ratione tum obstructio ipsa, tum
particulæ tumor, morbus est appellādus. Quemadmo-
dum, exempli gratia, si tunica alicuius venæ, quæ i gib-
bis hepatis est, adeo itumescat, ut eius cavitās obstrua-
tur: tumor quidem ipse, morbus diceretur, & sanguifica-
tionem oblædat: obstructio autem similiter, quod im-
pediat distributionem. Siquidem qui affectus primò læ-
dunt operationē, ii et sunt, & verè dici morbi merent̄.
At opationis oblæsiō, passio aut symptoma, non mor-
bus, est appellanda. Qui verò ipsam induxit affectus,
morbus absolutè vocatur: sicuti & causa morbifica, quæ
quid ipsum morbum pepererit, si aliam læsionem non
adferat. Attulimus itaq; exemplum morbi, quod in ge-
nere formationis consistit. At in numero, duas differē-
tias morborum assignaueramus: quum scilicet aliqua
particula crescit, aut superabundat. Quarum differen-
tiarum utraq; rursus in binas alias secatur. Siquidē eo-
rum quæ superfluunt, nonnulla planè sunt ex genere
naturalis: ut si cui sextus adnascatur digitus: nonnulla ve-
rò toto genere præter naturam: veluti si in ventre gi-
gnantur vermes, aut in vesica lapis. Similiter deficien-
tium particularum, nonnullæ quidem penitus abolitæ
sunt, nonnullæ verò ex dimidlo præcisæ: utrunq; aut̄,
aut natura, aut morbo. Ex his tamen, quæcūq; functio-
nem impediunt, eadem ratione in morborum genere
continentur. Quæcūq; verò partem aliquam opera-
tioni dicatam, vel refrigerant, vel non satis ei alimen-
ti transmittunt, causæ morborum dicuntur. Quædam
tamen & morbi, & morborum causæ censentur: ut si
gurgulio radicitus præcidatur. Nam & vocem pertur-
bat, & pectus & pulmonem refrigerat. In magnitudi-
ne etiam varii morbi contingunt: ubi scilicet to-

D I F F E. M O R B. L I B.

tum corpus vel pars aliqua, aut in prima generatione aut ob aliquem affectum præter naturā, vel prodigiosam contraxit molem, vel præter modum est imminuta. Qui morbi in deprauata compositura cōsistunt, varias differentias sortiuntur. Alii siquidem fiunt, vbi naturalis partium situs variatur. Alii vbi ligamēta nimis soluuntur, ac relaxantur. Alii vbi illa impense fuerint ascripta. Quippe immodica linguæ vincula, loquendi mādendiq; impediunt functionem: pudēdorum verò, ob auersum meatū, impedimēto sunt, quo minus procul reſtaq; excutiat ſemē. Reliquum autē est quintum ægritudinis genus, nempe vnitatis solutio, quæ tam similibus q̄ dissimilibus partibus accidere potest. Nam si in manu, gratia exempli, neruus aliquis præcidatur oīno, talis solutio erit communis, & toti instrumento, & ipsi præcisæ particulæ. Quod si non integrè, sed aliqua ex parte præcisus fuerit, solius nerui propria iudicatur affectio, instrumenti verò nequaq; nisi ex accidēti. Sed pro differentia particularum, continui solutio varia sibi nomina vendicat. Siquidem quæ in osse fit, ab omnibus fractura vocatur. Quæ verò in carne contingit, vulcus, vulnus, atq; ruptura. Quæ nervosis particulis accidit, conuulsio nominari consuevit. Diximus itaq; simplicium differentias morborum. Supereſt autem nūc, vt ad cumpositorum dignotionem veniamus. Erit igit iuxta hæresim priorem i particula similari morbus cōpositus, dum illius, hi quidem adstringuntur: hi verò relaxantur, meatus. At iuxta eos, qui elementa esse alterationi obiecta contendunt, quatuor numero compositi morbi cēsentur: nempe calidus simul & humidus: calidus simul & siccus: frigidus iuxta & humidus: frigidus atq; siccus: dum vtraq; videlicet qualitas excellit plus q̄ naturæ conueniat. Quod si etiā qualitatibus illis plus iusto auctis, accedat pariter humorum affluxus, totidē morbi nascentur, differentes nimirum ab illis, qui inua-

^s
Morbus in magnitudine.

10.
Morbi in deprauata compositiōne.

11.
Vnitatis solutio utriusq; partibus existit morbus cōis.

Solutionis continui species diuersæ, pro differentia particularum

12.
Similariū morborū cōpositorum differentia quatuor, iuxta cōstituētes partibilia elementa

Affluxus humorum gignit quatuor differentias morborum compositorum.

Solo continui. dunt sine humorum colluue. Similiter solutio cōtinui
 miscetur morbis compositis secundum vnam & alte-
 ram sectam, necnon simplicibus, quorum à principio
 mentionem fecimus. Porro omnes inflammatae simul
 & exulceratae particulae, tres quidem necessariò: non-
 nunquā quatuor morbos patiuntur. Voco autē imprae-
 sentiae inflammationem, rubentem renitentemq; tu-
 morem, & qui dolorem inferat. Quia verò omnes fe-
 rè id genus tumores, mutuo inter se commiscentur, ra-
 roq; reperire aliquē ipsorum purum atq; synceae licet,
 necessariò dicendum est, Erysipelas, herpetem, carbun-
 culum, cancrum, atq; alios id genus tumores, esse com-
 positas ægritudines. E quibus carbūculus quidem, sem-
 per cum vlcere inuadit: cætera verò, iterdum citra vl-
 cus infestant. Gignitur autem erysipelas à ruffa bile: ab-
 atra cancer: inflammatiō à sanguine: à pituita deniq;
 oedema, existens tumor laxis & cedens. Qui humores
 tametsi specie sint humidi, potentia tamen non omnes
 humidi sunt. Quippe atra bilis sicca est & frigida: flaua,
 calida & sicca: vt pituita frigida & humida: ac sanguis
 deniq; humidus simul & calidus. Igitur de morbis cō-
 positis similarium particularum dictum nobis quā sit,
 ad eos qui instrumenta discruciant, sermonem iam
 conuertamus. Proprii dissimilarium partium dicentur
 morbi compositi, qui plures atq; diuersas partes simul
 affligerint: ex accidenti autem, qui vnicam tantū in-
 strumentorum particulam occupauerint. Etenim si lip-
 pitudine obsideatur tunica incumbens corneae, quum
 lippitudo quidē sit inflāmatiō ipsius partis: inflāmatiō
 aut oīs existat cōpositus morbus, nemini dubiū est, lip-
 pitudinē futurā ēē morbum cōpositū, tunicae quidē ipsi
 proprium, ex accidenti verò vniuerso instrumēto. Cæ-
 terū si pterygium, suffusio, ac deniq; angulorum co-
 arctatio simul ipsum oculum presserint, constitutio ta-
 lis, totius oculi dicetur ægritudo composita: quum ni-

Inflammatē si-
 mul et exulce-
 ratae particulae,
 quot morbos si-
 mul patiantur.
 Inflāmatiō qd.

Carbunculus
 inuadit semper
 cum ulcere.
 Tumorū præ-
 ter naturā sin-
 gulis sui humo-
 res tribuuntur.
 Humorū qua-
 tuor, quali qsq;
 tēperie sit præ-
 ditus.

13.

Dissimilarium
 partium morbi
 compositi, qui
 sint dicendi

Lippitudo est
 inflammatiō tu-
 nicæ incumben-
 tis corneae.

CAUSIS MORBID.

7

mirum vno eodemq; tempore diuersæ particulæ con-
tristentur. Nihil autem refert si dixeris vnicam esse cõ-
positam ægritudinē, an plures, sed in diuersis partibus
constitutas.

GALENI PERGAMENTI DE

causis morborum, Liber vnus.

NVnc verò ad morborum qui secundum sectam
generosiores partes similes inuadunt, causas
discutiendas nos conuertamus, idq; à calore immode-
rato auspiciati. Vniuersa corpora plus æquo incalefce-
re solent, vel ex motu improbo, vel ex putredine, vel
ex consortio alterius corporis feruidioris, vel ex astri-
ctione, vel ex alimento ad accendendam caliditatem ac-
cõmodo. Cæterum vbi quis immodica exercitatione
vñsus fuerit, si calor inde ortus non occupauerit totum
corpus, lassitudinem tantum inducit: videlicet, articu-
lorum & musculorum, ad quos præcipuè mouendi mu-
nus spectat. Si verò extēdatur per vniuersum corpus,
febrim accendit. Ex ira etiam, quæ caloris iuxta cor ē
veluti quidam feruor, vbi is per totum corpus disper-
gitur, solet febris succendi. In tumorib; etiam præter
naturam, vbi humores putrescunt, calor interdum cor-
di sensim cõmunicatur, ac deniq; excitatur febris. Qua-
re hñc venit intelligenda secunda & tertia causa calor
præter naturam. Nam ob putredinem, & ob viciniam
partis contabescentis in iis tumoribus febrilis calor ac-
cenditur. Quarta species causæ consistebat in astrictio-
ne, & quidem meritò. Nam si ob astrictam cutim cohi-
beantur diffilari ea, quæ prius diffilari consueuerant, si
quidem fuliginosa fuerint, in specus cordis conuersa,
eos exurunt, protinusq; febrim accendunt. Calidorū
etiam alimentorum vsus, (in eo enim quintum genus
constituebamus) interdum febrim accendit: sicuti &
acria medicamenta, siue remedia sint, siue deleteria &
contraria. Non autem ex æquo omnes hæc ob causas

Calor immodi-
cus a quibus ac-
cendi occasio-
nibus possit.

Mouendi mu-
nus ad articu-
los et musculos
pertinet.

Ira est calor
qui iuxta cor
est, veluti qui-
dam feruor.

Febris ex astri-
ctione quomo-
do oriatur.

Aaa iiii

Febrire cum nō
contingat ex
æquo oibus.
Febri gignen-
dæ quæ requi-
rantur.

Causas antece-
dentes dici, quæ
in corpore oriū-
tur: vt pro ca-
tarcticis, quæ
adueniunt ex-
trinsecus.
Frigiditatis im-
modicæ, causæ.

Apoplexia vñ
de interdū con-
trahatur.

Epilepsiam vñ
de fieri contin-
gat.

Vinum modi-
ce sumptū, mi-
re calorem au-
get.

Cibi oēs alen-
tes plurimū, i-
modice sumpti
frigidus mor-
bos gignunt.

febricitant: q̄ nec semper illis contingat par quantitas
aut actiuitas causæ: quodq; animantium corpora pluri-
mum alterum ab altero differant. Etenim ad hoc vt ac-
cendatur febris in corpore, oportet vt corpus ipsum
sit accommodatum & habile, ad excipiendam febrilem
caliditatem: causa aut efficiens existat valida, tempusq;
& patientis proximitatē sortiatur: vt videlicet ī actio-
ne immoretur diuti⁹, & passuro corpore superior eua-
dat. Porro causæ quæ in corpore humano præter na-
turam oriuntur, causæ antecedentes vocantur: proca-
tarcticæ verò, siue euidentes, quæ extrinsecus adueniē-
tes occurrant. Frigiditatis etiam plurimæ existunt cau-
sæ: veluti frigidorum propinquitas, alimentorum quā-
titas atq; qualitas, astrictio etiam atq; laxatio, ociū de-
niq; & motus immoderatus: quibus ex occasiōibus cō-
stat etiam ipsum ignem extingui. Prima igitur species
causæ, occurrans extrinsecus, siue contactu ipso, siue et
potentia, solet frigiditatis morbum inducere. Ob secū-
dam verò, nempe ob frigidiora alimenta, nonnullos cor-
reptos vidim⁹ attonito aut epileptico morbo, aut alio
quopiam modo refrigeratos, id quod ex ebrietate vel
maximè accidere solet. Quamq; vinum modicè haustū,
quum familiare alimentum sit, mirè calorem auget.
In vniuersum autem, omnes optimi cibi, qui animali
plurimum nutrimenti adferunt, si supra modum sumā-
tur, frigidus morbos generāt: sicuti & cætera, quæ na-
tura refrigeratoria quum sint, similiter ingerūtur. Iu-
xta tertium genus causæ, nempe astrictionem, sæpissi-
mè corporis habitus etiam refrigeratur: vt quæ inter-
dum sopores graues, veterumq; & apoplexiam indu-
cat. Astrictione autem tunc præcipuè torquetur cor-
pus, dum venæ ipsæ & arteriæ, adeò turgēt & intume-
scunt sanguine, vt nullus relinquatur locus inanis, in
quem, vbi dilatantur, ambientem aerem possint exci-
pere. Quo quidem dum defraudantur, nativus calor sē-

bitò ferè extinguitur. Proinde qui sic sunt affecti, actum destituuntur motu simul & sensu: id quod Hipocrates significasse videtur, dicens: venarum (hoc è artèriarum) interceptiones statim vocem eripere. Igitur cordis calor per meatum gutturis, cum ambiente nos aere commercium habet. Quam viam si præcluseris, illico præfocaueris animal. Calor autem qui in omnibus est arteriis, per cor quidem, quatenus viam habet ad fauces, & per vniuersam cutem, in circūfluum aerē transpirat: ac ventilatur quidem, dum attolluntur artèriæ: purgatur verò à fuligine, dum contrahuntur. Atq; utroq; horum, naturalis ipsius modus seruetur. Si igitur tali motionis vicissitudine ob astrictiōē destituatur artèriæ, necessum est calorē extingui, corpusq; omnino refrigeratum emori. Cæterum si corpus referatū fuliginoso excremento astringatur, aut excitabitur febris, aut extinguetur calor natiuus: sin verò halituofo vapore sanguinis, aut fiet corpus ipsum plethoricū, aut eius calor increfcet. Sed quemadmodum astrictio sæpius frigefactionis est causa: sic etiam & rarefactio, vbi plus q̄ ex vsu sit, dissipat dispergitq; natiuum calorem, frigidius efficit corpus. At verò, perinde ac astrictio ipsa interdum vniuerso corpori, nonnunq̄ alicui eius parti accidere solet: eodem etiam modo habet & rarefactio. Porrò quæ extrinsecus adinouetur, partem ipsam raram, vel constipatam reddere possunt. At vincula artissima, & vita membrum priuāt, & ipsum impensè refrigerant. Sed iam de siccis affectibus opportu num est vt dicam⁹. Si quis multo magis diffletur, q̄ pro modo alimenti assumpti, vtaturq; cibis siccioribus, facile in siccam ægritudinem delabatur: præsertim si curis & anxietatibus, necnō vigiliis torqueatur. Sicca èt tēperies aeris, balnea quæ desiccādi vī obtinēt, necnon medicamēta, quæ itus & foris administrata, exiccandi possidēt facultatē, sicut corpora exiccāt. Humidorū mor

Arteriāū interceptiōes cur vocē eripiant. Suffocatio quā accidat.

Calorem cordis ventilari dilatatione artèriarū: purgari cōtractione earundem.

Astrictio sæpe frigefactionis est causa. Rarefactio: quæ ratione refrigeret.

Admota extrinsecus. Vincula artissima, vita membrum priuant.

Siccæ intemperiei causæ.

4.

5.

**Humidæ intē-
peratiæ causæ.**

6. **Compositorū
morborū cau-
sæ compositæ
sunt.**

**Contrariis in-
tēperantiis cor-
pus nostrum si-
mul posse af-
fici.**

**Inæqualis intē-
peries quæ sit
dicenda.**

**Humorum sin-
gulorum tem-
peries.**

**Tumores par-
tium variari, p
humorū diffe-
rentiis fluētū.
Facultates na-
turales sunt
quatuor.**

**Excrementum
omne qualita-
te aut quanti-
tate infestare :
semperq; a for-
tioribus adpar-
tes imbecillio-
res protrudi.**

**Cutis est oīum
ibecillima ps.**

boꝝ oēs sunt causæ contrariæ: nēpe maxima ciboꝝ hu-
mectantiū colluuiēs, molliuscula viuendiro, animi sum-
ma trāquillitas, ac deniq; balneaz dulciū vīus immode-
ratus, maximeq; post cibum. Ad idem facit desidiosa
vita, pluuiarum copia, humida temporis cōstitutio, ac
breuiter, humectantia medicamenta. **Iam verò causæ**
compositorum morborum, similiter compositæ sunt.
Si enim calida simul & sicca in vnum aliquando conspi-
rent, calidus simul & siccus sequetur morbus. Itidem ē
cogitandum & in aliis combinatiōibus. At sæpius cau-
sæ natura similes corpus ipsum inmutant. Plerunq; ta-
men viribus pugnant contrariis: ita vt aliquando con-
tingat corpus simul fieri calidum atq; frigidum, sicuti
& siccum & humidum, plusq; naturæ conueniat: etiā si
minimè id fieri posse videatur: quæ inæqualis intempe-
ries vocatur. Aduertendum autem est rursus, torpora
ipsa interdum à solis qualitatibus alterari, quandoque
etiam, ab illis quidem, sed accedente aliquo affluxu, hu-
mido quidem specie, facultate verò non item. Flaua si-
quidem bilis potestate est calida & sicca: atra, sicca &
frigida: sanguis, humidus atq; calidus: pituita deniq;
frigida & humida. Quorum humorum singuli, interdū
synceri & puri, interdum inuicem misti, solent in imbe-
cillio rem partem confluere: ob idq; tumores partium
variantur. Etenim quum quatuor sint facultates, quib;
quælibet pars tum animalis, tum plātæ prædita est, at-
tractrix, retentrix, alteratrix, expultrix: excrementūq;
omne aut qualitate, aut quantitate offendat: nec sit par
robur omnium particularum: semper quæ fortior est,
excrementum ipsum ad imbecillio rem propellit. Om-
nium autem imbecillima est cutis, totius corporis ex-
crementa recipiens. Assignatis iam causis morborum
similariū particularū, ad organicos deinceps nos cō-
uertamus, exordium à formatione vitiata sumentes.
Euariat enim interdum naturalis figura, dum ob ma-

ximam materiæ colluuiem, aut ob qualitatem incōmo-
 dā, impedito feminis motu, in vtero deprauatur ipsius
 fœtus formatio. Secūdo autem potest vitari alicuius
 particulæ forma, dū ifantes nō rectē ab obstetricibus,
 excipiuntur (facilē siquidem peruertuntur, molles flu-
 xilesq; quum sint) aut ruditer inuoluuntur fasciis, aut
 lac tabefactum sugunt, aut perperam educantur, siue
 inepta victus ratione, siue exercitiis intempestiuis. Cru-
 ra quippe, ob incumbentium eis corporum pondus, in-
 terdum in exteriorem, nōnunq; in iteriorem partē tor-
 quentur: idq; pro natua ipsorum inclinatione. Nā qui-
 bus rectiora sunt, q̄ ordo naturæ postulet, magna ex
 parte fiunt vatii: vari autē, quibus magis curuata. Vo-
 co enim vatium, cui in exteriorem partem crus verti-
 tur: varum cui econuerso. At postea q̄ adoleuerint, sæ-
 pe ob repletionem immodicam, aut ob alimenti penu-
 riam, figuram naturalem permutant, idq; primaria ra-
 tione. Illud enim in elephantiasis: hoc in tabe perspicuū
 est. At ob resolutionem neruorum, distentionem, inflā-
 mationem, aut scirrhum, naturalis membri figura ex
 accidenti vitatur. Siquidem in iis qui altera parte sunt
 resoluti, membrū trahitur a musculis actionem facien-
 tibus: at in iis quos in altera parte conuulsio exercet,
 aut phlegmone, aut scirrhus, aut dura cicatrix, pars sa-
 na trahitur ab affectis musculis. Cavitates partium atq;
 meatus pereunt, vel offenduntur, q̄ nimirū coalescāt,
 aut constipentur, aut obstruantur, aut confringantur,
 aut in sese concidant. At facultatis retentricis motus i-
 moderatus solet esse causa constipationis: quemadmo-
 dum laxitatis, operatio expultricis immodica, retēri-
 cisq; languor. Exasperantur læuia, & læuigantur aspe-
 ra (nam hæc ad formam vitiatam pertinent) illa qui-
 dem ob acres humores, aut medicamenta abstergētia:
 hæc verò ob pinguitudinem succi, viscositatem ue-
 Secundi generis, hoc est vitiati numeri, causæ sunt, si uari causæ.

Forma mēbro
 conueniens a
 quibus causis
 possit vitari.

Vatii qui fiāt.

Vari qui fiāt,
& qui dicātur.

Elephantiasis.
Tabes.

Resolutis alte-
ra parte muscu-
lis, membrum
trahitur a reli-
quis, q̄ in actio-
ne versantur.

Conuulsi alte-
rius partis mu-
sculi, ad se par-
tem valentē al-
teram trahunt.
Constipationis
causa.

Laxitatis cau-
sa.

Numeri deprauati causæ.

9. Magnitudinē
partis quę cau-
sę possint auge-
re, ac minuire.

10. Cōpositio par-
tis vitiosa vn-
de accidat.

Enterocēles ge-
neratio.

11.

Solutę vnita-
tis causę.

Caries vnde
gignatur.

Collisionis
causę.

Ruptio.

Conuulsio.

quidem numerus sit diminutus, sectio, aut putrefactio,
aut immodica refrigeratio: sin autem aliquid supercre-
uerit, quod non sit ē numero partium natura constan-
tium, formamq; naturalem sortiatur, abundantia opti-
mę materię erit causa. Quod si id ipsum prę se formā
non naturalem ferat, materię qualitas non naturalis
etiam erit in causa. Vtrobique tamen vires validas esse
oportet. Alioqui nec conformari poterit quod est vti-
le: nec extrudi qđ vitiosum existit. Natura enī vtrūq;
molitur. Magnitudo partium augetur (i ea enim oblę-
sa tertium genus constituēbamus) à copia materię be-
nignę, necnon à potentię robore: imminuitur autem
à causis contrariis: vel ob sectionem, vel exustionem,
vel putrefactionem, vel deniq; ob frigectionem in-
gentem. Quantum verò morborum iustamentalium
genus, quod in praua compositione consistit, iterdum
ob repentinam improbāq; agitationem contingit: in-
terdum ob articulorum humiditatem immodicā: quā-
doq; ob euersionem superciliorum in ipsis articulis: est
quum ob relaxationem compositio vitietur, quem-
admodum in intestinorū lapsu, quę laxato peritonæo
in scrotum descendunt. Ex his itaq; & aliis plurimis oc-
casionibus, organorum compositio peruertitur. Nunc
verò alteri generis causas examinemus, quod vtrisque,
tam corporibus similaribus, q̃ instrumentalibus cōmu-
niter accidit: id enim est vnitatis solutio. Quę quidem
si carni accidat, vlcus aut vulnus vocatur: sin autem os
si, dicitur vel fractura, vel caries: quę ab erodentibus
oritur humoribus. Ad capitis ossa, complura instituta
sunt nomina. Collisio, magna ex parte accidit carni:
q̃q; & in osse nonnunq; etiam contingit, idq; maximē i
pueris, sub irruente extrinsecus aliquo violento, vali-
do, ac duro corpore. Ad solutionem etiam continui p-
tinent & ruptio, & conuulsio, hæc in neruis, illa in car-
ne consistens: quę causam suę generationis habent

repentinum, validum, atq; inæqualem motum. Ut igitur paucis expediam, omnium huiusce generis ægritudinum causæ, nonnullæ quidem occurrunt extrinsecus: nonnullæ ab ipso corpore emanant. Porro extrinsecæ sunt, ea omnia quæ percutere, collidereq; sunt apta. Quæ verò à corpore emergunt, sunt immodicæ inordinateq; animalis motiones, ac præterea humores vitiosi, erodendi vim possidentes. Hæ itaq; sunt simplices ægritudines similaribus partibus, organicisq; communes: ac præterea ipsarum simplices causæ. Compositas autem ægritudinum causas, non est admodum inuenire difficile, quā nimirum ex his quas diximus, constituentur.

GALENI PERGAMENI

de Symptomatum differentiis, Liber vnus.

Omnis præter naturam affectus, aut morbus est, aut morbi causa, aut illius symptoma. Est autem morbus, affectus quidam præter naturam, functionem lædens. Cæterum differt affectus à morbo, nam ille quidem extenditur etiam ad sanos & neutros: hic verò solum circa ægrotantes versatur: quum nimirum sanitati contrarius existat. At ab utrisq; dissidet, quod Græci pathos, Latini passionem appellant. Est enim passio motus qui ab altero fit in alterum: ita ut agentis motus dicatur actio: motus verò eius quod affectum est, passio. In summa, ipsum affici, quodammodo idem quod pati est. Differt itaq; ab affectu passio, ipsius tantum motionis ratione. Quandoquidem in ipso verti & mutari, præterea alterari, & moueri, passio habet generationem: in eo verò quod manet, prorsus affectus consistit. Proprie igitur affectus dicitur passio iam facta: non autem quæ etiamnum fit. Sed quemadmodum ad sanos & ægros ipse affectus extenditur, sic etiam & passio: quo quidem nomine à morbo similiter differt. Rursus affectus ipse, alius quidem naturalem actionem efficit: alia verò euertit & labefactat. Est igitur sanitas,

Affectus præter naturam est triplex.

Morbus est affectus præter naturam functionem lædens.

Affectus & morbus ut differant.

Passio quid.

Actio quid.

Affici quodammodo est idem quod pati.

Passio versatur in motu.

Affectus consistit in permanentia.

Passio, ut affectus, ad sanos extenditur.

Sanitas quid.

naturalis quidam affectus functionis author : morbus autem, affectus præter naturam, oblæſæ functionis cauſa. At paſſio, motus eſt in materia, q ab agente fit, actio

Cauſa quid.

verò, ipſe motus agentis. Quod autem ſuapte natura aliquid confert ad eius quod fit generationem, cauſa

Cauſa multi-
pliciter dicitur.

vocatur: quæ quidem & ipſa multiplex eſt. Nam materia, utilitas, ſcopus, inſtrumentum, initium deniq; unde proficiſcitur motus, hæc omnia cauſæ dicunt. Quæ

Cauſæ rōnem
eius ſine quo
nō, obrinētes.
Fieri per ſe, &
ex accidenti,
quid ſit.

verò nihil conferunt, ſed tamen ab iis quæ conferunt ſeiungi non poſſunt, hæc eius ſine quo non, rationem obtinent. Aduerte autem, aliquid fieri per ſe, idem eſſe quod primò: ex accidenti verò, quod ſecundò. Vt ſi qſ digito vnum calculum moueat, à quo moueatur & alius: per ſe quidem dicetur mouere primum: ex acciden-

Morborum
cauſæ.

ti autem ſecundum. Ad eundem igitur modum, qui affectus præter naturam ſuapte ratione actionem nō labefactant, ſed per morbos à ſe productos, ii non mor-

Morbi primo
lædūt functio-
nem.

bi, ſed morborum cauſæ, ſunt appellandi. Morbi enim ſunt, qui primò lædunt actionem. Porro quod morbū

Symptoma ē
quod ſequitur
morbum.

veluti vmbra, ſequitur, id morbi ſymptoma vocatur: quemadmodum functionis læſio. Eſt autem ſymptoma largè ſumptū, omnis à naturali ſtatu mutatio: ob idq;

Symptoma
large ſumptū
quid ſit.

quicquid animali præter naturā accidit, ea ſignificatio ne eſt ſymptoma. Quamobrem morbus quadantenus etiam ſymptoma dicitur: ſicuti & cauſa præter naturam.

Symptoma
ab actione &
morbo quo
differat.

Differat autem à paſſione ſymptoma (tamenſi interdū in idem coeant) q paſſio quidem, omnino in motu

verſetur, ſitq; interim ſecundum naturam: Symptoma verò, non in motu tantū, ſed in habitu etiam & permanētia eſſe poſſit, omnino præter naturam. A morbo verò differt, quoniam neq; affectus neceſſariò eſt, neq; actionem ex neceſſitate lædit: quæ ſanè ad con-

2. Symptoma p-
prie dictum, ē
triplex.

ſtituendum morbum deſyderantur. Porro ſymptoma ta propriè ſtrictèq; ſumpta (de quibus agere eſt animus) differentia triplici continentur. Alia ſiquidem no-

SYMP. T. DIF. LIB.

155

stri corporis sunt affectus: alia functionum læsiões: alia
ambo hæc comitantur: vt sunt excrementorum imo-
dicæ tum excretiones, tum suppressiones. Cæterū sub
actionis læsione, priuatio quoq; mihi inaudiat, quē-
admodū immobilitas, insensibilitas, atq; cruditas: quæ
quidem actionum læsiones sunt. Has igitur symptoma
tum differentias deinceps examinemus, ab actionis læ-
sione auspicati. Actionum læsio duplex est. Altera enī
ad animalem: altera verò ad naturalem functionem p-
tinet: Actiones siquidem duplices potissimum numerā-
tur: naturalis videlicet & animalis. Rursus animalis di-
uiditur in sensibilem, motiuam, atq; gubernatricem.
Quorum membrorum singula rursus in alia secantur.
Sensibilis quippe animæ functio, quinq; differētias for-
titur, visuam scilicet, olfactoriam, gustatoriam, audi-
toriam, atq; tactricem. Motiua autem facultas, quum
vnicum instrumentū habeat, vnum tantū habet
motionis modum: variatur tamen pro particularium
instrumentorum diuersitate: Vltima functio animæ,
quam diximus esse gubernatricem, in imaginatricem,
ratiocinatricem, ac deniq; memoratricem diducitur.
Igitur noxæ omnium actionum sentiendi, communes
quidem, vniuersalesq; sunt, insensibilitas, & difficultas
sensus: particulares autem, quæ in singulis sensibus re-
periūtur: quemadmodum in oculis cæcitas, & caligo:
in auribus surditas & hebetatio: atq; in aliis similiter,
vbi videlicet actio abolita est, aut deprauata, aut dimi-
nuta. Cæterū tactus in actione sua, q̄ reliqui sensus,
multo grauius symptoma, quum ab extrinsecus occur-
rantibus, tum vel maximè ab affectibus interioribus,
solet recipere. Etenim alii sensus, nō ab internis, sed ab
externis affectibus, in functionibus suis p̄tristantur: ac
ne id quidem per se, sed ex accidenti, q̄ videlicet in se
habeant facultatem tangendi. Est enim tactus omnib⁹
sensoriis sensus quidā cōmunis: reliqui verò quatuor,

Actiōnū læsio
est duplex: al-
tera ad aīalē,
altera ad natu-
ralē functionē
pertinens.

Actiō anima-
lis est triplex.
Sensibilis aīæ
functio est quī-
tuplex.

Motrix fūctiō
uariatur, p̄ in-
strumentorum
diuersitate.

Gubernatrix
aīæ functio est
triplex.

Sentiēdi actiō
nū læsiones cō-
munes & par-
ticulares.

Tactus, q̄ reliq;
sensus, multo
grauius afficit.
Sensus reliqui
a tactu, ab ex-
ternis cōtristā-
tur duntaxat:
idēq; rōne ta-
ctus quem pos-
sident.

Tactus est omnibus sensoriis cōis sensus.

Sensus communis symptoma est vigilia, venter nūq̃.

Motricis facultatis symptoma est triplex.

Motus deprauati species.

Epilepsia quid.

Apoplexia quid.

Imaginatricis facultatis symptomata.

Ratio cinatricis facultatis symptomata.

Amentia quid.

Fatuitas quid.

Delirium quid.

Rationē interdū vitari, imaginatione atq̃ memoria illaesis: sicuti cōtra

4.

Naturalium facultatum singulis duplex tribuitur symptoma: nempe & abolitæ functionis, & non rite obitæ.

suū quisq̃ tantum est proprius. Quamobrem oculi sæpissime graui dolore cruciantur, contristato sensu tangendi. At verò vigilia & venter sunt ipsius cōmunis sensus symptomata. Motricis facultatis triplex reperitur symptoma: immobilitas: diminutus motus: ac deniq̃ deprauatus. Cæterum deprauatus motus, alius tremulus est, alius conuulsiuus, alius palpitans, alius deniq̃ vibrans. Porro si conuellatur vniuersum corpus, aīa q̃ princeps potentia simul sit impedita, id symptoma epilepsia vocatur: apoplexia autem, dum totius corporis perit omnino motus, simulq̃ principes actiones cohibentur. Hæc itaq̃ motuæ actionum sunt vitia. Proximum est, vt gubernatricium functionum iam offensas tradamus, ac primum imaginatricis. Hæc enim interdum tota corrumpitur, exoluiturq̃, quemadmodum in catalepsi: interdum autem vitatur, vt in delirio: est quum deficit atq̃ debilitatur, quod in lethargo contingit. Sic etiā ratiocinatio, nūc exoluitur penitus, ipsumq̃ symptoma est amentia: nūc deficit atq̃ remittitur, vocaturq̃ id symptoma fatuitas: nunc læditur ac deprauatur, quod symptoma vocant delirium. Plerumq̃ siquidem in vtriusq̃ simul cōsistit delirium, tum parum probe imaginando, tum parum aptè ratiocinando. Est quādo dūtaxat in altero. Interdum quippe ratio vitatur, imaginatione simul atq̃ memoria illaesa. Quemadmodum etiam ratione integra, contingit tum imaginatio nem, tum memoriam vitari. Quod autem in memorandi potentia consistent vitia, nemini opinor obscurum. De animalium itaq̃ actionum symptomatis dictum nobis quum sit, ad naturalium symptomata examinanda nos conuertamus. Methodus autem eorum inueniendorum est, naturalium facultatum cognitio: in quarum singulis duplex reperitur symptoma, alterum abolitæ functionis: alterum non rite obitæ, quod quidem hoc est duplex: alterum quod in diminuta, alterum quod in vitata

vitiata actione consistit. Exemplum autem ponamus in
 concoctione ventriculi, quæ interdum quidē tota cor-
 rumpitur: interdum remittitur ob imbecillitatem: in-
 terdum vitiatur. Quorum primum symptoma dicitur
 cruditas: secundum, concoctionis tarditas: tertium pra-
 uitas & vitium vocatur. Porro appetitricis functionis
 symptomata sunt abolita appetentia, & inmodica ci-
 bi cupiditas. Circa nutritionis actionem, si scopum
 minimē attigerit, atrophia & phthisis accidunt. Viti-
 tam verò nutritionem sequitur leuce, ophiasis, alo-
 pecia, & reliqua id gen^o symptomata. Quum igitur na-
 turales facultates sint quatuor, attractrix, retentrix, al-
 teratrix, expultrix, sanē in singulis naturalib⁹ organis,
 quatenus naturalia sunt, duodecim oriri possunt sym-
 ptomata: tribus videlicet in vnāquāq³ facultatem con-
 gestis: in animalibus verò, quindecim. Quod si anima-
 le instrumentum simul & mouendi, & sentiendi vi-
 res obtineat, duodeviginti symptomatum formas ha-
 bere poterit. Ventriculus igitur, duodecim sortit⁹ sym-
 ptomata, quatenus est cōcoctionis organum: totidēq³
 quatenus pars similis, quæ nutriri desiderat. Siquidē
 omnes particulæ quæ nutrimentum suscipiunt, duode-
 cim recipiunt symptomata, nempe tria (vt diximus)
 secundum singulas facultates. Vbi videlicet aut nihil tra-
 hunt, aut languidē, aut vitiosē: vbi id quod attractum
 est, aut non retinent, aut lāguidē, aut vitiosē: vbi quod
 iam retinuerunt, aut penitus crudum relinquunt, aut
 diminutē concoquunt, aut in alienam qualitatem con-
 uertunt: vbi excrementa ipsa expellere nequeunt, aut
 lāguidē, aut perperam, hoc est, citius aut tardius, q̄ ani-
 mali expediat. Ex quibus utiq³ accidit particulas, non
 nutriri, aut imbecilliter, aut perperā & vitiosē. Quod
 verò ī facultatibus similariū particularum dicimus,
 id etiam intelligendum est, in iis quæ ad instrumenta-
 les spectant. Porro alteratrix facultas in ventre tunc

Ventriculi actio
 nis symptoma
 ta sūt, cruditas
 cōcoctionis tar-
 ditas, puitasq³.
 Appetitricis fa-
 cultatis sym-
 ptomata.

Nutritrix a-
 ctionis sympto-
 mata.

Facultates na-
 turales sunt
 quatuor.

Naturaliū in-
 strumentorum
 singulis, duode-
 cim attribut⁹
 symptomata.
 Animalis instru-
 mento quinde-
 cim esse posse
 symptomata.

Similariū par-
 ticularū singu-
 lis quæ nutri-
 mentum susci-
 piūt, duodecim
 attribuuntur
 symptomata.

Alteratrix fa-
 cultas, ventri-
 culi, quando
 abolita, & im-
 becilla, & de-
 prauata dicat⁹.

abolita censetur, ubi cibus talis relinquit, qualis assumptus est. Imbecilla autem dicitur, quæ tardè concoctionem absoluit, sicuti deprauata, quæ in malignam qualitatem cibos ipsos permutat. At absoluta concoctio dicitur, ubi cibus in qualitatem animati familiarem mutatur. Aduertendum tamē hoc loco magnopere est, al

Symptoma unum succedit alteri.

Deiectionē ciborum celerem quæ sequant.

Corruptelam ciborum quæ sequantur.

Morbi, quorum sint causæ symptomatum.

5. Symptomatum quæ in corporum consistunt affectibus, prima differentia est quadruplex.

Naturalia omnia ex commoda temperie nascuntur.

teri symptomati, alterum nonnunquam succedere. Siquidē iniustum complectendi tempus cōtinuò sequitur diminuta concoctio. Præterea celeris deiectionis ciborum inseparabilia symptomata sunt excrementorum humiditas, alimentiq; per corpus imminuta digestio. Corruptelam cibi sequitur necessariò quidem, excremento foetor: non necessariò verò mordicatio & inflatio. Atque horum sanè omnium iam dictorum symptomatum, quæ in actione oblata consistunt, sicuti & aliorum duorum generum, sciendum est, morbos causas existere. Symptomatum quæ in corporum consistunt affectibus, primæ differentiæ sunt quatuor. Siquidē alia ad visum, alia ad odoratum, alia ad gustum, alia deniq; ad tactum pertinent. Etenim quæ ad visum spectant, ea sunt quæ consistunt in colore præter naturam: siue is vniuersum corpus occupet, ut in arcuatis: siue aliquam eius partem, ut in carbunculis. At quæ pertinent ad odoratum, ea in respiratu ac perspiratu deprehenduntur: ut si, gratia exempli, quod indies expirat è corpore, siue per arteriam asperam, siue per vniuersam cutim, graueolens ac putre sentiat. In gustu autem symptomata sunt, omnes sapes qui ægris præter solitum accidunt: ut si alienas qualitates percipere sibi videantur. Tangibiles differentiæ sunt, ubi ea quæ subiiciuntur tactui, genuinam mutarunt constitutionem: ut si cutis quæ antea erat mollis, deprehendatur dura, rigidaq;: aut è cōuerso. Quum igitur omne quod naturale est, ex commoda temperatura nascatur: utiq; id quod præter naturam existit, ex aliqua intemperie orietur. Quamobrē, quæ

SYMP.T. CAV. LIB. I.

hæc omnia quæ diximus, prorsus præter naturā sint, meritò intemperiei feruntur accepta. Atqui intemperies omnis est morbus: ergo liquidò constat, has quatuor symptomatū differentias, à morbis generationē contrahere. Quæ verò vel excernuntur à corpore, vel retinentur in eo præter naturam (hæc enim ad tertiū pertinebant genus symptomatū) aut tota quidem substantia, aut qualitatibus tantum, aut deniq; quantitativis, à naturæ ordine digrediuntur. Atq; ipsa etiam vel immediatè sequuntur morbos, vel mediatè: intercidētib; scilicet symptomatibus aliis. Iam verò hæmorrhagia, quod ad excretam substantiam pertinet, toto ē genere præter naturam, sitq; aut aperto vasis osculo, aut rupto vase, aut eroso. Etenim vulnus, ruptura, erosio, proprii similarium partiū sunt morbi: at apertio osculorum, ad instrumenta pertinet. Accidit enim interdū ipse sanguinis fluor ob retentricis facultatis infirmitatem: interdum quia expultrix immodicè mouet: nonnunq; ob vtriusq; functionis noxam. Sic fit etiam muliebri profluuium, aut ob dictarum functionum symptomata, aut quia sanguis est nimis serosus atq; subtilis redditus. Sciendum tamen est, nihil eorum quæ tēpestiuè, hoc est ad animalis commodum, circa corpus contingunt, etiam si toto genere præter naturam sint, verè dici symptoma (quale utiq; est id quod sequitur morbum, atq; in læsione actionis consistit) quum nimirum vnumquodq; eorum sit elegans & absolutū opus naturæ, tametsi ad alterum symptomatum genus, nepe ad affectum præter naturam reduci possit: vt si sanguis per nares, aut hæmorrhoidas, cōmodè erumpat.

GALENI PER GAMEMI DE
symptomatum causis. Liber primus.

IN sensili actione triplex symptomatum genusprehenditur. Vnū, quum primum sensus instrumentum quippiam perpeffum est: alterum, quum sens-

Intēperies omnis est morbus.

Hæmorrhagia quibus modis fiat.

Symptomata dici non debēt quæ tempestiuè atq; ad animalis commodum circa corpus contingunt, vel si toto sint genere præter naturam.

Sentiendī actio triplex symptomatū gen^o i se ipsa admittit.

Bbb ii

CrySTALLINUS
humor est pri-
mum sentiendi
organum.
Opticis nervis
inest manifestū
foramen.

CrySTALLINUS
humor octo of-
fendi solet in-
temperantiis.
Visoria facul-
tas offenditur,
vel nervo af-
fecto, vel cere-
bro.
Solutionē con-
tinui esse com-
munē morbū
similibus &
instructariis
particulis.

ChrySTALLINO
humore fursū,
aut deorsum,
peruerso, obie-
cta videntur
dupla.

Pupillæ fora-
minis relaxa-
tio semper vi-
sui incommo-
dat: contractio au-
tem, si quidem
natiua sit, acu-
tissimæ visio-
nis est causa: si
vero a morbo
producta, ledit
visionem.

tiendi potentia: tertium, quum ministrantium primo
sensus instrumento partium aliqua fuerit affecta. Ut
in oculo primum sentiendi instrumentum est crystal-
loides humor, qui à coloribus alteratur. Vis sentiendi,
est quæ à cerebro per nervum opticum qui solus mani-
festum habet foramen, in ipsum descendentem, proce-
dit. Illi⁹ verò grā creatæ sunt reliquæ oēs oculi partes.
Quicquid igitur ex enumeratis sit læsum, aial vel malè,
vel nihil oino videbit. Solet crySTALLINUS humor octo in-
tēperaturis à naturæ mō discedere. At facultas visoria
offenditur, vel nervo affecto, vel cerebro. Hæc autem,
quatenus similia sunt, octo morborum generibus cō-
ficiantur: quatenus instrumentalia, tum obstructione,
tum aliarum rerum innixu, atq; adeo diuortio ptinui,
quod quidem tam similibus, q̄ ipsis instrumentalibus
semper adest commune. Iam verò, si crySTALLOIDES hu-
mor peruertatur ad alterum angulorum, haud ita no-
tatu digna succedet noxa: sin verò vel ad superiora,
vel ad inferiora declinet, tūc quicquid cernitur, duplū
esse videtur. Illa porrò quæ ex vsu sunt primo instru-
mento, variis modis etiam contingit lædi: vtputa si ala-
bugineus humor, spiritus ue, qui ante crySTALLOIDEM lo-
catur, vsq; adeo copiosus sit, vt visoriam facultatē im-
pediat: aut similiter si foraminē rhagoidis vel relaxetur,
vel coarctetur, magis q̄ expediat visioni: aut si i aliqua
diuellatur partem: aut deniq; si rumpatur. Cæterum re-
laxatio illius, siue ab ortu sit, siue postea præter naturā
acceserit, semper visui incommodat: adstrictio autem
& imminutio, si quidem à natiuitate contracta fuerit,
acutissimæ visionis est causa: sin verò ex morbo talis
coarctatio cōtigerit, visionem impedit manifestè: idq;
non quatenus coarctatio est, sed quatenus à pessimis
causis inducta. At reliquorū neutrum, siue à primo or-
tu, siue postea q̄ quis genitus est, acciderit visioni incō-
modum notatu dignum adferre potest. Etenim vbi al-

terum oculum claudimus, dilatatur alterius pupilla, & spiritus antea ambobus particulatim distributus, vniuersus in vnum confluat. Idcirco quibus suffusus altero oculo clauso pupilla clarius apparet, ii sperare debent fore aliquando, vt visum, punctione facta, recuperent. Quibus autem non dilatatur, ii omni spe recuperandi visus sunt destituti. Vnde liquidò constat, spiritum aliquem animale à cerebro demitti ad oculos. Si igitur pupilla amplior fuerit, spiritus implere illà non potest: quare diffundi ipsum, dissolui, dissipariq; est necesse. Si verò angustior, cogitur, & cōstringitur, ac densior fit spiritus. At coactus spiritus cōstrictusq; ad facilitatem sensus conducit plurimum. E diuerso dissolutus dissipatusq; sentiendi difficultatem inducit. Est autem albugineus humor veluti propugnaculum crystallini, cuius et non nihil essentiam iuuat. Quamobrem, si imminuatur quodammodo, ipse crystallinus arescit ac super ipsum rhagoides tunica corrugatur & cōcidit: sic vt visio ipsa oblādatur: nimirum externo lumine, per exiguum medium, humori crystallino occurrente. Iam verò instrumentum visionis, citra tædium tolerare splendorem nō potest. Ob idq; rhagoides tunica illi est obiecta, nigra existens simul atq; cœrulea, quibus coloribus ocul' potissimum recreatur, quem infestauit splendor. Verum coarctatio pupillæ, quēadmodum amplitudo, si quidē ab humiditate superflua trahat ortum, facilem: sin verò à siccitate quadam inexpugnabili, desperatam curationem sortitur. Porrò si rhagoides tunica ita sua continuitate solvatur, vt tenuis ille humor prolabatur ad exteriora, maximè visio labefacta. Ad hæc si humor ille albugineus se ipso crassior sit redditus, exactam cernendi aciem multo obtusorem reddet. Quòd si plurimum aucta sit crassitudo, visum omnino prohibebit. At si non totum foramen à contento ibi crasso corpore obtenebretur, sed relinquatur eius aliqua particula

Oculo altero clauso, cur dilatetur alterius pupilla. Suffusorū, qui nā possint visum recipere, & qui minime. Spiritū animale a cerebro demitti ad oculos.

Spiritus cōstrictus, coactusq; plurimū cōducit ad sensus facilitatē: at dissolutus, contra, obest. Albuginei humoris usus.

Rhagoidis tunice usus.

Pupillæ coarctatio quando facile, & quando aggre curationē recipiat. Rhagoidis solutio quādo vltimum exoluat.

Obiecta quan-
do fenestrata
videantur.

Videre plane
distantia obie-
cta, quibus con-
tingat.

Ceratoides tu-
nica.

Ictericī putant
omnia obiecta
pallere.

pura, videre licebit per illam externas res, idq; nihilo de-
terius q̄ antea: sed vnāquālibet solam. At si in pupillæ
centro exigua cōsistat suffusio, maneatq; partes quæ
in circuitu sunt, puræ, qui sic sunt affecti, quicquid aspi-
ciunt, id veluti fenestratum putant. Vbi verò humor i-
ter crytalloidem atq; ragoidem medius, proprium co-
lorem mutarit, si quidem ad fuscum declinet, arbitra-
bitur quis se per nebulam, vel per fumum etiam vide-
re. Sin alio quouis colore inficiatur, huius quoq; ima-
ginem, ea quæ spectant, referēt. Præterea, quibus adeò
absoluta est cernendi facultas, vt ne minimum quidē
visibile eos latere possit, si vapores à vētriculo sursum
ferantur, hos symptomata suffusiōi similia infestabūt.
In vniuersum autem, vel parua, vel magna symptoma-
ta accedent, pro ipsius magnitudine affectus. Cui spiri-
tus animalis simul & multus fuerit, & æthereus, is, res
quæ porrò distant, & videre, & discernere potest. Cui
verò paucus quidem fuerit, sed purus, is vt res propin-
quas planè discernit, sic distātes haudquāq; videt. Quod
si humidior simul fuerit & multus, res distantes videt q̄-
dem, sed nō ad vnguem discernit: quemadmodum cui
humidior simul fuerit & exiguus, is neq; exactè, neq;
porrò videre potest. Ceratoidis tunicæ pars illa quæ
pupillæ est obiecta, si crassior densiorq; sit, aciem hebe-
tem reddit. Si verò humidior densiorq; fuerit, non mo-
do reddit visum obtusum, sed etiam efficit, vt qui sic ē
affectus, putet se per tenebras, aut nebulam, aut vapo-
rem aliquem, aut p̄ fumum res ipsas cernere. At si hu-
mores non multitudine sed colore peccauerint, secun-
dum eiusdem coloris naturam ipsa cœcutiētia oborie-
tur. Proinde qui morbo regio laborāt, quicquid vidēt,
id pallere arbitrātur. Quibus autem ea ceratoidis pars
insigniter vlcerata est, aut vulnerata vsq; adeò, vt ipsū
vulnus ad iteriora pertingat, ii magna ex parte obcœ-
cantur. Vidi tamen equidem puerum, quum iuxta pu-

SYMP T. CAV. LIB. I.

pillam pūctus fuisset stylo, sic vt aquosus humor efflueret, ac tota omnino cornea corrugaretur, visum (icredibile quippiam) recuperasse: instaurato scilicet paulatim humore qui per vulnus effluxerat. Solius etiā corneæ ipsius corrugatio (qualis senectute confectis solet semper accidere) similiter visum offendit. Cæterum si pupilla simul sit imminuta, scire licet, aquosum quoque humorem imminutum existere: sin verò æqualis permanserit, ad solam ceratoidem affectus pertinet. Corneæ igitur morbi, si fuerint magni, in totum visionem impediunt: maximè si vel phlegmone, vel suppuratione, vel scirrho (quatenus instrumentum est) ifestetur. Inhærens verò membrana phlegmone obsessa, ex accidenti quoque impedire potest visionem. At chymosis, vnguisque, non ex accidenti, sed primaria ratione pupillam ipsam obscurant: quemadmodum genarum ingentes tumores præter naturam.

Grauis auditio surditasque animanti euenire solent, aut ob auris partem aliquam, aut ob neruū à cerebro descendentem: aut ob cerebrum ipsum, si ea in parte, vnde neruus oritur, affectum fuerit. Igitur nerui cerebrique offensa in his, haud aliter quàm in oculorum affectibus, accidit. Reliquarum verò partiū noxæ, illis ad portionem respondent: verum non omnino similis læsio existit. Partes itaque ad auditum pertinentes, quatenus similes sunt, octo intemperaturis vexantur, ac præterea solutione continui: quatenus autem instrumentales, tum hac, tum obstructionibus inuaduntur, ob tumorem aliquem præter naturam, aut ob sordem obturantem auditorium meatum.

Quum autem lingua sit duplici facultate prædita, ac per vnā quidem sentiat, per alteram voluntariè moueatur: contingit sanè ipsam, aut minimè sapores percipere, aut deprauatè: idque ob tunicæ, quæ illam inuoluit, vel corporis ipsius, vel mollium nervorum, vel ei?

Visum recuperare pueri, cui albugineus humor effluebat, corneaque oīno corrugabatur, Galenus vidit.

Chymosis.

Vnguis oculi.

Auditus symptomata vnde proficiantur.

Linguae inesse duplicem facultatem: sentitricem, atque motricem.

Bbb iiii

Gustandi vis
ob quarū par-
tium affectus
corumpi, aut
vitiari possit.
Sensuū alluci-
nationes quo-
modo fiant.

Odorandi sen-
soriū esse prin-
cipium antero-
rum cerebri vē-
triculorum.
Nasum inserui-
re odoratui &
respirationi.

Olfaciendi vis
a quibus solet
labefaciari.

5 **Tactus inest**
omnibus sensi-
bilibus.
Hæmodia vn-
de pficiuntur.

Torpor, affe-
ctus cōpositus,
a quibus cau-
sis oriri solet.

cerebri partis, vnde illi exoriuntur, affectum aliquem præter naturam. Etenim deprauata saporū dignotio vbi lingua alieno quopiam humore fuerit imbuta, euenire consuevit. Nam quemadmodum per suffusiones, ipsa visoria facultas foris videtur ea cernere, quæ in oculo apparent: ita & gustandi vis, internā linguæ affectionem rebus sensibilibus tribuit: quemadmodum ē, vbi sonum aures percipiunt, nulla re extrinsecus obstrepente, sed ipsa circa membranas motione, phantasmata transmittente.

Quod verò spectat ad olfactricem potentiam, odorandi sensorium est principium anteriorum cerebri ventriculorum: inseruit autem nasus odoratui simul & respirationi. Si igitur vel contundatur ipse, vel eius obstruatur meatus, idque vel ab humore aliquo, vel à tumore præter naturam, olfaciendi facultas vel minus probè odores percipiet, vel eos omnino non sentiet. Obstructiones etiam ossium colatoriorum, præterea cerebri membranarum, atque adeò illæ quæ in processibus anteriorum cerebri ventriculorum oriuntur, ac denique insignes dictarum partium tum cōtusiones, tum sectiones, olfactricem vim maximè labefaciunt. Ob intemperiem etiam ipsarū partiū, solet fieri olfactus vitiosus.

Porrò tactus (qui sensus communis est omnibus particulis sensibilibus) varia symptomata recipit: iter quæ annumeratur tū hæmodia, tū torpor. Est enim hæmodia dentium stupor, qui ob acidos acerbosque cibos magna ex parte oboritur. Torpor autem in toto corpore contingere solet, ex sentiendi mouendi que difficultate affectus quidam compositus. Qui quidem manifestè videtur, tum à refrigeratione, tum à compressione corporum nervosorum, ac denique à torpedinis marini animalis contactu procedere. Vbi verò citra aliquam huiusmodi causam ultro torpor acciderit, tunc vel vitæ ignauiam, vel ciborum multitudinem, crassitiem, len-

titudinem, aut solitæ secretionis suppressionem antecessisse necesse est. Igitur eius causa coniuncta, affectus nervi talis, ut facultatem illi à præcipe parte missam, impedire possit. Atqui impeditur, si nervus meatu aliquo præditus, vel obstructus sit, vel compressus. Si verò meatum non habeat, sed uti Solis radii per aquam, aerem, &c. transeunt, eodem modo facultas à principio per nervorum corpora permeet, ipsa in transitu præpedietur, si ad immodicam crassitudinem nervus ipse pervenerit: id quod illi continget, aut crassis viscidisq; succis nutrito, aut violento frigore perfrigerato.

Nervi ipsi sunt
neferaminibus
præditi, an mi-
nime, Galenus
hæret.

Torpescent etiam nervi, ubi vel laqueo, vel manibus constringuntur: aut extrinsecus à vicinæ partis phlegmone, vel scirrho comprimuntur: aut ubi luxatis fractis, &c. ossibus fiunt arctiores. Principio igitur stupidi fiunt, deinde omnino & sensum et motum amittunt: quod vitium ipsorum, dicitur paralytis: à torpore sola magnitudine differens. Quod si omnes occupaverit nervos, repente universum corpus sensu & motu priuabit, succedetq; citissima mors, quæ prohibita sit respiratio. Si spiritus præcipuum lædat, solæ partes capitis, quo ad vixerit animans, & sentire & moveri possunt. Si tamen cerebro quoque noxa ipsa acciderit, qui sic afficiuntur, iis omnium partium perit simul & motus & sensus. Vivere autem possunt utriusque tanto tempore, quanto vivunt ii qui præfocati strangulantur.

Paralytis a tor-
pore sola ma-
gnitudine dif-
fert.

Spina verò in inferiori loco affecta, nempe sub ea nervorum propagine, à quibus thorax attollitur, si quidē fingens fuerit affectus, partes inferiores omnes subito & sentiendi & movendi facultate priuantur. Si verò non ita vehemens affectus videatur, stuporem inducet. Atque ii sanè mortem effugiunt, quandoquidem in ipsis respiratio servatur. At quibus quinta spinæ vertebra affecta est, eorum manus omnino & sensum & motum amittunt. Vox autem omnibus illis perit, quibus ea spi-

Spinæ quintæ
vertebra affe-
cta, resolvi ma-
nus.

Vox quibus
pereat.

Motum quarū
dam partiū vo-
luntarium ex-
olui, prorsus il-
læso sensu, sicu-
ti e contra: id
quod accidit i
omnibus parti-
bus quę per di-
versos nervos
vtramq; facul-
tatē recipiunt.

Tactus pati vi-
detur potiusq;
agere.

Tangendi fun-
ctio cur ab exi-
gua facultate
perfici possit.
Motus cur plu-
rima facultate
indigeat.

Delectatio &
dolor quibus
sensibus ma-
ior, & quibus
minor adsit.

Doloris causa.
Voluptas quā
do sit.

næ pars quæ in cervice est, fuerit insigniter læsa. Porro
qui nervi, dū rectè valēt, facultatē sentiēdi suppediāt,
iidē lædūt ipsam si affecti fuerint. Cæterę quū partes ali-
quæ p quē nervū voluntariē mouent, p eundē sentiēdi
quoq; vi hēant, duplex necessariò noxa oriet ex ipsius
nerui affectu: quæ altera qdē sensum, altera motū ipe-
diet. Interdum tñ quarundā partiū motus voluntarius
exoluitur, sensu prorsus illæso: sicuti e conuerso etiam
contingit sensum perire, incolumi functione mouēdi:
vt in lingua & oculis planè videre licet, ac breuiter in
oibus partibus, quæ p diuersos nervos, hoc ē molles &
duros, illas facultates recipiunt. At i quibus mēbris du-
ri duntaxat nervi inueniuntur, per quos vtracq; facul-
tas defertur: ex ipsorum vehementi læsione functiões
ambæ labefactantur. Nam si ablata cute subiectus mu-
sculus, qui nudus est, videatur immobilis, sentiat tamē
tangentes, exignam ei accidisse noxam putādum est:
nempe q tantam animalis facultatis partem suscep-
rit, quanta ad sensum excitandum sufficiat: ad muscu-
li verò motum, non item. Quippe tangendi sensus, pa-
ti aliquid, potius q agere, deprehēditur, proinde ab exi-
gua facultate functio eius perfici potest. At musculorū
motus in agendo, non in patiēdo, actionis efficaciam
posidet. Is enim totum corpus transferre debet: quā-
obrem plurima indiget facultate animali. Delectatio
autem & dolor omnibus accidit sensibus: sed in oculis
minus q in cæteris euidenter perspicitur: in tactu & gu-
stu, luculentissimè: ab iis deinceps in odoratu: atq; hūc
tandem auditus sequitur. Iam verò affectio præter na-
turam violentè affatimq; incidens, doloris (vt Plato
inquit) est causa. Vbi verò corpus ad naturalem habi-
tum redit, idq; rursus affatim, oboritur voluptas. Por-
rò vehementes eueniunt in tactu à naturali habitu trās-
mutationes, ob violentem calidi frigidiq; occursum:
atq; ob eas res, quæ contundere, secare, extēdere, aut

SYMP. CAV. LIB. I.

erodere possunt. Nam siccitas humorq; nisi calori frigori ue iungant, occursum suo inferre vim minimè con-
sueuerunt. Cæterum sectio & ruptio dolorem infert, non vbi facta est: nisi fortè ex accidenti aliquo: sed vbi etiamnum fit. Iam instrumentum gustandi, quatenus habet facultatem tangendi, à iam dictis causis diuellit: quatenus verò ad gustum propriè pertinet, ab amaris, acidis, acerbis atq; acribus: quandoquidem horum sim-
gula continuū diuidere possunt. At ab humoribus acri-
bus resoluti vapores, vim olfactricem infestant: nam & ipsi continuum diuellunt. Auditum vox turbat aspe-
ra, grauis, maximaq; & celerrima: quemadmodū om-
nis violentus strepitus. Visum autem, illustrissimi splen-
dores offendunt corrumpuntq; eo qd nimium disgre-
gent. Passio itaq; molesta quatenus dictum est, oriri in
omnibus sensibus solet: delectatio autem illi aduersa, à
contrariis nascitur causis. Etenim vt cœruleus color iu-
cundissimum est oculis spectaculum, ita splendor can-
dicans, qualis i Sole cernitur, maximum ipsis dolorem
inferre potest. Post hos secundo loco molestus quidem
est color albus: delectat verò fuscus: nam ille visificam
essentiam dissoluit: hic eam cogit, citra violētiam. Co-
lor siquidem niger hoc nomine visionis essentiæ aduer-
satur, qd cogat ipsam violentius, q̄ vt eam reducat ad
naturalem habitum. Cæterum id quod nigerrimum
est, splendidissimo minus visum offendit, quia crassio-
ri constat substantia, ob idq; minus efficaciter agit.
Quum niimirum omnis res tenuis crassam actiuitate su-
peret. Sic igitur sol ualde tenuis quum sit, protinus vi-
sum dissipat. Quare si quis diu i dēssimis tenebris vbi
versatus fuerit, postea luci restituatur, occœcabitur
is quodammodo. Merito itaq; cœruleus color, vt visio
ni iucundissimus est, ita maximam quoq; præbet vtili-
tatem: sed non illi quæ à sole discussa fuerit. Huic enim
utpote iam agrotanti, contrarium remedium(vide-

Delorem nec
siccitas nec hu-
miditas infert
ppria ratioe,

Gustandi senso-
rium a quibus
nam afficiatur.
Olfactū acres
vapores infe-
stant.
Auditum quæ
obtundant:
Visum quæ of-
fendant.

Ceruleus color
est optatissi-
mus oculis.

Niger color
qua ratione vi-
sui aduersetur.

Tenuis res om-
nis, crassā acti-
uitate superat.
Sol cur visum
dissipet.

Color niger, fuscus cœruleusq; disgregationibus ipsius visus conferunt.

Colores medii, ex contrariis inuicem confusis oriuntur.

Auditui bene affecto, & egrotato, quæ voces sint infestæ: & quæ gratæ.

Sensuum qui maiori voluptate fruuntur: & qui crassiora obiecta possideant.

Vapor est extenuatus humor.

Gustui qui succi delectent.

Pingues succi, exasperata leniunt.

Ventriculus inservit visceribus atq; venis.

licet color niger) est adhibendum: ei verò quæ sana, sed fatigata est, color cœruleus, fuscusq; saluberrima spectacula existunt. Porro fuscus color, ex albo nigroq; contemperatis nascitur: cœruleus verò, vbi cādor splendori iunctus, non ita parum in nigrum degenerat. Medii siquidem moderatq; colores (vt inquit Platō) ex contrariis inuicem confusis oriuntur. In auditu verò non malè affecto, vt iucundissima vox censetur quæ & lenissima & tardissima ē: ita asperissima, citissimaq; maximam inferre solet molestiam. Vbi autem fatigatus auditus fuerit, p̄ter lenem ac tardam, exigua quoq; est amica. At quum ægrotat, leuissima simul & tardissima, atq; perquam exigua: iisq; multo magis absolutū silentium. In hoc sensu manifestior conspicitur delectatio, quia crassiori constat essentia: manifestiorq; adhuc q̄ in hoc, voluptas percipitur à sensu olfactus: q̄ ipsius quoq; essentia sit crassior. Etenim vt aer splendore crassitudine vincit, ita vapor (qui extenuatus est humor) aere crassior existit. Atqui splendor ad videndi, aer ad audiendi, vapor ad odorandi sensum pertinet: quemadmodum ad gustum natura humida: ad tactum verò, solidum corpus. Gustui igitur, quum à naturali habitu non declinat, maximam voluptatem adferunt omnes succi dulces, pinguesq; ceu corporis essentia familiarissimi. Si verò ab aliquo ipsum infestante nuper vitium contraxerit, pingues. Nam ii exasperatas partes maxime lenire consueverunt. At vbi iam morbo afficitur, tunc succi contrarii iis qui morbum excitarūt, delectare videntur. Vētriculus etenim visceribus & venis inservit, huiusmodi succos appetens, quales illis sunt necessarii. Præcedit tamen iudicium linguæ, quæ iis potissimum delectatur succis, quibus ventriculus indigere videtur. Consensus autē huiusmodi potissima causa est vestiens ipsam membrana. Porro odorandi vis, quod ad ea pertinet quæ extrinsecus vel voluptatem, vel molestiam

adferunt, gustandi facultati proportionē respōdet. At vapores qui intrinsecus continētur, si molesti fuerint, possunt sensu percipi: suaues verò & omnino delectabiles, sensum latent: quemadmodum in visu quoque, & auditu, qui in se nullum patiuntur vehemētē affectū. Delectamur in id genus sensibus, ad naturalem habitū redeuntēs: hoc autem fit per idonea contraria: idoneū autem voco id, quod primariò & per se, non per medium alterius rei interuentū, fuerit effectus causa. Quare procaciticae causae impraelentiarum spectandae nō sunt. Iam verò genitales partes proprio quodā & eximio sensu afficiuntur, vnde & validissima p̄dita sunt facultate, expultrice quidem seminis genitalis, in masculis: in foeminis autem tum hac, in testiculis & seminariis vas: tum attractrice per totum vterum. At genitalis seminis tum excretionem, tum comprehensionē ingens comitatur & cupiditas, & voluptas. Molestia autem quae ex redundatē atq; intus retento semine oritur, paulatim & longo temporis tractu increfcit. Nulla autem est pars, quae vel adeò exactē sentiat, vel principum partium vtrinq; pro suarum affectionum modo perinde afficiat, atq; orificium ventriculi, qui stomachus appellatur. Siquidem syncope, cardialgia, dyspnoea, apnoea, morsus, epilepsia, delirium, isania, huius partis occasione euenire solent: idq; cōfortii lege. Abolitam verò, difficilem, & deprauatam appetentiā, ipsa per se sustinet. Abolitam voco appetentiā, dum quis nihil omnino appetit: difficilem eam quae est imbecilla. At deprauata, partim ad immoderatā cibi portionisq; exhibitionem vertitur: partim ad alienae qualitatis desiderium. Etenim quum nutritoria functio nō vitalis, sed naturalis sit: haud aliter in animalibus q̄ in plantis p̄ficitur. Idcirco animalibus vice terrae fabrefecit natura ventriculum, veluti promptuarium cibi. Addidit in super facultatem qua penuriam sentiret: vt animalia

Odorandi vis, vapores quidē internos vbi sunt graues, sentit: qui vero delectabiles sunt eam latent. Sensus intra se nullū affectum vehemētē patiuntur.

Genitaliā membrorum vires.

Seminis excretionem cōprehensionēq; comitatur ingēs cupiditas, voluptasq;.

Molestia ex retento semine.

Os ventriculi exquisitissimo est sensu p̄ditum.

Os ventriculi quorum affectionum confortii lege & ppria rōne, sit causa.

Nutriticiā functionem nō aliter p̄fici i animalibus, quam in plantis.

Ventriculus promptuarium cibi.

- Appetētia qd.** ad eibum potionemq; excitata, eodem implerentur tēpore: vocaturq; huiusmodi plenitudinis desyderiū appetentia. Hæc ortum habet à penuriæ sensu, quum venæ ex ipso ventriculo trahunt, veluti mulgentes, sugentesq;. Igitur suctionis sensus est fames. Primū itaq; symptoma omnium est inanitio. Secundum est inanitarum partium naturalis appetentia. Hanc sequitur per venas, quæ porriguntur in vētriculum, suction. Deinde suctionis sensus. Postremo ipsa aīalis appetentia omnium vltima, Quam sanè functionem aboleri contingit, si vel suctionis sensus pereat, vel suctus non fiat, vel corpus non inaniatur. Imbecilla verò erit, si iam dictæ affectiones accedere proximè ad abolitionem videātur. At deprauata fit appetentia, si vehemētia modum excedat: vocaturq; à nonnullis canina, vbi vel ob acidi humoris vitium ventriculus mordicus infestatur: vel dum totum corpus exhaustum, assidua nutritio ne idiget. Quippe frigidi humoris vitium, rosionē quæ suctui proportionē respondeat, inducit: ac appetentiā, non aliter q̄ naturale pathema, excitat: magis tamen cibi q̄ potionis desyderium affert: idq; propter refrigerationem. Si verò falsi aut biliosi humoris vitio ventriculus mordicationem senserit, potionem magis q̄ cibū desyderabit. Itaq; ad excitandam famem frigus in ventriculo non parum cōfert. Inter potissimas autem causas, quibus fames impeditur, calor annumeratur: vt q̄ solida quidem corpora laxando dissoluat, atq; ad attractionis functionem reddat imbecilliora: humida verò fundendo, supra modum extendat. Prauas autem qualitates appetunt ii, quibus ventriculi tunicæ sunt prauo aliquo excremento imbutæ. Qui affectus citta, seu pica dicitur, & mulieres vitiosis succis refertas infestare consuevit, præcipuè vbi vtero gestant: quanq̄ uiris et nonnunq̄ accidit, vbi ipsis quoque vitiati humores ad osculum vētriculi cōfluunt. Similiter circa potum ac-
- Fames quid.**
- Appetentiam** quādo aboleri, uel imbecillam reddi, vel vitia si contingat.
- Canina appetētia** a quibus causis proficiat.
- Frigidi succi** appetentiam excitant.
- Sitim falsi** humores atq; biliosi gignunt.
- Fames cur** a calore impediatur.
- Citta morbus** quos maxime infestet.

SYMP.T. CAV. LIB. I.

cidit quasi priuatio appetentiæ, vbi corpus nulla omni-
no eget potione, ob frigoris atq; humoris excessum :
vel ventriculus propriam affectionem non sentit. Defi-
ciens verò appetentia apparet, vbi hæc eadem fuerint
imbecilliora. At deprauata potionis cupiditas, deprauata
appetentiæ ciborum proportionem respondet. Si-
quidem immoderata potio appetitur, quando cōtenti
in ventriculi tunicis vitiosi humores, aut falsi sunt, aut
biliosi: interdum etiam, quū veluti feruet in eo natua
ipsius humiditas. At prauas potiones nōnulli appetūt,
pro vitiosi humoris, qui in ipsis vincit, ratione. Est præ-
terea & aliud symptoma nonnunq̃ osculum uentricu-
li infestans, nempe cardialgia uocata: quæ à mordaci-
bus succis oritur. Bulimos etiam, siue inexplebilis fa-
mes, symptoma est eiusdem particulæ, ubi penuria, im-
becillitate, atq; refrigeratione afficitur. Mirandum au-
tem non est, si ob oris uentriculi affectus, animalia ma-
ximis iisdemq; uehementissimis affectibus affligantur,
quum nimirum pars illa per neruos quidem cerebro,
per arterias autem cordi, uicino sibi, suas offensiones cō-
municet. At uerò singuli sensus in singulis particulatim
instrumentis à sensibilibus alterati, perficiuntur. Hanc
uerò alterationem pars alterata sentit, eo q̃ à cerebro
suscepit facultatem, quæ ad ipsam per neruum deriuat-
ur. Quippe cerebrum non ut sit sentiendi instrumen-
tum, sed ut sensuum instrumentis uim sentiendi largia-
tur, à natura institutum est. Nam q̃ singulis animalis
partibus per neruos sentiendi facultatem transmittat,
liquido patet, ubi neruus aliquis est dissectus. Siquidem
pars ea in quam neruus ille distributus est, protinus sen-
sum amittit. Taceo sensus inter dormiendum, aut ocio-
sos omnino esse, aut debiliter agere: q̃ tunc exigua fa-
cultas à cerebro i reliquas partes destuat. Quiescit itaq;
per somnum animalis facultas, naturalis autē ualidius
operari uidetur: quum tunc cibus multo melius coqua-

23 31
Appetentia po-
tionis quibus
de causis aut
pereat, aut mi-
nuatur, aut de-
prauetur.

Cardialgia vn-
de exoritur.
Bulimos quan-
do accidat.

Oris uentricu-
li cum principi-
bus membris
connexio.

8.
Sensatiōes quo-
modo fiant.

Cerebrū quorū
sum conditum.
Cerebrum vim
sentiendi par-
tibus per ner-
uos largitur.

Facultas aīalie
per somniū q̃e-
scit: Naturalis
operatur ueho-
mentius.

tur non in uentriculo modò, sed etiam per uniuersum corporis habitum. Est etiam rationi còsonum, illud animæ malis membrum, in quo anima rationalis, veluti in arce habitat, aliquādo quiescere. Cor siquidem exiguū admodum habere quietem videtur, quòd lōgiori non magnopere indigeat, At res aliter se habet in cerebro. Quod quidem per vigilias officio suo semper fungitur: per somnum verò feriat. Quamobrē profundius videntur dormire ii, qui fatigati multa exercitatione fuerunt: vtpote quibus inter exercitandum plurimum facultatis à principio defluebat: quocirca cerebrum & requie & virium instauratione indiget, tum ob facultatis quam transmisit, inanitionem: tū ob labores, quibus per multas functiones defatigatū est. Quēadmodū autē exercitati & prouiores sunt ad somnū, & grauius dormiūt: ita illi quoq; qui cibum ingesserunt. Atq; hi eo grauiori detinentur somno, quo ingestus cibus humidior sua pte natura fuerit. Itidē et ii qui plurimò se vino igurgitarunt, aut balneis multis, calidisq; liberaliter circa caput sunt vti. Quippe huiuscemodi omnia implere cerebrum suo madore videntur: qui alioqui non est inutilis et quem multa exercitatio & lassum & aridū reddidit. Etenim q̄ repletio capitis somnum conciliet, satis Aristoteles demonstrauit. At verò, si à frigida multaq; oppressatur humiditate ipsum cerebrum, veternosum lethargicūq; somnū inducit. Igitur ea quæ duntaxat humectant, non ab re somnifera nominantur: quæ verò refrigerant, ea nec somnum conciliare, nec indolentiā inducere verè dicentur: sed pro somno veternum, grauemq; soporem: pro indolentia autem, vel abolitionē, vel difficultatem sensus efficient: idq; ob frigiditatis excessum. Rursus siccitas immoderatio, & calor, veluti in phrenitide, vigilias infert: quas neq; moestitia, neq; sollicitudo peperit. Sed apoplexia etiam & morbus comitialis affecto cerebro fiunt. Verū vt profundus somnus sentiendi

Exercitati vehementius, cur alius dormiūt.

Cibo ingesto, cur prou ad somnum redamur.

Cerebrū quæ possit implere. Capitis repletio conciliat somnum. Veterni causa. Lethargi cā. Somnifera sūt humectantia. Soporifera dicuntur quæ extreme refrigerant. Vigilias inducit siccitas & calor immoderatus.

SYMP.T. CAV. LIB. II.

nus sentiendi functiones: ita apoplexia eas actiões quæ pendent à voluntatis imperio, offendit. Ad hæc qualis est insomnietas sentiendi functionibus: talis est conuulsio per morbum comitiales motibus voluntariis. Porro conuulsio quæ per totum corpus fit citra delirium, aut soporem, à spinalis medullæ, quæ in ceruice continetur, morbo depēdet. Si verò vel manus, vel crus, vel musculus distendatur, aut conuellatur violēter, ad illū semper neruum, qui partē mouet, referenda est noxa.

33
Apoplexia quæ
lis affectus sit.

Epilepsia quæ
lis cōuulsio sit.

G A L E N I P E R G A

M E N I D E S Y M P T O M A

T V M C A V S I S L I B. I I.



QUANDOQVIDEM Iam expo-
suimus symptomata quæ circa sen-
sum versantur, operæpretium fuerit,
deinceps illa etiam examinare, quæ
sub deprauato motu, ceu cōmuni ge-
nere, continentur. Cuiusmodi sunt con-
uulsio, tremor, palpitatio, singultus, tussis, ructus, ster-
nutatio, pandiculatio, & stridor dentium. Quorum san-
nè nonnulla quidem, naturæ sunt opera, sed coactæ ab
aliqua causa præter naturam: alia morbos sequuntur
affectus, nihil ad ipsorum generationem cōferente na-
tura: alia deniq; à natura & morbo simul coeūtibus du-
cunt originē. Porro naturæ opera sunt sternutatio, tus-
sis, oscitatio, pādiculatio, & singultus. Solius morbi pal-
pitatio, conuulsio, resolutioq;. Sicuti amborum coeun-
tium, omnis torpor, & tremor. Ad quorum sanè om-
nium particulares propriasq; differentias inuestigan-
das, sciendum est, quatuor eē facultates, quibus omnia
quæ aluntur corpora gubernantur: attractricem videli-
cet, retentricem, alteratricem, & expultricem. Quum

Sensus depræ-
uati sympto-
mata

Symptomata
quæ ad motū
deprauatū spe-
ctant, alla qui-
dē naturæ, alia
morbi sūt ope-
ra: sicuti alia
vitiūsq;

Facultates na-
turales sunt
quatuor.

Tomus. III.

C c c

2. **Motus voluntarii noxae.**

Apnoea quid.

Aphonia quid.

Linguae paralysis.

Ischuria naturalem functionem cohibet.

Excretiones in voluntariae quo referendae sint.

Apoplexia est paralysis vniuersi corporis.

Dentium stridor.

Strabilissimus.

Gonorrhoea.

Singultus.

Respirationis duplex refractionis.

Epilepsia.

Stupor quo fit ut modo.

igitur iuxta naturae leges animal gubernat, nullus ipsarum motus esse symptoma censeatur. Quod si quippiam in corpore praeter naturam consistat, insurgatque ad ipsum deiiciendum expultricium facultatum aliqua, fit iterum, ut ipsarum motus sensu minimè percipiantur: interim ut non lateant sensum: utriusque tamen in naturam symptomatis transeant. Igitur functionis à voluntatis imperio prodeuntis noxa est, nervorum resolutio, convulsio, tremor, stupor. Ceterum si instrumentorum quibus respiratio perficitur, resoluti sint nervi, apnoea, hoc est abolita spiratio: si verò vocales nervi, aphonia, id est vocis priuatio: vocatur. At linguae paralysis, & si sermonem, voluntatis opus, omnino tollat, nullum tamen proprium obtinuit nomen. Rursus ischuria, hoc est urinae suppressio, haud absimile quiddam apnoeae significare videtur: quāvis per ipsam functio, à natura, non à voluntatis imperio pendens, tollatur. Sed si quis iuitus cogatur mectere, voluntariae functionis offensa est. Haud aliter alui excrementa, si supprimantur, ad naturalem: si deiiciantur, idque homine inuito, ad voluntariam functionem noxa referri debet. At si paralysis totum corpus inuadat, symptoma ipsum apoplexia vocatur. Convulsio etiam ipsa pro varietate particularum, varias appellationes sortitur. Nam si mandibularum musculi conuellantur, stridor dentium: si verò oculorum, tum peruersio, tum strabilissimus, symptoma dicitur. Iam verò si rigido pene semen effluat, veluti convulsio quaedam ipsa gonorrhoea existit: si non rigeat penis, referri debet ad retentricis facultatis imbecillitatem. Non desunt & quibus videantur tum singultus, tum duplex inspirandi aeris refractionis, aliquando ex convulsione musculorum qui inspirationi inserviunt, procedere. Epilepsia autem est convulsio vniuersi corporis. At stupor imperfecta quaedam est resolutio nervorum: estque ferè mixtum symptoma, coeuntibus in vnum pugnantibus

SYMP. T. CAV. LIB. II.

35

busq; morbo simul & facultate. Oēs autē affectus qui nervos intendere possunt, in duo capita reducūtur: plenitudinem scilicet atq; etiam inanitionem. Ac phlegmonæ quidem, plenitudinem pariunt: ardētissimæ autem & aridissimæ febres, inanitionem. Quod verò ad motum immobilitatemq; pertinet naturalem, si manum extendere, extentamq; immobilem seruare valeamus, animalis facultatis hæc functio est: qui status, & motus & immobilitas dici potest. Sin autem supra rem aliquam solidam, rectè valentem manū deponēs, omnes musculorum actiones laxaueris, hæc manus quietem, neq; ad morbum, neq; ad facultatem, sed ad innatam animalibus grauitatem referre oportet. Quemadmodum autem extenta manus duobus æquè ualentibus regitur motibus, sursum quidem ferēte facultate: trahente verò deorsum insita grauitate: sic etiam tremor perficitur duabus motionibus: vna, qua cogitur membrum ob grauitatem ad inferiora dehiscere: altera, qua sursum fertur à facultate. Pugnat itaq; per tremorem manifeste facultas cum grauitate: vicissimq; facultas nunc vincit, nunc imbecilla vincitur. Quamobrem contrariorum semper inter se motuum successionē, tremor fieri videtur: quū sit motus compositus, quemadmodum arteriarum pulsatio. Patet ergo huius quoq; symptomatis generatio, & q; oīno cū conatu sit mouēdi, scđm q; uolūtatis iperīū cū facultatis tñ īfirmi- tate. Porrò maximū onus validā deiicit facultatem: in ualidam verò, non solum hoc, sed parua quoq; proster- nit sarcina. Quòd si ad multā imbecillitatē deuenierit, vel sub proprio opprimeī corpore. Quemadmodū autē animi affectus, qui motricem facultatem imbecilliorē reddunt, tremulas functiones efficiunt (vt in timore vi- dere licet) sic morbi corporis, incōmodantes viribus, tremoris symptomata inducunt. In primis itaq; & om- nium maximè officit facultati, quicquid in intemperie

Tensio omnis fit, aut a plenitudine aut ab inanitione.

Tremor fit, ip- sius mēbri pō- dere pugnante cum facultate.

Tremorē esse voluntariam actionem, sed imbecillam.

Animi affectus tremulas fun- ctiones efficiūt, ac similiter morbi corporis.

Ccc ii.

Senectus est in temperies.

Tremore cur senes, nonnulli, que ex iuuenibus, corripiantur.

Palpitatio quid sit, & quibus partibus accidat.

Palpitationem esse diuersum motum a pulsu.

Palpitationem fieri a vapore crasso simul & multo incluso in palpitante particula.

Palpitationis motus existit præter naturam.

Palpitatio a tremore quo differat.

Rigori adesse motum multum, citum atque frequentem.

cōsistit. At senectus quoque intemperies quædam est, ad frigus & siccitatem procliuior. Quamobrem senes facile tremore vexantur. Ex iuuenibus verò corripuntur ii, qui vehementer fuerunt refrigerati: & qui multo meraco vino se repleuere, aut multas subinde cruditates congesserunt, aut qui diu multis cibis ingestis, nullo vti sunt exercitio, sed ignavi in otio vixerunt: aut qui intempestiuè frigidam aquam biberunt. Præterea crassi lentiq; succi, facultatis meatus obstruentes, tremorē efficere possunt. Palpitatio autē est dilatio præter naturam, oī parti, quæ dilatationē suapte natura admittit, accidere potens aliaque verò nulli. At dilatari sunt nata, omnia quæ naturaliter mollia existunt. Palpitationem itaque nonnunquam cuti subiectisq; illi musculis, & visceribus accidere cernimus: quemadmodum ipsi cordi & arteriis: alio in eis præter pulsum (qui ab insita facultate fit) deprehēso motu. Quum autem palpitatio ipsa celeriter oriatur & euanescat, necessum est illius causam esse aeream essentiam. Quæ quidem si pauca fuerit & tenuis, illico à corpore defluet. Proinde videtur esse vapor crassus ac multus, idq; pro captu spatii in quo continetur. Dilatat igitur, attollit, atque inflat partē, donec violēter explosus, in cognatū sibi aerem expiret. Verisimile autem est, refrigeratis quomodolibet partibus, atque interdum etiam obstructis, palpitationes accidere. Porro vniuersus palpitationis motus, quo in vtraque partem agi videtur membrum, existit præter naturam: qua ratione à tremore distinguitur, & quæ etiam maiora iterualla, quàm tremor ipse, sortiatur. At verò, ut in membrorum palpitatione fit motus paucus, paruus, & rarus: ita in rigore fit multus, citus, & frequens. Atqui multum, voco ex ipso motionum numero: citum, ex motionis impetu: frequentem, ex breui tempore quietis. Cæterum motus hic non est vniuersus, præter naturam, ut palpitatio & conuulsio: sed potius

totus ad expultricem facultatem est referendus: & si ipsam irritans causa, cogensq; vt violenter moveat, præter naturam esse censeatur. Est itaq; rigor motus qdani compositus ex causa præter naturam, & facultate animantis, sed in quo virtus, q in tremore est vegetior. Vt aut exempla facultatis expultricis proponam, vterus non alio pacto ad foetus æditionem insurgit, q vt retentam expellat molem. Quum enim nouem mē sibus sustineat tum foetus gravitatem, tum suam ipsius extensionem, atq; toto hoc tempore osculum ipsius adeò exactè clauditur, vt ne specilli quidē aculeum admittat: absoluto foetu, ad ipsius secretionem accedit, diuersa omnino constitutione affectus. Nam fauces quidem ipsius antea clausæ, adeò patēt, vt facilè per ipsas totus foetus erumpat. Tunicæ verò plurimū antea extantæ, & contrahuntur vndiq; , & foetum explodunt, vt q celeriter ab vteri ceruice decidat. Corruptum verò foetum eiicit illa facultas expultrix, aut tertio, aut quarto, aut alio quolibet mense, haud aliter q instante pariendi tempore, matricis fauces aperiens. Similiter etiam ventriculus, ingestis cibis, claudit inferius osculum: ac nihil egredi sinit, priusq accuratè concoctum fuerit: si modo nihil aliud intercideri ipsam cogat functionem: quemadmodum corruptela foetus in vtero. Sic si quidem solet ventriculus natantes cibos euomere: ad inferiora verò tendentes, per inferiora deicere. Sine cibis etiam insurgit sæpe ventriculi facultas ad vomitum: idq; ob prauam aut bilem, aut pituitā, aut aliū huiusmodi succum, aut sanie. Iam verò, qualis est p vomitiones in ventriculo expultricis actio, eiusmodi etiam per tusses, est in pectore, & in pulmonibus, beneficio spiritus qui ad exteriora vehementer mouetur. Nullum autem animal, aut nauseare, aut vomere, aut tussire didicit. Verum, si causa præter naturam, aut vetriculi osculum, aut respirationis meatū obsederit, pro

Rigore est referendus ad vim expultricem.

Rigor est motus cōpositus ex causa præter naturam & facultate animali.

Vteri cōniuentia & relaxatio opportuna;

Ventriculi retentrix, expultrixq; facultas.

Vomitum.
Tussis.
Sternutatio.
Nares sunt me-
atus respiratio-
nis.

A. Tussis quid sit.

Humores, qui a
pectore educā-
tur facile.

Sternutamēta,
quam tussis, ua-
lidius a pecto-
re in pactos hu-
mores euehlūt.

Tussis nihil cō-
ducit capiti.
Sternutatio iu-
uat plurimum
caput, nisi ob
destillationem
accidat.

Nausea præce-
dit vomitum.
Cerchnos præ-
cedit tussim.
Tussi reiciē-
da esse, que spi-
ritum, interci-
piunt.

tinus animal vel vomitione, vel tussi vexabitur. Ad ho-
rum genus refertur etiam sternutatio, qua expelluntur
quæ retenta in naribus hærent: quæ & ipsæ, meatus re-
spirationis existunt. Spiritus igitur vehemēter motus,
earum meatus expurgat, tibicinum exemplo, tibias, fi-
stulasq; expurgantium. Itaq; huiusmodi motus, natu-
ræ opera existunt: annumerantur tamen symptoma-
tis præter naturam, ob causas naturā ipsam ut sic mo-
ueatur cogentes. Tussis porrò nihil est aliud, q̃ vehemē-
tissima efflatio, qua plurimus spiritus celerrimè foras
erumpens, impetu suo extrahit, exploditq; excremen-
ta, meatum ipsius obstruentia. Expelluntur autem faci-
le, quorum nec nimis aquosa, nec lenta essentia fuerit.
Cæterum illos humores qui in arteria contumaciter
hærent, & qui difficulter expectorantur, magis euellūt
sternutamēta: utpote quæ ualidiorem, q̃ tussis, habet
spiritus impetum, licet aliam generationis suæ causam
fortiant. Quippè non ob ea quæ asperis arteriis, sed na-
ribus molesta sunt, spiritus uiolenter emittitur: cū quo
ex prioribus ventriculis cerebri explodi nō nihil solet.
Proinde tussis capiti nihil conducit. Sternutatio verò,
nisi ob destillationem acciderit, haud mediocre præsidi-
um affert capiti repleto uaporibus. Nec mirum uide-
ri debet, spiritum unico impetu & ex pulmone & ex
capite emitti: nam quum principium insurgit, ut expel-
lat quæ infestant nares, utroq; utitur expirationis mea-
tu. Hæc igit sunt facultatis à uoluntate pendentis, sym-
ptomata. Vomitum uerò, quæ illis proportionē quadā
respondeat, ad facultatem naturalem refertur. Ut au-
tem uomitum nausea præcedit, sic tussim cerchnos,
exiguus ad tusiendum impetus. Porrò quicquid spiri-
tum interceperit, id tussi reicere oportet: siue humor
sit à capite defluens, siue illapsa portio cibi uel potus, si-
ue aliquid in asperis arteriis collectum, ut in peripneu-
monia, pleuritide, & in cōuexarum iecinoris partium

S Y M P T. C A V. L I B. I I.

phlegmone, aut in gutturi ipsius asperitatibus. Est & aliud tussis genus, quod accidit respirationis organo refrigeratis. Sed ita affecti nihil inter tussendum expuunt: adeoq; est exigua ea tussis, ut spiritus cohibitione sup-
primi, & ne eueniat, prohiberi possit. Quippe augetur in instrumentis respirationis calor, ob cohibitam ani-
mam: spiritusq; sub thorace uolenter oppressus, in om-
nes arctos meatus penetrat. Hæc autem utraq; dum
sunt, omnia læuigant, ad temperamentiq; æquabilita-
tem perducunt. Iam uero intemperies ipsa, interdum
simplici qualitate, interdum duplici constat: nonnunq;
eiusmodi qualitates comitatur id quod intemperatum
est: ueluti ros quidam. Sed enim æqualis intemperies
nullo dolore affligit, quum nimirum particulæ affectæ
adsit iam ueluti acquisititia quædam natura. Nullum
autem corpus à sua ipsius natura infestatur. Nam ii quo-
rum natura mutatur, corrumpiturq; dolore afficiun-
tur: non quorum iam mutata aut corrupta est. Vbi ue-
rò in corpore quopiam sentiendi vi prædito, inæqua-
lis suboritur intemperantia, quanta fuerit intemperiei
magnitudo, tanta etiam erit molestia. Quare per tales
intemperantias inæqualitatem quandā sentire se aiunt
ægri, & pandiculantur, omnesq; partes distendunt, sese
tuendi gratia. Distenduntur autem maximè à somno
experrecti, utpote carnibus uaporantia excrementa
sentientes: tum ob congesti cibi coctionem: tum ob hu-
iusmodi motionum quietem. Triplex autem in lassitu-
dine potest oriri sensus: contundens scilicet, tensiuus,
& ulcerosus, idq; à causis præter naturam, omnes cor-
poris partes quassantibus, distendentibus, exulceranti-
bus. Igitur ubi tendi uidetur corporis moles citra quam-
piā exercitationem, affectus is lassitudo tensionis spon-
tanea uocatur: quemadmodum ulcerosa, ubi ulceris sen-
sus transcurrere per corpus apparet: id quod motis ma-

Ccc iiii

39

Tussis ob refri-
gerata organa,
spiritus cohi-
bitione prohi-
betur,

Spiritus cohi-
bitio calorem
in organo re-
spirationis ad
auget.

S.

Æqualis intem-
peries cur nul-
lo afficiat do-
lore.

Dolor quando
accidat.

Inæquales in-
temperies do-
lores secum in-
ducunt.

Experrecti a
somno cur se
distendant.

Lassitudini tri-
plex potest ori-
ri sensus.

Lassitudo ten-
sionis spontanea,
quæ

Lasitudo ulce-
rosa motis ma-
gis accidit, q̄
quiescentibus.
Lasitudo con-
tundens.

Horror transit
in rigorem, si
motus adsit.

Excrementa a
quibus causis
moueantur.

Causa emota
longe est mo-
lestior gescere.

Mordax mota
que omnis cau-
sa, siue frigi-
da siue calida
fuerit, horrore,
rigoremq; in-
ducere potest.

gis accidit, q̄ quiescentibus, nisi admodum magna sit lasitudo. Per tertium uerò lasitudinis genus, quo aiūt sibi quassa esse ossa, ne minimum quidem motum tolerare ægri possunt: sicuti nec per lasitudinē ulcerosam, ubi nimium increuerit. Cæterum quemadmodum ubi ulcerosus fit sensus horrent ægri, si commoueātur: ita horrore affectus, si aliquis motus accesserit, i rigorem transit. Atqui hæc omnia oriunt ab excrementis mordacibus. Differunt uerò inter se excrementorum multitudinem & motu: propterea q̄ alia magis, alia min⁹ erodant: quodq; ex corporib⁹ ipsis alia sint imbecilla, alia facilius, alia ægrius, & afficiantur, & sentiant: facit etiā discrimen causa, ubi citius, uel tardi⁹ mouetur. Adhæc idem etiam homo, dum quiescit, solam interdum sentit inæqualitatem: dum mouet, horrore: dū uerò exercitatur, rigorem. Quamobrem sic affectis consulūt medici, ut ab omni motu se abstineant. Quin etiā sol, balneum, exercitatio, ad motum excitant excrementa, alioqui quiescentia: quemadmodum & ex animi affectibus ira. Porro à seipsis ad motum excrementa insurgunt si uel calfiant, uel extenuentur, uel in spiritum dissoluātur. Causa itaq; emota longè est molestior quiescente, præsertim ubi defertur per corpora sensibilia. Quum enim quippiam per hæc transiens, uiolenter ad cutem fertur, in ipso per carnem cutemq; transitu, necesse est, ut stimulet, pūgat, diuidat, uulneretq; eas partes omnes, quibus obuium fuerit. Omnis autem causa mordax, motaq; siue frigidissima, siue calidissima fuerit, & horrorem, & rigorem animati inducere potest. Cæterum febres tertianæ, ut omnium maximè biliosæ, calidæq; sunt, ita præ cæteris maximè horrorem possunt efficere: & quo fuerint synceriores, eò in ipsis uehementior fit rigor. Porro ardentem febrem rigor inperueniens soluit q̄ bilis quæ interim in uenis conti-

SYMP T C A V. L I B. I I.

nebat, à natura per carnes ad cutem decretoriè excu-
ciatur. Quare motionis eius rigor & symptoma est &
signum. Nam huiusmodi rigore affecti, postea sudant
& liberantur à febre, nimirum eiecta bile. Quæ inter-
dum etiam non ad cutem, sed ad internas partes impe-
tum faciens, vel vomitione, vel alui solutione deiicit.
Sæpenumero & intrò & foras eadem die defertur, vt
simul & sudore & vomitu, & alui deiectione bilis ua-
cuetur. Vbi igitur erodens quippiam in particulis con-
tinetur, contristatur sanè, præcipuè si illud moueatur:
quare maximè ad eius expulsionem festinant. Contra
hunc itaq; atq; constringunt sese: mox quælibet im-
pellit eam quam cõtinet excrementi portionem. Atq;
in hunc sanè modum motis vniuersis particulis, totum
corpus concussione quassationeq; vexatur: qualis vide-
tur in iis, qui sunt rigore correpti. Similiter etiam con-
cutiuntur thoracis muscoli, ea quæ carnibus ipsorum
molesta sunt, per pulmonum arterias expellere prope-
rantes. At verò nonnulli ægri quum egeant reiectione
sputi per regionem pulmonis, nec eam ob imbecillum
thoracem moliri queant, sibi sternutationem prouo-
cant, naribus irritatis: vt ob violentum motionis impe-
tum, ea expuant, quæ tusiendo antea reiicere haud-
quaquã poterant. Illa autem tussis, quæ ob intemperiem
organorum respirationis accidit, ad horroris rigorisq;
genus pertinere videtur. Vbi verò quæ corpus infe-
stant, humida suapte natura fuerint, per tussim ac rigo-
rem ab expultrice facultate impulsæ, vltro citroq; fe-
runtur, donec applicuerint ad conuenientem euacua-
tioni locum. Sin autem solus spiritus sine humore, imo
dicè vel calidus vel frigidus per corpus transeat, is tunc
horrorem excitat, ac nonnunq; rigorem: nulla tamen
sequitur conspicua euacuatio. Quum igitur & frigida
& calida causa possit excitare rigorem, calidæ quidè, si
aerea fuerit, refrigeratio satis efficaciter auxiliatur. Si

41

Rigor ardentè
febrem, illi su-
perueniens, cur
soluat.

Concussio quo
modo corpori
accidat.

Sternutatione
interdum ea
expui, quæ rei-
ci per tussim
non poterant

Rigor oriri à
causa calida &
frigida potest.

Rigoris mede- verò sit humor, eam febris necessario sequetur. **Cur-**
la. tur autem euacuatione. At frigida, si aerea fuerit, re-
medium est calfactio. Sin verò sit humor, interdum so-
la concoctio sufficit: interdum vacuatio: nonnunquam am-
bae conueniunt. Etenim citra febrim nonnunquam oriuntur
Rigores citra rigores ob pessimam victus rationem: ubi quis per otium
febrim, quado se impleuerit, & subinde à cibo lauerit. Quam rigoris
gignantur. speciem veteres ignorarunt medici, & homines supe-
riori illo seculo, nec tam intemperanter viuerent, nec
Intemperatius tam crebro lauarent. At tamen rigor ille quo partes ue-
viui nunc, quā hementer quatuntur, & concutuntur, ob frigidos suc-
supiori seculo. cos nunquam excitari videtur: quod ii ob crassitudinem vehe-
Rigor quando menter moueri non possint. Iam verò si rigor per fe-
est letalis. brem non intermittentem acciderit, idque aegro imbe-
cillo, est letalis, ut inquit Hippocrates. Siquidem in eius
Atra bilis in modi rigoribus insurgit natura contra res noxias, quo
quartanis qua eas expellat: sed victa cadit, extinguiturque, atque hanc
ratione rigore ob rem redditur perniciosum symptoma. Porro in quar-
gignat. tanis febribus succus ex calido frigidoque mixtus, rigo-
rem excitat. Quippe atra bilis suapte natura, frigidus
succus censetur. Vbi verò adeo putris effecta est, ut fe-
brim inducat, quanta adfuerit illi putredo, tantus &
calor inerit. Quum autem rigor à calidis simul & rodē-
R' gente homi- tibus succis fiat, mirari haudquaquam oportet, si partes ex-
ne solę partes tremæ omnes refrigerantur, declinante animali facul-
extremæ refri- tate una cum sanguine ad interiora. Qualem motum
gerantur, recur- videre licet in compluribus animæ affectibus. Quod ve-
rente sanguine rò ad animæ essentiam pertinet, quaecumque illa fuerit, è
ad interiora. duobus alterum fateri oportet: aut quod ad omnes fun-
Animæ substā- ctiones, ut primis instrumentis utitur & spiritu & san-
tiam Galenus guine, ac vel alterius, vel vtriusque calore: aut quod in his
definire non ipsis consistit. Per timorem etiam & spiritus & sanguis
audet. intus sese recipiunt: quo fit ut algeant partes in super-
Timore persui- ficie positæ. idque adeo interdum vehementer, ut non-
gerari extrema nulli rigore quoque arripiant, Per iram verò soluunt ac
calore ad inter-
na se recipiēte.

SYMP.T. CAV. LIB. II.

43

disperguntur, proindeq; exteriora incalescunt. At agonia, affectus ex vtriusq; conflatus, inæquales habet motiones. Iam & cordis & arteriarum pulsationes, & minimæ & per q̄ debiles in trepidantibus esse videntur: sicuti in iratis maximæ & validissimæ. At in agonia sunt inæquales. Per verecundiam, animalis facultas in primis quidem ad interiora mouetur: sed rursus affatim redit ad exteriora. Nam si non redierit, non verecundia, sed timor censeretur debet. Vt autem in timore confertim, sic in tristitia paulatim ad interiora fit motus: magnitudine dūtaxat ac vehementia, non toto genere differentibus inter se pathematis. Atqui nonnulli ob subitum timorem perierunt: id quod solet contingere vbi debilis suapte natura animula, sub valida perturbatione confertim, & extinguitur, & suffocatur. Et enim extinctio, affectum ex refrigeratione ortum cōsequitur: suffocatio autem, cōcursum sanguinis vniuersi ad ipsum principium. At ex iratis nemo mortuus est unq̄: utpote quibus neq; calor refrigeratur: neq; robur dissoluitur. Præ gaudio autem nonnulli supra modum pusillanimes animam exhalauerunt, quemadmodū & timentes. Iam dolor è diuerso cogēs moueri animā, haud leuiora symptomata q̄ maximus timor inducit. Quippe laborantes decolores fiunt, refrigerantur, concutiuntur rigore, tremunt, pulsus habent minores, exolutosq; ac tandem similiter iis qui perterrentur, moriuntur. Nam & in iis fugit insitus calor ad suum principium: animaq; simul & soluitur, & extinguitur. Per rigorem itaq; frigus nō internarum, sed externarum partium sentitur. Quamobrem tunc nonnulli vehementi siti cruciantur: nimirum ipsis iterno calore seruato. Conflatur igitur, pugnatq; per rigores cōtra ea quæ infestant, facultas: donec radicitus euellantur, excutianturq;. * Ob incursiones autem vehementes, & quia etiam in intimo corpore cogitur, rursus magna vi ca-

Ira calfacit partes extremas.

Agonia quid.

Verecundia, vt moueatur.

Tristitia quam motionem fortatur.

Timor subitus quando pimat:

Extinctio quid. Suffocatio qd.

Iratorum cur nullus obierit. Gaudio fuisse nonnullos exanimatos.

Dolor qualia inducat symptomata.

Rigenti externa refrigerantur, & interna incalescunt.

Rigori febris cur supueniat.

6 Pruritus quid,
& quos infesta
ne soleat.

Pruritus causa.
Vicerose lasi-
culinis causa.
Lepræ pforeq;
caus a.
Horroris causa.
Rigoris causa.

7 Sternutatio nō
nunq̃ ex acci-
denti conducit
excremētis pe-
ctoris educēdis
purgatq; ven-
trem & gulam.

Stultitia oritur
a frigore.
Obliuio a fri-
gore gignitur.

loris reuertitur, febrimq; à rigore accendit, in eo certa mine materiam habens auxiliatricem: vnde, & febris euadit vehementior. Quòd si aliquando in pugna defatigetur, antea q̃ dimouere res noxias possit, necessariò mors subsequetur. At pruritus, qui excrementorum leuiter mordicarium est sensus, eos vexare solet, qui aut balneum negligunt, aut strigimentis redūdant, aut eruditatibus sunt referti, aut prauis succi cibis vescunt: sed præcipuè affligit insectos psora vel lepra. Vt autem prædictorum symptomatum causas accuratius exponam, exigua quidem est, tenuis, falsa, & immota in pruritu. Exigua, tenuis, erodens, immotaq; in lasitudine vicerosa. Multa, falsa, crassa, & immota, in lepra, psoraq;. Pauca, tenuis, mordax, ac breuē motū possidēs, in horrore. Si verò aut vehementius moueat, aut multū abūdet, aut sit mordacior, iam non horrorem, sed excitare rigorem est nata. Pro intensiōe autem aut remissione ipsius causæ, intenduntur aut remittuntur symptomata. Iā tussis causa, in pulmone, gutture, ac thorace consistit: Sternutamenti, in naribus: singultus verò, in ventriculo & gula. Atq; in his omnibus expultrix facultas, quo excutiat molesta, se ad motus vehementissimos excitat. Porro sternutamentum ipsum, nonnunq̃ ex accidenti, humorum in pectore delitescētium, remedium existit, licet eius rei gratia excitatum non fuerit. Similiter purgat ventrem & gulam: qua ratione etiam singultui auxiliatur. Sed iam opportunum est vt de iis dicam⁹ symptomatis, quæ circa principes functiones versantur. Quorum sanè tria genera deprehenduntur. Primum, vbi perit omnino functio. Secundum, vbi illa oblæditur. Tertium, quando in alienam speciem degenerat. At perit quidem functio ī stultitia, obliuioneq;, qui affectus à frigore oriūtur. Quippe me dicamētis quæ huiusmodi symptomata facere possūt, refrigerandi facultas inest. Hæc itaq; symptomata ce-

SYMP.T. CAV. LIB. II.

48

reberi corpus esse refrigeratum declarant. Apoplexia
verò, epilepsiaq; ex subitanea colluione pituitæ, re-
plentis ventriculos cerebri, nasci videntur. Proinde ho-
rum symptomatum subita est generatio & discussio,
qualis esse per corporum intemperies non posset. At
modica offendicula, ac veluti torpores tum rationis,
tum memoriæ, ob minorem refrigerationē eueniunt.
Porrò delirium omne, deprauatus est principis faculta-
tis motus, à prauis succis, aut cerebri intemperie ortū
habens. Cæterum phrenitis dicitur, si febris adsit: vt
mania, si absq; febris, accidat. Solæ autem melancholi-
cæ alienationes, à frigidiori succo produci solent. Nam
phrenitis non simpliciter ob calidos succos accidit: sed
quum phlegmonem vel in cerebro, vel in ipsius mem-
branis producant. At quæ deliria in acutissimarum fe-
brium vigore oriuntur, mordacem calidumq; vaporē
habent, cerebrum occupantem. In omnibus autem ani-
mi alienationibus, si timor atq; tristitia diu perseuerēt,
atram bilem in causa esse est indicium. Quòd verò atra
bilis rationalē animæ arcem occupans, timorem, mœ-
stitiam, ac mortis expectationem inducat, nihil miran-
dum est: quum videamus in rebus externis nihil magis
nos, q̃ tenebras ipsas, perterrefacere. Si igitur quip-
piam tenebris simile rationali parti animæ circun-
fundatur, hominem semper timere est neces-
se: vt qui timoris causam semper in cor-
pore secum ferat, vt in flatulento il-
lo morbo, quem hypochondria-
cum nominant, in dies vi-
dere licet.

Apoplexiæ cā.
Epilepsiæ cā.

Deliriū quid et
vnde ortum
habens.

Phrenitis qd
Mania.

Melancholicæ
alienationes.

Phrenitidi gi-
gnendæ requi-
rit phlegmone
in cerebro, aut
in membranis
illius.

Attra bilis sede
rationis occu-
pans, timorem,
mœstitiam, ac
mortis expe-
ctationē iducit
Tenebræ per-
terrefaciunt.
Hypochondria-
cu. affectus.

GALENI PERGA

MENI DE SYMPTOMA-
TVM CAVSIS.

LIBER III.

Concoctio qd.

Alterationis er-
ror est conco-
ctionis sym-
ptoma.

Cruditās quid.

Concoctionis
vitium contin-
git bifariam.Facultas bifa-
riam læditur.
Essentia facul-
tatis, læsiones
proprie, sunt
intemperies.
Instrumentorū
morbi.

DEINCEPS Autem de symptoma-
tis quæ circa tum actiones, tum facul-
tates naturales versantur, dicendum
est. Quandoquidem igitur concoctio
nihil est aliud q̄ alteratio secundum
qualitatem, quam ventriculus nimi-
rum molitur, dum sibi cibos assimilat: nemo sanè ne-
gauerit alterationis errorem fore concoctionis sym-
ptoma. Cæterum si nulla penitus alteratio fiat, hoc
symptoma absolutè vocatur cruditās. Si verò fiat qui-
dem alteratio, sed non qualem fieri expedit, vocabitur
& hæc cruditās, non quidem tanq̄ priuatio, sed ceu vi-
tium concoctionis existens. At vitium ipsum, bifariam
accidere solet. Aut enim tardè alterantur cibi, vt vix
propriam transmutationem suscipiant: aut corrumpū-
tur omnino, vt nullam concoctionem admittere pos-
sint. Atq; huiusmodi sunt cōcoctionis noxæ. Quarum
causa communis quidem est alteratricis potētia ab sco-
po aberratio. Cuius aberrationis duo prima sunt gene-
ra. Vnum, qđ in potentia læsa: alteræ, qđ in externo ali-
quo errore cōsistit. Cæteræ potētia bifariam lædi: aut
p̄ suā ipsius essentiam: aut per aliquem morbum instru-
mētorum. Error aut̄ externus tripliciter accedit. Nam
aut ab excrementis ventriculi, aut à cibis, aut à somni
tempore oritur. Iam in propria essentia noxæ, intem-
peries quædam agētium qualitatum existunt. Ad mor-
bos instrumentorum pertinent tumores præter na-
turam, abscessusq; & alii affectus consimiles, quibus si

crucietur ventriculus, impeditur facultas eius conco-
ctrix. Quod si cum intemperie coeant ipsi instrumen-
torum affectus, utroq; modo facultas illa patietur no-
xam. Atq; ob hasce omnes causas ventriculus malè cō-
coquit, uel nullo extrinseco errore incidente. Ecōuer-
so autem ventriculo non male affecto, interdum non
coquit animal, aut propter ciborum potionumq; im-
modicam quantitatem, aut qualitatem alienam, aut q̃a
intempestive, aut non recto ingerūtur ordine, aut pro-
pter excrementum inutile, aut somnum breuem. Or-
dinem præposterum voco, vbi quis aut cydonia, aut
punica mala in primis ingesserit: mox olera sumat ex
oleo & garo. Intempestius autem dicitur vt sin au-
rora antequā hesternus cibus descenderit, aut corpus
fuerit modicè exercitatum, prandium sumatur. Porro
corruptelæ ipsæ, quæ quidem fumosæ sunt, ex calidio-
ribus, magisq; fumosis oriuntur cibis: acidæ verò, ex
iis qui frigidiores natura sunt, magisq; pituitosi. Simili-
ter etiam & in excrementis cōtingit. Acidæ si quidem
creant, quæ pituitosa sunt & frigida: fumosas, quæ bi-
liosæ & calidæ. Nec secus venter, sub frigidioribus qui-
dem morbis, acidæ: sub calidioribus, fumosas muta-
tiones efficit. Tarda concoctio fit, quia cibi difficulter
corrumpuntur, vel quia illos facultas non superat, vel
quia somnus fuit breuior, q̃ vt eos vincere posset. Vbi
verò citra corruptelam cibus omnino cōcoctione pri-
uatur, sciendum est, ventriculum planè esse uictum, vel
ab immodica multitudine, vel ab ingenti frigore. Ad
eosdem reducuntur modos, quæ in vasis cruditates cō-
tingunt: illæq; etiam quæ in tertia concoctione gignū-
tur. Atq; hæc omnia indicauit nobis præcognita cōco-
ctiōis ratio. Quum enim temperiem hmōi, quæ ex qua-
tuor elemētis conflatur, & quæ corporis vētriculi pro-
prietatem constituit, sciuerimus esse causam alteratio-
nis ciborum: quodq; ad hanc rem non mediocriter cō-

Cruditatis, aut
concoctiōis in-
tiosæ causæ, it-
leso v̄triculo.

Cydonia esse
edenda in vl-
timis.

Intempestius
ciborum vsus.

Corruptelæ fu-
mosæ, acidæq;
a quibus cibis
gignantur.

Concoctionis
tarditas vnde.

Alterationis ci-
borum causa ē
temperies ven-
triculi.

Symptomatum
genera tria re-
periri in vniuer-
sis actionibus:
nempe aboli-
tam functionē
remissam, &
deprauatam.

Succi vitiosi
quos affectus
producant.
Atrophia.
Gracilitas.
Leuce.
Elephantiasis.

Imbecillitates
facultatis quos
morbos sequā-
tur.

Intemperies
omnis vehe-
mens deficit
vires.

fert calidum elementum, facile nobis via ostendetur, qua cruditatis causas quoque inueniamus. Igitur in vniuersis actionibus tria symptomatum genera reperiuntur. Quorum quidem primum est, abolita actio. Secundum, imperfecta, diminutaque; tertium denique, vitiosa, seu deprauata. Ventriculus itaque actione priuatur, vbi ne minimum quidem immutat cibos. Imperfecte concoquit, vbi tarde concoquit. Deprauate vero, vbi cibos corrumpit. Eadem etiam habenda est ratio, & in coctione quæ fit in venis, & in vniuerso corpore. Porro ex vitiatissimis succis gignuntur erysipelata, cancri, gangrenæ, phagedænæ, carbones, herpes, alique id genus affectus. Circa nutritoriam autem actionem, priuatio quidem actionis, atrophia est: deficiens nutritio, gracilitas: at vitiosa, in leucis, & elephantiasi consistit. Quorum sane causæ, aliæ ad potentiæ imbecillitatem: aliæ ad errorem qui circa cibos committitur: aliæ ad studia, siue exercitia & ea quæ extrinsecus animali accidunt, referuntur. At vero imbecillitates potentiæ, quæ quidem propriæ sunt, simularium intemperiem: quæ vero non propriæ, instrumentales sequuntur morbos. Error autem circa cibos exhibitos, ad multitudinem, succorumque qualitatem refertur. Quemadmodum & studia, & ea quæ extrinsecus occurrunt, ad ordinem præposterum, & intempestiuum usum pertinere videntur. Oportet autem non modo symptoma nosse, verum eius semper causam inuestigare. Nam si ventriculus ciborum causa nihil omnino concoxerit, facile id symptoma corrigitur. Si vero ob extremum potentiæ lapsum, in lienteriam, aut in tympanitem mutabitur. Similis etiam & in sanguificatione, & in coctione illa quæ per totum corporis habitum fit, est inuestigatio facienda. Omnis autem intemperies, si vehemens fuerit, vires deiecit. Quod si frigus vicerit, frigidos affectus efficiet: contra, si calor: nec secus in reliqua oppositione. Si itaque ventriculus calore immodico

SYMP.T. C A V. L I B. I I I.

re immodico æstuet, illico corrumpentur. Quæ quidem corruptela nidorem communiter refert: priuatim verò quilibet cibus id nidoris genus reddit, quod naturæ suæ proprium existit. Nullus autem cibus, si immodicè fuerit excafactus, putredinè effugere potest. At qui sic sunt affecti, siti cruciantur: atq; interdum paruis tenuibusq; hecicis corripuntur. Si ob frigoris vehementem intemperiem cibus omnino crudus permanferit, ita affecti nec sitiunt, nec febriunt: sed ciborum qualitatem percipiunt, siue ad ructum, siue ad vomitum prouocentur. Quòd si leue aliquod cibus impriatur coctionis vestigium, fueritq; ciborū natura aut modicè temperata, aut frigidior, acidi ructus incitabuntur. Si verò calidiore itemperie fuerint, aut suapte natura flatum excitare possint, vapore spirituq; ventriculū replent. Atq; in huiusmodi intemperies faciliè ventriculus labitur. Ad tantam autem vel siccitatis, vel humiditatis intemperiem, vt actio eius aboleatur, ventriculus nisi in multo tempore, peruenire non potest. In retentrice potentia, triplex etiā reperitur symptoma. Nam aut nihil omnino complectitur: aut debiliter: aut deprauatè. Quum igitur, vel nihil penit^r, vel debiliter retinet, tum inflationes, tum fluctuationes sequuntur. Porro vltimæ imbecillitatis ventriculi causa aliquis morbus existit. Morborum autem qui accidunt illi, alii veluti similem, alii tanquam instrumentalem partem, ipsum solēt affligere. Miscentur autem interdum & morbi, & symptomata tum retentricis, tum expultricis potentiae, vt in ea ventriculi commotiōe, quæ veluti conuulsio illius est, eiq; per singultum accidit. Ventriculus siquidem per singultum, prauè cibos complectitur: conaturq; deprauato illo conuulsio q; motu, etiam molesta expellere. Etenim quemadmodum per vomitiones expelluntur ea quæ in capacitate fluctuant, sic per singultum illa, quæ imbuerunt ipsius ventriculi corpore,

D d d

49

Ventriculus æstans, cibos in vapores nidosos corrumpit.

Acidi a quibus edantur ructus.

Retentrice potentie triplex symptoma tribuitur.

Ventriculi morbi duplices.

Singultus causa.

Singultus expelli illa, quæ inhibita sunt in ipsius ventriculi corpore.

Piper si tenuē
sumat, postmo-
dumq; bibat
calida potio,
singultum ex-
citat.

Nausea, expul-
tricis faculta-
tis est deprau-
tatus motus.

Lienteria cā.

Cholera mor-
bis.

Attrahēdis fa-
cultatis sym-
ptomata.

Voluulo mor-
bo affligente,
ventriculus ab
intestinis excre-
menta suppres-
sa recipit.

Voluulus un-
de soleat oriri.

triculi corpus. Quamobrem piper, si in tenuissima cō-
minutū (vt possit penetrare ipsius ventriculi corpus)
sumatur, bibaturq; postmodum calida potio, singul-
tum vel maximē excitat. In vniuersum autem, siue
calida sint, siue frigida, quæ permeant ventriculi cor-
pus, excitabūt singultum: qui primū quidem expul-
tricis, dein retrahēdis facultatis est motus. Nausea quo-
q; expultricis facultatis est deprauatus motus, quo p-
gulam celerrimē vacuetur, quod os vētriculi infestat.
Inter hæc numeratur lienteria: vbi à re quapiam sic ir-
ritatur ventriculus, vt eam per inferius osculum ex-
pellere cupiat. Illo si quidem ad expulsionē vtitur orifi-
cio, in quod humores contristantes inclinant. Quod si
in vtrunq; repant, vt in cholera morbo, vtrunq; orifi-
cium accommodat. Attrahēdis ē facultas, aut omnino
nequit cibos attrahere (quod symptoma dicitur gulæ
paralysis) aut difficulter trahit, vbi incipit gula resolui:
aut deprauatē trahit: de quo motu iam sæpe diximus.
Est quum ob innatam carunculam tota gula aut eius
pars obstruatur: qui morbus instrumentalis vocatur.
Quum igitur ventriculus naturaliter habet, supernis
partibus ad sese trahit: atq; per inferiores deiicit. Vbi
verò præter naturam affectus est, etiam ab infernis assu-
mit aliquid. Siquidem nonnullis clysi vomitiōe sunt
redditi: sicuti & stercus, per letales voluulos. Satiū ta-
men est dicere, ventriculum per id genus affectus, non
trahere, sed recipere ab intestinis excrementa violen-
ter compressa. Id quod solet contingere iis, quibus ob
negotia non licuit, quando expediens erat, deiicere.
Nonnunq; etiam fit voluulus, vbi intestina suo illo na-
turali constitutionis motu priuantur. Quinetiam indu-
ratum stercus, tumoresq; præter naturā, obstant ali-
quando, vt vel nihil excrementorum feratur deor-
sum: vel nō satis copiosē deiiciani. In summa verò oīa
symptomata intestinox, ad ea quæ de vētriculo dixi-

SYMP.T. CAV. LIB. III.

51

mus, referunt. Alimenti p corpus digestio (que & ipsa naturale opus existit) tunc ad amum perficitur, vbi qualibet pars peculiarem sibi allicit cibum. Accidunt autem illi tria symptomatum genera. Nam vel imbecilla est: vel deprauata: vel omnino cessat. Quorum sane symptomatum causae dicuntur, aut trahentium partium intemperies, aut instrumentorum morbi, aut digerendi alimentum prauitas. Ac per intemperies quidem, facultas redditur imbecilla. Instrumentorum vero morbi, alimenti meatus costringunt. Prauitas autem dicitur, si vel crassior, vel glutinosior sit cibum. Similiter impedita expulsionis excrementorum, triplices causae inueniuntur. Vna, quum partes quae excrementa expurgant, sunt imbecillae. Altera, viarum angustia. Postrema est excrementi malitia. Imbecillitate intemperies parit: angustiam vero, vel obturatio, vel aliquis instrumentorum tumor. Atqui tumorum causa est humorum affluxus. Obturationem facit humorum vel crassitudo, vel lentor, vel innatum tuberculum. Excrementorum autem malitia, est multitudo, crassitudo, & viscositas. Per concoctionem in venis factam, tria redundant excrementorum genera. Vnum bilis amara, quae ab hepatis vesica expurgatur: alterum atra bilis quae a liene: tertium veluti serum, quod attrahitur a renibus. Quum autem viarum duo sint genera: vnum per quod excrementum trahitur: alterum per quod expellitur: vtriuslibet angustia excretionem laedere potest. Nonnunquam etiam horum nullum est laesum, sed excrementi multitudo quum immodica est, vt tota expurgari non possit, vna cum sanguine, per totum corpus defertur. Huius vero immoderationis duplex affertur causa: nempe alteratrix potentia male affecta, & alimentorum prauitas. Iam vero pallida bilis, si redundet per vniuersum corporis habitum, regionum morbum: sin autem in vna tantum parte consistat, erysipe

Digestionis ciborum symptomata, atque ipsorum symptomatum causa.

Expulsionis excrementorum non respondentis, causa triplex.

Excrementorum peruagantium uenas cum sanguine, tria genera.

Excrementorum viae duces.

Bilis pallida quos morbos gignat, per corpus fusa.

Ddd ii

Atrabilis quos
morbos pariat
Pituita quos
morbos gi-
gnat.

Serum sangui-
nis quos affe-
ctus producat.

Nutritio ē na-
turaliū actionū
prima.
Assimilatio al-
teratio est.

Nutritoriæ fa-
cultatis sym-
ptomata.

Atrophia.

Elephas qd.

Alphi.

Alimenta ad
suam naturam
immutant car-
nē & immutā-
tur ab illa.
Perficaplanta.
Coniuncta af-
fici mutuo.

lata & **herpetes** excitat. **Atram bilem**, si in vniuerso
adsit corpore, **elephas**: si in vna aliqua parte, **cancer** se-
quitur. **Pituitam**, si per vniuersum corpus increuerit,
leucophlegmatia comitatur. Sin autem in vna parte,
oedema. **Serosa excrementa** si redundant, **ascitē aquā**
inter cutim inducūt. Quæ si vnā aliquā partem in-
uasierint, in ea pustulas gignunt. Pro miscella autem
ipsorum excrementorum, variari solent & morbi, &
symptomata. Porro nutritio, vt naturalium actio-
num est prima, sic per q̄ necessaria existit: quippe quæ
species alteratricis facultatis censetur. Assimilatio si-
quidem alteratio est: quæ quidem, licet nomen diuer-
sum à nutritione sortiatur, idem tamen vtriusq̄ est
opus. Nutritio autem ab scopo aberrat, si vel nihil
omnino agit, vel ab actione perfecta deficit, vel vitio
sē agit, idq̄ ob altricē facultatē, quæ sub alterationis
genere continetur, vel ob materiæ tum defectum, tū
prauitatem. Ob defectum quidem, vt i atrophiiis: siue
hæ ex defectu, siue ex priuatione dicantur. Hic autem
in atrophiiis defectus, non propriè ad cibum qui inge-
ritur, sed ad materiam membro dicatā, est referendus.
At prauitas cibi, leucas & elephantiasim eiusq̄ gene-
ris alios affectus gignit. Verū vbi caro nigra pallidaq̄
fuerit, elephas nominatur. Nec aliter affectus hic gigni
solet, q̄ leuce: Iam alphi hand diuersam à prædictis ha-
bent generationem. Cæterum per hos non caro vni-
uersa afficitur, sed corporis superficies duntaxat, velu-
ti squamis quibusdam ispergitur. Atq̄ albi quidem ex
pituita: nigri verò ex melancholico humore prodeūt.
Si quidem alimenta carnem, maximè permutare ad
suam ipsorum naturam possunt (Etenim Persica plan-
ta, quum in Persia fuisset letalis, postea in Aegyptum
translata, quod inerat noxium amisit) quanq̄ a carne
etiam, alimenta ipsa immutantur. Omnis siquidem, res
vel si longè potentior sit, ab illa cum qua uersatur: affi-

citur. At nō solū ob alteratricis facultatis imbecillitatem, pars aliqua alimento priuatur: sed etiam vbi attrahendi vis imbecillior fuerit: aut expultrix immodicē mouerit. Atqui tunc immodicē mouet expellendi vis, vbi retentrix potentia grauatur, vel ob excrementorum multitudinem, vel acrimoniā, vel ob propriā imbecillitatem. Tunc siquidem necesse est, vt cum eo quod redundat, simul etiam id quod vtile est, excernatur: vt in lienteria, dysenteria, choleraq; fieri cōtingit. Quod si expultrix facultas sit imbecilla, necesse est carnem tunc humidiores fieri, pluribusq; excrementis impleri. At redundantia multorum excrementorum, ob alteratricis facultatis imbecillitatem accidit. Pro ipsorum autem excrementorum tum quātitate, tum qualitate, aliās aliter caro immutatur. Quod verō ad sanguinis excretiones pertinet, si excipias eam quæ foeminis per singulos menses accidit, reliquæ omnes toto genere præter naturam existunt: profluua autem vteri, vbi modum in quantitate excesserint, tunc solū præter naturam cēseantur. Omnium autem sanguinis fluorum causa, trifariam potest accidere. Quippe vel facultas ora vasorum aperit, vt i sanguinis fluore è naribus est videre: vel sanguis è male affectus, vel vasorum aliquod etiam malè affectum, vel ruptum. Etenim vasa rumpi contingit, aut ob plagam acceptā extrinsecus, aut ob saltum, aut ob casum ab alto, aut ob vociferationem vehementem. Sanguinem malè affectum dico, vel quum adeò vitiosus est, vt vasa quibus continetur, erodat: vel adeò auctus, vt à vasis contineri non possit. Vasa malè affecta dicuntur, si vel molliora, vel duriora, vel tenuiora fuerint. Siquidem qd immodicē molle est, facilè ob imbecillitatem rumpitur: sicuti & valde durum, quia non facilè multum extendi potest. At tenue, ob huiusmodi has vtrasq; affectiones, non solū ab internis causis, verū etiam ab

Alimenti priuatio vnde accidat.

Expultrix vis quando immodice moueat.

Expultrice facultate existente imbecilla, quid accidat.

Sanguinis excretiones omnes, menstrua excepta, præter naturā existunt.

Sanguis quotupliciter effluere possit.

Vasa quibus modis dirumpi possint.

Sanguis aut quātitate, aut qualitate immodicus.

Vasa quotupliciter male affecta dicantur.

Reseratio va-
forum unde ac-
cidat.

Vomitum a qui-
bus causis mo-
veri possit.

Sanguis in ve-
triculo, contine-
tur præter na-
turam.

Deiectionem ci-
tantes cause.
Cibus multus
quotupliciter
dicitur.

externis vt rumpatur facile, est habile. Verum non omnia uasa erodi similiter possunt. Nam durum crassumq; erosu est contumax. Similiter de reseratione e dicendum. Nam uasa imbecilla, mollia, & tenuia, pro- na sunt vt oscula ipsorum pateant: robusta verò, & cras- sa, & dura, sunt ad talem reserationem inepta. Cæteræ reseratio accidit ab iis quæ ora uasorum irritant, & à plenitudine grauante: sicuti quandoq; à natura, quum excernit ea quæ sibi molesta sunt. Sed iam de iis quæ vomitu reijciuntur dicamus. Excernuntur igitur hæc interdum & quantitate & mole sua ventriculum gra- uent, vt quum plurimum cibi est ingestum: iterdum, q; sua mordacitate contristent: vt si nutrimentum assum- ptum vel acidum, vel nidorosum, vel amarum, vel acre, ob vitium concoctionis euaserit. Eodem genere conti- nent & biliosa, & pituitosa, & serosa excrementa, vel inibi nata, vel ex vniuerso corpore illuc confluentia. Tertium causarum genus ventriculum ad vomitum incitans, est quod haudquaquam irritans, in illo continetur præter naturam: vt videlicet sanguis. Cõmuniter autem dicuntur esse præter naturam, quæ etiam si sint conco- cta, minimè possunt alere. Iam verò recrementorum ad infernas partes expulsio, nonnunquam solitum tempus præuenit, vel quia uenter copia multi cibi grauatur, vel pungitur, vellicaturq; vt à re mordente: quam vt alienam expellere nititur. At dicimus multum cibum, vel quia facultas seipsa imbecillior e reddita: vel quia existit assumptum alimentum immodicum: vel ob utrâq; causam. Præter iam dictas causas, alimenta tum hu- midiora, tum viscosiora ingesta, ipsam deiectionem ac- celerant. Quæ tum celerius delabuntur, quum leuiter post eorum assumptionem deambulaueris. * Quum au- tem complura sint intestinorum volumina, per quæ deferri alimenta est necesse, cibi sanè ipsi, ob grauita- tem diu immorari non possunt: q; si eorum quippiam

SYMP.T. CAV. LIB. III.

59

in ipsis circumuolutionibus fixum inhæreat, id subito ab actione intestinorum (quibus inest vis expellendi in festantia) propellitur. Tardius quàm pro consuetudine excernit vèter, aut ob intestinorum vel imbecillitatem, vel obtusum sensum: aut ob alimentorum tum paucitatem, tum qualitatem. Sed musculorum abdominis imbecillitas etiam deiectiones retardat: præsertim si duriora sint excrementa: quo tempore thoracis musculi etiam auxilio sunt. Pauciora quàm pro ratione assumptorum excrementa excernuntur, ubi plus ex cibis per corpus digeritur. Econtrario plura deiciuntur quàm pro portione ingestorum, interdum ob defectum digestionis per corpus: interdum ob excrementa quædam è supernis ad regionem ventris defluxa. Porro assiduæ excretiões, uel ob imbecillitatem, uel ob morsum eueniunt. Imbecillitatem intemperies inducit. At mordicant humores contenti. Est & alius assiduæ deiectionis modus, quæ fit ob sedis musculos resolutos. Quippe huiusmodi deiectiones à uoluntatis imperio non pendunt: proinde & intempestiuæ, & inordinatæ, & assiduæ sunt: Iam verò solet flatu in uentriculi spatiis oriri, quum vel humores pituitosi illic contenti, uel cibi, in uapores ab imbecillo calore soluuntur. Etenim ut ab solutum frigus uaporem haudquaquam excitat, sic uehementis calor exactius magna ex parte cibum ipsum comminuit, quàm uaporis generationi conueniat: nisi fortè is suapte natura sit flatulentus. Quemadmodum enim frigidissima constitutio, maximè spirante borea, aerem sereniorē reddit: ac rursus calidissima constitutio æstatis, efficit aerem nos ambientem purissimum: mediæ verò constitutiones nebulas pariunt: sic in animalium corporibus à solo moderato, imbecilloque calore * flatulentum gigni excrementum contingit. Hoc igitur si per os excutiat, ructum efficit: sin autem per sedem, flatum molitur, interim strepentem, interim sine strepi-

Aluum tardius deicere quæ compellant.

Excrementa cum nunc plura, nunc pauciora quàm pro ratione cibi assumpti excernantur. Fluxionis assiduæ, causæ.

Deiectiones intempestiuæ, siue præter uoluntatis imperium, flatu in ventrigigni a pituitosis humoribus, et calore imbecillo.

Serenissimum reddi aerem, Borea spirante.

Flatum in uentriculo genitum, quæ sequantur symptomata.

Ddd iii

**Strepitū a fla-
tu profectū eo
acutiorē edi,
quo flatus ipse
tenuiora intesti-
na magis pua-
dit: grauiorem
autem, quo ma-
gis ille crassio-
ra versus descē-
derit.**

**Strepitus mur-
murillus, purus
fridensq; quid
indicerit.**

**Defluxus vnde
in ventriculū
accidat.**

**Excretio qbus
fiat modis.**

**Excrementum
sola quantitate
alienum, quod
sit.**

**Hepatici qui
dicantur.**

tu. Quum uerò per neutram defertur partem, infla-
tionem, symptoma uetriculi imbecilli, producit: quæ
etiam mota per vacua intestina, in illis uarios gignit
strepitus: qui quidem eo acutius atq; tenuius resonat,
quo purior spiritus fuerit, magisq; per intestina tenuio-
ra & superiora delatus: eo autē minor, sed grauior re-
sonatio sentietur, quo spiritus magis ad inferiora in-
testina descenderit. Quod si intestina ipsa aliquam hu-
miditatem contineant, strepitus murmurillus dictus
gignetur: qui humidi excrementi defectionem nuncia-
bit. Si uerò strepitus æditus, purus & clar⁹ resonet, aut
intestini ipsius inanitionem, aut in superiori eius par-
te excrementa dura contineri significabit. Qui strepi-
tus cum fridore fit, is ab instrumentorum angustia, &
inflante spiritu, atq; pauca humiditate procedit. De-
fluxus à supernis partibus in uentriculū fit, ubi facul-
tas præualida, redundantia excrementa expellit: in-
terdum ubi ad eò imbecilla existit, ut ne id quidem qd
utile est, ferre possit. Excernitur id quod redūdat, tum
per crisis, tum per integram ualeitudinem, ut in mulie-
ribus singulis mensibus, & in iis quibus aliquod mem-
brum est mutilatum: id quod etiam per definitos cir-
cuitus contingere in aliis multis uidemus, qui prioris
uitæ exercitia, cum ignauo otio mutarunt. Atq; ex-
crementum huiusmodi sola quantitate est alienum. Al-
teræ qualitate aberrat: magnaq; ex parte in acutis mor-
bis solet excerni per crisin. Inter hæc duo excremen-
torū genera, est aliud tertium genus medium, ut in ven-
triculo semicoctus cibus. Hoc autem per hepaticas af-
fectiones maximè excernitur. Cæteræ nominantur he-
patici, quos ob iecinoris imbecillitatem infestat mor-
bus, etiam si nulla adsit phlegmone. Hepar igitur, si qñ
alimētum, quod per meseraicas venas attraxerat, ne-
queat conficere, per easdem rursus id semicoctum ac-
simile aquæ in qua fuerunt ablutæ carnes nuper ma-

S Y M P T. C A V. L I B. I I I.

Ata, respuit. Quod si alimentum in hepate accuratè concoctum fuerit, ob aliquod autem impedimentum distribui in corpus non possit, vt ad * ventrem redeat est necessarium. Quo tempore excretus sanguis apparet nigrior, splēdidiorq; illo, qui naturalis existit: utpote ex sanguine & atra bile commistus. Etenim sanguis solus per se ob refrigerationē nigricans, tantū abest vt splendorem ullum acquirat, ut etiam eum quem ab initio habuit amittat. Atra autem bilis eo splēdidior existit: quale maris mortui bitumen iudaicum. Siquidem non ex refrigerato sanguine, ut grumus, sed ex immodicè assato, feruidoq; veluti quidam cinis, gignitur atra bilis. Cæteræ ipsa est frigida, quia terrestris: non tamen caloris expers: quemadmodum nec cinis, nec etiam acetum. Igitur cruentorum excrementorū quatuor sunt differentiæ. Prima est, vbi sanguis quatenus dictum est, per circuitus quosdam emanat. Secūda, quum ob imbecillitatem iecinoris, haud absimilis lauacro abluta carnū sanguis deiicit. Tertia (quam nuper diximus) ex melancholico splēdenteq; sanguine constat. Ac per has tres differentias, & multum est excrementum, & assatim excernitur. Per quartam vero (quæ ex ulcere intestinoꝝ oritur, præcipueq; dysenteria vocatur) paulatim & breuib; interuallis deiectionē fieri contingit: nonnunq̃ synceri sanguinis: nonnunq̃ grumosi: cum quo interdum puris quoq; nonnihil excerni solet: quēadmodum & ramenta, & partes quædam membranarū intestinorū cōsimiles. Sæpenumero densum quoq; stercus excernitur, cruentis guttis respersum. Eiusdem generis cum prædicta dysenteria est tinesmos vocatus, ob recti intestini vlcus eueniens. Qui quidem cætera symptomata dysenteria similia habet: tensionis verò vehementia, dysenteriam longè superat. Vrinæ tum suppressiones, tum depravatae expulsionēs, excrementis quæ uel in uentre reti-

7
Alimentum ab hepate in ventrem rege-
ri, quando necessū sit.

Atrā bilē esse excreto sanguine splēdidiorē. Atram bilē gigni ex sanguine immodicè assato, esseq; frigidā, non tamen caloris expertem. Cruentorum excrementorum differentiæ quatuor.

Dysenteria signa.

Tinesmus oritur ab ulcere intestini recti.

Vrinam unde
supprimi acci
dat.

Ischuria, quorū
symptoma exi
stat.

Vrinæ meatus
ex quibus ob-
strui occasione
bus possit.

Vesicæ osculū,
qua ex causa
conniueat.

Stranguria fit
vel ob imbecil
litatem vesicæ
vel ob lotii a-
crimoniam.
Colliquationes
partium quī-
bus modis sol-
uuntur.

Renū facultas.

nentur, vel præter morem naturæ eiciuntur, propor-
tione respondent. Supprimitur igit, vel ob vesicæ im-
becillitatem excernere non potentis, vel ob ostioli ipsi-
us angustiam. Quorū duorū morborū ischuria est unum
commune symptoma. Est & aliud symptoma quum
nihil penitus urinæ in vesicam delabatur, abolita nimi-
rum renū actione. Alius itaq; affectus censendus est,
quum oppleta vesica, alius quā uacua, nihil urinæ red-
ditur. Nam in ea affectione qua vesica est plena, oportet
aut orificium eius angustum, aut naturam imbecil-
lam existere. Os igitur fit angustum, quia obstruitur et
conniuet. Atq; obstruitur quidē, à grumo, uel crasso pu-
re, uel lapide, uel callo, uel tuberculo, quod in meatu
creuit: cuiusmodi in externis partibus omnibus accide-
re cernimus. Conniuet autem, aut ob tumorem præ-
ter naturam, cuiusmodi est phlegmone: aut ob siccita-
tem ingentem: qualis per febres ardentissimas gignit.
Sunt verò deprehensi quidam vesicam oppletam habē-
tes, qui veriti surgere à cœna, ut illam exonerarent,
postea meiere nequiverunt: qualis etiam affectus ven-
tri & intestinis solet interdum accidere. Igitur iam di-
cti affectus, vim excernendi vrinam, sua functione de-
fraudent. Qui verò ab iis magnitudine relinquuntur,
actiones efficiunt obtusas, torpidasq; . Reliquos affe-
ctus tertium genus symptomatum (quod in motibus de-
prauatis consistit) comitari cōsuevit: cuius multæ spe-
cies habentur. Primam stranguriam appellant, quæ
vel ob imbecillitatem vesicæ, vel ob acre lotium fieri
videtur. Secunda species profluuii ventris est similis.
Solet aut fieri quædam veluti resolutio, colliquatiōque,
interim vniuersi corporis: interim succorum tantum,
quos venæ continent. Deinde quod ita liquatum est,
modo in ventrem, modo cum vrina defluit: nonnunq;
in sudorem degenerat. Igitur venarū succos in sero-
sam sanie solutos, renes ad sese trahunt, vbi integrē

valent, continenterq; ad vesicam transmittunt. Si vero inualidi fuerint, vt ipsos trahere nequeant, tunc venæ eiusmodi serum aut in ventrem demittunt, nimirum si crassius sit: aut in vniuersum corpus pellentes illud, vbi est tenuius, subito totum habitum ad aquam iter cutem transmutant. Quod si caro liquata sit, tum vel venter suscipit ipsam fluxionem, si sit crassiuscula, vel sudores profluent, si in vapores soluantur. Reliquorum lotii symptomatum, alia quidem vesicæ aut renū quosdam affectus indicant: alia quantum vel cruditatis vel concoctionis accesserit sanguini, ostendūt. Vt vero ad sudores transeamus, vbi in resolutio corporis habitu eueniunt, affectus vocatur syncope: cuius sane rei contrarium, per sudores creticos accidit: quippe qui robustas vires annunciant. Eis autem sudores sunt similes, quos modica exercitatio, & balneum, & calor æstiuus euocat. Per exercitationes autem immodicas, nonnihil vtilis humoris excernitur. Odorem verò & colorem excrementi quod expurgant, sudores obtinent. Cæterum multus sudor effluit, aut ob corporis raritatem, aut excrementi tenuitatem, aut abundantiam. At detinetur, si paucum, viscidum, crassumq; excrementum fuerit, aut constipati meatus: id quod accidit ipsis, quia vel obturantur, vel conuiuent. Ac obturantur quidem a succis crassis & viscidis. Conuiuent se ob nutritionem pleniorē, vel ob refrigerationem, vel ob mollitiem. Adhæc sudoris tum excretio, tum suppressio, ob viriū in carne imbellitatē interdū accidere solet. Porro nulli⁹ partis functio, manere ipsius essentia illæsa, impediri potest. Nulla autem qualitatum agentium, res vicinas perinde alterare videtur, ac calor. Quare corpus calidum simul & humidum, q̄ celerimē proprium sibi alimentum concoquet, assimilabitq;. Quod uerò ita sit dux, ut & flectatur faciliē & firmiter innitatur, id & trahere uehementer quidlibet, potest.

Aqua inter cutem quomodo generetur.

Syncope quid, Sudores cretici robustas vires annunciant.

Sudores retinēt odorem & colorem eius, quē purgant, humoris.

Sudoris tū nimis fluentis, tū suppressi cau-

Essentia partis illæsa, functio impediri non potest.

Calor vicinas res omniū maxime alterare potest.

3.

Calidū & humidum corpus quā celerrime propriū sibi alimentum assimilare.

Frigida & sicca corpora cur nutriantur inficissime.

Concoctio.

Nutritio.

Appositio.

Adhæsiō.

Pueri vim retentricem habent imbecillio- rem: expultricemq; non admodum fortem.

Pueri quibus facultatibus superet iuuenes, & quibus ab eis superentur.

Puerilis iuuenilisq; caloris discernimen.

Nutriuntur omnia similibus.

& ipellere uolēter, & detinere fortiter poterit. Optimē itaq; nutriuntur calida & humida corpora: ut quæ & celerrimē immutent, alliciantq; ad se, reponantq; & assimilent alimentum. Pesimē omnium frigida, & sicca: ut quæ nec alterare, nec suscipere, nec apponere, nec assimilare sint apta. Quod verò humidiora corpora tum facilius, tū celerius adhæreant, coalescātq;, duriorum autem, alia nequaq;, alia non facile id perferantur, nemini obscurum existimo. Cæterum concoctio & nutritio, alterationes esse censentur. Appositio fit, quum cibus in roris speciem redactus, à nutrito suscipitur. Adhæsiō est, alimenti cum alito cōglutinatio quædam: dum in vnum coalescunt. Atq; in his omnibus pueri, aliiq;, quorum temperamentum calidius est & humidius, optimē degunt: nec infeliciter in illis distributio perficitur. Retentricem tamen facultatem pueri habent imbecillio- rem, ob idq; excernunt celeriter. Similiter etiam expellendi facultas, vt retentrix, modicē illis est imbecilla. Eget autem longiori tempore facultas retentrix, quo suo fungatur munere: expultrix verò breuiori. Pueri igitur, vt alteratricis facultatis robore iuuenes superant, sic attrahendi vī sunt ipsis longē inferiores: atq; ab eis etiam in duabus reliquis facultatibus superantur. Quanq; expultricis imbecillitas in eis minimē deprehenditur, idq; ob temporis breuitatem, quo suo fungitur munere. Quippe crebrius & deiciunt & vomunt, q̄ iuuenes, non ob expultricis potentiaē robur, sed ob retentricis imbecillitatem. Atq; in concoctionibus quæ ad ventriculum pertinent, si humida molliaq; sumpserint, ea perinde ac iuuenes concoquunt: dura verò, deterius conficiunt. Si quidem puerorum calor, ad vaporis naturam: iuuenum, ad siccitatem magis accedit. Atqui humidiora corpora humidioribus indigent alimentis: sicciora siccioribus. Senes ad omnes ferē actiōes corpus malē as-

S Y M P T. C A V. L I B. I I I.

fectum sortiuntur: quippe qui iuuenib⁹ aridiores sint, præterea etiam frigidi. Quare nec probe concoquunt, ob caloris penuriam: nec rite nutriuntur, partim ob siccitatem, partim ob imbecilitatem alteratricis potentiae. Iam digestio per corpus ipsis & tarda, & imbecilla est, nimirum instrumentis veluti torpenti- bus ob frigiditatem. Porro ad functiones actiuas cali- dum instrumentum & siccum, magis idoneum est: fri- gidum verò & humidum, imbecillius. Reliquæ duæ con- iugationes medium inter has locum obtinent. At ve- rò si ætates ipsas spectes, naturaliter frigidum & humi- dum corpus, minimè deprehenderis: quanquã ob affe- ctum præter naturam, talia reperiri contingat. In vni- uersum igitur, frigidum ubique est debilius, & torpidum, siue humori, siue siccitati iungatur. Haud aliter inter naturales potentias, retentrix robustior quidem videtur in aridioribus calidioribusq; instrumentis: im- becillior verò, in humidioribus frigidioribusq;. Simili- ter nerui, tendones, syndesmi, & muscoli, quanto sic- ciores, tãto robustiores euadent: nisi adeò modum ex- cesserint, vt ob duritiem vix flecti possint. Nam si sic sint affecti, corripientur spasmo. Contrà naturalia in- strumenta, quo sunt humidiora, eo sunt ad nutritio- nem magis idonea: vel si ad extremam humiditatem peruenerint: ad concoctionem verò non sunt aptiora, nec se ipsis, nec aridioribus, quibus similis adsit calor: nisi siccum aliquando cibum exhibeas instrumẽto sic- co & squalido, non liberaliter ei cribuens humiditatẽ. Cæterum & ad digestionem per corpus, & ad excre- tiones, corpora admodum dura, ineptissima existunt: quod haud facile vel dilatantur, vel contrahuntur. Quorũ alterum attractiõem: alterum excretionem molitur. In summa verò, calor auctus ad omnem alterationem efficacissimus est, nisi ad tantam, vt colliquet, vehemẽ- tiam increuerit. Siccitas ad robur & firmitudinem cõ-

61

Senes cur fere ad vniuersas functiones cor- pus male affe- ctum sortiatur.

Actiuis functio- nibus quæ in- strumenta sint commodiora.

Frigidum & hu- midum natura- liter nullum cor- pus reperiri in ætatibus.

Frigidum ubique esse debilius, torpidumq;.

Naturalia in- strumenta, quo sunt humidio- ra, eo sunt ad nutritionem magis idonea: ad concoctionẽ verò, ineptiora aridiorib⁹, quibus adsit simi- lis calor.

Qualitatē quæ
in quibus sint
efficaciores sū
etiā quæ
inutiles.

Corvza.
Catharrus.

Destillatio est
defluxus in os.
Grauedo est de
fluxus ad nares
Raucedo est ad
fauces deflu-
xus.
Vua.
Antiades
Paristhmia.

Vteri corpus a
quibus causis
durari possit.
Menses unde
retineri contin-
gat.

Menses quibus
ex causis plus
æquo fluant.
Muliebri pro-
fluuium.

fert, nisi adeò sit cruda, vt corpora rigida, immobilia, ac friabilia efficiat. Humiditas ad nutritionem quidē mirificè facit: cæteris verò functionibus omnibus aduerfatur, excepta qua corpus augetur. Deinceps autē de fluxionibus à cerebro oriundis aliquid etiam dicamus. Destillationis igitur & grauedinis (hæc coryza, illa Græcis catharrus dicitur) cerebrum causa existit: vt pars quidem similis, vel à frigore, vel à Solis ardore in intemperiem, adactum: vt instrumentum verò, quatenus infestatur à plenitudine. Cæterum destillatio fit, si ad os excrementum defluerit: grauedo si ad nares: quemadmodum & raucedo, si ad fauces decumbat. Quod si fluxio gurgulionem inuadat, aut vuā pariet, aut ipsum in tumore attollet. In glandulas quæ ad finem oris vtrinque adiacent, si decumbat, antiadas procreat: Sicuti & paristhmia, inuadēs ea quæ illis proxima sunt. Ac defertur quidem fluxio à capite nonnūq̃ in ventrem: nonnūq̃ in asperam arteriam, vtrilibet maximè nocens. Quod verò ad vteri corpus spectat, si solidum fuerit, aut durum, causa est, cur supprimantur menses. Duratur autem, vel illico à primo ortu: aut tractu temporis, post ipsam generationē: videlicet ob intemperiem, aut affectus alios præter naturam. At in temperies vteri, interdum à natura oritur: interdum sequitur morbos, perinde ac densitas. Detinentur etiā nonnūq̃ menses, ob materiam ipsam vacuādam, vbi vel crassa est, vel viscida: necnon vbi à crassis humoribus vasa quæ ad vterum descendunt, obstruuntur. Ad hæc vterus nihil omnino excernit, ob multas exercitationes, & victum tenuem, & quum ad alias partes repunt humores. Minus excernit æquo, ob easdem causas, sed remissiores. Plus autem ob diuturnum otium, & victum opiparum. Cæterum deprauatæ vteri fluxiones (quod symptoma fluxus muliebris dicitur) sunt expurgato per hanc partem vniuerso corpore. Ac talē

semper speciem refert id quod excernitur, quale est quod in animali redundat. Est & aliud ex utero depravatatum profluuium, ob affectum aliquē ipsum infestantem eueniens. Insuper interdum cohibentur menses, sanguine, ob robustas vires, in alias partes irruente. Ad hunc autem sermonem pertinet meminisse mulierum minimè foratarum, quibus vteri meatus coaluit. Iam priapismus est, quum inuito intumescit inflaturque masculinum pudendum: cuius symptomatis causa existit flatulentus spiritus. Porro gonorrhœa, si pudendo non intento acciderit, retentricis facultatis in semina riis vasis imbecillitatem sequitur. Si verò intento pudendo eueniat, conuulsioni quodammodo erit affectus similis. Colorum vicissitudinem (vt summatim dicā) faciunt succi à sua naturali specie aberrantes, aut in profundum subeuntes, aut cutem veluti illuentes. Particulatim verò, causæ, ob quas succos ad huiusmodi tum motus, tum affectus peruenire oportet, sunt affectiones animi: aeris nos ambientis vel ad calorem, vel ad frigus mutatio, corporis affectus, vel calidiores, vel frigidiores: item sanguis vel paucus, vel plurimus: tum foras elatus, tum intrò reuulsus. Huc accedit etiā quodlibet humorum vitium, ad suam ipsius speciem vniuersi corporis colorem permutare potens. A naturali autem figura deflectunt partes, immodicè vel replete, vel inanitæ, vel à propriis sedibus deturbatæ, aut reuulsæ. Vt autem hunc iam commentariū claudamus, operæpretium mihi videtur addere, quæ nam symptomata sibi mutuo & necessariò succedant: & quæ item non necessariò. Igitur id quod fit, vnāne ex causa fiat, an ex pluribus, considerandum. Nam si ab vnica tantum fiat, necessariò causæ efficienti succedet. Si à pluribus, non necessariò. Symptoma itaque quod ab vno alio dependet, necessariò consequitur illud. Vbi verò aliæ quædam causæ ad secundi symptomatis genera-

Causæ mulierum res.

Priapismus est inuoluntarius tumor virilis pudendi à flatulento spiritu ortus.

Gonorrhœæ species. Colorum vicissitudines vnde oriuntur.

5.

Figura partium à quibus causis vitietur.

Symptomatum quæ nam sese mutuo ac necessario sequantur: et quæ minime.

tionem accedunt, ipsum non necessario ad primum consequitur. Neque enim cruditatem, gratia exēpli, inflatio ex necessitate sequitur, vel mordicatio, uel nauſea, quā tum horum, tum reliquorum symptomatum, ferē omnium nullum est, quod non aliquando cruditates sequi videatur. Verū & cruditatis magnitudo, & differētia, tum hominis natura, tum sensus, uel acutus, uel obtusus, itē singularum corporis partiū & robur & imbecillitas faciūt, ut aliās aliud symptoma cruditatem sequatur. In summa, uerō quæcūq; pars cruditatē fecerit, illa noxam percipiet, quæ maximē imbecilla fuerit. Proinde nullum symptoma necessario sequi cruditatem, possumus asseuerare. Vbi autem alimentum minimē per corpus digeritur, siue priuatio, siue imbecillitas fuerit actionis, atrophiam necessario inducet, quēadmodum in singulis partibus alteratricis potentiæ noxa. Præterea expultricis facultatis circa excrementa, aut sanguificæ potētiae, aberratio, necessario producit prauī coloris symptoma.

Cruditatē nullum necessario symptoma sequitur.

Atrophia sequitur necessario alimenti defectum.

GALENI PERGA

MENI DE CAUSIS

PROCATARCTICIS.

LIBER VNVS.

Procatarctice causæ inualida tantum corpora immutant.



QV A S Procatarcticas, siue externas, siue præincipientes appellant, ut magnus calor, frigus ue ambientis, aut etiam aliquis animi affectus, inualida solum corpora commouent: ac proinde à nonnullis nō causæ sed morborum occasiones uocantur. Videmus etenim mille simul in theatro sedentes, ē quorum numero quatuor dūtaxat æstuant: & in eis à febre unus solus arripitur, quod nuper

quod nuper familiari nostro Menandro contigit: quē nos secunda die inuisentes, iussimus caput rosaceo fo-
ueri: mox dormire: postmodum impensē lauari, ac sic tandem est restitutus. Alios etiam complures, ob æstū & labores febrientes, reclamantibus cæteris medicis, plurimis balneis ac uictu humidiori usus, similiter persanauit. Non desunt tamen, qui varia connectentes sophismata, quas nuper causas procatarcticas diximus eas morborum causas esse inficiantur: quæ uidelicet nec semper, nec omnia corpora lædāt. Qui quidem nō secus habendi sunt odio, ac illi, qui spinas & hamos, in viis, per quas sunt transituri homines, semināt. Nos itaq; horum impedimentorum nonnulla iam rescindamus: aliqua emendemus: alia conteramus: ut antiquā viam, quæ non ad ciuitatem, sed ad artē omnibus ciuitatibus utilissimam ducit, purgemus. Quod igitur tū frigus, tum immoderatus calor, & contristare, & morbos gignere soleant, id idies natura rerum nos docet: quum nimirum vel ipsa animalia bruta, soleant loca & regiones, mutare, ut æstate quidem calorem: frigus verò hyeme declinent. Quod si hæc noxia quidem, nō tamen morborum esse causas fateātur, quæ nec semper, nec omnibus noceant, iam non de re, sed de nominibus disputant: quanquā ne sic quidem effugere poterunt, quin cōuincant, saltem illas esse causas nocuenti iis, quibus nocent corporibus. Sūt porro duæ primæ causæ ac maximè principales in vniuersum: scopus videlicet, siue finis, cuius gratia fiunt omnia quæ fiunt: ac p-terea id, à quo ea fiunt. Has dignitate sequuntur tertia & quarta, instrumenta nimirum quibus, & materia ex qua. Etenim in humanis artibus, nisi causæ omnes cōspirent, nullus vnq; effectus absolui poterit. Nā nisi aliqua esset lecticæ utilitas, nunquā faber illam cōstrueret. Sed si aliqua sit illius utilitas, careat autem dolabra, ser-
ra, terebello, aliaq; supellectili instrumentorum, nec

Menandru ex
insolatu febric
tē, qua ratione
sanarit Gale-
nus.

Bruta mutant
regiōes, ut æstū
& frigus vitæ.

Causæ primæ
& maxime pri-
cipales in vni-
uersum, sunt fi-
nis cuius gratia
fiūt omnia quæ
fiunt: & præte-
rea id a quo
fiunt: quas po-
stea sequuntur
reliquæ, nēpe
instrumenta si-
mul atque ma-
teria.

Effectus nullus
absolui poterit
in humanis ar-
tibus, nisi cau-
se in unum oēs
cōspirēt: id quod
in iis quæ for-
tuito cōtingūt
minime neces-
sariū uidetur.
Oīa egere ma-
teria ex qua,
& efficiente a
quo fiant.

Causæ appellā-
te sunt, quæ ad
rei generatio-
nem conducunt.

Causæ accidē-
tariæ sine quibus
operari non li-
cet.

Vacuum nusquā
dari.

sic lecticā coagmentabit. Et si hæc illi oīa præsto sint,
& mox ligna deficient, neque ita componetur lectica.
Sed nec si instrumenta & materia parata sint, & utili-
tas urgeat, absit autem artifex, quicquid unquam compingi
possit. In iis tamen artibus quæ casu fiunt, interdum fi-
nalis causa desideratur: quum ea nullius gratia fiant:
est etiam ubi id per quod fiunt, abest. At nihil inuenire
licebit, quod materia non egeat, ex qua constet, & ef-
ficiente, a quo fiat. Semper liquidem est necesse, ut sit
conuentus alicuius patiētis, quod vicem materiæ sub-
eat: & alterius quod circa ipsum agat, & efficientis ra-
tionem obtineat. Hoc autem nonnunquam instrumento
eget, si alicuius gratia operetur. Interdum sine instru-
mento agit, ubi nullius gratia neque ex proposito agit.
Vbi igitur ex frigore vel æstu aeris ambientis, aliquis
læditur, aer ambiens dicitur causa effectrix: materia,
corpus affectum. Nullus itaque effectus oriri poterit, nisi
efficiens & materia iungantur. Vnde oportet ut hæc
vtraque aliquid ad generationem rei conferat. Quæ au-
tem ad rei generationem cōducunt, merito causæ ap-
pellandæ sunt. Reperire autem licet præter iam dictas,
etiam & alias causas, accidentales tamen: veluti inter-
medium spatium minimè impediens, quo faber indi-
get, ut circa lignum agere possit: idque non qua artifex
est, sed qua corpus, quod alium ab eo qui continet ma-
teriam circa quam operatur, occupat locum. Hæc si-
dem ex accidenti dicuntur: & tanquam ea sine quibus non.
Solidum quippe corpus interiectum inter fabrum & li-
gnum, impedimento est, quo minus operari artifex
possit. Quod si de medio tollatur, ex accidenti conseq-
tur, ut aer in illius locum succedat: quum nusquam in hoc
orbe vacuum possit consistere. Proinde constat fabri
acre ex accidenti indigere. Similiter ambulationis cau-
sæ sunt: ipsius utilitas: vis animalis: atque etiam crura:
at causæ sine quibus id fieri nequit, aer circumfusum ce-

dens: pauimentūq; renitens. Quod autem ait Erasistratus. Si refrigerari febricitandi causa est, qui magis refrigeruerit, ille magis febricitabit: maximè absurdū videtur. Nam si effectrix causa ipsa id absq; patiēte apto efficere posset, qui magis refrigerarētur, magis quoq; febricitarent. At si frigus non omni corpori febrem adferre potest, sed illi tantum, quod ad eam excipienda est habile, utiq; non amplius erit necesse, ut qui frigerunt magis, magis quoq; febricitent: immò facile nonnullos reperias, qui ne semina quidem febris concipiant: sicut tamē a troniti, vel torpidi, vel tremuli, vel conuulsi, ut accidit Alexandro, dum æstiuo tempore in Cydno, Ciliciæ Flumine, se lauaret. At verò, nec illud etiam reuera confici potest, ut qui magis, frigescit, magis quoq; lædatur: sicuti neq; hoc etiam, ut si magis lædatur, magis febricitet: quum aliquando contingat aliquem magis lædi, qui tamen non modo non magis, sed nec omnino febricitet. Idem etiam dicendum est, de labore plenitudineq;, & aliis id genus causis, quas eodem paralogismo, ab ordine procatactica rum febris causarum, exterminabat. Sed cur interim operam ludimus, dum hæresim Erasistratorum conuellimus, qui asserunt patriam potius prodendam esse, q̃ proprium dogma? Adeò enim stupidi simul & pertinaces sunt, ut etiam omnes febres à phlegmone exoriri contendunt: ob idq; nec potum frigida, iis qui ardenti febre tenentur, concedant: quum tamen ea opportunè exhibita, nisi obstet viscerum inflammatio, ægri confestim sudent, liberiq; à morbo reddantur. At si in discernenda hypostasi purulenta, ab ea quæ in sanis, & post solutas febres conspicitur, essent exercitati, conuincerentur. Quippe in sanis, & ubi febres solutæ fuerint, id quod residet, album est, nec foetorem habet, nec colorem, nec lentorem, qualis cernitur, ubi phlegmone in suppurationem conuersa soluitur. Sed

Frigus illi tñ corpori febrem adferre potest, qđ ad eā excipiendā est habile.

Alexāder fuit torpore correptus, dū in Cydno, ciliciæ flumine, se lauaret.

Erasistratii cēsebant, patriā potius prodendam esse, q̃ proprium dogma.

Frigida opportune exhibita iis qui ardenti febre tenentur nisi viscerum inflammatio obstet ab affectu eos liberat.

Puris hypostasisq; discriminē.

Ecc ii

hæc etiam est summa impudentia Erasistrati, q̄ quum fateatur repletionem plethoram efficere: hanc verò, sanguinis paremptosim ad arterias: atq; hanc deniq; phlegmonem: nolit tñ concedere repletionem phlegmonis causam existere. Nā & nos pari modo dicem, q̄ qui plaga homini illata venas colli secuit, non extitit illi causa mortis: quoniam causa proxima fuit, non ille qui percussit, sed potius effusio sanguinis.

GALENI PERGAMENI

De plenitudine. Liber vnus.

Sicuti nullum est quod nostra tempestate in ore ferè omnium medicorum crebrius versetur, q̄ plenitudinis vocabulum: ita nec aliud facilè inuenias, quod magis ab eis ignoretur. Ut autem eos qui ignorantie tenebris occæcant, quiq; absurda tuetur dogmata, impræsentiarum missos faciamus, cum ingenuis verò ac veritatis amore flagrantibus, confabulemur: duas i vniuersum notiones, relationes'ue plenitudinis proponamus: vnam quidem, secundum robur, viresq; illius q̄ talem plenitudinem defert: alteram, secundum excipientis vasis capacitatem. Dein verò, sedulo perscrutemur, quæ nam sint vniuersæ animantis vires, & quomodo plenitudo, quæ secundum earum vnamquaq; consistere potest, sit & agnoscenda, & curāda. Postmodum, quot sint eorum humorum species, qui vel vires aggrauent, vel à vasis contineri non possint. Igitur in libris de Placitis Hippocratis & Platonis satis à nobis monstratum est, q̄ alia ea vis sit, quæ in venis consistit, alia quæ per arterias, sicuti & alia quæ p̄ nervos diffunditur. Vbi etiam docuimus cor * facultatis arteriarū fontem atq; originem esse: nervorum autem, cerebrū sicuti iecur venarum. At in libris de Elementis ostendimus, substantiam eorum omnium quæ generationi & interitui obnoxia sunt, à quatuor primis qualitatibus

Plenitudo est duplex: una iuxta vires illius q̄ eā defert, altera iuxta vasis illā continentis, capacitātē.

Cor est arteriarum origo. Cerebrum est fons nervorum. Hepar ē venarū pricipium.

immutari: & ex earum certa quadam temperatura, omnium corporum substantiam, ac proinde viriū earum essentiam, quæ corpus nostrum dispensant, constare: quippe quæ non sit, nisi ipsius temperamēti quædam proprietas. Porro vis ipsa siue facultas, causa effectrix existit, non materialis substantia, patibilis' ue. Facultas itaq; erit alicuius actionis causa, quam mox necesse est esse motum ab agente in id quod patitur. Sicuti & affectus qui in patiente est, motus erit ab agente, in rem patientem. Vnde vires suam quidem ex alterius comparatione notionem habent: essentiam verò, * ex habitudine ad alterum. Quod autē in se ipsum aut agat, aut aliquid efficiat, omnem mentis captum excedit: sicuti etiam, quod se ipsum aliquid contineat. Quare non modo ex Herophileis multi, sed & ex Stoicis iuniores, dum contendunt ostendere, qd spiritus atq; ignis & sese, & cætera elementa contineant, terra vero & aqua ab iis contineantur, nullam demonstrationem adferunt. Nos quippe euidentissimè cernimus, ita nihil ab igne contineri, vt potius ab eo vniuersa soluantur. Etenim quod durum est, renitensq; , ac densum, vel primo aspectu potius continere videri possit: contra verò, quod molle, cedens, rarumq; est, altero indigere à quo contineatur. Dicamus igitur, quotiescunq; præ multitudine aliquid nimis distēditur, aut dirumpitur, affectum talem, ad continentia vasa spectare, non verò ad aliquas vires: quum verò grauatur, ad sensutricem potentiam. Nam neq; id ipsum omnino ad vires pertinet omnes. * quum naturalis potentia hæc grauitas affectus non sit. At verò plenitudinis genus, quod ex loci continentis capacitate commensuratur, non modò in animantibus reperitur, verū etiam in rebus inanimis, quemadmodum i vestibis, vinculis, pelilibus, vasisq; fictilibus. Rumpuntur siquidem omnia hæc, vbi multa replentur flatuosa substantia. Porro

Essentiā facultatū corpus nostrum regētiū, extēperie quatuor qualitātū constare: effectq; proprietatē temperamenti. Facultas ē causa effectrix.

Agere in se ipsum, nihil potest: sicuti nec se continere.

Ignis oīa dissoluit.

Continere videtur dura, renitētiq; ut contineri, quæ mollia & cedentia existunt.

Plenitudo distēdēs aliquid, dī iuxta vasa.

Plenitudo grauians, ēt si non distēdat, ad vires sensutrices referē: minime autem ad naturales.

Plenitudinē iuxta vasa reperiri ēt in rebus inanimis.

4.

Ecc iii

Plenitudo iux-
ta uenarum ui-
tes, qua rōne
deprehēdi que-
at, neq̃ scriptū
Galenus, neq̃
ab aliis scriptū
reperit.

Sensu uacuas
particulas, nec
grauitatis, nec
prorsus ullius
symptomatis
posse sensum
percipere.
Medullæ oēs
insensiles.
Iecoris gibba
insensilia esse.

quum quatuor sint naturales potentia, attractrix, retē-
trix, alteratrix, expultrix, alia sunt inquirenda indicia
ad cognoscendam plenitudinem quæ secundum earū
singulas accidit: nam nec grauitas in istis sufficere pote-
rit. Etenim imbecillus ventriculus, vi sensitrice maxi-
ma est præditus, qua sibi graua sentire possit. Iam qui-
bus signis arteriarum plenitudinem, quæ ex collatiōe
ad earum vires constat, probè deprehendere liceat, in
commentariis de pulsibus exposuimus. Venarum ve-
rò, nec ego signum aliquod vnq̃, quo id ex scientia ha-
beri possit, præscripsi: neq̃ ab alio quopiā literis man-
datum reperire potui. Vt aut de plenitudine agamus,
quæ sigillatim quasq̃ particulas occupat, sciendum
est, ea membra quæ parum sentiunt, vel sunt sensus oī-
no expertia, nequaquā parem cum ventriculo aut vesi-
ca, excrementorum, quæ in ipsis cōgesta sunt, sensum
habere: sed aut omnino exiguum, aut penitus nullū:
exiguum quidē, vbi maxima plenitudo adfuerit: nul-
lum, vbi illa non multa fuerit. Nam in pulmone, ieco-
re, renibus, atq̃ in nonnullis ossibus, aliquis nonnunq̃
oboritur alicuius pōderis sensus: q̃q̃ is certē, potius ad
membranas referri debet, q̃ ad eorum viscerum car-
nes. At secundum cerebrum, per q̃ manifestum sui sen-
sum grauitas interdum excitat. In partibus autem seu
su vacuis, nullus potest non modo grauitatis, sed nec
alterius etiam symptomatis sensus haberi. Atqui sensu
carere videntur nonnulla ossa, adeps, & glandulæ quæ-
dam: præterea medullæ omnes, sensus expertes sunt.
Cerebrum tamen atq̃ spinalem medullam, nonnulli
in sentientibus particulis collocant. Tutius tamen po-
terit quispiam de carne, qua gibba iecoris pars con-
stat, asserere, q̃ absq̃ vllō sit sensu: quū neruus illi nul-
la ex parte inseratur. De parte autem illius caua, facile
dubitatio exorietur, quum nerui qui iecori iuxta por-
tas distribuuntur, adeo sint exiles, vt cōtexere solam

membranam videantur. Grauitas igitur, euidentissimū signum illius est plenitudinis, quæ ad vim sensitricem spectat. Nā si in aliqua particula quæ sensu prædita sit, vlla humorum multitudo aggregetur, i ea statim grauitatis sensus quoq; excitatur. Nec tamen quotiescūq; pondus loco alicui infederit, ibi etiam humorum multitudo aggregabitur: quandoquidem si facultas sit imbecillior, poterit vel ex ipsismet solidioribus mēbris grauari: quemadmodum in corporibus resolutis contingit. Si quidem præ resolutione imbecillioribus redditis musculis, sentit ille qui resolutus est, in motu grauitatem insignem: ita tamen, vt infirmus musculus sibi ipsi minimē grauis videatur. Grauitas quippe ab altero, & in altero, gignitur. Potest itaq; musculus fieri se ipso inualidior, imbecillior q;: vt verò sibi ipsi sit grauis id fieri nequit. Age igitur, maioris perspicuitatis gratia, ponamus nunc ab spiritu per neruum delato, moueri musculum: à musculo verò, tibiam primū, cui is inseritur. Qua mota, articulus in genu, vbi crus vniuersum cōmittitur, subinde etiam moueatur. Quibus sic constitutis, quisq; verè asserere poterit, & musculum, & totam tibiam, inualido spiritui esse oneri. Quocirca minimē potest exquisitè dignosci, quid sit id qd primū grauet, quodq; p̄mū grauet, nisi prius sciat, id qd primū in nobis vnāquāq; mouet pticulā. Ad qd quidem vir tum in discernendis potentiis quæ nos gubernant, peritus: tum in anatome exercitatus, desyderatur. Iam verò, vt nulla est necessitas, illis qui in obeūdis functiōibus, valētiores q̄ prius forent, effecti sunt, humores aliqua ex parte accreuisse (quod Erasistratus existimabat) ita per necessarium videtur, vt si qui validiores actiones habeant, eis virium robur accesserit. Actionum siquidem fortitudo, ad virium robur consequitur: sicuti & robur virium, fortitudinem comitat functionis. At à sanguinis multitudine, cōsequutio nul

Grauitas ē certū indicium illius plenitudinis quæ ad uis sensitricē spectat.

Plenitudini ad vires nō requiritur necessario magna humorū colluies

Grauitas ab altero & in altero gignitur.

(6) 7.
Actionū fortitudo ad viriū robur cōsequitur.

Robur viriū, fortitudinē comitat functionem.

*Actiones vali-
dæ, nō aucti sã
guis, sed uigẽ
tiũ uirium sunt
inseparabilis no
ta,*

*Vlcerosus sen-
sus acrẽ sequi-
tur qualitatem
humorum.*

*Tendi pñt par-
ticulę a quauis
substantia humi-
da & flatulenta.*

*Mordicatum
humorum, qua-
tuor, secundum
magis & mi-
nus differentie
habentur.*

*Acres humo-
res particulis
exulceratis, ad
moti horrore
atq; rigore ex-
stant.*

la necessario est futura: quũ neq; si is maiori sit copia
q̃ antea, validior ex necessitate futurus sit homo: neq;
si minori, imbecillior: sicuti nec si æqualis sit, necessari
est illum viribus eodem se habere modo. Liquet itaq;
actiones validas propriam esse ac inseparabilem viriũ
vigentium notam: sanguinis verò aucti nequaquã. Por-
rò vbi adest tensionis sensus, nec tamen exercitatio p̃
cesserit, ibi necesse est, plethoram esse congestam. San-
guis autem auctus, non tamen eò, vt venæ adhuc ten-
sæ sint, nondum plethoram absoluit. Vt verò tensio,
copiæ humorum propria vasa tendentium affinis est,
ita vlcerosus sensus, acrem sequitur qualitatem humo-
rum, potestq; vel ex solis quãdoq; motionibus gigni.
Si igitur particula quæ distenditur, particeps sensus fue-
rit, necessum est, vt quæcunq; fuerit ea res, quæ eo ip-
sam distendit, vt capi nequeat, tensionis sensum in ani-
mante excitet. Atq; is affectus qui tunc membra occu-
pat, tensio appellatur. Quæ si plurimum augeatur, erit
etiam necesse, vt quod tenditur disrumpatur. Cæterũ
non tantũ ex ipso sanguine, sed ex quacunq; substã-
tia humida & flatulenta, possunt partes tensiuo affectu
occupari. In vniuersum autem, id quod grauat, mul-
tum: quod verò pungit, aut mordet, molestum esse di-
cemus. At plures reperiri humores mordaces, qui par-
tim in nobis gignantur, partim accedant extrinsecus,
omnibus ē compertum. Quorum quatuor penes ma-
gis & minus differentiæ extant. Etenim qui modicẽ
mordent, pruritus inferunt, vti scilla: qui verò ma-
gis, rodunt, vt cæpa. Sed si aliqua præterea adhuc his
fuerint acriora, horrorem excitabunt: præcipuẽ qui-
dem, si particulis admoueantur exulceratis: proroga-
to verò, atq; aucto horrore, symptoma illud, rigor vo-
catur. In nobis quoq; mordaces gignuntur succi eadẽ
ratione, per has quatuor ideas distincti. Quorum sanẽ
pruriginosi illi sunt, qui modicẽ existunt acres: vlcerø

sum verò sensum pariunt, qui his sunt mordaciores: q
autem hos quoq; mordacitate superant, horrorem:
sicuti qui præterea iam mordacissimi sunt, hi rigorem
inducunt. Affectio igitur vlcerosa, ex succis mordaci-
bus gignitur. Grauitas autem, à multitudine pro viriū
comparatione. At tensionis affectio, & ipsa quidem hu-
morum multitudinem sequitur, non tamen per colla-
tionem ad vires corporum continentium, sed tantum
ad capacitatem qua continentur illi. Ad hanc ergo affe-
ctionem vltimam, tensio tantummodo pertinet: vt ad
secundam grauitas. Vlcerosus verò sensus, neutrius ē
propria nota: nec plenitudinis nuper dictæ, nec secun-
dæ, quæ vires respicit. Ex symptomatis itaq; alia ad
plenitudinem pertinent, quæ respicit vires: alia ad eā
quæ in infusione consistit: nonnulla præterea non sunt
*simpliciter plenitudinis notæ, sed huiusce plenitudi-
nis. Quædam verò, nullius quidē plenitudinis, sed hu-
morum potius prauitatis & corruptionis sunt signa:
aut virium imbecillium, aut tumoris solidorū corpo-
re. Ergo affectio tensiua, nisi exercitationis sit comes, plu-
rimam omnino substantiam in corpore quod sensu p-
ditum est, contineri insinuat: non tamen qualis sit ipsa
substantia, ostendit: nisi alia etiam indicia accedant.
Actionum verò imbecillitas, vires inualidiores osten-
dit: *q; mouens causa impediatur: quæadmodum ac-
cidit in languidiori manuum motione: id quod plures
constitutiones consequi potest. Nā si in aliquo carneū
ac adiposum particularum genus, viribus tamen eos-
dem fines seruantibus, adaugeatur, necesse fuerit mo-
tiones imbecilliores fieri: moto nimirum aucto: mouē-
te verò æquali pmanente. Sed si aut vnus qspiā ex hu-
morib⁹, aut oēs ēt simul excrescāt, nec vires alioqn sil-
vnā augeant: sic quoq; necesse erit actiōes iualidas red-
di: nec sec⁹ si humores simul & effusiōes creuerint, nul-
lo aut in viribus incremēto facto: quæadmodū & si pa-

Vlcerosus sen-
sus neutri ple-
nitudinis est p-
pria nota. 10.

Symptomatiū
differentiæ ua-
riæ.

Tensiuis affe-
ctus quid indi-
cet.

Actionis lan-
guor, vires iua-
lidiores ostēdit

Facultates per
uniuersa soli-
diora corpora
permeare.

Tumore corpo-
ris nō oēm cē
signum pletho-
ricum.

Venarū tumor
qñ sanguinis
plenitudinē in-
dicet.

res illi se habuerint, vires verò imbecilliores euadant. Fieri ēt pōt, vt & demat de viriū robore, & humores vnā cū parēchymate, seu trāsfusione (quæ imp̄sentiaꝝ molē carnis, pinguitudinisq; signat) vel plures fiāt, vel pauciores. Horum itaq; vtrunius eueniat, necessario auadent * functiones imbecilliores. * Arbitrari autē q̄diu solida corpora optimē nutricantur, posse nōnūq; edi imbecilliozem motum, hominum planē est, mini- mē perpendentium, facultates per vniuersa solidiora corpora permeare: sed perinde ac fistulas, aut canales quosdam, sic spiritui venas & arterias constituērium. Hallucinantur etiam, qui inter plethorica indicia, cor- poris tumorem reponūt. Quippe venarum tumor po- terit forsam esse plethoricum signum, inseparabileq;: vbi corpus ita se habuerit, vt neq; interna externis: ne hæc illis, caleant magisq; nec præterea calor im- modicus vniuersum corpus detineat. Carnis autem & adipis moles, eorundem multitudinem indicabit: non tamen plethoricæ plenitudinis quæ desyderat euacua- tionem, signum existet. Quum autem syncer⁹ sanguis nunq̄ ita reperiatur in venis, quin illi aliquid aut bilis, aut pituitæ, aut serosi excrementi permistum sit: perin- de sanē erit dicere, sanguinem ipsum augeri, ac si etiā humores dixeris. Venarū itaq; tumor, sanguinis ple- nitudinem indicat, si tamen is à nulla gignatur exter- na constitutione prorsus inualecente, aut ex fusione, aut ex ebullitione. Cauendum præterea erit, ne parti- cula illa declinīs fuerit: ne ue paulo ante cæteris vehe- mentius mota. In summa verò, plenitudo à venarum tumore indicabitur, si omnes corporis partes eandem constitutionem seruarint, idq; cum mediocri calore. Cæterum tum tumor ipse, tum tensio, quum à sin- gulis humoribus, necnon à flatu excitari possint, ple- nitudinis quantitatem, potius q̄ specificas differentias declarant. Siue igitur sanguis eò incrementi peruene-

rit, vt citra tunicarum tensionem, naturæ modum excedat, corporiq; grauis videatur: siue ita sit auctus, vt vasa continentia distendat: vtrunq; certè & multū, & plenitudo dicitur: sed prior illa, secundum vires: hæc penes vasa vocetur. Iam rubor, si nec ex sole, nec ex balneo, nec ex immoderato exercitio, neq; ex calor, nec ex ira verecundia' ue, neq; ex alia deniq; occasiõe extrinseca oriatur, sed vndequaq; corp' æqualiter fuerit affectum, sanguineæ plenitudinis nobis indicium existit. Omnem autem plenitudinem, quæ in venis congesta est, facile motus arteriæ ostendit, ob mutuā vālorum confluentiam: nisi vbi humores contenti in venis, q̄ maximè sunt crassi & tenaces. Plenitudinis autē species, vbi in vniuersum illa corpus dispergit, his notis sunt distinguendæ. Rubor plenitudini sanguineæ attestatur: color verò suppallidus, flauæ bili. Quum autem pituita nimis excreuerit, i album magis q̄ pro naturæ modo, color ipse mutatur: quemadmodum in atrum, si bilis atra. Opus tamen est, vt cum singulis horum humorum simul sanguis augeatur: alioqui nō plenitudo aut plethora, sed cacochymia potius dicenda venit. Cæterum si grauitas vel tumor præter naturæ modum accesserit, affectio talis, plethora appellabitur: ipsiusq; humoris vincentis species, ex colore diiudicabitur. Sola tamen bilis, nec tumorem, nec pondus (quæ à plenitudine seiungi nequeunt) inferre potest. Nam ante q̄ ita ea increſcat, alia illi superuentura est affectio. At si sola pituita augeatur (inter cuius species annumeratur humor qui crud' dicitur, fabāq; imitatur elixam, q̄ alia pituita, crassior, ac minus flatu lentus existens) dūtaxat in leucophlegmatia solet per vniuersum corpus exuberare. Sunt enim & aliæ pituitæ species: dulcis nempe, acida, & salsa. Verūm ex dulci fiunt somnolenti: ex acida quum redundat, famelic: quemadmodum siticulosi ex salsa. A cruda autem,

Plenitudo secundum vires.

Plenitudo secundum vasa. Rubor insitus, sanguinis plenitudinem indicat.

Arteriarū motus, uenarū plenitudinem indicat.

Plenitudinis spēs quibus notis sunt distinguendæ.

Cacochymia quid.

Plenitudini perpetuo adesse tumore & pondus.

Pituita i leucophlegmatia dūtaxat solet per vniuersum corpus exuberare. Pituitæ spēs diuersæ, earūque usus & facultates.

Sopor unde,
Vigiliarū cau-
sa.

Melancholici
sunt difficiles,
& præter oēm
rationē tristes.

Pituita in ore
nētris collecta,
appetentiam
facit.
Bilis utriusque
facultates.

Melancholicus
succus.

Pulsū dñæ p
uarietate hu-
morum exupe-
rantium.

Sanguinis tem-
peries a diuer-
sis causis varia-
tur.

deicitur appetentia, somnolentiq; etiam fiunt. Si-
quidem si humescat, refrigereturq; cerebrum, quod
est sentiendi principium, statim soporosa affectio obo-
ritur: quemadmodum si siccescat, atq; incalcescat, in vi-
gilias illabitur. Proinde omnes qui vtraq; bile, redun-
dant, insomnes degūt: id tamen peculiare habent, qui
atra bile cruciantur, q; difficiles sunt, atq; præter oēm
rationem, tristes. Vigiliæ itaq; & somni causa, in cere-
bro ipso consistit. appetentiæ autem & illius defectus,
ad os ventriculi pertinet. In quo quidem si colligatur
pituita, appetitiones excitat: si flaua bilis, tum sitim, tū
cibi fastidium pariet, osq; fiet amarulētum. At si atra,
morosi, tristes * atq; formidabiles fiunt, & sine siti: fa-
liuq; plurimum illis scatet: atq; nonnulli eorum satis
videntur famelici: in quibus nimirum atra bilis, acida
qualitate fuerit affecta: id quod sanè cōtingit, vbi ipsa
malignior est reddita. Porro vbi ea veluti fæx sangui-
nis permanet, neq; exactè est acida, satius fuerit illam
appellare melancholicum succum: non autem melan-
choliā, siue atram bilem. Quod verò ad pulsus perti-
net, si in plenitudine flaua bilis redundet, tales necesse
est reddi pulsus, qualis vbi cor calfit simul & exiccat.
Si atra bilis, quales quum frigescit & exiccatur. Si pitui-
ta, quales edi solent in humida frigidaq; constitutio-
ne. Vbi verò sanguis se omnino secundum naturam
habuerit, nulla fiet in pulsu ab antiquo statu mutatio:
alterantur autem, secundum ipsius sanguinis mutatio-
nem. At verò ex orio & humido victu sanguis humi-
dior seipso redditur: ex ira autem, exercitatiōe, æstu,
frictione, medicamento, alimentoq; calfacientibus,
nec nō meraciori antiquiori; vino, calidior efficitur:
quemadmodum frigidior, ex recenti frigore. Quod si
quispiam alimentis temperaturæ siccioris diutius vta-
tur, quæ tamen alia nulla intemperie teneantur, san-
guis siccior euadet. Sed secundum etiam varias com-

plicationes causarum, in diuersas incidet sanguis com-
positas intemperies: idq; citra miscellani aliam in eo
superantis humoris. Quod si ob aliorum quoq; humo-
rum misturam, illabatur in intemperiem, certè absq;
cacochymia constare talis dyscrasia non poterit: alias
tamen octo differentias fortiètur, sed diuerso modo,
q̄ vbi ille solus & per se fuerit talis. Verum an intempe-
ries ad solum pertineat sanguinem, an ad aliquem aliū
illi humorē permistum, ex iis quæ diximus, & ex aliis
multis signis, facile deprehendi potest. Pingamus igit
homini qui febre est vacuus, venas in tumorem attol-
li, ac totum corpus rubicundius euadere. Statim enim
est expendendum num et causæ aliquæ occurrerint,
ex illis quæ vim calefaciendi habent: & si hoc fortè vi-
deatur, præstiterit huiusce rei dignotionem tantisper
differre, donec motio ab illis in corpore vniuerso exci-
tata, conquieuerit. Tunc autem, si qualem diximus, ta-
lis appareat, sanguinem sanè in eo abundare, indicium
erit. Mox verò grauitatē, tensionem, pigritiam ad mo-
tum, pulsus, vigiliam, sonnum, appetentiam, fastidiū,
præcedētq; vitæ rationem, expedit reuocare ad exa-
men, expēdereq; an aliqua excretio solita, illi suppres-
sa sit, aut exercitatio neglecta: & an alimentis plurib⁹,
aut plurimi nutrimenti sit vsus: vel si post cibum se p-
ter morem lauerit: solitusq; sit plethoricis morbis cor-
ripi. Quibus addenda est temporis & regionis consy-
deratio. Nam hyeme & vere, locisq; tum frigidis, tum
temperatis, maior colligitur plenitudo: minor verò lo-
cis & temporibus calidis atq; siccis. Sic etiam qui den-
sa sunt cuti, frequentius plenitudinem colligunt. Sicut
rarius, qui rara.

Plenitudo ma-
ior colligitur
hyeme & uere

G A L E N I P E R G A M E N I

De atra bile. Liber vnus.

Sanguis (qui humor omnibus hominibus est notis-
simus) vbi vel arteria, vel venafuerit conuulnera-

Sanguis extra
sua uasa, subi-
to in grumum
concrescit.

Serum sangui-
nis.

Atra bilis.

Salfos humo-
res esse morbi-
ficos.
Pituita oīs eē
debet colore
albo, minime-
q; cōcrefcere.
Flauē bilis spe-
cies.

Bilis porri co-
lorem referēs,
in uētriculo gi-
gnitur.
Bilis ærugino-
sa.

ta, illico effundi videtur: rubens sanè magis è venis: fla-
uior autem ex arteriis manuum. Vndecunq; autem
exeat, subito concrescit in grumum: idq; nō solū ex-
tra corpus, sed intra illud etiam: in quouis ipsius lo-
co præter naturam contentus. Igitur magna ex parte
in hoc humore rubeus color exuperat: & talis exactè
optimus sanguis existit. Apparet autem nonnunq; hoc
ipso flauior & nigrior: sicuti etiam et consistentia cras-
sior atq; tenuior. Quin et videtur quandoq; in con-
creto sanguine tenuis quædam humiditas, contracta
à potu innatare. Interdum & pituitosus humor cum
sanguine per venas defertur. Caterū hæ differentia
humorum nō mutant sanguinis appellationem. Est &
alius quidam humor sanguini crasso & nigro persimi-
lis, qui tum per vomitum, tum per deiectionem excer-
nitur: non tamen etsi diutius aeri ambienti expositus
fuerit, omnino densatur. Atq; hic ipse humor aliquan-
do à vomentibus acidus simul & acerbus sentitur: quā-
doq; verò nullam qualitatem manifestā præ sese fert.
Quum autem sanguis maiori ex parte dulcis eē vide-
tur: pituita autem insipida, veluti aqua: certè si quādo
hi humores sentiantur falsi, morbofi erunt. Euadit au-
tem interdum ipsa pituita dulcis. Porrò pituita omnis
esse debet colore albo, minimeq; concrefcere. Est &
alius humor, qui dum vomitur, semper amarus appa-
rer: non semper tamen flauus: sed quandoq; pallidus.
At semper qui flauus est, pallido crassior videtur. Iam
verò, vt flaua bilis tenui seroseq; humiditati cōmixta,
& pallidior, & aquosior euadit: sic vbi resoluitur pluri-
mum, vitellis crudorum ouorum apparet similis: ob
idq; vitellina appellat. Igitur hæc bilis, siue pallida sit,
siue flaua, siue vitellina, i vasis habet suā generationē.
At in ventriculo quædā alia gigni bilis, quæ porri colo-
rem refert: Alia quæ ab æruginis similitudine, ærugi-
nosa vocatur. Alia, quæ isatidis imitatur colorem. Qui

bus omnibus ē commune, vt quales sunt, tales permanant. Vt verò ad atram bilem redeamus, ea, quia nō concrefcit, à sanguine nigro distinguitur: non tamē ab iis quæ propriè excrementa nigra appellantur, eo nomine differt. Hæc si quidem, quum talia sæpius vomantur ac deiciantur, ab atra bile q̄ plurimum & facultate & qualiatribus differunt. Nam neq̄ acerbum saporem, neq̄ acidum manifestè participant: quum atra bilis tū gustui, tum olfactui talis esse videatur. Ad hæc, excrementa nigra minime terram fermentāt, vt atra bilis. Quæ quidem * hac in re quum sit aceto q̄ acer rimo si milis, partium tamē crassitie ab eo q̄ maximè disfidet. Quamobrem, quibus corporis partib⁹ pura & impermixta adhæret, eas exedēdo exulcerat. Acetum etenī, q̄ tenuium sit partium, p̄meat: at bilis atræ crassities, quum illi sedem firmam exhibeat, corrosionis sit causa. Taceo q̄ nullum animal atram bilem gustare sustinet, sicuti nec meram falsuginem: in qua nullū animal degere potest. Cuius rei mare mortuum firmum indicium præbet. Perniciosa itaq̄ illius generatio censet, quum ex humore atro supra modum assato cōtingat. Cæterū ea bilis atra quæ ex flaua bile immodice assata ortum habet, tanto hac perniciosior est æstimanda, quanto flaua bilis efficacior est sanguinis sedimento, quod amurcæ aut fecis instar generari est proditū. Igitur vt exactæ bilis atræ humorem semper excerni ad perniciem animaduerti, sic eorum quæ nigra ap̄ellantur euacuationē, non rarò salubrem extitisse comperi. Porro sanguis qui vena secta mittitur, nigrior esse videtur in siccis calidisq̄; temperamētis corporum: sicuti & in huiuscemodi anni temporibus, & regionibus, cōstitutionibus, vitæ studiis, victus ratione, ac de niq̄ cibis crassis & siccis: quales sunt, lens, cochleæ, et carnes taurinæ, hircinæq̄, præsertim sale asseruatæ. Consimilis etiam naturæ est vinum nigrū, crassumq̄;

Nigra excrementa quō ab atra differant bile.

Atra bilis est acida, terrāq̄ fermentat.

Atra bilis differt crassitie ab aceto.

Atra bilis cum exedat, corrodatq̄.

Atram bilem gustare nullum animal sustinet.

Mare mortuū nullum in se piscem alit.

Atra bilis quæ flaua præassata orit, est oīm p̄niciosiss ima. Atra bilis semper ad perniciem excernit.

Sanguis niger quibus secta vena vacuetur. Melancholicū succum gignētia.

3.

4.

Tumores ab
atra bile orti.
Carbunculus.
Elephantiasis.

Cancer.
Cancer exulce-
ratus.

Hæmorrhoids.

Varices.

Varices hæ-
morrhoidesq;
siquis cohibe-
re conetur, pe-
riculum est ne
homo corripia-
tur, melanco-
lia.

5.

& austerum. Pari etiam ratione quæcūq; ægritudines
sunt ex calida siccaq; intemperie, cuiusmodi sunt fe-
bres ardentes, crassum & nigrum sanguinem gignūt.
Vbi igitur per febres ardentes melancholicus humor
in cutim ipsam propellitur, carbunculus appellatus
producit. Si verò ad eam, citra febrim, decumbat,
fueritq; permixtus sanguini, elephantem gignere est
aptus. Sin autem solus existat, ab initio quidem nigrū
tumorem gignit, qui procedēte tempore terminatur
in cancerum. Rursus, vbi acrior & contumacior hic hu-
mor fuerit, cācrum exulceratum: vbi autem mitior,
latentem & citra vlcus producit. Quippe omnes hu-
iusmodi affectus, & præsertim cancer, ab humore me-
lancholico oriuntur: cæterum vt à calidiori carbuncu-
lus, ita ab eo qui minus calidus est, oriri cancer consue-
uit. At vbi is humor niger qualitates obtinuerit mi-
tiores, nimirū permixtus sanguini, subrubeos elephan-
tas progignit: qui tamen processu temporis longè ni-
griores euadunt. Sæpius autem natura, vasorum quæ
ad sedem sunt, referans venam, huiusmodi humorem
excernit, commixtum sanguini: ob idq; excretio ipsa
hæmorrhoids appellatur. Sæpenumero etiam eundem
humorem ad crurium venas transmittit, à quo dilata-
tæ & distentæ, varicosæ redduntur, & cutis quæ huius-
modi venas attingit, temporis processu nigrescit.
Quod si venas illas turgentem melancholico humore
quis moliatur excidere, periculum imminet, ne homo
corripatur melacholia: id quod fieri sæpius est visum,
non in varicibus modo, verum etiam in hæmorrhoi-
dibus, quæ ex huiusmodi humore cōsistunt. Quod igitur
in venis & arteriis humores omnes vnā cum san-
guine continentur, ostendit ipsius varietas, tum in co-
lore, tum in consistentia: id quod etiam ex iis quæ dixi-
mus, & quæ in libro de Natura humana, ab Hippocra-
te prodita sunt, liquidò constat. Qui humores quādiu
tēperamenti

temperamenti obtinuerint mediocritatem, animal erit sanum: ægrotabit autem, vbi vel in omnibus vasis, vel in parte aliqua, eorum aliquis à naturæ modo recesserit. Rationi autem est consentaneum, similes affectus oriri in partibus quæ profundo in corpore delitescunt, iis qui in cute consistunt. Quum itaq; flaua quidam bilis in vnam quampiam decumbens partem, generet erysipelas: atra verò, carbunculum atq; cancrum: mirum sanè esse non debet, si vtraq; in intestina descendens (quandoquidem internæ partes nō sortiuntur cōstitutionem adamantinam) aliàs aliud ipsorum erodant, ac nonnunq; prorsus insanabilem dysenteriam efficiant. Omnes siquidem exulceratiōes ab atra bile sunt insanabiles, nisi quis curationem appellet, vbi affecta pars tota circūquaq; ad partem sanam vsq; dissecta, abscindatur. Quemadmodum igitur intestina citra alicuius auxilii spem vlcerantur ab atra bile: à flaua autem, difficulter curationem admittunt: sic in profundo sitis accidit cæteris partibus, atq; iis præcipuè, quæ intestinis sunt nobiliores. Adde q; intestinorum curatio facilior est, eo q; medicamenta quæ iniiciuntur per sedem, statim locis affectis occurrūt: quod sanè in cæteris partibus fieri facile nequit. Porro lien malè affectus, vel ex inflammatione, vel scirrho, vel imbecillitate, ad nigrius conuersus, colorem vitiosum in toto corpore efficit. Quin & ipse semper iecore nigrior existit: & præsertim in animalibus calidioribus & siccioribus: qualia sunt ferratos dentes habetia. Hoc viscus etiam vel elixum, gustui quippiam acerbum refert, vt iecori nihil simile appareat. Vnde liquet iecur expurgari à liene: qui nimirum attrahit quicquid in ipso sanguine fœculētum existit: quale utiq; est fæx in vino, & in oleo amurca. Ex hoc verò q; medicamenta flauam bilem trahentia, auxiliantur eis qui regio morbo laborant: quæ autem aqua educunt, hydropes ascitas euacuant: sicuti & quæ

Erysipelas
Carbunculus.
Cancer.

Dysenteria.

Exulceratio
omnis ab atra
bile est insana
bilis.

Intestinorū
curatio, cur facili-
or sit, q̃ alia-
rum internarū
particularum:
Lien malè af-
fectus colorem
totius corpo-
ris vitiat.

Lien elixus
gustui quippiam
acerbū refert.

Hepar a liene
expurgatur.

7.

Purgantiū me-
dicamētorum
singula sibi fa-
miliaresuccos
attrahere.

Lienem nutri-
ri ab acido hu-
more, quem re-
cipit.

Ventriculo de-
mitti aliquan-
do humores, p-
easdem venas,
per quas solet
suggeri alimē-
tum hepatis.

8.

Mēstruum san-
guinem quan-
titate & quali-
tate esse inuti-
lem.

Pituitam in
ventriculo gi-
gni, at postea
coctā a iecore,
in sanguinem
verti.

Pituitæ purgā-
dæ cur nullum
datum instru-
mentum sit a
natura, vt reli-
quis excremē-
tis.

9.

nigra expurgāt, elephātos & caneros augeri prohibēt:
in confesso est etiam, vnumquodq; purgantium medi-
camentorum familiarem sibi humorem attrahere. Vt
autem ad lienem reuertar, quandoquidem vnāquāq;
corporis partem proprius alit humor, animalium ve-
rò serratos habentium dētes lien acerbā acidāq; exhi-
bet qualitātē, manifestū est, humorem qui illū nutrit,
talem etiam existere. Non igitur erit aliam particulā
excogitare, quæ melancholico humori excipiēdo sit
destinata. Iam verò, per quas venas à ventriculo in he-
par alimentum suggeritur, per easdem à toto corpore
in illum etiam humor demittitur: tum in purgationi-
bus quas moliuntur medicamēta: tum in iis quas natu-
ra in morborum crisis efficit. Quin etiam i rectē va-
lentibus, nōnunq; optimus sanguis ad ventriculum cō-
meat, ipsum videlicet nutriturus: id quod in lōgis ine-
diis accidit. Porro quum natura quæ foetum format
& auget, pgnatiōis tempore optimum sanguinem at-
trahat, in venis relinquitur vitiosissimus: qui post par-
tum tandem excernitur, quemadmodum singulis mē-
sibus, qui non solum quantitate, sed qualitate etiam
superfluous atq; inutilis est. At pituitosus humor, ex pi-
tuitosis cibariis, in prima concoctione, quæ in ventri-
culo fit, generationem obtinet: veluti biliosus melan-
cholicusq; in iecore. In cuius quidem coctione pitui-
tosus humor etiam in sanguinem vertitur. Quam ob
causam nullum ipsi proprium instrumentum molita ē
natura, ad sanguinis expurgationem, quemadmodum
est vtraq; vesica & lien. Siquidem hæ sanguinem à bi-
lioso humore & seroso expurgant: lien verò, à melan-
cholico humore. Itaq; pituitosus humor, qui in ventri-
culo gignitur, quum deferatur in iecur simul cum hu-
moribus genitis ex comestis & bibitis, vnā cum illis
concoquitur, in sanguinemq; mutatur. In vniuersum
igitur, omnes qui ab humore melācholico proueniūt

affectus, statim inter initia medicamentis cum humorem vacuantibus validè purgans, quo minus augeant prohibebis: vsq; etiam ad caneros. Non est autem eadem bilis atra in iis qui integra sanitate fruuntur, & in nonnullis eorum, qui olim naturalem habitum sunt egresfi. Porro medicamenta singula proprium quendam similèq; sibi succum eliciunt: non autem in naturam suam corporis humores permutant. Nam si medicamenta morbo regio laborantibus propinaueris: quæ verò bilem educūt, his qui infestantur aqua intercutim: q̄ minimum proprii humoris videbis utrobique vacuari. Atq; inde non solum nihil iuueris ægrotantes, verū etiam q̄ maximè læseris: haud aliter, q̄ si ipsis venas incideres. Aduerte autem columbas, atq; alia animalia plerq; destituta esse vesica fellis.

Melancholicus affectus quomodo inhibēdi sint

Medicamenta purgantia, familiares sibi succos attrahere.

Columbæ carent fellis vesica

G A L E N I P E R G A

M E N I D E T V M O R I B V S P R A E T E R

N A T V R A M. L I B E R V N V S.

Inter ea corpora quæ naturaliter, & quæ præter naturam se habent, tertia quædam est constitutio eorum corporum, quæ non secundum naturam affecta sunt. Siquidem qui crassior vel gracilior est factus, non adhuc naturalis habitus fines egreditur: sed tantum alter supra naturæ modum, alter verò infra inuenitur: vterq; autem secundum naturam est minimè affectus: quanq̄ certè horum affectuum non naturalium, excessus quidem, præter naturam existunt: terminus autem eorum excessuum, est actionis oblæsisio. At qui tumorem ex aqua inter cutem contraxit, & qui ex ta be euasit gracilior, præter naturam sanè vterq; est affectus. Igitur in præsentī libro, de tumoribus præter naturā, qui tum corpus vniuersum, tū quālibet illius partem occupant, nobis differere est animus, sumpto aphlegmone initio. Phlegmone dicitur tumor carno

Fff ii

Phlegmones
accurata de-
scriptio.

Phlegmones
curatio.

Putrescere ca-
lida & humi-
da, vbi in cali-
dum locū im-
pacta, nec va-
cuantur, nec re-
frigerantur.

Offa interdū
fluxionē ipsam
inscipere.

Phlegmonis
generatio.

3.

farum particularum, vbi cum tensione, renitentiaq; necnon dolore pulsatili & calido, ruboreq; maiorem sibi tumorem contrahūt. Ex quibus quidem signis sanguinem redundare in inflammatione ipsa, existimandum est. Cuius sanē defluxus priusq; sit impactus, facilimè his quæ refrigerant atq; astringunt, repellitur: p- fertim si tumor fuerit exiguus. Vbi autē fluxio impacta iā tenaciter hæserit, nullum ab astringentibus & refrigerantibus auxilium admittit: indiget autem vacuari. Iam verò pars phlegmone obsessa, nō statim ab initio fit immodicè calida: sed procedēte tempore: pristina nimirum perspiratione impedita, ex obstructione omnium meatuum. Iccirco si inibi sanguis diu immoretur, necessum ē, vt omnino putrescat. Siquidem omnia corpora simul calida & humida, in calidum locum coacta, putrescunt promptè, si nec euacuentur, neq; refrigerētur. Quare & quæ ex ipsius putredine caliditas nascit, ei superuenit, quā ante habebat. In vniuersum autē, nihil in inflammata particula permanere potest exactè secundum naturam se habens, inflammatione perseverāte diutius: sed omnia simul cum carne, cutis videlicet, nerui, tendones, membranæ, atq; vasorum tunica, fluxionem ipsam suscipiunt. Quare & ossa interdum fluxio ipsa inuadit: sicuti & ab ipsis primò affectis, nonnunq; oritur: quemadmodum etiam à neruis, vbi scilicet, vulnerantur. Cutis igitur, vbi secundū naturam se habet, laxa est, in iis qui crassi non admodum sunt: & locus medius, cui ipsa incumbit, existit vacuus: nec secus ea quæ in carne sunt spatia, conspiciuntur inania. Omnia autem hæc per inflammationes replentur sanguine: ex vasis quidem, per eorum tunicas resudante: in quacuncq; autem carnis particula, ad modum roris permixto. Vbi verò procedente tempore vicerit quidem natura: fluxio autem omnis cōcocta fuerit, ac genitum pus: extra carnem id pellitur à faculta

te, quæ in ea est, expultrice. Quòd si vel meatus naturalis còspicius sit, vel locus rarus existat, pus sanè partim perspirat: partim sensibilibiter effluit. At si incūbens cutis densa duraq; extiterit, ibi pus detinetur, atq; eā à subiecta ipsi carne dirimit: deinceps & sui acrimonia corrodit, & foras egreditur, nisi quis eam præuertat scarificare. Cæterum natura a fluxione victa, non amplius ad pus, sed ad alienam quampiam mutationem, aliàs diuersam, proficiscitur sanguis. Porro dū pus corpora excoriat, continentiaq; à subiectis diducit, ac deinceps eo utcunq; vacuato, quæ disident inter se, pristinam constitutionē nequeunt recuperare, is affectus vocatur sinus. Qui nimirum nisi quā celerrimè percuretur, callum contrahit, procedenteq; tempore durus euadit, nec amplius subiectis ipsi partibus agglutinari potest. Astringitur tamen medicamentis, & victione exiccatur, ita ut particula integrè esse sana videatur. Non solum tamen ex inflammatione gignuntur abscessus, hoc est diductiones particularum: sed & statim à principio iterdū proueniunt, pp humorem aliquem, qui temporis processu excoriet, atq; à contētis continentia dispescat. Proinde & incisi omnimodam speciem humidorum ac solidorum corporum itus habere apparent: & non rarò etiam animantia in ipsis reperia sunt, omnibus ferè quæ ex putredine ortum habent, simillima. Fistula, sinus est angustus & lōgus, aliis sinibus similis. Qui sanè astringitur, & rursum diducit etiam ob excrementorum effluxum. Iam in atheromatis reperitur quiddam pulti consimile: in melice ridibus, melli: ut seuo, in steatomatis. Plerunq; autem quædam tunica membranosa singula hæc continet. At gangræna carbunculiq; excitantur, quum sanguis tanq; feruens & inflammationi propinquus, exurit cutim. Proinde & cum crusta fiunt, & bullæ vlcus præcedunt, quemadmodum in ambustis. Quin & acutissimā

Abscessus quo
modo fiant.

Sinus quid.

Animalcula
interdum repe-
riti in absces-
sibus.

Fistula quid.

Atheromata.
Meliceris.
Steatomata.

Gangræna:

Carbunculi.

Carbunculorū
descriptio.

Atra bilis,
qualis,

7. Cācros gignit
atra bilis non
feruida: quæ si
acrior fuerit, il-
los pducit ex-
ulceratos.

8. Gangræna qd

Dolor pulsati-
lis affligit in-
flammas par-
ticulas, ob ar-
teriarum mo-
tionem.

9.

Erysipelas.
Herpes.

febrim inferunt, atq; in discrimen vitam trahunt. Ni-
gra autem prorsus, ac cinerulenta apparet crusta car-
bunculorum vlceris: nec tamen inflammationis circū
stantis color, sicuti in aliis, ruber conspicitur: sed ad ni-
grius vergit, alio sanè modo q̄ in suggillatis, vel à gelu
perfrigeratis. Non enim vehementer liuet, veluti in il-
lis tumor: verūm habet quippiam splendidum, quem-
admodum bitumen Iudaicum. Huiusmodi siquidē est
exquisita atra bilis: vnde & malignitas vlcerum quæ ī
carbunculis sunt, accidit. Siquidem sanguis, vel statim
ab initio, vel in ipso feruore superassatus, melancholi-
cus fieri videtur. Verūm citra feruorem atra bilis can-
cros constituit: atq; eos cum vlcere, vbi acriorem il-
lam esse contigerit. Quamobrem & nigriores sunt co-
lore omnibus quæ inflammatione infestantur, & mi-
nus calidi. Venæ aut in his replentur & tēdunt magis,
q̄ in ipsis inflāmatioib⁹. Ad hæc gāgræna maximis suc-
cedit inflammationibus: quæ sanè mortificatio quæ dā
affectæ partis existit: & nisi curet celerrimè, vsq; adeo
pars affecta extabescit, vt inuadat alias cōtinuas, atq;
sic hominē perimat. Porro in naturali statu, insensibi-
lis nobis est arteriarum motus: in inflāmationibus au-
tem, is cum dolore sentitur. Arteria siquidem dum di-
latatur, corpora circūiacentia percutit: atq; ex eorū
plaga ob inflāmationē dolemus. Quod si arteriæ tu-
nica inflāmatione vrgeatur, tunc ratione percutien-
tis simul & percussi, geminatur dolor. Si fluxio bilio-
sa in aliquam partem decumbat, idq; ab exquisita bile
profecta, cutem exulcerat: si verò sanies aquosas, vel
etiam sanguinem habeat, minus erit acris, sed particu-
lam magis ī tumorem attollit, q̄ exulceret. Hoc igitur
erysipelas nominatur: alterum verò herpes. Humor
autem à quo vnumquodq; horum gignitur, tū ex co-
lore, tum ex caliditate partis affectæ, faciliè dignosce-
tur. Rursus, quum fluxio acris, hæc quidē min⁹, hæc

verò magis, talis existat: sciendum est, ab acriori fieri herpetem exedentem: ab altera verò miliarem. Atq; hæc sanè fluxio pituitam habere mistam mihi planè videtur: ut illa proficisci à meracissima bile: quare & cum erosione oritur, affectu semper proximam inuadente cutem. Verùm si ex æquo sanguis & bilis cōmixta fuerint, huius affectus forma & natura, in medio erysipelatis & inflammationis consistet. Quod si alter ex humoribus longè exuperet, ab exuperante affectus nomen sortietur: cum adiectione tamen humoris admisti. Dicetur itaq; erysipelas inflammationis princeps, flaua bile superate: inflammatio verò erysipelatosā, vincente sanguine. Similis quoq; erit aliarum missionum interpretatio. Quatuor enim sunt affectiões, quæ assiduè ex humorum fluxione oriuntur: erysipelas, oedema, inflammatio, & scyrrhus. Erysipelas igitur, ut dictum est, biliosa fluxione exuperante oritur: inflammatio, sanguinea: oedema verò, tenui pituita: quemadmodum & crassa & lenta, altera quædam scyrrhorum species consistit: namq; alteram fæx sanguinis efficit: quæ ipsa rursus sanguinis fæx, est duplex: alterā enim speciem Hippocrates nigram nominat: altera verò & ipsa quidem est nigra: propriè tamen atra bilis vocat. Istius itaq; canceri soboles sunt: alterius verò nigræ, vna quædam scyrrhorum species: quæ sanè ab altera quæ ex pituita consistit, colore distinguitur. Atq; vtriusq; cōmunia sunt, maior q̄ sit pro naturæ ratione tumor, tū dolore vacans, tū durus: & q̄ vtraq; species quandoq; ab initio gignatur: quandoq; ex permutatione alicuius tumoris inmoderati refrigerati. Scyrrhis propinqua sunt tum ecchymomata, hoc est trāsfusiones: tū melasmata, siue denigrationes. Qui affectus fiunt sanguine ex ipsis venis effuso: nunc tunicis earum contusis: nunc ipsarum finibus reſeratis. Quod si arteria adaperata fuerit, affectus hic aneurisma vocatur. Fit au-

Herpes exedens
gignit ab acriori bile: ut miliaris, a minus acri.

Erysipelas
phlegmonosū.
Inflammatio erysipelatosā.

Oedema.
Scyrrhorum species duæ.

Fæcis sanguineæ duplex species.

Ecchymoma . 10 .
ta.

Melasmata.

Aneurisma. 11.

Fff iiii

Arteriarū san-
guis qualis exi-
at.

Oedema quō
ab aneurisma-
te differat.
Sphacelos.
Syderatio.

Gangræna.

12.

13.

Phagedæna.
Herpes depa-
scens.
Cacoethe ulce-
ra,
Scabies.
14. Lepra.
Cancer.
Elephas.

tem, ea vulnerata, quum ad cicatricem superposita cu-
tis deuenierit, arteriæ verò vlcus permanferit, ipsa ne-
quaquam conglutinata, neque ad cicatricem perducta, neque
carne obturata. Cæterum tumor ille compressus digi-
to cedit. Quum igitur sanguis quæ arteriæ continent,
tenuis & flauus existat, ac præterea mistus subtili spiri-
tui, & multo, proindeque sit etiam calidior eo qui conti-
netur in venis, adeò sanè is effluit, ubi vulneratur ar-
teria, ut ægrè supprimi possit. Cedit etiam in ædemati-
bus materia premētibus digitis: & pars ipsa foueæ mo-
do excavatur. At in hoc affectu pulsus non adest, ut p-
cipitur in aneurismate, & color albicantior existit. Ad
hæc oedema longè latius & maius est aneurismate: nisi
quando grumus adnatus, coalit^r ex aneurismate, spha-
celum, hoc est siderationem, efficiat. Sic enim vniuer-
sam solidorum corporum corruptionem appello: ita
ut ossibus quoque insit. Gangræna autem, solidorū cor-
porum mortificatio est & ipsa, verum ossa nequaquam cor-
ripit, maximasque sequitur inflammationes. Reperēdū
autem rursus hoc est, atram bilem, si quidem mordax
decubuerit in carnem, circumpositam cutem exulcera-
re: si verò mitior extiterit, canculos citra vlcus induce-
re. Iam verò, qui affect^r ex ulcere & tumore circumā-
biente constat, phagedæna vocatur. Depascitur etiā,
& herpes circumuicinas partes: solius tamen cutis exul-
ceratio existit: phagedæna verò, vnā cum cute, attin-
git etiam subiecta. Quæ vlcera omnia, cacoethe, hoc ē
maligna vocantur. Porro scabies & lepra, melancholi-
ci affectus, ad solam cutem spectant: quemadmodum
si in solis venis & carne fiant, nomen obtinent cancri.
Præterea elephas affectus melancholicus est, iā sangui-
ne quidem melancholico primam habens generatio-
nem: tempore verò procedēte, atra bilis copia sangui-
nem ipsum exuperat. Quo tempore corpus iam & gra-
uiter olet, turpeque & deformatum videtur: atque iter-

dum etiam exulceratur. Iam pudendorum tensiones præter naturam, quæ non desistunt, quidam satyriasmus, quidam priapismum appellant. Achor autem, vlcus est in capitis cute, quod coniiceret pituitæ salsæ, & nitrosæ esse sobolē. Ac defluit quidem ab eo sanies quedam nec aquosa simpliciter, nec ita, vt mel, crassa. Cera (quos fauos nominant) cum tumore quodam exiguo & plurimis foraminibus accidit, melleo quodam humore fluentibus. Quin & alii tumores præter naturam his minores per cutem fiunt, nimirum myrmecia, acrochordones, psyraces, & epinyctides: qui sanè affectus omnibus cogniti sunt. Non minus autem est notus furunculus: qui quidem mitis existit, si solam cutem obfederit: malignus autem, si descēderit altius. Sic enim tuberculo est similis, ab eo sola duritie differens. Vterq; autem affectus mixtæ cum inflammatione esse speciei videt. His tertio loco succedit bubo. Quarto is quem nonnulli vocant phygethlon, caliditate simul & generationis celeritate id ab aliis tuberculis distinguentes. Qui affectus glandularum partium est inflammatio. Hæ autem partes vbi ad scyrrhum deuenerit, is affectus struma & choëras vocatur: quemadmodum etiā vbi iduratur testes, σαρκώλη, & ramex carnosus dicitur. Quum autem in eorum tunicis humor aquosus colligitur, hydrocele nominatur: à quo affectu, epiplocele & enteroccele differunt: q̄ alterum omēti: alterum intestini cuiuspiam descensum in tunicas testium significet. Quemadmodum autem vnumquodq; dictorum nonnumum partis morbum indicat, à qua affectus cognominat, sic & σαρκώλη recens nomen, hoc est varicosus ramex, in parte iam dicta declarat ipsum affectum consistere. Quanq̄ veteres, & alias etiam turgentes venas κίρσους, hoc est varices nomināt. Fiunt quippe in cruribus etiam varices, ob imbecillitatem venarum quæ inibi existunt: & tunc præsertim, quum san-

Satyriasmus.
Priapismus.
Achor.

15.

Cera.
Myrmecia.
Acrochordones
Psyraces.
Epinyctides.

Furunculus.

Tuberculum.

Bubo.
Phygethlon.

Struma.
Choëras.
Sarcocèle.
Ramex carnosus.
Hydrocele.
Epiplocele.
σαρκώλη
Ramex varicosus.
Varices.

16.

Bubonoccele.
εξομφάλους.

Hydropis tres
species.

Epulides.
17. Parulides.
Thymi.
Vua.
Tonsillæ.
Paristhmia.

Polypodes.

Encanthis.

Vnguis oculi.

Staphyloma
ta.

guine corpus crasso redundat. Peritonæo vulnerato, vel rupto, nec postea cōglutinato, tumor quidem molis eam regionem occupat. Quod si id in inguine eueniat, tumor tale bubonoccele nominatur. Si verò circa vmbilicum, sic affectos εξομφάλους quidam appellant. Cæterum peritonæi solius nulla harum affectionum existit: sed & nerueam propaginē musculo affici prorsus est necessarium. In hydropicis etiam, copia quidē materiæ eadem in regione aggregatur: aquosæ sanè, in ascite: flatuosæ, per tympanitem: pituitosæ deniq; in affectu anasarca, & eo quem leucophlegmatiam appellant. Porro epulides, parulides, thymi, & alia id genus, carneæ suppullulationes existunt. At vuæ, gurgulionis: tonsillæ, earum glandularum quæ inuicē in faucium initio opponuntur: paristhmia deniq; eorum corporum quæ in ipsis faucibus sunt, inflammationes existunt. Polypodes autem, aut inflammatione, aut tuberculo, aut alia quapiam suppullulatione in naribus consistente, gignuntur. Encanthis verò, in magnis oculorum angulis fit, tumor non toto genere præter naturam, sed sola magnitudine. Vngues autem adnascuntur quædā sunt mēbranæ exterius adnatæ oculis: quæ ab osse circūambiente delata, vsq; ad iridis coronā extendit. At quæ vocant staphylomata, hæc quidem solo situ: hæc verò dispōne ipsa, pter naturā existunt.

GALENI PERGA

MENI DE TREMORE

palpitatione, conuulsione, & rigore.

Liber vnus.

12. Motus sensibilis duplex: vnus uolūtari⁹ qui ad nervos & musculos; a-



SENSILES motus in sanis animalium corporibus, duplices genere existunt. Alii siquidem sunt secundum voluntatis imperiū: quos sanè à nervis & musculis edi-

tos, liberæ voluntatis actiones mos est medicis appellare. Alii autem à corde & arteriis profecti, functiones appellantur vitales. Est & tertia in venis insensilis motus species, de qua impræsentiarum differere, nō videtur expediens. Cæterum motus à nervis & musculis editus, quo manus atq; crura mouemus, in tremore, & conuulsione, morbofoq; rigore, ac nonnunq; palpitatione apparet. Etenim istiusmodi affectus, incompositi, exorbitantesq; sunt motus instrumentorum, quæ dum integrè valent, motus voluntarios proficiunt.

Tremor igitur, imbecillitate facultatis quæ vehit atq; mouet corpus, efficitur. Etenim animalium partes græues quæ sint, deorsumq; ferri natæ, ex se vsquequaq; moueri nequeunt: sed facultas à principio musculis, per nervos delata, quasi vehiculum quoddam, atq; ala motus ipsarum est. Quæ si exactè defecerit, partes vti relaxatæ resolutæq; deorsum vergunt, atq; instar auis expilatæ concidunt. Vnde membra hoc pacto affecta, omni motu priuantur. Verùm si facultas ad musculos per nervos fluat, exigua tamen & debilis, vt quātum oportet membra corporis vehere, librareq; aut veluti pondus aliquod ferre, non possit: membrum sic dispositum, cum tremore dehiscere necessariò conspiciamus. Siquidem motus coacti violentiq; qui vires debiliū superant, fiunt haud dubiè tremuli: vt constat in onera graua gestantib⁹. Pari quoq; modo si quis timore correptus fuerit, manibusq; siue quid agere, siue librare voluerit, tremulæ quidem manus agendo: tremula quoq; crura incedendo ei ob timorem fiunt. Timor quippe facultatis robur, nihilominus q̄ onus, imminuit. Consimili modo senes imbecillitatis causa tremuli euadunt: & quibus ob ægritudinē laborauit ipsi⁹ corporis robur, his haud sine tremore perficitur motus. Tremor itaq; est compositus motus, fitq; vbi corpus propria grauitate deorsum vergit, sed rursus à fa-

lius vitalis, qui ad cor, & arterias pertinet.

Tremor quo modo fiat.

Motus violenti, qui viribus superiores sūt, fiunt tremuli. Perculsi aīo ædunt actiones tremulas.

Timor facultatis robur imminuit. Senes cur tremuli.

Tremor est metus cōpositus.

4. Palpitatio a tremore quo differat.

Moueri multa quæ prorsus i-mota uidentur: ut auis quæ se i sublimi aeris regione sustinet.

Statio est motus.

Iacentem in pedes delabi facultatis extremæ laborantis est signum.

Extensam manum habentes, mouentur.

cultate eleuatur sursum: particulis nimirum ipsis vicissim loca mutantibus. Differunt autem inuicem palpitatio & tremor, quum nimirum non eodem loco quo tremuli, palpitatione correpti afficiantur, nec eadem causa, nec præterea idem sit vtriusque symptoma. Nullus enim tremit utique, nisi membrum aliquod mouere præelegerit. At membra palpitantia, & si reposita iaceant, nulloque exagitentur motu, palpitant: id quod mirum esse non debet. Alia siquidem multa, licet immobilia videantur esse, utpote in eodem permanētia loco, mouentur nihilominus tamen. Auis quippe, in sublimi regione aeris suspensa, dum sese, quo minus ruat, sustinet, aliquo uti motu videtur. Is igitur motus (quæ immobilitas fortasse tibi apparuerit) ex duobus certis motibus, qui in contraria loca diducere corpus queunt, est mistus. Quorum sanè si alterum, nempe motum sursum, sustuleris, à reliquo deorsum deduci corpus minimo negotio videbis. Ob id etiam stare quod incedere iis qui viribus sunt imbecillibus, haud minus est laboriosum: quum statio sit quoque motus. Sublata namque anima, quæ & mouet, & corpus erigit, corpus prius rectum, mox stratum facile videremus. Quare non immerito monuit Hippocrates. Si æger seipsum continere non possit, & ex lectica in pedes corruat, grauius est. Nam iacentem ad pedes delabi, facultatis extremæ laborantis firmissimum est indicium. Etenim stare, aut sedere, aut surgere non posse, graue certè est, sed eo sanè minus graue. At more viuentis decumbere non posse, sed ceu demortuum inanimatumque corpus deorsum irrepere, extremum est malum. Quod autem ubi quis manum extensam aliquandiu in illa figura conseruat, aliquo motu moueatur, argumento sunt utraque genera musculorum simul & ex æquo tunc operantia. Liquet itaque, ei qui nullo se mouere motu conatur, tremorem minimè accidere posse. Palpitatio autem,

TR. PAL. CON. ET RI. LIB.

partibus etiam motu carētib; euenit. Etenim supercilium, palpebræq; & oculus, sæpenumero, nulla concurrente voluntate, attolluntur. Præterea in partibus palpitatione affectis, eleuationes depressionesq; apparentes, corporum quasi repletorum, moxq; euacuatorum, extensiones & contractiones existunt: in tremoribus autem, nec distenditur quicq̃, nec etiam contrahitur. Cæterum non omnia palpitant. Nervum siquidem, aut os, aut cartilaginē, palpitare non videas, quum cavitate careant, qua nunc distenta, nunc cōtracta, attolli quum distenduntur, cadere quum contrahuntur suis partibus possint. Est itaq; palpitatio, dilatatio quædam, atq; cōtractio, præter naturæ ordinem. Tremor verò, partiū quæ vicissim sursum deorsumq; feruntur, motus inuoluntarius. Vnde perspicuum est, membra quidem tremula priorem mutare locum: palpitantes autem particulas, perpetuo eundem tueri. At verò spiritum crassum & vaporosum in aliqua cavitate collectum, exitu q; prohibitum, palpitationum esse causam pronuncio. Nā quod palpitatio ab spiritu oritur, celeritas ortus & solutionis illius indicat. Etenim corpus nostrum constituunt (vt nos Hippocrates docuit) continentia, & contenta, & quæ feruntur impetu. Continentia siquidem appellauit solidā: continent enim, ac liquida claudunt. Contenta autem, liquida: nam liquida solidis continentur. Quæ verò impetu semperq; feruntur, spiritus: nāq; hi per vniuersas corporis partes facile permeāt. Erit igitur spiritus quidē, sed crassus & vaporosus, palpitationis causa. Nam si ille clarus, tenuis, purusq; fuerit, citra vllum impedimētum transluet: ac proinde partes nec replebit, nec euacuat. Porro vt solis arteriis inesse palpitationem minimè verum est (quod profitebatur Praxagoras) sic reperiri posse arteriam non dubito, quæ & palpitatio nis & conuulsionis aliquid sæpe ostēdat. Iam verò pal

23

Palpitatio quibus partibus accidat, & quibus minime.

Palpitatio est dilatatio & cōtractio præter naturæ ordinē. Tremor ē motus inuoluntarius.

Palpitationis causa.

Constituentia corpus nostrū sunt continentia, cōtenta, & quæ feruntur impetu.

Palpitatio qui
bus sit familia
rior.

Calfacientium
uires.

Refrigerantiū
facultas.

Palpitationem
quæ soluūt me
dicamenta.

Palpitatio ex
frigore tātum
prouenit.

Tremoris cau
sæ diuersæ.

Trementē mu
lierē ob purga

pitazione facile corripitur frigidiores ætate. Adhæc, natura corporis frigidior, regio frigida, hyems, mollis viuendi ratio, crapula, & vini vsus immoderatus, cū bi flatulenti & frigidi, omnia breuiter quæ corpus absolute refrigerant, palpitationi sunt generandæ idonea. Sicuti illorum contraria eandem submouere possunt. Calfacientia quippe, attenuant spiritum, corporaq; mollia simul & rara efficiunt, vt ille expirare possit. Verum refrigerantia condensant, congregantq; ac corporis meatus arctiores reddunt. Insup crassum, densumq; ac turbidum efficiunt spiritum, qui sua crassitie, corporumq; ipsum continentium dēitudine, retinetur, vt minimè exhalare possit. Merito igitur veteres, iis contra palpitationē sunt vsi medicamentis, quæ attenuare & excalfacere possunt. Cuiusmodi sunt quæ ex pyrethro, adarce, & pipere constant. Aquas quoq; calidas ex terra prodeuntes, & præcipuè nitrosas, sulphureas, bituminosasq; cōmendant. Et aqua marina actu calida, muriaq; marinæ vice vtuntur, si mare absit. Porro castoreum, non solum bibitū, sed et admotū extrinsecus, ad id optimum est medicamē. Cæterum palpitationis generatio ex frigido dūtaxat prouenit: tremorem verò, ob multas & alias causas fieri contingit. Nam dispositio hæc, facultatis quæ corpus mouet est imbecillitas: sed causa quæ hanc ipsam imbecillitatem inducere potest, specie variat. Aut enim alimentī defectu, aut exoluto vitali robore, aut violenta vehementiq; refrigeratione, virtutem occupante, aut repletionē ipsam instar ponderis aggrauante, admodum imbecillis ad motū facultas redditur. Vnde non sicuti palpitantibus, ita & trementibus vna dūtaxat medicamentorum species congruit, sed varia. Ac pro differentia ipsius causæ, oportet per contraria semper medendi rationem variare. Etenim mulierem quæ post partum nec secundas expellere, nec sanguinem expurga

TRE. PAL. CON. ET RIG. LIB.

re poterat, indeq; tremore correpta est, secta i malleo
lo vena, curauit Hippocrates. Quod autem sanguine
exuberante, venam incidere oporteat, omnibus no-
tum esse arbitror: quum sanguis contineatur in venis.
Quod verò laborante matrice, in malleolo aut popli-
te incidere expediat, id docet commercium venarum.
Siquidem per venas cōmunicantes semper vacuare
est opus. Nam si venas, quæ particulæ affectæ non con-
sentiunt, pertundas, minimè affectum locum curabis,
sed potius sanum offendes. In animalibus itaq; motus
voluntarii opifex, fabricatrixq; facultas est, quæ vni-
uersas animalium partes gubernat. Huius autem in-
strumenta, nerui & muscoli existunt. Igitur motu pri-
uari, aut non pro dignitate moueri contingit mēbra,
vel ob instrumentorum, vel ob facultatis affectus. Pal-
pitationes itaq; & conuulsiones, & membrorum reso-
lutiones, instrumentorum vitia: tremores verò, virtu-
tis imbecillæ affectus existunt. A rigore autem distin-
guitur tremor, quod tremor quidem non sine consi-
lio mouendi partem, contingat: quassatio verò, quæ
vehementer rigentibus insidet, adeò violēter valideq;
concutiat corpora, ut quietem agere minimè queant,
vel si quis viriliter illis resistat. Insuper, tremor, vnus
duntaxat particulæ: rigor vniuersi corporis est affectus.
Adhæc, tremere quidem nonnullos, absq; vlla refrige-
ratione sensibili, conpertum est. At rigēre, absq; hoc
vt videatur corpus refrigeratum, est impossibile. Non
tamen refrigeratum esse, & videri, idem esse fatearis.
Motus præterea in rigentibus, inuoluntarius omnino
est: in timentibus autem, non absq; imperio volunta-
tis consistit. Porro vt motus aliquis dici rigor mereat,
opus est vt cum refrigeratiōe sensibili, inæqualis inuo-
luntariusq; totius corporis motus accedat. Quæ sanè
quassatio, si in nonnullis accessibus solam superficiem
concutiat, nec vniuersum corpus commoueat, is affe-

95

mēt a post par-
tium retenta,
secta in malle-
olo vena cura-
uit Hippocra-
Matrice labo-
rante, vena se-
cāda est i mal-
leolo, aut po-
plite,

Palpitatio est
organorum ui-
tium,

Tremor, uirtu-
tis imbecille ē
affectus.

Tremor nō fit
sine cōsilio mo-
uendi partem.
Rigor fit iuitis
Rigor a tremo-
re quo diffe-
rat.

Rigori quid re-
quiruntur.

Horror talis af-
fectus est cutis,
qualis totius
corpis, rigor.

Rigor quid.

Calidū innatū
nō est aialis ge-
neratione po-
sterius.

Natura nihil
aliud q̄ calidū
est.

Aīa nihil ē ali-
ud, q̄ calidum.

Calidū innatū
quō itro & fo-
ras moueatur.

Calidū innatū
esse mixtū, atq̄
ex calore &
frigore suū or-
tum habere.

ctus horror vocatur. Horror itaq̄ talis duntaxat cu-
tis, qualis vniuersi corporis rigor, affectus est. Ceterū
impræsentiarum non de rigore aut horrore qui sana
corpora infestant, sed de illo qui ægris solet superueni-
re, disputare consilium est. Igitur morbosus rigor se-
cundum Hippocratis dogma, refrigeratio quædam ē
dolorifica, cum inæquali totius corporis concussione.
At verò rigore affici, innati calidi affectum esse omni-
bus ferè in confesso est. Verū enim verò, calidū hoc
innatum minimè gigni motu aut frictiōe arbitramur,
sed corpus omni ex parte conspirabile, confluxileq̄;
esse contendimus: calidum autem ipsum non aduenti-
tium, nec animalis generatione posterius, sed prima-
rium, primordiale, insitūq̄ putamus. Natura itaq̄, ani-
maq̄, nihil aliud q̄ calidum est. Quocirca si hoc sponte
semperq̄ mobile eē cognoueris, errare minimè pote-
ris. Qua igitur ratione is calor semper existit mobilis,
ea nimirum, nec intus solū, nec foras mouetur: sed
alter ipsius mot⁹ succedit alteri. Cito enim immobile
ipsum redderet intus statio: foris autē, quies eum dissi-
paret. Nam calidum moderatè extinctum, rursusq̄;
moderatè accensum (vt ait Heraclitus) semper mobi-
le remanet. Accenditur igitur, vbi appetens nutrimen-
tum versus centrum inclinat. Extinguitur autem, vbi
foras & vnde quaq̄ dispergitur. Ac mouetur quidem
ipsum innatum calidum à suo principio foras, calidita-
tis ratione: intrò verò, atq̄ ad proprium principium
illabatur, quia etiam frigiditatis est particeps. Hoc si-
quidem calidum, & mixtum est, & ex calore frigoreq̄;
ortum habet. At prima quidem calidi ratio spontaneā
sui ipsius mobilitatem includit, hacq̄; ad operandum
maximè eget. Nihilominus tamen magnum quoq̄ à
frigore adiumentum accipit. Nam quum innatum ca-
lidum & eleuare in altum, & secum alimentum rapere
natum sit, certè si frigus lationem calidi nō coaceret,
penitus

penitus euanesceat, atque dissiparet. Porro animal tunc sanum existimatur, ubi temperamentum, naturae ipsius limites non excedit: hoc est, quum calor frigusque temperatura mediocri mutuo inter se miscentur. Si vero altera qualitas immodice alteram superet, tunc animal laborare morbo, qui congruens sit naturae causae superantis, necesse est. Etenim * inflammationes, erysipelata, ulceraque; serpentia, necnon carbones, omnesque tum impense calidi, tum febriles affectus, dum vis calidi dominatur, utique fiunt. At convulsiones & tetani, palpitantes, stupores, resolutiones, morbi comitiales, atque ii affectus qui homines attonitos reddunt facultate frigoris dominante oriuntur: inter quas affectiones rigor enumeratur, qui refrigeratio simpliciter non est, sed tantum secundum sensum. Fuerit itaque rigor innati calidi, vehemens, confertimque affligens, ac violenta secundum sensum refrigeratio. Iam vero quemadmodum quod in naturam haud latenter reuertitur, est iucundum, ita quod a natura pari modo recedit, dolorificum fuerit. Quare vnum idemque; frigus, alias quidem delectasse, alias vero tristitia affecisse credimus. Nam si frigus corpori extra modum calfacto, admotum fuerit, id prorsus delectat. At si corpus suam naturam retinens, confertim, abundeque refrigeretur, dolebit utique & tristitia afficietur. Igitur nec dum alimenti defectu innatum calidum obscuratur, nec dum pabuli copia obruitur, nec dum ob imbecillitatem collabatur, rigorem fieri contingit: sed quoties ipsum validum existens, intenditur, ac dein coercetur, reprimiturque: quod solet flamma, ubi confertim aqua illi instillatur. Calor itaque per rigores, nec substantia nec robore laesus, ad vniuersas corporis partes extendi ferrique; properat: impeditus autem, versus principium propriè confurgit, inibi que; permanere non valens (substantiae enim semper mobili quies mors est) seipsumque; congregans, ac veluti in spiram con-

Animal, quum & ualere, & egrotare dicatur.

Affectus calidi

Affectus frigidi.

Rigor est secundum sensum refrigeratio.

Iucundum quid. Dolorificum quid.

Rigor quum oboriatur.

Mobili substantiae quies mors est.

trahens, æqualiter quidem, non amplius tamen citra violentiam, extenditur. Vbi verò exiliens infestantibus reluctantibusq; rebus occurrit, ac nunc pellit illas, nunc pellitur, idq; impulsibus & conflictibus variis, tunc sanè corpus mira quassatione ob duplicē illū atq; inæqualem motum, haud citra dolorem concutitur, q̄diu molestia adfuerint. Concussio igitur, quassatioq; necnon omnium membroꝝ fremitus, omnisq; irregularis, inordinatus, inuoluntariusq; motus, ob caloris innati, factiq; iam vaporosi, inæquales, validos, violentosq; occurfus atq; resultatiōes, rigoris tempore, perficiuntur. Quamobrem corpus in rigoribus rursus incalescit exactius, q̄ quum naturaliter se ipsum habebat. Sudores quoq; effunduntur ē corpore. Etenim vbi post multos conflictus molestia fuerint explosa, exacte q; iam perspirauerit corpus, tribus de causis id calferi est necesse Nempe q̄ calidum vndiq; spiratione priuatum, in profundo collectum fuerit: quodq; postea vehementer ad exteriora se extenderit: ac tertio deniq; q̄ per occurfus illos, conflictus, atq; violentos motus, natura calor reaccenditur. Itaq; sæpe i huiusmodi reditu de profundo calidum quasi ebulliens, confertim humidum quoddam effundit, quod sudorē vocamus. Ob idq; in rigore refrigerari, nec rursus calferi, prauum est: calidumq; succubuisse portendit. Est autem rigor indicium maximum exquisitæ tertianæ: quæ ab ingenti oritur ardore: eatenusq; ab ardente cōtinua deficit, quatenus in ea incendium ipsum facit intermissionem. Nam & sitis inexpugnabilis, & refrigerationis cupiditas, & bilis syncere vomitus, vomituq; peractō quies (quæ omnia signa sunt caloris exuberantis) comitantur exquisitam tertianam. Febris ē ex ingenti ardore continuis, solet rigor superuenire, easq; soluere. Præterea acre calidumq; medicamentū vlceri admotum, primò dolorem, mox horrorem, ac

Incalescit corpus a rigore vehementius q̄ antea, tribus causis.

Rigentes non recalferi, prauum indicium ē.

Tertiana, quō ab ardente cōtinua differat.

Rigor solet febres ardentes soluere.

TREM. PAL. LIB.

99

dæmum rigorem inducit. Inflammationi etiam in abscessum conuersæ, rigorem horroremq; necessario accidere nouimus. Ad hæc res auditu visuq; formidabilis, interdum horrorem, rigoremq; inducit. Ex quibus utriq; liquet, non frigori duntaxat, rigorem tribuendum eē: quum ab aliis causis, & præcipuē ab acri & calido humore delato per sensibilia corpora interdum proficiscatur. Cæterum neq; frigidum humorē, neq; acrem, ad rigoris generationem, simpliciter excellere, sed proprium modum ipsorum utriq; necessario inesse, oportet. Modus autem fuerit aut copię mensura, aut humoris qualitas, aut aliquis corporis locus, in quo illum aggregari conueniat. In quiete quoq; motuq; atq; ipsius motionis modo, haud parua dīa oboritur. Vbi igitur flaua bilis, non p̄ vasa, sed per carnes mouetur, manifestē gignitur rigor. Hoc nanq; solo febres ex ingenti ardore à tertianis differūt, q̄ illæ quidem in valis bilem contineant: hæ autem, extra vasa diffusam per sensibilia corpora. Per quæ quidem dum bilis fertur, acredine sua tristitiam inferens, dolorem excitat. In hoc autem duo quædam eueniunt, nempe vt sanguis contrahatur in profunditatem corporis, ob idq; exteriores partes refrigerentur: & vt ille eadem corporis partes quæ à bile punguntur, impellant ipsam facultate expultrice, donec ab omnibus profulgata partibus, per sudorem, aut vomitum, aut deiectionem exterminetur. Hoc etiam iis qui non * concoxerunt, aut malis succis repleti sunt, aut in sole æstiuo, vel balneo diu sunt immorati, aut seipsos exercuerunt, cōtingit. Horum nāq; aliqui horrore confestim, ac dein rigore correpti sunt. Verūm non solum mordax causa, sed vehementer mota, si rigor fieri debeat, desyderatur. Atq; hoc sanē tam frigidæ q̄ calidæ causæ est commune, q̄ vtraq; corpus cum dolore cōmoueant. * Iccirco per quartanas atq; tertianas febres,

Acia viceri
admotā, rigore
inferunt.

Rigor accedit
inflammationi
in abscessum
conuersæ.

Formidabilia
inducunt hor-
rore, rigoreq;
Rigoris causa.

Rigor fit vbi
flaua bilis fer-
tur per sensibi-
lia membra,
Ardētes febres
quō a tertianis
differant.

Frigere extre-
ma p̄ accessio-
nes vnde acci-
dat.

Rigor fit a cā
non quiescen-
te, sed mota.

Ggg ii

Pituita vitrea
inducit inter-
dum rigorem.

Rigentium ex
frigido humo-
re, curatio.

Quartanis ex
acerbationib⁹
medicamē ex
succo cyrenai
co & castoreo
auxiliatur.

Tertianus ri-
gor qualis.

Motus volun-
tarii a muscu-
lis sunt.

Cōuulsio qd.

Tensio neruo-
rum interdum
ab humectan-
tibus interdū
a sic cantibus
causis oritur.

quis à contrariis oriantur humoribus, rigor tamē in-
uadit. Etenim ut atra bilis est frigida, sic flaua calida
existit. Cæterum non solum ex atra aut flaua bile, sed
ex pituita ultra modum frigida (quam vitreā appella-
uit Praxagoras) rigor fieri consuevit: idq; in mulieri-
bus magis, & quæ in otio vitā traducūt: qui rigor tñ ve-
hemens non est, & quiescentibus, nulloq; modo mo-
tis corporibus, ipse etiam conuiescit. Ii autem qui
simili affectu correpti sunt, in principio quidem me-
dicamentum diatrion pepereon propino: inbinde ve-
rò nostrum ex calamintha: deindeq; ex succo cyrenai-
co, castoreoq; compositum, quod quartanæ ex acer-
bationibus maximè confert, præsertim quando ingē-
tis rigoris impetu ægri afficiuntur. Porro qui quarta-
nis correpti sunt febribus, vsq; ad ossa sibi penetrare
rigorem affirmant: & talem, qualis per immensa frigo-
ra, dum iter facerēt, eis accidebat. In rigore autem q
tertianas, pariq; modo ab ingenti ardore ortas comi-
tatur, quasi ab acutis tenuibusq; acub⁹ se perpungi fa-
tentur. Nunc verò de conuulsione nonnihil dicamus.
Voluntarii omnes motus, per musculos absoluuntur.
Vbi igitur musculi in propria retrahuntur capita, ad
ea singulæ partes, quibus natura infixi sunt, retrahun-
tur, cōuellunturq; Verum si passio aliqua suboriatur,
quæ intensiorem ipsos adducat, hanc sequitur motus
similis quidem naturali, inuoluntarius tamē: atq; hæc
passio conuulsio appellatur. Nam tendi cōtrahi q; mu-
sculum in proprium principium, secumq; illam corpo-
ris partem, cui est insertus, reuellere, bene valentibus
conuulsisq; commune profectò est. At si inuitò id aga-
tur, præter naturæ ordinem dispositis, minimeq; sanis
contingit. Tenduntur autem nerui, perinde ac citha-
rarum chordæ, interdum quidem plurimò humore im-
buti: interdum à causis exiccantibus arefacti. Euenire
etiam potest, aliquam corporis partem, aut ob inflam-

MORBO. TEMPO.

mationem, aut aliqua alia de causa, vehementer affectam, nervos sibi vicinos vnâ secum reuellere. Porro in febribus ab ingenti ardore contractis, conuulsiones accidunt, ob solam siccitatem insignē vniuersi nervos si generis: in phrenitide autem, ob principii nervorum inflammationem. Cæterum quum corporis partes antè tenduntur, symptoma dicitur emprosthotonos: quum verò posterius, opisthotonos: * at quum in vtrūq; latus ex æquo inclinant, tetanus. Igitur conuulsiones à siccitate ortas, minimè curâdas susceperis. Nam qui his sunt affecti, citissimè intereunt. Quæ vetò vel ab humorum copia, vel ab inflammatione trahunt ortum, his, si plenitudinem vacues, aut inflammationi commo- dis remediis succurras, mederi poteris.

60101

Emprosthoto-
nos.
Opisthotonos:
Tetanus.

Cōuulsio a sic-
citate non re-
cipit curationē

GALENI PERGA- MENI DE MORBORVM TEMPORIBVS. LIBER VNVS.



QUOD in animalibus ætas, idem tēpus in morbis significat. Etenim quemadmo- dum ipsi nos geniti ad vigorem vsq; au- gescimus: inde iam contabescere incipiē- tes, ad extremam vsq; corruptionem de- clinamus, si omnes ætates pertransituri simus: ita sin- guli morbi à prima ipsorum constitutione ad statum vsq; increscunt, donec pro augmenti prioris portio- ne decrescunt, in totum dissoluantur. Hoc tamen di- scrimen interest, q̃ animalibus quidem, quum sint cor- pora, proprium generatiōis tempus præscriptum est, quo omnes ad vitam necessariæ partes figurantur, for- manturq;: morborum autem, quum sint accidentia cor- porum, nullum huiusmodi tempus est p̃finitum, sed

Tempus mor-
borum cōpa-
ratur ætati ani-
malium.

Tempora mor-
borum ab æta-
te animalium
quomodo dif-
ferant.

G g g i i i

Morborum generationi non esse certū quodam tempore præscriptum. à prima statim generatione augescunt. Figurationem itaq; generatiōemq; proprietates corporum postulat: accidentia autem ipsorum, quum nullam figurationē desiderant, statim ubi genita sunt, ad incrementum festinant. Si quidem phlegmone exempli gratia quum primum inceperit esse, huiusmodi speciem habere videtur, qualem habebit ubi erit maxima: sola autem

Phlegmones accidentia.

Febris quid.

Vigor in singulis rebus, est magnitudo summa.

Initium morbi.

Incrementum, Status.

Declinatio.

Circuitus quotidiani.

Circuitus tertiani.

Circuitus quartani.

magnitudine differt. * Porro pars phlegmone obsessa, calidior seipsa euadit, cum tremore maiori, itē dolore, & tensione. Sed hæc parua primo aditu sunt: inde autem ad magnitudinem quandam non omnibus æqualem increscunt. * Postea verò aut discutitur remediis tumor ipse præter naturam, simulq; illi⁹ dolor atq; calor resoluitur: aut certē in pus conuertitur. Tēpus itaq; nullum inflammationis generationi singulariter proprium tribuitur, ab eo, quod augmenti est, diuersum. Febris etiam (qui calor præter naturam est) propriū distinctumq; generationis tempus nō habet. Sed ubi corpus primum calidius q̄ antea febrili calore fieri cœperit, inde aliud, atq; aliud tempus affectiōis incrementum excipit, vsq; ad perfectum vigorem, quē in singulis rebus summam esse magnitudinem intelligimus. At verò principium specie quadā ab incremento post ipsum, diuersum esse demonstrare conabimur. Etenim initium vniuscuiusq; morbi esse cēsuerunt veteres, non primum illum simplicemq; insultum, duntaxat: sed temporis longitudinem latitudinemq; notatu dignam ipsi tribuerunt. Post principium ipsum, collocarunt ascensum: dein, statum: ab hoc declinationem. Ex quibus sanē temporibus circuitus morborū constant. Ipsorum autem circuituum nonnulli describuntur horis viginti quatuor: quotidianiq; vocantur: alii quadraginta octo, hoc est duabus diebus & noctibus, vocanturq; tertiani. Alios (quos appellant quartanos) septuaginta duarum horarum tempus describit

At hi circuitus omnes, aliquando ad integritatem perueniunt: vt in quotidiana, tertiana, & quartana febris: interdum ad declinationem solum, vel propius ad integritatem: vel longius ab illa accedent. Igitur in auspiciis tertianæ febris (quæ exempli grâa propono) horror mediocris oritur. Deinde cum maiori horrore extrema omnia refrigerantur. Postea verò & rigore, & frigore concutiuntur plurimæ corporis partes. Quo tempore pulsus durior, minorq; q̃ prius, redditur: necnō in cōtractione velocior. Præterea quies post cōtractionem ferè maior contingit: post dilatationem, eodem cum illa mō: sæpe priori æqualis: & si aliquñ inæqualis. Atq; hæc sanè * in quibusdam tertianis, curriculo duarum horarum æquinoctialium solèt sæpe cōtingere: in aliis autē longiori vel breuiori intervallo. Inde pulsus maior simul & celerior, densiorq; fieri incipiens, sensim singulis commemoratis icrescit: statimq; ægri calidiores q̃ antea redduntur. In summa inæqualitas quæpiā non mediocris in corpore per hoc tempus exuperat. Atq; hoc sanè est secundum tēpus, à primo illo, in quo ex priori statu fuit vniuersum corpus refrigeratum, pulsusq; in contrariam constitutionem mutatus. Vbi verò febris ad integritatem desinit, tunc pulsus ad naturalem statum reuertitur, si qua fides habenda est sensibus. Primum itaq; tempus totius periodi est, quo corpus cum prædictis mutatiōibus pulsus, in alserit. Aliud ab hoc secundum est, quod pulsus & calorem in contraria mutat, donec tota corporis moles æquabiliter concalescat. Post hoc tertium, quo calor etiamnum augetur, pulsibus magnitudine, celeritate, & frequētia ei respondentibus. Quarta constitutio post tres commemoratas conspicitur, omnibus iam dictis æqualem sibi magnitudinem pro sensus nostri iudicio seruātibus. Ad hæc quinta alia, quum iam calor manifesto decreuit: halitus autem per cutem excernitur, pulsusq; ad

3.
Tertianæ febris descriptio.

G g g iiii

4.

(5)

Tertianæ ac-
cessions tem-
pora sex descri-
buntur: qualia
reperiuntur &
in aliarum in-
termittentium
circuitibus.

7.

Febrî non in-
termittentium
reperiri tempo-
ra quinq;.
Cōtinuârū fe-
brî se remittē-
tium species.

Quartana non
intermittens,
raro inuenitur.

naturalem habitum redit, reiiciens omnia, quæ præ-
ter naturam in magnitudine, celeritate, frequentia,
duritieq; conquirit. Hoc tempore plurimis ipsorū
sudor oritur. Post hoc autem, intermissiōis, siue inter-
ualli tempus succedit. Igitur primum tempus integri-
tati cohærēs, quod frigoris sensum præbet, principiū
vocetur. Secundum verò, quod frigus paulatim depo-
nit, tempus inæqualitatis dicat. Ab hoc tertium, æqua-
lis incrementi. At quartum post hoc, cōsistentiæ. Quin-
tum imminutionis. Sextum deniq; integritatis. Quod
igitur sex hæ temporum differentiæ in tertianarum
aliarumq; intermittentium febrium circuitibus repe-
riantur, id sensu vel multitudo imperita iudicat. Nihil
tamen obstat & alium quodammodo febris circuitū
in duas sed maiores partes diuidere: vnā, primæ ac-
cessions à primo insultu ad extremam vsq; remissio-
nem: alterā, quæ in declinationis & insultus secundæ
accessionis medio consistit. Quod igitur ab Hippocra-
te dictum est, in accessionibus abstinendum esse, pro
accessione intelligendum existimo tempus à primo
insultu, vsq; ad ipsam declinationem. Porro clarioris
doctrinæ gratia, omne id quod accessionem sequitur,
remissionem vocabimus: quāuis in intermittentibus
febris, remissio ipsa ablatio etiam dici meretur. Di-
uisimus itaq; febres desinētes ad integritatem, quidā-
nā, tertianā, quatanā: quæ singulæ sex distincta sor-
tiuntur tempora. At verò quæ non intermittunt inte-
grē, in quinq; tantū soluuntur, ab eis nimirum sola
integritate remota. Quarum sanē nonnullæ quotidie
accessionem habent: quædam tertio quoq; die. Quæ
verò quarto habent, non frequenter, sed raro euenire
vident. Vtpote quæ magna ex parte ad integritatem
desinant. Adhæc, febrium quotidianarū, tertianarū, &
quatanarum, quæ ad integritatem non desinunt, du-
plex species est. Quædam namq; magnitudinem, cele-

ritatem, frequentiam, atque duritiem pulsus deponunt: quædam autem reliqua tria ad naturalem statum deducunt: at conseruant celeritatem: hæc magis, illæ minus. Verum in quibus febribus circa sensibilem systolē, accessiois insultus accidit, tria tempora in vnum recidere est necessarium, totumque id usque ad statum fieri incrementum. Nam ubi non adfuit conspicua systole, ibi nec inæqualitas adesse potuit. Statum verò nunquam defuisse memini: sed semper sensibili æqualitate in omnibus febribus aliquādiu permanisse. Insultum etiam millesime dictis conspexi symptomatis. Quibus febribus nullus circuitus adest, ut iis quas synochos vocant, nec accessio quædam omnino est, neque prædictæ partes. At tamen hæc quoque secundum diuersa tempora totius morbi particulas obtinent: aliis modis innotescences, quæ per accessionum tempora. Sed nunc tantum de febrium circuitibus, iisque non complicatis, sed simplicibus nobis habetur sermo. Aduerte autem aliud esse misceri: aliud inter se complicari. Semitertiana quippe, ex miscella & temperamento quotidianæ & tertianæ febris oritur. Potest tamen ipsi semitertianæ copulari alia simplex febris, vel tertiana, vel quotidiana. At huiusmodi varietas minimè ad hunc librum pertinet. Cæterum cognitis singularum febrium temporibus, facile complicatarum tempora cognoscemus. Igitur de simplicibus dictum abundè quum sit, de commistis deinceps differam: in quibus interdum horrificus insultus quidam contingit, omnes principii peculiare notas habens, præter rigorem: quāuis interdum & huius quandam imaginem repræsentans. Siquidem vehemens horror, vel aliquod rigoris initium, vel parum rigor videri potest. At exactum rigorem, qualis in tertianis, quartanisque est, febris miscellanea cuiusmodi semitertiana existit, non recipit. Vbi igitur signa quædam secundi temporis, febris hæc præmonstrarit, initium rursus alterius intra

Synochis febribus nullum circuitum adest: ac proinde neque accessionem.

Missionem febrium differre a complicatione earundem. Semi tertiana ex quibus consistet.

Rigor vehemens non adest miscellaneis febribus.

Semitertianæ
febris accessio
nunq̃ integre
desinit.

Semitertianā
febrem inuale
scere maxime
Romæ.

fionis horrificum efficit: quod nonnulli repetitionem appellant. Aliquando hoc secundò molitur: quibusdā tertiò facit. Deinde vix æquabiliter simplex redditur, ad vsq; statum increescens. Hæc febris ad integritatem nunq̃ desinit. Nam permultum temporis vsq; ad vigorem habet: declinatiōemq; sine perspiratu sensibili: tantum abest, vt integrè cum sudore solvatur. Quemadmodum igitur à primo insultu accessio ad vigorem vsq; multo tempore peruenit, sic à vigore paulatim minuitur: ideoq; postridie altera accessio aduenit, horriffica quidem illa, sed quæ non item cum prior repetitiōes habeat. Porro hæc accessio ad vigorem etiam longo tempore ascendit, nec exiguo inclinatur: atq; ob hoc ipsum tertio die, eadem quæ primo accessio inuadit: postea rursus, quarto, similis ei quæ secundo habita est, idq; perpetuo ordie. Hanc igitur febrē, quæ maximè inualefcit Romæ, voco semitertianam. Sunt & aliæ differentiæ particulares febrium, multiq; alii circuituum modi, differentiis particularibus variantes, quos ex industria omitto, ceu nihil conferentes ad præsentem cōmentationem. Atq; hætenus de particularibus morborum temporibus.

GALENI PERGA MENI DE TOTIVS MOR BI TEMPORIBVS. LIBER VNVS.

Totius morbi
t̃pa quatuor.



TOTIVS etiam morbi tempora, similiter ac animantium ætates consideramus. Quorū vnum quidem & * primum, generationi ipsoꝝ tribuitur: Incremento secundum: Tertiū vigori: Quartū deniq; declinationi, si ægri salui futuri sint. Nam si vel in ascē

fu, vel statu decesserint, liquet talem morbum non oīa tempora pertransiisse. Ridiculum autem fuerit, primū tempus primæ accessionis, totius morbi principiū existimare: quum nimirum principium morbi ad præsidia ferenda, vtilis præbeat indicatiōes. Ad id principium respiciens Hippocrates ait. Incipientibus morbis, si qd mouendum videtur, moue: consistentibus verò, præstat conquiescere. Præterea non minus absurdum fuerit, morbis qui intra diem soluuntur septimum, & iis q prorogantur in annum, æquale principium tribuere. Ostendimus autē primo libro de Crisibus, totius morbi principium, ipsius cruditatem existere. Porro inflā- mationis principium, totum illud tempus existit, quo sanguinea substantia pars affecta repletur. Quum autē influxus cessauerit, & quod in particula continetur, putrefieri inceperit, calor quidam ob putredinem nascit, & fusio magis propter calorem: vnde etiā spiritus generatur, atq; ob hæc ambo, particula magis q̄ antea distenditur, etiam si nihil influat. Hoc igitur secundum tempus, est inflammationis augmentum. At quum humor in pus iam vertitur, maximi tunc dolores partē ipsam corripunt. Nam in puris generatiōe dolores, febrisq; magis q̄ prius, infestant. Vocatur autem hoc tempus, ægritudinis vigor. Quòd si humor in pus mutetur, vel digeratur, minorem tumorem atq; tēsiōnem efficiet: huiusmodiq; est declinationis principium. Sic itaq; in inflammatione tempora diuidūtur: nec secus in febris, quæ ab illa trahit ortum. At quæ ab humore citra inflammationem oritur, molestantium humorum cruditatem pro initio habet. Hi vbi concoqui incipiunt, initium finitur, atq; ascensus siue incrementum adueniat. Vbi verò maximè concoctio perficit, vigor adest. Quā declinatio ē vestigio sequitur, dum symptomatum magnitudo, & humorum copia est repressa: restat autem humorum modicum, adhuc concoctionem

Principiū morbi ad præsidia ferenda, vtilis præbet indicationes.

Principiū morbi totius, est eius cruditas.

Inflātionis quatuor tpa describuntur.

Febriliū ab humorum putredine ortarum, tēpora describuntur.

Vlcerū tēpora.

**Tempora mor-
borū non aliū
de cognosci, q̄
ex cruditatis
et cōcoctionis
indiciis.**

4.

**Tempera vni-
uersa morborū
latitudinē mo-
mentaneā for-
tiuntur.**

**Morbi cuiusq̄
generationi p-
priū quoddā
est tempus.**

5. **Tempora to-
tius morbi,
quatuor.
Morborū qui
non soluuntur,
naturā duplex**

desyderans. Vlcerum quoq; eadem habentur tempo-
ra. Primū nāq; sanies aquosā, incoctā & tenues ab
ipsis defluunt. Dein pauciores, atq; crassiores. Postea
iam pus tenue. Postremò minus quidē copia, sed cras-
sius, & albidum magis redditur. Quemadmodum ap-
paret etiam in pleuritide & lippitudine. Quare nullus
morborum solutorum existit, qui non hæc quatuor p-
currat tempora. Non tamen ex quodam alio q̄ crudi-
tatis & concoctionis indicis, quæ excrementis de-
prehenduntur, cognitio ipsorum constat. Etenim flu-
xionum quæ ex cerebro per palatum & nares fiunt,
non secus q̄ lippitudinis, initium quidem ē, quū aquei,
tenuesq; necnon copiosi & acres, qui fiunt humores
apparent. Nam extremam hæc cruditatem significāt.
At concoctionem portendit, crassior & minus acris,
modicusq; humor descendens. Iam verò quemadmo-
dum in ætatibus, non ipsum vigorē modò, sed omnia
quatuor tempora latitudinem habere comperim⁹, sic
etiam particularium accessionum, ac totius morbi vni-
uersa tempora, latitudinem momentaneam sortiuntur.
Vigor itaq; tum accessionis, tum totius morbi, sensibi-
li tempore absoluitur. Igitur vniuscuiusq; morbi pro-
priū quoddam tempus generationis existit: interim
sensui manifestum, interim minimè. Post quod rursus
augmenti tempus aduenit, * nec id æquè manifestū
in omnibus. * Post hæc, vigoris sequitur tēpus, omni-
no sensibile. Quòd si salus futura sit, declinationis etiā
tempus sequetur, & hoc sensui subiectum: quum nimi-
rum amplam latitudinem habeat. At verò morborū
qui non soluuntur, duplex natura est. Nonnulli enim
ipsorum præparationem habent, vbi exactè illam ab-
solutam sint consequuti: alii ex eorum natura sunt, q̄
soluuntur: id quod eis in ægri perniciem accidit. * Hoc
autem contingit tripliciter. Nam aut propter ægrota-
tium imbecillitatem, vel propter propriam vehemen-

tiam, vel propter vtramq; prius perimunt, q̄ soluant.
 In vniuersum autem, nemo seruari potest, nisi natura
 superauerit morbum: nec perire, nisi illā morbus pro-
 strauerit. Igitur morbi singuli ex sua quidem natura,
 magnitudinem quandam possident: quæ vel supra vi-
 res est, vt eas opprimat: vel viribus ægri imbecillior,
 vt ab eis superetur, omnibus probè eueniētib. Pro-
 ide quum supra vires fuerit, homo prorsus morietur.
 At morbi tempora tunc partim simili modo cum præ-
 dictis sumuntur: partim dissimili. Siquidem initium si-
 militer in morbi generatione constituitur. Ascensus
 autem, haud in concoctionis, sicuti in iis qui supersti-
 tes sunt futuri, sed in cruditatis signis, letalibusq; con-
 sistit. Ergo bene colorata urina, & mediocriter crassa,
 omnium optima existit, quantum ad colorem & con-
 sistentiam pertinet. Conueniet autē præterea, vel eneo-
 rema, vel nebulam, vel hypostasim salubrem adesse, vt
 cunq; morbi natura postulauerit. At cruda vrina est il-
 la, quæ nec suspensum quicq̄, nec subsidens, nec nebu-
 lam habet: immo quæ nec crassitiem aliquam, nec pal-
 lorem assumpsit, sed alba est, & persistētia tenuis, aquæ
 speciem referens. Quod si aut nubecula, aut eneo-
 rema, aut hypostasis nigricare videatur, talis vrina est le-
 talis: quemadmodum si quædam similia furfuri, vel la-
 mis, in ea videantur. Iam verò, si aut foetida sit, aut pin-
 guitudinem oleaceam in se contineat, mortem minat.
 Hæc igitur sunt vrinæ, magni morbi notæ. Magnum
 etiam esse morbum cognosces, si sputum pleuritide &
 peripneumonia laborantibus, vel nigrum, vel * fuluū
 vehementer, vel spumās, vel impense foetidum fuerit:
 vel nihil omnino expuatur: id ē ingenti dolore, vel spi-
 randi difficultate hominem affligente. Respondent his
 & alii morbi, qui iecur, ventriculumq; exercent, eodē
 letalium signorum genere comprehēsi. Vnde in huius-
 modi morbis vigorem similiter cum eo qui salubrium

Seruari nemo
 potest, nisi na-
 tura superaue-
 rit morbū: nec
 perire, nisi illā
 morbus pro-
 strauerit.

Vrina optima
 qualis.

Vrinæ crudæ
 indicia.

Vrinæ letalis,
 nota,

Sputi pessimi
 signa.

est, determinare non licet. Nam illic maximæ accessiones statum definiunt. Hic verò non licet maximas accessiones similiter determinare: quum morbus quidem ipse à principio incoctus persistat. Verum intellectu maximum capere oportet. Porro in inflammatione quæ terminatur, puris generatio, vigoris terminus est: in ea verò quæ non finiet, homo etiam in eius ascensu mori potest. Cæterum vires validissimæ usque ad extremam phlegmones magnitudinem sufficere possunt: quæ magnitudo extrema, vel in gangrænam, vel in putredinem terminatur. Iam verò uno eodemque tempore duobus tribusue morbis homo infestari potest: quorum alius iam inclinatur: alius principii tempus adhuc, vel augmenti primordia occupat: tertius plurimum auctus est. Deinde hominem mori contingit, non propter inclinantem, vel nunc incipientem, sed ob vehementer auctum.

Qua de causa, tria facultatum nostrum corpus regentium principia, summè considerabis, quo nam statu sint prædita. Dico autem hæc, cerebrum, cor, & hepar. Deinde alias quæque universas particulas, ex singulis principiiis ortas, nempe nervos, venas, arterias: adhuc illas, quæ naturam quidem propriam habent, sed ab omnibus principiiis reguntur. Nam ex hac speculatione, primum, siue unus, siue plures, in homine morbi sint, inuenies. Proximum est, cuiusque propria tempora ad præfidiorum inuentionem necessaria inspicere. Etenim circa initium & fines, omnia imbecilliora sunt: in vigore fortiora: quæ hæc intercedunt, medio consistunt ordine. Igitur in vigore, quod mitigandi vim possidet, in curatione præpollere debet: in principio & fine, quod vehementiam habet. At media tempora, pro

Principia facultatum nostrum corpus regentium, tria.

8.

Victus & remedium rationem institui iuxta ipsius morbi tempora.

summorum proportione capiantur. Neque enim quam quis victus rationem instituet, inuenire poterit, neque unquam nutrire, sine certa temporum distinctione. Etenim si vigoris tempori, etiam sine alimenti exhibitione

sufficere possit æger, optimum sanè fuerit, donec morbus inclinet, à cibo abstinere. Si verò sufficere citra cibum non possit, protinus ab initio in quolibet tempore, quod alimentum admittit, alendus est. Atq; hoc, remissionis est tempus. Voco remissionem modo, secundam partem totius circuitus in duo vniuersa diuisi, nè pe accessionem & remissionem.

G A L E N I P E R G A

MENI DE LOCIS AFFECTIS.

LIBER PRIMVS.



DR O Differentia partiũ humani corporis, variari affectuum curationem contingit. Partes igitur quæ insuperficie corporis sitæ sunt, vnà cum affectibus quibus vexantur, facile sensibus deprehenduntur. At quæ in imò corpore delitescunt, exercitatæ cogitationis virum desyderant, quum in partium actione & vsu, tum vel maxime in arte secãdi corpora: quæ nimirum nos docet ac curatissimè proprietatem essentiaẽ vniuscuiusq; partis. * Si igitur inter tussendum, bronchium aliquod expuatur (est enim id natura chartilagineũ) maximo sanè vlcere affligi pulmonẽ existimamus. Nã tamen si aspera arteria similibus sit ex brochiis compacta, tam grandis tamen exulceratio, sine præmatura morte in illa gigni non poterit. Nec verò tantum ex proprietate essentiaẽ, sed ex magnitudine etiam excrementi reiecti, affectus locus discernitur. Vt si vnà cum tussi excreetur aliqua portio vasis grandiuscula (quod aliquãdo contigit) tunc certè credendũ est, illam educi à pulmone. Quandoquidem venæ quæ in asperam arteriã disseminantur, minutissimæ sunt, & capillorum instar.

Curatio affectuum varia, pro differentiis affectarũ particularum.

Ars secãdi corpora docet nos proprietatẽ essentiaẽ vniuscuiusq; partis. Essentiaẽ proprietatẽ.

Magnitudo excretæ substantiaẽ.

Res naturali-
ter in particu-
lis quibusdam
contentæ.

Sanguis arte-
riarum qualis.

Res adhærentes.

Res contentæ
præter naturā.

Vrina suppres-
sa quæ sint cō-
sideranda.

Musculus vesi-
cæ collū con-
stringens, agit
voluntarie.

Similiter si per dysenteriam tunicam aliquam corporulentiorē alius aliquando reddiderit, non ab re coniecties vlcere crassiora intestina torqueri. Nec non ex rebus naturaliter in particulis quibusdam contentis, creberrimè sedes affecta cognoscitur. Vt si vrina per vulnus reddatur, vesicam: sin verò stercus, intestinorum aliquod: at si cibus, ventriculum liquet esse conuulneratum. Similiter etiam si vulnerato thorace, spiritus p vulnus effletur, indicat membranam cingentem constas, solutam esse. Præterea sanguis eiectus saliendo, arteriam esse vulneratam denunciat. Qui quidem arteriarum sanguis, eo qui à venis effluit, calidior, tenuior atq; flauior apparet. Ex adhærentibus etiam rebus, affectæ sedis notæ petuntur: quum nimirum & ipsæ et essentia proprietatem obtineant. Huius generis est ramentum: quod quidē ostendit illius partis vlcus, à qua reiiicitur. Nam si id cum lotio excernatur, vrinae meatum: si tusiendo, spiritalium instrumentorum: si per vomitum, gulæ aut ventriculi: si cum alui excrementis, intestinorum vlcerationem significat. Est præterea & alius diiudicandi modus sumptus à rebus alicubi contentis præter naturam. Vt si in vesica aut renibus cõtineatur lapis: in thorace pus: aut deniq; aliquis humor molestus in animalis corpore, illic genitus, vel adueniens extrinsecus. Fingamus igitur (gratia exempli) aliquē tribus diebus non reddidisse vrinam. Adhæc, euidentis quidam tumor circa pubem emineat, euidentem repletionem vesicæ indicans. In primis enim considerandū est, num resolutæ excreticis potentia nomine id accidat: an ob obstructum vrinarium meatum: nā vtrūq; potest accidere. Prius tamen reuocare in memoriam oportet, muscolum qui claudit collum vesicæ, ab actione quiescere, dum fungitur vesica suo munere. Cuius quidem musculi actio, parit voluntatis imperio. At vesica ipsa, vtpote naturaliter agens, minimè voluntati obsecundat.

obsecundat. Inest etenim illi quemadmodum cæteris
ferè omnibus partibus, facultas quædam expultrix,
qua utitur, dum contristatur ab excrementis. Quæ sa-
nè excernendi vis, si aliquando fuerit affecta fieri potest
ut supprimatur vrina. Proinde si hominè sic figuraue-
ris, ut decliuus sit colli vesicæ positus, ac manib⁹ pubis
tumorè psseris, tandè reddet lotiū. Quod si sic facièdo
nihil omnino promoueris, non resolutā eam vim, sed
vrinæ fistulam constipatā esse, suspicari oportet. Quip-
pe musculus ei circumdatus, si resoluatur, non cohibi-
ti, sed præter voluntatem emisit lotii, est causa. Trifa-
riam autem cōtingit obstrui collum vesicæ. Aut enim
corpus ipsius in tantum tumorem attollitur, ut mea-
tus inde occupetur: aut aliquid ei præter naturam, ut
caruncula vel callus innascit: aut deniq; à re quapiam
adueniente, meatus ipse obstruitur. Por rō corpus eius
ad magnitudinem insignem attollitur, si vel inflamma-
tiōe, vel scirrho, vel abscessu, vel alio quouis tumore,
fuerit affectum. In meatu caro quidem oritur, si præ-
cesserit vlcus. Obstruitur meatus, vel à lapide, vel gru-
mo, vel pure, vel crasso lentoq; humore: quæ omnia
distinguere oportet, ex præsentibus præteritisq; ac-
cidentibus. Sit igitur aliquis puer, qui perpetuò puden-
dum scalpat. Eius autem vrina sit aquæ similis, in qua
fabulosa quædam subsideant. Dein verò, repente sup-
primatur vrina. Nunquid, optima ratione coniecero,
huic lapidem incidisse in collum vesicæ? Itaq; sup-
pino collocato puero, ut crura reliquo corpore sint subli-
miora, multifariam ipsum concuties. Sic enim feceris,
ut lapis à meatu recedat. Quibus peractis, iube ut puer
vrinam conetur reddere. Quod si profluxerit, notitiā
causæ, ac simul curationis modum, te inuenisse, ne du-
bitaueris. Sin autem nihilominus supprimatur vrina,
tunc demissa ænea fistula, simul lapidem à vesicæ collo
repelles, & euocabis vrinam. At nulla lapidis nota præ-

Vesica non præ-
ret voluntatis
imperio.

Vrinā suppres-
sam ob resolu-
tā vim excer-
nendi, quō ex-
pellere oportet.

Obstruitur col-
lum vesicæ tri-
fariam.

Lapidis incū-
bētis collo ve-
sicæ, indicia.

*Ænea fistula
ad qd utilis.*

*Cariculae col-
lo vesicæ inna-
tæ argumēta.
Cōiectura arti-
ficiofa.*

*Vrinæ excre-
tio a qbus fiat*

cedente retentum lotium, si sanguis simul cum vrina proflexerit, argumentum est grumum aliquē extitisse ipsius obstructionis causam. Quāq̃ fieri potest, vt ob vlcus vesicæ, citra sanguinis profusionē, paulatim grumus concreascit. Potest etiam cōtingere, vt sanguis ex renibus per vteras in vesicam defluens, grumum efficiat. Ad hæc igitur omnia, sicuti etiam vbi pus, vel aliquis lentus humor meatum vrinæ obstruxit, haud inutilis est ænea fistula immissa. Sic etiam vbi ob carunculam ab vlcere innatam, vesicæ cervicem obstructā esse putamus, & ex præcedentibus vlcereis notis, & ex eo q̃ immissa ænea fistula vrina vacuatur, id intelligere possumus. Quippe demissa fistula, dolorem mouet in ea meatus parte, vbi vlcus eē coniicimus: fractaq̃ sub fistula carne, sequuntur cum vrinæ excretiōe & cruor & carnis fragmenta. In omnibus igitur his artificiosa coniectura nobis perq̃ utilis est, vt quæ inter exactā notitiam, & omnimodam ignorantiam, media quodammodo existimet. Cæterum cuiuslibet partis vsus, magnificè ad affectorum locorum cognitionem conducit. Etenim actio, motus partium factius ē: at vsus, omnibus inest, vel nihil etiam agentibus. Fit itaq̃ excretionis vrinæ actio, à compressione vesicæ, opitulantis etiam abdominis musculis, vbi vrinam admodum exiguum continet, aut vesica ipsa est infirma. Reliquæ autem partes omnes, ad actionem sunt utiles. Porro si vesica minimè in tumorem extēsa, vrina reddi non possit, necessum est, vel vteras, vel renes obstructos esse. Quapropter hic rursus intueri oportet, num anteq̃ supprimeretur vrina, aut lapidis, aut inflammationis, aut alterius cuiuspiam mali accidentia præcesserint. Neq̃ interim negligenda est, vniuersi corporis dispositio: vt possimus planè discernere, num in ipsis renibus à lapide, vel crassis humoribus, fuerit obstructio oborta: an in vocatis vteris. Quum igitur singu

læ actiones corporis, peculiaria sortiantur organa, quibus obeuntur, sanè actionem lædi est necesse, instrumento efficiente ipsam, quomodolibet læso. Verùm interdum facile affectus productus soluitur, ita vt simul atq; opifex causa semota fuerit, prorsus ipse cōquiescat. Interdum verò vsq; adeò pertinaciter hæret, vt permaneat diutissimè, etiam ablata causa. Accidit autem nonnunq, vt efficiens causa pertransiens, non firmum faciat affectum: veluti quum suffusioi similia oculi imaginantur, collecto in ore ventriculi aliquo tenui excremento, vnde vapores sublatis ad oculos, similes imagines mouent, quales per suffusiones cernuntur. Oportet siquidem oculos participes fieri eius dispositionis, quæ infestat ventriculū, si videndo debeāt hallucinari. Itaq; necessum est ordiri semper ab instrumento actionis oblæsi. Dein autem inuestigare, quis nam sit ipsius noxæ modus. Num videlicet dispositio ipsa sit permanens: an adhuc in generatione consistens, nec nata perseuerare. Quòd si nunc quoq; fiat, vtrum causa quæ effectū producit, contineatur in ipsa parte: an per ipsam transeat, inuestigandum. Etenim arefacto immodicè humore, quem crystalloidem vocant, perseuerans erit oblæsiō, & essentia ipsius propri' affectus. Si verò crassus humor in pupilla constiterit, essentia quidem nondum * est læsa: verùm accidētis causa in oculo ipso cōsistit. Tunc autem per ipsum trāsire dicitur, quum euaporans humor in ventriculo continetur. Non autem necesse est, ad hoc vt pars aliqua esse affecta dicatur, in essentia ipsius permanentem esse dispositionem. Nam vbi vehemens dolor aliquod intestinum infestat, firmato in vna quapiam parte dolore, vt quasi perforari videatur, quo pacto quis, vel nequaq, intestinum affici dixerit, vel in eo affectū non consistere, quis huiuscemodi dolores interdum, excreto quodam humore vitreo, vel temporis momento soluantur. Is igitur humor, vi

Actionē lædi ē
necesse, instrō
efficiēte ipsam
quolibet læso.

Oculis caligā
tibus, quæ sint
cōsiderāda.

Humor vitre
us.

Hhh ii

*Causa ē id, quo
tangēte quidē
afficiuntur: abla-
to aut, affectus
ēdatur.*

*Dysenteria
causa mordax
existit humor.*

*Morbus oīs p
tinus ab initio
eandē sibi ipsi
naturā, atq; es-
sentiā sortitur:
nec differt nisi
magnitudine a
iā absoluto, &
maximo.*

*Morbosexigu-
os subito vin-
ci a natura.*

*Dysenteria est
vltus intestino-
rum.*

treus, causa illius doloris existit. Id siquidem quo tan-
gente afficiuntur, & quo separato quiescit affectus, cau-
sam esse, omnibus in confesso est. At verò ipse affectus,
nonnunquam à causa aliqua oritur, sed ita oritur, ut subla-
ta causa effectrice, haud quamquam permanentē habeat di-
positionem. Interdum autem partim iam factus est:
partim etiamnum fit. Sæpenumero etiam si fieri desi-
nat, utpote ablata causa, persenerans tamē permanet
dispositio. Veluti in dysenteria, cuius affectus, mordax
humor existit causa: utpote qui ab initio extergat, ab-
radatque, ac dein temporis tractu ulceret intestinum.
Quod si antea quod produxerit vltus, * pfluere is humor
delinat, affectus ipse nondum dysenteria vocabitur.
Sin verò vltus iam intestinum exerceat, etiamsi humor
finiatur, non ob id finitur affectus. Hoc autem summo
pere venit considerandum, omnem morbum protin-
us ab initio, ubi primum corpus ipsum limites tem-
peraturæ, quæ sanitati debetur, excesserit, eandem sibi
ipsi naturam atque essentiā sortiri, nec differre, nisi ma-
gnitudine, à iam absoluto & maximo. Siquidem res
similares, quum nullam figuram naturalem desyde-
rent, protinus ab initio eadem essentia constant. Dis-
similares verò, & quibus varia est forma, ut domus, es-
sentiā generatione posteriorem habere poterūt. Quum
itaque causæ agunt in corpus, ipsa species affectus ab ini-
tio est eadem, tamen ob exiguitatem non planè cerni-
tur, sicuti neque in saxo concauitas, quā vnica stilla pro-
duxit. Cæterum id genus affectus exigui, separatis ef-
ficientibus causis, illico à natura vincuntur. Illi quippe
dūtaxat externo egent auxilio, quos ob magnitudinē
vincere natura non potest. Igitur ubi primum mor-
dax humor aliquod intestinum eroserit, quis id quod
iam factum est, nōdum apertè videatur, nihilo minus
dispositio ipsa sub dysenteria specie comprehenditur.
Sit autem hoc initium viæ ad inueniendas affectas se-

LOCIS AFFE. LIB. I.

des, nullam actionem lædi, nisi pars quæ illā efficit, afficiatur. Verum vt affectio & actio diuerse sunt voces, ita diuersus quoq; earum est vsus. Id siquidem agere dicitur, quod ex seipso motum obtinet. Affici verò, qd motum habet ab alio. Quum itaq; duo sint motus genera, alterationis & lationis: vbi ad permanentem dispositionem alteratio peruenerit, fueritq; dispositio præter naturam, morbus vocatur, quæ per abusionem non nulli eam dispositionem affectum nominet. Distingue da tamen est interim propria & primaria affectio, ab ea quæ per cōsensum accidit. Vt autē recta, propriaq; nominum appellatione utar, afficitur quidem caput, quando condolefcit ventriculo: ægrotat verò, quum proprio morbo laborat. Similiter ventriculum affici qdem dicemus, vbi à vitiosis molestatur humoribus: ægrotare verò, aut per intemperiem propriam, aut quū inflammatioem, vel vlcus, vel abscessum habet præter naturam. Porro corruptionis ciborum tres primæ ac veluti generalissimæ sunt differentia. Vna quidem per proprios ventriculi morbos: altera à vitiosis humoribus in ipso collectis: tertia ab alimētorum qualitate inducitur. Licet itaq; vitiosam ædi coctionem, ventriculo non primaria, sed secundaria ratione, affecto: minimeq; circa actionem propriam hallucinante: quemadmodum vbi vitiosi cibi & corruptioni obnoxii ingeruntur. Si igit quispiam fumosum ructū emittat, igneo quodam calore ventriculum eius esse dicemus prædictum. Ac deinde rursus distinguendo inuestigabimus, vtrum ab intemperie corporis ipsius ventriculi, is calor oriatur: aut à flaua bile, eaq; vel in ipsius spatio cōtenta: aut in tunicas ita, vt vix abstergi possit, demissa. At ne hic quidem cessabimus. Nā rursus quærere oportet, an iecinoꝝ male suo officio fungēte, huiusmodi humor accumuletur: an is ex vniuerso defluat corpore: an etiam in ipso met gignatur ventriculo. Ergo si in vē

H h h i i i

117

Actio nulla lædit, nisi pars quæ illam efficit, afficiatur.

Agere quid dicatur.

Affici quid dicatur.

Motus genera duo.

Morbus qd.

Affici qñ dicatur caput.

Ægrotare qñ dicat caput.

Corruptionis ciborum tres differentia.

Ructus fumosus signat igneum calorem ventriculi.

3.

4.

Acescere in v̄
triculo cibos,
ob causam fri
gidam.

Ructu edito fu
moso, vel aci
do, quid agen
dū, cōsideran
dū, ad vtrius
q; causam per
estigandam.

Vomere nemo
cogēdus est, ni
si sit ad vomē
dū procliuis.
Nausea inanis
īdicat calidū
succū imbibī
tum ventriculi
tunicis.
Cupiditas ci
bi vnde exci
tetur.
Locus affectus
quid indicet.
Diatrion pīpe
reō mēturi aci
do confert.

triculo cibi in fumosam qualitatem mutantur, idq; nō
ex sua ipsorum natura, causam calidā, si verò acescāt,
eam frigidam esse est necesse. Vt discernas autem num
intemperies aliqua, an vitiosus quispiam humor ven
triculi corpus īfestet, offerre oportet cibos qui suapte
natura q̄maximē corruptionis modo aduersentur: vt
panem aut chondrum illis qui in fumum transmutare
cibum consueuerunt: mel autem his, qui à cibo acidū
saporem percipiunt. Dein cōsiderare excrementa,
tum ea quæ vomuntur, tum quæ deiciuntur per aluū:
num humor aliquis cum illis quidē biliosus & calidus:
cum his verò pituitosus ac frigidus excernatur. An nul
lo vacuato humore, ipsa exigua quandam mutatio
nem obtineāt. Quippe vbi * citra humoris affluxum
igneo calore ventriculus īfestatur, panem aut chon
dram absq; humore videbis deici, per q̄ exigua ī ipsis
facta transmutatione. * Quòd si humor quoq; prau
in ipso ventre consistens corrumpat cibos, videntur ī
(vbi deiecti fuerint) in huiusmodi humore submersi,
& ab ipsius actione manifestius alterati. Id quod à vo
mitione etiam clarius discernitur, si laborans sit procli
uis ad vomitum. Nam cogere eum qui nequeat vome
re, absurdum est. Atq; hæc ita deprehēduntur, si in spa
tio ventriculi noxius cōtineatur humor. Si verò in tu
nicis sit imbutus, vt ad calidum nausea quædam inanis
(hoc est citra vomitum) sitisq; vehemens cōsequitur,
ita à frigido ciborum cupiditas excitatur. Porro cali
da dispositio, vbicunq; fuerit, semp refrigeranda ē. At
quousq; aut quo mō, aut qua materia refrigerare con
ueniat, locus affectus commōstrat. Iam verò iis qui aci
dum ructum ædunt auxiliatur medicamen diatrion
pepereon, aut aliud simile, ex aqua vel vino epotum.
Aliis autem qui nidorosum, tum absynthium, tum hie
ra picra ē ex vsu. Quo quidem medicamine (hiera vi
delicet, quæ ex aloe constat) in potu exhibito, quosdā

olim colicos persanavi, quibus mordacium humorū defluxus in intestinum, conciliauerat affectionem. Cæterum intestinorum proximæ ventriculo partes, exhibitum tum cibis, tum potibus: quæ verò non ita multū à sede distant, clysmis promptius curantur. Fingamus rursus per ventrem deiici excrementa quædam: aliquñ quidem ramenta, aliquando cruētum aliquid: simulq; aliquando hæc ambo. Tunc sanè intestinum vlcere affectum esse, dubitauerit nemo. At verò vtrum in exilibus intestinis, an crassis, ipsum vlcus consistat, id ex rasa, & exitu tempore, & ex mistione cum stercore, distinguere oportet. Siquidem infimarum partium vlcera, nullas omnino vlcere habent notas alui excrementis admistas: earum verò partium quæ paulò altius sunt sitæ, vlcera, mistas quidem cum stercore notas habent: sed id leuiter duntaxat. Quemadmodum, si multo sint sublimiores, vehementior erit mistura. Præcipue verò in supremis intestinis vlcere notæ stercorei accuratè miscentur. Potest ex vno quandoq; indicio simul & locus & dispositio deprehendi: aut locus vnà cū causa. Cæterum locorū notæ, & ab actione læsa, & excrementis, & positu, & doloris proprietate & propriis accidentibus desumuntur. Affectuum verò, & ab excrementorum specie, & loci natura, & doloris proprietate, & propriis accidentibus. Actio itaq; læsa, affectam partem, indicare potest, hoc modo. Si enim accidēs aliqd circa cernēdi offm̄ euenerit, oculū affici constat. Excrementorū spēs partē affectā indicat, vel q̄ sint ex essentia illius, vel q̄ ab ea contineantur. Positus etiam affectam partem commonstrat. Durus quippe in dextra p̄ cordiorum parte tumor, non lienis, sed iecoris affecti est nota: in sinistra autem, non hepatis, sed splenis affectum indicat. Adhæc, si membranosa tunica frustulū vomendo fuerit reiectum, aut gulæ, aut ventriculi: si tusiendo, gutturis, aut asperæ arteriæ: si excreando,

Hiera picra qbus conducat affectibus.

Intestina suprema cibo & potu: infima proprius clysmis curari.

Vlcus, obfideat ne tenuia intestina, an crassa, quō dignoscendum.

5.

Locorū notæ vnde sumant.

Actio læsa partem affectam indicat.

Excrementorū species partē affectā idicat. Positus idicat partē læsam.

H h h iiii

Dolores singu-
li affectū pnt p-
te ostendere.

Accidentia p-
pria indicāt lo-
cum affectum.

Peripneumoni-
cis vident ma-
xillæ rubeæ.

Affectū notæ
vnde deprehe-
duntur.

Lapis in qui-
bus gignatur
partibus.

Abscessū cor
sustinere non
potest.

Dolorem nec
pulmo, nec li-
gamētū pati.

Horror intēpe-
ritus cū febre
suppurationē i-
flammationis in-
dicat.

6. Affectū pro-
pria signa que
sunt.

faucium: si cum vrina, eius fistulæ: si à sede, alicuius in-
testinorum: si per mulieris pudenda, vteri affectum
portendit. Singuli etiam, dolores, propositus varie-
tate, possunt affectam sedem ostendere. Nam si appa-
rentibus per vomitum vlcis notis, in anterioribus
partibus circa præcordia sentiatur dolor, ventriculū:
si verò in posterioribus circa dorsum, gulam exulcera-
tam esse est indicium. Ex propriis accidētibus etiam in-
notescit affectus locus. Nam ore ventriculi affecto, fa-
stidium infestat. Per hepatis verò imbecillitatem, ex-
crementa alui, aquæ in qua carnes nuper maceratæ ablu-
tæ fuerunt, assimilantur. At in peripneumonicis, maxil-
læ videntur rubeæ. Quinetiam propriæ ipsorum affe-
ctuum notæ, in excrementis deprehenduntur. Siquidē
ramentum, vlcis: si in vrina sabulosum residet, lapi-
dis: cucurbitæ verò seminibus excrementa similia, la-
torum vermium indicia sunt. A locis etiam ipsis, mor-
borum indicia sumuntur, eo q̄ quibusdam solis mor-
bus ille accidat: quibusdam verò solis nunq̄ eueniat.
Quippe soli oculi suffusione laborat. Lapis in vesica &
renibus duntaxat nascitur: atq̄ vt nonnullis placet, et
in colo. Lumbrici in intestinis gignuntur. Rursus impos-
sibile est, vt cor abscessum sustineat: aut pulmo, aut li-
gamenta, dolorem. Ab accidentium quoq̄ proprieta-
te affectuum indicia oriuntur. Nam quibusdam per ta-
bificos morbos, vngues adunci euadunt. Intempestiu⁹
horror cum febre, inflammationis ad suppurationem
transeuntis indicium est. Lingua nigricans ardentē febrē
portendit. Pauca tñ affectuum sunt notæ, quæ non si-
mul affectam sedem ostendāt. Cæterum vt actionum
noxæ affectam duntaxat particulam, sic differentiæ ea-
rum, ipsius affectum declarant. Ea igitur sola sunt affe-
ctuum propria signa, quæ per accidens ipsos sequunt.
Porro quum ob vapores vel etiā humores ipsos ascen-
dentes ad cerebrum, mens læditur, nemo sanè dixerit

LOCIS AFFE. LIB. I.

cerebrum tūc laborare primogenio affectu: q̄q̄ omni affectu carere, ipsum hauquāq̄ defendi pōt. Quare dicendum est, illud consensum siue consortii lege affici: hoc est ab altera parte talem affectionem recipere. Sūt præterea nonnullæ actiones, quæ idonea indigentes materia, ipsam ab aliis partibus præparatam accipiūt. Qua de re interdum optima ratione contingit, nulla existente in actionis cuiuspiam propriis instrumentis noxa, actionem ipsam perire, defectu scilicet eius materiæ, ex qua fieri consuevit: veluti in voce accidit: cuius quidem materia efflatio existit. * Hæc autē sit contracto thorace ab intercostalibus musculis. His igitur nihil agentibus, animal vocem amittit: & quidem nullo interdum in propriis vocis particulis apparēte affectu. Sunt verò hæ partes, tres cartilaginee à tribus cōmotæ musculis, in quos inseruntur nervi demissi à cerebro. Est præterea i gutture ligula, siue epiglottis, maxime proprium vocis ipsius instrumentum. Etenim accidit quidam ab alto, ita vt dorsi initium affligeretur. Is tertio die exiguam admodum vocem emisit. Quarto deinde die omnino obmutuit: resolutaq; simul fuerunt & crura: manibus prorsus illæsis. Sed nec spirationem amisit, nec difficulter spirabat. Nam quum tota sub ceruice spina esset ei resoluta, accidit thoraci, vt & septum transversum, & musculi superni, numero quodam sex, mouerentur. Quippe nervi ex spinali medulla, quæ in ceruice est, in ipsos descendunt. At nervi musculorum intercostalium, qui efflatum efficiūt, omnes affecti erant. Vbi igitur sedata fuit spinæ inflammatio, à septimo die vox restituta est iuueni, & crura motionis facultatem, antea interceptam, recuperarunt. Huiusmodi ergo noxæ speciem, magis proprie per consensum euenire dixeris, q̄ vbi ab humoribus in uentriculo contentis, exhalantibusq; caput dolore tēatur. Iam verò, ut ad crura facultas quædam sed citra essen

121

Affici per consensum qm̄ dicatur cerebrū.

Vocis materia est efflatio, quæ fit contracto thorace ab intercostalibus musculis.

Vocis propria instrumenta sunt tres cartilagines quæ constitunt laryngē, ac præterea epiglottis.

Affectiōis per consensum species duæ.

tiam substantiam ue descendere ob phlegmonem prohibita est, sic ad oculos, cum essentia, ubi obstructi fuerint uisorii meatus. Ad guttur autem, quous materia perueniat per illam spinæ dorsi resolutionem, sufficiens tamen ipsius quantitas nequaquam accedit. Qui uerò ob intercostalium musculorum perforationem obmutuit, is totam uocis materiam amisit. Porro quemadmodum crura resoluuntur ob inflammationem spinæ, ita etiam guttur vocalibus siue recurrentibus nervis (quos ipse inueni) aut incisus, aut laqueo interceptis. Atque idem est modus quo læduntur gutturis musculi, siue recurrentes nervi, siue ii qui iuxta arterias sunt, vitientur. Vtrinque enim animalis facultas desideratur, sine qua moueri nemo potest pro voluntatis imperio. Incisis præterea musculis qui epiglottida mouet, animal etiam euadit mutum. At laqueus collo circumdatus non solum reddit animal mutum, sed etiam suffocat, ipsum respiratione priuando. Aspera autem arteria, si dissecetur, uoci quidem nocet, sed animal non priuat respiratione. Angina uerò, quum sit internarum gutturis partium inflammatio, strangulationi proportionem respondens, respirationem tollere potest, ipsius meatum obstruendo. Idcirco vocalis instrumenti maximè proprius affectus est. Quis autem ex affecti loci notitia ipse curationem inuenerim, ex hoc exemplo perdisces. Occurrit mihi olim quidam, cui sensus trium digitorum manus, iam triginta diebus perierat, prorsus illæsa motione: nec iuuebatur quicquam à medicamentis ipsi manui admotis. Quum igitur intellexissem ex illo, cum proficisceretur Romam, se decidisse à vehiculo, ac initium dorsi tunc sibi contusum fuisse: nec multo post accidisse digitorum affectum: conieci inde, * in primo statim exortu nervi post septimam vertebra, partem aliquam ob ictum fuisse inflammata, eamque iam induruisse in scirrhum. Quippe neruorum qui à ceruice prodeunt, ultimi pars

Recurrentes ner-
uos inuenit
Galenus.

Moueri pro vo-
luntatis imperio
nemo potest, abs-
que facultate
animali.

Angina est in-
flammatiō inter-
narum guttu-
ris partium.

Loci affecti
notitia qua ra-
tione Galeno
ipsam curatio-
nem effecit.

* humillior, quæ descendit per cubitum, in cutem minorum digitorum diffeminatur, ac præterea per medii digiti mediam partem dispergitur. Quamobrem illi spinæ parti, * quæ affectæ particulæ principium in se continebat, congruenti medicamento cum succurrissem, digitis suum sensum restitui, cum maxima spectantium omnium admiratione. Quo autem modo sensus digitorum perierit, motu prorsus illæso, iā audies. Sentire enim, veluti quiddam pati est: moueri autem, ceu quoddam est agere. Quamobrem ut quis moueatur, opus est robore: at ut sentiat, vel minima facultas est satis. Ob idq; necessum est, ut sensu ipso deperdito, simul exoluatur & motus: ubi per vnum eundemq; nervum ambæ perficiuntur actiones. Porro omnis voluntarius motus, ad musculorum officium pertinet. Quippe nullus nervorum per se, sine musculo, ullam huiusmodi in animantis particulis actionem efficere possunt. Cæterum ad partes mouendas muscoli ipsi aliquando quidem * immediate perueniunt: aliquando verò per medios tendones: quales sunt illi qui mouent digitos. Si igitur affici musculorum nervos contingat, digitorum motus peribit: si verò eos qui ad cutim ptingunt, tangendi sensus corrumpitur. At ubi tota resoluuntur membra, quum videlicet commune principium est læsum, simul & motus & sensus pereunt. Ac tunc locum primario affectum, ex læsorum nervorum multitudine duntaxat inuenire poteris. Accidit autem iterdum, ut dextra tantum pars ipsius spinæ afficiatur, altera omnino illæsa: aut e contrario, ut illa manere integra, sinistra affectum sustineat. Atq; hac ratione nonnunquam tota pars sinistra resoluitur, dextera illæsa manente: nonnunquam contrà, dextra pars duntaxat, & afficitur, & resoluitur. Vbi verò non affecta spina, tantum unus nervi processus est læsus, eas duntaxat partes resolutio occupat, in quas ille nervus est distributus. Itaq; si

Sentire est veluti quiddam pati. Moueri est veluti quiddam agere. Sensu amisso, cur motus pereat, ubi per vnum eundemq; nervum utraque actio perficitur. Nervum nullum absq; musculo posse motum præstare.

Spinæ interdum dextram, interdum sinistram partem resolui.

Medendi rōne
esse cōueniēdā
ad affectus ori
ginem.

Sedis musculū
resolui ob fri
gus imodicū.

7. Instrumētis na
turalibus, co
gnata actionis
vis inest.
Instrūtis anima
libus, veluti lu
men a sole, a
principio facul
tas defluit.

spina fuerit affecta, aut aliquod neruorum principii, conuertenda illuc tota medendi ratio est. Alioqui frustra circa resoluta membra occupaberis. Iam verò, ob frigus immoderatum, interdum sedis musculus resolui solet q̄ maximè: siue sederit quis super lapidem frigidum: siue in aqua frigida supra modum fuerit versat.

Quam sanè resolutionem sequitur inuoluntaria excrementorum deiectio. Qui igitur in anatome exercitatus fuerit, accurateq; præcedentia & præsentia accidentia norit, ac sic ad curandorum morborum experientiam methodo & ratione peruenerit, is inueniet & locum affectum, & ipsani dispositionem. Vt autem affecti musculi, voluntarias: sic vesica, necnon intestina oblæsa, naturales actiones lædere possunt: eo q̄ ipsis contractis excernantur ea quæ continent. Ac differunt certè plurimum naturalia ab animalibus instrumentis: q̄ naturalibus quidem, cognata actionis vis inest: animalibus verò instrumentis à principio (veluti lumen à sole) ipsa defluat. Quamobrem solis partibus quæ & sentiendi & mouendi vim habent, accidit, vt ipsis interdum haudquaquæ affectis, nihilomin⁹ eorum actio exoluatur: id quod naturalibus instrumentis minimè solet accidere. Quoties enim horum actio læditur, semper ipsa primò afficiuntur. Cæterum animalibus instrumentis omnibus, * naturalis quoq; dispensatio adest, quum nimirum & arteriarum & venarum adminiculo indigeant, ad essentiam propriam seruandam.

Proinde alterari à vicinis, ipsis vt naturalibus: alterationem verò sentire, vt animatis cūcinit.

G A L E N I P E R G A

M E N I D E L O C I S A F F E C T I S L I B. I I.

C A P. I.



R E S sunt exercitationis modi circa affectorum locorum notitiam. Quorum vnus circa singulas corporis partes: alter circa causas & dispositiones: tertius circa differentiam accidentium versatur, Igitur à locis sumitur modus, vbi dicimus: affecto cerebro huiusmodi accidentia sequuntur. A dispositionibus & causis sumptus, existit talis: vt si dixerimus, inflammationis seorsum, aut refrigerationis, huiusmodi sunt accidentia. Ab accidentibus, vt quum dicimus: hoc doloris genus hasce dispositiones, aut hosce locos portendit.

Exercitationis
circa affectorū
locorū notitiā,
tres modi.

C A P. I I.

H Allucinatur autem Archigenes, vbi dolorem stupidum nervis tantum euenire ait. Quippe stupor à frigida dispositione oritur, nō nervorum duntaxat, sed etiam venarum, arteriarum, carnis, membranae, tunicarum, & cutis. Quod si ob id q̄ hæc omnia per nervos sensum habent, ad nervos illam dispositionem refert, cur non reliquas omnes dolorum differentias, proprias eē nervorum ait? Etenim dolor, tristis est sensus: quemadmodum ipsa voluptas, blandus. Quod si re accuratius inspexeris, haudquaquē doloris species dicendus est * stupidus dolor: sicuti neq̄ species vlcis inflammationum vlcus: sed vtrobiq̄ duarum dispositionū concursus adest. Etenim stupor refrigeratio est insignis: iccirco corporibus ita dispositis & sensus & motus difficultatem inducit: quemadmodum completa refrigeratio & sensum & motum omnino tollit. Quod autem

Archigenis opinio refellit. Stupor a frigida oritur dispositione.

Dolor, tristis est sensus.

Voluptas est blandus sensus.

Refrigeratio completa sensum & motum tollit.

Stupor medio-
cris, dolorem
soluere potest.

Stupor quos i
festare soleat.

Stupor accide-
re oibus parti-
bus potest.

Caro per se re-
peritur nunq̃.
Musculi cōpo-
sitio.

3.

Pulsus dolorifi-
cus q̃n sentiat̃.

Dolor inflāma-
tis musculis
vnde accidat.

Stupor ē dispo-
sitio media, in-
ter resolutionē
& integrā va-
letudinē.

stupor dispositionis, non doloris, aut sensus, sit nomē, Hippocrates docet, vbi ait: Stupor enim mediocris dolorem soluere potest. Porro cōstrictas vehementer particulas, atq; eos qui torpedinē animal dum adhuc viuunt tetigerint, infestare solet etiam stupor. At quib; membrum aliquod stupidum fuerit, ii quicquid tetigerint, obscuro & hebeti sensu percipiunt, neq; moueri possunt. Si verò moueri cogantur, dolent. Ceterum citra hoc q; moueri tētēt, affectū ipsum stuporis haud obscurē persentiunt, sed tunc minimē dolent. Stupor itaq; nō particulæ cuiuspiam proprius affectus est, sed dispositio, quæ accidere qdē oibus potest partibus, ab iis tamen dūtaxat manifestē sentiri, quæ & suos affectus percipere, & moueri pro voluntatis imperio sunt natæ. Iam verò ex carne (quæ nusq̃ sola ac per se reperitur) ligamentisq; & tendonibus per ipsam disseminatis, musculorum essentia constat: quæ vt pmanere posset, venis indigebat, arteriisq;. Verum citra dolorem pulsare, ad solas arterias pertinet, animali etiā nū rectē valente. Vbi verò ingens inflammatio est oborta, vel erysipelas, vel abscessus, arteriarum pulsus cum dolore sentitur: quum per bonam valetudinem, nec cum dolore, nec sine dolore ipsum discernere mus. Etenim duabus præcipuē occasionibus vehemens dolor particulis inflammatis infertur: * nempe quum mouetur, & quum à re quapiam præmuntur. Proinde inflammato musculo, duplici nomine, ob dilatatas arterias, dolorem percipimus: & q; moneantur illæ, & comprimantur ab adiacente carne, atq; ipsam similiter cōprimant. Quin etiam sine musculo, arteria inflammatorum affectum sustinens, ipsa per se cum dolore pulsat. Quod si aliquando per id genus affectus, stupidus esse pulsus ipsi ægro videatur, tūc scire licet, dispositionem in musculo nervis ita consistere, vt ad resolutionem tendat. Nam dispositio stuporis, media est inter resolutionem

LOCIS AFFE. LIB. II.

& integrā valetudinem. Cæterum neq; i peripneumonia, neq; in laterali morbo pulsatis potest dolor contingere: idq; ob partium naturā. Pulmo siquidem, sensum nō habet: morbus verò lateralis, membranæ cingentis costas affectus est. * Cuius quidem pars illa quæ costis adhæret, necessario comprimitur: * quæ verò inter costas, ē collocata, comprimi nequaquā potest: sed inflammationis duntaxat ratione dolet. Siquidem in eo spatio arteriæ consistunt, per musculos intercostales dispersæ: idq; altius q̄ vt membranam cingentem costas attingant. At inflammatis interdum intercostalibus musculis, dilatatio arteriarum dolorem necessario infert. Proinde æger pro magnitudine inflammationis, sentiet in parte inflammata ipsum dolorem pulsatilem. Igitur pulsatis dolor (qui vehementes partiū sensibilibus inflammationes sequitur) arterias ipsas primario affectu molestat: per consensum autem cæteras partes sensibiles: eo q̄ à vicinorum contactu præmanetur. At neq; in hepate, neq; in renibus vnq̄ huiuscemodi pulsatio percipitur, quoniam nullus per totum corpus ipsorum, sicuti nec per pulmonem, nervus diffeminatur. Quia verò membrana quæ eorum viscerum quodlibet ambit, & per quam dispergitur nervus, sensu prædita est: ob id nimirum in ipsis grauitatis sensus percipitur, vbi tumor aliquis præter naturam illa, infestauerit. Etenim membranæ, cutis, adenesq; , quum his partibus nullæ insint arteriæ, vbi inflammatae sunt, non pulsatis, sed extensiuo dolore cruciantur. In vniuersum autem, primæ doloris species sunt duæ: vna quæ dum subito temperies mutatur: altera, dum continuas soluitur. Siquidem pars intenta, aut compressa, aut contusa, aut vulnerata, dolet ob continui diuturnum. Cæterum non eandem doloris speciem excitāt mordax humor & plurimus. Ille quippe rodendo: hic verò tendendo dolorem infert. Quantam autem vim

227

Pulsatis dolor, nec in peripneumonia, neq; in pleuriti de oritur.

Pulmo caret sensu.

Pleuritis quid.

Pulsatis dolor quas inflammationes sequitur: & quibus non accidat partibus.

4.

Extensiuo dolore quæ afficiuntur partes.

Doloris species, primæ, sunt duæ.

5.

Intēperies do-
lores infert.

Colicos dolo-
res oriri ab hu-
more vitreo,
impactio in ali-
quo intestino
crassiori.

Oleū rutaceū
colico dolori
est remedium.

Dolorē qui hu-
mores maiorē,
& qui minorē
inferant.

Crassi intesti-
ni dolor, ut di-
gnoscentur.

Doloris colici,
& eius qui ab
impacto lapi-
de oritur, sunt
cōmunia prae-
sidia calfacien-
tia.

Philonium.

Colici doloris,
& orti a lapi-
de, signa di-
uersa.

habeat intemperantia ad inducendum dolorem, ex his licet planē perpendere, qui vehemēter refrigerati, ad ignem manus affatim calfacere tentant. Quippe intolērabilem sentiunt dolorem, praeipueq; iuxta unguis radices. Similiter etiam per dolores vocatos colicos, ubi frigidissimus aliquis humor (qualis ille est quem vitreum Praxagoras nominat) in quopiam intestino crassiori est impactus, adeo torquentur aegri, ut videantur sibi circa vreterarum regionem terebro perforari: id quod olim mihi etiam contigit: ceterum iniecto oleo rutaceo, quum id paulopost conarer excernere, excreui humorem vitro fuso persimilem. Sunt & alii dolores, per quos palus infixus ut: qui & ipsi corpus affectū crassum esse significant. Differunt aut inter se, aut multitudine, aut crassitudine, aut rei dolorem facientis potentia, siue ea humor fuerit, siue spiritus flatulentus. Si quidem paucus plurimo, & tenuis crasso, & permanēs moto, ac deniq; minus refrigerans, eo qui vehementissimam refrigerandi vim obtinet, minorem solet excitare dolorem. Igitur siue clauo transfixus esse, siue terebro perforari locus videatur, is dolor ad crassum intestinum est referendus. At qui huiusmodi dolores, ab eo quo lapis impactus est, discerni non possunt, nisi quis accidentia quae postea consequuntur, expectauerit. Vtriusq; tamen doloris sunt communia praesidia: & quidem calorifica in primis, siue ea extrinsecus adhibeantur, siue ea iniiciantur. Deinde nisi mitigatus dolor fuerit, eorum medicamentorum quae dolorem obtundere possunt, aliquod adhibendum est: cuiusmodi existit, qd a Philone instituit. Vex si lapis dolorē excitauerit, ipse interdū solus, interdū vnā cum cruore excernitur. in vrinisq; subsidet sabulosa quaedam. At si in collo affectus constiterit, nihil horum ut: sed protinus inflatio quaedam, & extensio, & flatus complures, & tormina, & excrementa flatibus plena cernuntur. Ea autē licet discernere

licet discernere, si & super aquam natet, & bubulo ster-
cori simulentur. Quinetiam cibi tum cupiditas, tum cō-
coctio deterior euadit, & præsens, & præcedēs, & quæ
sequetur. Ventriculum nāq; malè affici accidit, vt qui
parti primariò affectæ continenter adhæreat. Insuper
colicos nominatos affectus magna ex parte præcedit
cruditas, & spiritus flatulentus, & vomitus & nausea,
quæ multo tempore inanis permanet, & i præcordiis
mordacitas, & fastidium, & indigentia plurima. Igitur
id genus dolores vehementissimi, consistere in crassis
intestinis putantur. Qui verò mitiores sunt, ex duobus
alterum necessarium est: aut q; in his ipsis sunt, sed à le-
uiori causa orti: aut q; in tenuibus intestinis consistāt.
Porrò qui mordaces dolores sunt, ii à mordaci humo-
re intestinum erodente fiunt. Vnde dysenteriam semp
huiusmodi dolores præcedunt: vtpote per quam inte-
stina vlcerentur. Cæterum dysenteria illa, quæ veluti
fæculentum sanguinem excernit abūdantissimè, ieci-
noris affecti censetur esse symptoma. Ea verò per quā
sincerus multusq; sanguis excernitur, plerunq; vni-
uersum corpus euacuat, haud secus q; hæmorrhoides,
aut muliebre profluuium. Vt verò ad dolorum differē-
tias reuertar, punctorius dolor, potissimum circa mē-
branas consistit. Quamobrem lateralis dolor, puncto-
rius esse censetur. Iam verò hæmodia, siue dētium stu-
por, solis dentibus & gingiuis accidere solet, vbi quis-
piam & austeros & acidos cibos ingesserit. Cæterum
complura alia dolorum genera sunt ab Archigene pro-
dita, sed quæ prorsus intelligi nequeant. Qui tanē vir,
ita omnium affectuū proprietates descripsit, ac si oēs
ipse fuisset perpeffus, quod nō verisimile est. Præterea
vbi ait hemicraneas sphacelodes circumscribi, hoc est
submoueri à dissectione vasorum, minimè declara-
uit quidnam sphacelos esset: de cuius vocis significato
uarii variè opinantur. Dein dolorem pulsatorium &

Colicos dolo-
res quæ præ-
cedāt sympto-
mata.

Dysenteria do-
lores mordaces
præcedunt.

Dysenteria hæ-
patica.
Dolor puncto-
rius.
Hæmodia.

Sphacelos.

Dolor turgidus.

Nervi in quibus laxentur affectibus: & in quibus tendantur.

Actionis læsio est affectus partis symptoma.

Convulsiones oriuntur a plenitudine, & ab inanitione.

Citharistæ cur chordas instrumentorum laxent.

Nervi subduntur arteriis & venis.

Tēdones sunt nervosa corpora.

Dolor nervorum non est affixus.

turgidum inferri ab arteriis cōtendit, vbi ipsæ per hemicranias sphacelodes primogenia affectiōe laborāt. Est autem turgid⁹ dolor, qui à parte primariò affecta, veluti à radice incipiens, celeriter in partes adiacentes transfertur. Id quod non solum in hemicrania, sed in cephalea etiam solet accidere. Sed neq; illud etiam est verū, affectos nervos, protin⁹ intorqueri, indurariq;: quum reperiantur nonnulli affectus, per quos laxiores evadunt nervi: quemadmodum per atrophiam cōspicuum est. In inflammationibus autem & tumoribus præter naturam, manifestè intenduntur nervi. Cæterum inflammationis partibus, præter tēSIONem, accidit, vt rubescant, renitentur, intumescāt, & doleant. Aduerte tamē interim, propriæ actionis læsionem esse singulæ partium proprium symptoma. Porrò convulsiones nervorum, Hippocratis testimonio, & à plenitudine, & ab inanitione oriuntur: quum nimirum nervi per eas dispositiones immodicè tendi possint: quemadmodum chordæ in cithara, quæ à contrariis aeris statibus, siue humidus fuerit ille, vt rigare ipsas imple req; possit, siue vehementer aridus, ad ultimam tensionem perveniūt. Quamobrem citharistæ, vbi instrumenta, post vsum, reponunt, solent chordas ipsas laxare. At quod Archigenes dixit, profundos esse dolores nervorum, id ab accidentibus quæ plurimis nervorum eveniunt, est sumptum. Etenim quum venæ quidem semper priores in superficie cōsistant: deinde post eas arteriæ, quibus tandem nervi subduntur: iccirco laborantes tensionem in imo sentiunt. Quanq̃ multi tendones (quæ corpora sunt nervosa) nō profundos, sed in superficie dolores habent, si quando ipsos sic quoq; tēdi contigerit: vt sunt illi qui extendunt digitos. Minimè autem nervis accidere potest affixus dolor, vt falso profitetur Archigenes: quum magna ex parte dolores ipsorum ad infernas supernasq; extendatur partes.

LOCIS AFFE. LIB. II.

Iam verò membranarum dolores in latitudinem protenduntur: videnturq; esse æquales, q̃ vniuersum illarum corpus æquale existat. Semper tamen vbi intenta particula sensu acutiori est prædita, ibi vehementior infestat dolor. Adhæc pleuriticoz nonnulli iugulū dolent, porrecta in hunc locum succingēte costas membrana. Aliquando ad p̃cordia descendit dolor, percepto ipsi sensu in septo transuerso: vtpote quod necessario mouetur, quum pleuritici respirant, idq; magis q̃ cæteræ ipsius thoracis partes. Vbi enim veluti radix doloris consistit in latere, tū laborātes, musculis qui illic sunt, respirare pigritant: ac proinde soli septo transuerso respirationis munus committit natura: quemadmodum in bene valentibus, qui leni, ac minimè violenta vtuntur respiratione. Igitur quum in infernis partibus lateris inflammatio aliqua oritur, septum transuersum intentum impensius dolet. Quum verò in supnis, tunc iugulum potius dolor infestat. Vbi ingens in hepate inflammatio oritur, aut vbi ipsum est induratum, dolor qui tunc iugulum in dextra parte infestat, causæ venæ magis, q̃ membranarum tensionem sequitur. Quod autē membranarum quæ ossibus adiacent, dolores profundi sint, & veluti dolētium ossium quandam imaginem referant, haud quidem mirādum est. Proprius autem arteriæ venæq; dolor extensæ secundum longitudinem corporis, veluti chordæ cuiusdāq; speciem refert, nullā grauitatem inducens. Porrò vlcerosus dolor, nō solum ad cutem, sed ad imas quoq; partes, vt ossa, extenditur. Pruriginosus autem, ad solam pertinet superficiem: non tamen p̃mario, pro ratione ipsius propria, sed per accidens, * q̃ nimirum cutis omnes sibi subiectas partes spissitudine superet. Horum ergo dolorum vterq; propriæ dispositionis est accidens. Fiunt autem ob quosdam humores acres: tantumq; ipsi inter se, q̃tum dispositiones à quibus oriūtur, dissident. Verum

iii. ii

131
Membranarum dolores sunt latissimi, æqualesq;.

Pleuritide infestante respiratione ipsa perficitur a solo septo transuerso

Dolor ab inflammato hepate, Dolor membrarum ambientium ossa. Dolor arteriarum & venarum.

Dolor vlcerosus & pruriginosus.

Cutis superat omnes subiectas sibi partes spissitudine.

Dolor pungēs.

Sinus quid.

**Dolor tenlius
quā accidat.**

8

**Dolor hepatis
vicina corpo-
ra i consensum
adducit.**

**Hepatis inflam-
mationi neces-
sario adest fe-
bris.**

9.

**Pulmonis in-
flammati sym-
ptomata.**

quia crebro dispositio pruriginosa, vlcerosam antecedit, necnon soluta quiescenteque; vlcerosa in pruriginosam fieri transmutatio assolet, inde est quod de ipsis scripserit in distincte atque confuse Archigenes. Qui quidem ubi etiam ait * pungentem dolorem in profundo esse, perperam hallucinatur: quandoquidem ad membranas is, non ad imas partes proprie pertinere videtur. Similiter ubi infixum dolorem vocat, quum sinus accesserit, sermo illius absurditate non caret. Quippe sinus cavitas quaedam est: quum partium antea coniunctarum, altera distat ab altera. Vbi igitur fluxione impletur, ita ut adiacentes partes tendantur, tunc tenuius dolorem sentiunt laborantes, non quidem longo spatio porrectum, sed propriis limitibus circumscriptum. Præterea dum ait, hepatis dolorem inhaerentem, hoc est eodem in loco permanentem, existere, an non etiam veris contraria profert? Siquidem hepatis dolor, si quæpiam alius, vicina corpora, ad consensum perducit. Nam & ad iugulum usque porrigitur, & spirandi difficultatem creberrime infert: atque interdum tussim quoque, & dysenteriam excitat: nec raro nothas costas infestat. Porro inter vehementer respirandum nonnunquam gravitatem in dextra præcordiorum parte sentimus. Cæterum si id citra febrim eueniat, aut obstructione, aut dura dispositione hepar laborare, coniecito. Nam ubi inflammatione infestatur, tunc febrim adesse est necesse.

CAP.

III.

Igitur ad inveniendas affectas sedes, in primis querere oportet, an singulorum locorum, quomodo cunque afficiantur, propria signa inueniri possint: an pro affectuum ratione alterentur. Deinde, utrum singulorum affectuum propria sint signa: an circa quolibet partem varientur. Postea verò expedit, loci simul & affectus memores, signa ipsa perstringere. Veluti si ita acciderit, ut pulmo inflammatione laboret, tanta spirandi

difficultas orietur, tantaq; angustia, vt suffocari laborantes videantur, ac recti sedere conentur, quem affectum vocant orthopnoeam. Quin etiam calidam sentiunt * expirationem, idq; maximè si erysipelatis par ticeps ipsa inflammatio fuerit: quamobrem vbi plurimum efflant, iuuantur, inspirareq; abundanter frigidum aerem desyderant. Sputum verò ipsum modò hoc, modò alio expuunt colore tinctum. Insuper grauitatis cuiusdam thoraci incumbentis sensum sæpenumero ægri percipiunt: ac dolorem ex imo ad ipsum peruenire, & ad pectus, & ad spinam. Præterea febris acuta ipsis adest. Pulsum verò habent, qualem in libro de Pulsib⁹ diximus. Similiter vbi membrana costas succingens est inflammata, acuta febris infestat, simulq; dolor puctorius, vnà cum spirandi difficultate. Magna etiam ex parte sputum colore infectum apparet, haud secus q̃ in peripneumonia. Igitur vtrunq; affectum respirandi difficultas necessario cõsequitur: eo q̃ affecta particula spiritus instrumentum existat: Oritur autem febris, & propter affectum ipsum (calidus enim affectus est inflammatio) & propter positum. Nam & pulmo, & succingens costas membrana prope cor cõsistunt. Sic etiam tussis ipsis vt spiritalibus conuenit. Sed quod aliquid expuatur, id ab affectu procedit. Quippe iam ostendimus omnem inflammationem ex affluente sanguine fieri. Quapropter si biliosus sanguis fuerit, flauum aut pallidum erit sputum: si pituitosus, spumans & candidum. Si melancholicus, aut nigrum aut liuidum. Si nihil horum infecerit sanguinem, rubrum. Quinetiam in laterali morbo sæpenumero magis biliosum: in peripneumonia verò magis pituitosum sequi sputum consue nit. Quod autem inflammatarum thoracis partium excrementa, per asperam expurgentur arteriam, in causa certè est, tum positus earum, tum formatio: vt quæ per solam hanc viam effluxum sortiantur. At ve-

Orthopnoea.

ad thoracem rñm
os pulmonis & spinam.

Pleuritidi quæ
ad sint sympto
mata.

Inflamatio ois
ex affluenti sit
sanguine.
Sputi pleuriti
corum species
diuersæ.

Thoracis ptes
inflammatas ex
purgari p aspe
ram arteriam.

**Cerebri excre-
menta per quas
regiones vacuē-
tur.**

**Sedes affecta
vnde dignosci
possit.**

**Iecorarius af-
fectus a pleuri-
tico, quomodo
discernatur.**

rō vētriculus duos habet meatus: ac quod in eo vitio-
sum est, supernatare solet, vomitioneq; eiicitur: quod
autem in intestinis subsidet deiectione vacuatur: veluti
renum vesicæq; excrementa, meiendo excernuntur.
Nam quæ redundant in cerebro, per nares præcipuè:
nonnunq; per palatum & aures exterminantur.
Sedes itaq; affectæ dignoscuntur & ab accidentibus, et
ab actione læsa, & ab excrementorum qualitate, & à
tumoribus præter naturam, & à dolorib⁹, & à coloris
vitio, qđ sequitur, vel in vniverſo corpore, vel in vna
quapiã parte, vel duabus, idq; maximè in oculis & lin-
gua: quibus addere potes etiam eam affectionem, quæ
per consensum affligit. Fit autē in hisce omnibus exer-
citatio, vbi particularia sub eandem viam & rationem
ducuntur. In p̄mis igitur intueri oportet, num sit actio
aliqua læsa. Quippe cum ipsa proprium aliquod instru-
mentum affici necesse est. Deinde vbi actionem esse læ-
sam perspexeris, ad modum læsionis accedendo, con-
sidera ad quem affectum propriè ptineat. Postea par-
tem affectam expende, num tumore quodam, aut do-
lore infestetur, & quidem accuratè cuiuslibet horum
speciem inuestigando. Fingamus ergo, vt quispiam in-
ter respirandum, in notharum costarum regione do-
leat. Non protinus hunc esse pleuriticum suspicari de-
bes. Sed in primis quidem, an tussiedo aliquid expuat,
considerare. Id enim si coloratū videris, tunc ægrum
dices esse pleuriticum. Quòd si tussiedo nihil omnino
expuat, fieri potest vt nihilominus pleuriticus sit ille q-
dem, sed inflammationem habeat incoctam adeò, & i-
pactam, vt nihil ab ea foras eiici possit. Fieri quoq; po-
test, vt ob hepatis inflammationem dolor in iam dicta
fede excitetur. Cæterum ex differentia pulsus, ex deie-
ctionibus, ex tumore præter naturā, ex gravitate, &
pondere, ac deniq; ex aliis notis, quæ hepatis inflāma-
tioni sæpe solent accidere, iecorarium affectum, à pleu-

ritico, licebit nobis discernere. Verum in huiusmodi dispositionibus, solidum firmumque discernendi indicium, per omne tempus morbi, à pulsu sumendum est: deinde tractu temporis, reliqua etiam consideranda. Nam & linguæ, & vniuersi corporis color alteratur, vbi hepate affecto, alteratur totius corporis color. Sicuti rursus thorace affecto, incre-
scit tussis, atque sputa cernuntur. Distinguendi tamen sunt interim affectus qui primarii dicuntur, ab iis qui per consensum affligunt. Nam si in pleuritide vel peripneumonia delirium aliquod incidat, existimandum est principem animæ sedem, in qua & scientia, & opinio, & cogitatio consistit, consentire thoraci, atque ob eam necessitudinem affici: in aliis autem affectibus, ut in lethargo & phrenitide, minimè consentire, sed laborare affectu primario: vndique verò affici, vbi propria-
rum ipsius functionum aliqua oblata fuerit. Proprias enim functiones dico, quæ à nulla alia parte ut instrumento, fiunt. Nam re vera & videre animam, & audire, haudquaquam negandum est: sed videre oculis, & audire auribus. Atqui ut cogitet, reminiscatur, existimet, eligat, neque oculis, nec lingua, nec alia quapiam parte utitur. Verum quod dux sensus & voluntarii motus sedem habeat in cerebro: quodque cerebrum contegatur menyngibus, alibi à nobis est declaratum. Si igitur per solum consensum cerebro affecto, illa pars quæ primario affectu laborat, curata fuerit, priusquam cerebro propria aliqua dispositio eueniat, nullum in ipso accidens relinquetur. Quod si ex consensu permanens aliqua in ipso dispositio remaneat, non solum parti primario affectæ, sed capiti quoque remedia adhibenda sunt. Quapropter exactè definire vtrum cerebrum, an membrana ipsius primitiuè afficiantur, haud magnam utilitatem afferre potest, quum in vtraque dispositione capiti succurratur eadem medendi ratione. Præcipuè verò danda opera est, ut morbi essentiam deprehendamus:

Hepate affecto
alteratur totius
corporis color.
Affectus primarius
nos ab iis qui
per consensum
accidunt, distin-
guendos esse.
Animæ princi-
pis sedes quoniam
se, et quoniam per con-
sensum ledatur.

Proprie fun-
ctiones cerebri
quæ dicantur.

Originem motus
& sensus consi-
stere in cerebro.

Affectuum per
consensum cu-
ratio.

Cerebri & eius
membranae af-
fectibus eadem
succurri mede-
di ratione.

Essentiam morbi
in primis est co-
gnoscenda.

*Curationē per
contraria mo-
iendam esse.*

*Delira, & vigi-
lia a causa ca-
lida oriuntur.
Soporosi affe-
ctus oriuntur a
causa frigida.
Vinū meracius
inducit vigi-
lias.*

*Calida cur vi-
galias efficiāt.
Frigida cur gi-
gnant soporē*

*Affectus pro-
prius quando
putandus sit.*

*Affectus per
consensum qñ
dicatur.
Accessione fe-
brili inuadēte,
cur aegri corri-
piātur sopore*

Soporis cause.

qua cognita, facile nobis licebit per contraria curatio-
nem moliri. Itaq; non tantum affectum locum, sed cau-
sam etiam inferentem noxam considerare oportet.
Vt exempli gratia, delirium est eius actionis sympto-
ma quæ à loco mentis cōpote prodit: similiter sopor
stupidus: sed à contrariis causis oriuntur. Siquidem &
vigiliam, & delirium, causa potestate calida efficit. At
quotquot somnolenti soporisiq; affectus existunt, om-
nes à frigida causa proueniunt: id quod ex medicamē-
torum natura planè discere licet. Quippe frigida stu-
porem soporemq; calida verò vigilias & varias mo-
tiones inducunt. Tenuis etiam victus ratio, & vinum
meracius, vigilias pariunt, præcipuè si vinum ipsum
fuerit suapte natura calidum, aut etiam antiquius val-
de. Etenim calida causa motum excitat, ob idq; vigi-
lias affert: frigus aut ociosum, & ad motiones pigrum
reddit animal: qua ratione somnum soporemq; conci-
liat. Igitur qui hæc intelligit, quum per ardentium fe-
brium vigorem, hominem viderit & vigilare, & deli-
rare, deinde inclinante iam febre, & dormire, & rectè
sapere, in capite nullam propriam esse dispositionem,
sed à febris abundanti calore delirium fieri, perpēdet.
Quippe tunc affectus proprius putandus est, quum per
manere in parte quapiam conspicitur. At vbi pars ali-
qua simul cum alia sic afficitur, vt irritata quidē vna,
altera infestetur vehementius: remissa verò irritatione,
quiescat, eam per consensum affici putandum est. Sic
etiam contingit, vt quum febrium accessiones inuade-
re incipiunt, sopore laborantes grauentur: q; eo tem-
pore cerebrum sit vehementer refrigeratum, alio-
qui paratissimum, vt noxam eiusmodi subeat:
quum nimirum frigidiori intēperie sit præ-
ditum. Gignitur autem sopor, vel ab
intemperie frigida, vel à pituita
in cerebro exuperante.

G A L E N I P E R G A

M E N I D E L O C I S A F F E C T I S .

L I B E R T E R T I V S .

C A P . I .



GIT V R Ad cognoscendas affectas sedes, curandosq; illarū affectus, accurata inquisitione est opus. Ceterū per artis exercitationem comperi, eam remediorum inuentionem, quæ ex vera demonstratione oritur, in iis quæ rarò contingunt, experientia longè præstare. Nam experimenta dūtaxat sectantes medici, nō ea quæ rarò, sed quæ crebrò accidunt, memoria & imitatione assequuntur: Quocirca dispositionum rarò euenientium, non solum curationem, sed præuenientes et notiones ipsarum, negligunt. Ego verò semper inuestigare studui, quæ nam sedes vel afficeretur ipsa, vel alteri consentiret. Quumq; eam inuētam esse arbitrarer, tunc ad dispositionē eius inuestigandā, atq; ex vtriusq; totius curatiui generis indicationem sumendam, ac de niq; remediorum qualitatem, quātitatem, idoneamq; materiam comparandā, me accinxi: haud neglecta interim, ætatis, naturæ, temporis, regiōis, aliorumq; id genus omnium contemplatione. Deprehendi autem possunt affectæ sedes ab excrementis, atq; ab iis quæ affectis partibus adnascuntur, necnon à functionum noxa: quibus connumeratur & color præter naturam, si guraq;. Verū vbi nulla mihi pateret aliàs via, sola functionis læsio fuit satis, ad inuentionem affectarum particularum.

C A P . I I .

QUum autem exoletam cuiusdam memoriam restituere conarer, primum quidem apud me

Remediorū inuentio quæ ex vera demonstratōne paratur, in iis quæ raro contingunt, longè experientiæ præstat.

3.

Affecta sedes vnde deprehendatur.

Memoriā exoletam restitutor, quæ sint consideranda.

4.

Archigenis in-
constantia de-
miratur Gale-
nus.

Memoriae obli-
tae a causa fri-
gida & sicca,
cucurbitulas
admotas non
esse ex usu.

Cucurbitulae
absq; scarifica-
tione adhibitae,
soliis excitandi
caloris gratia
sunt utiles.

Anime faculta-
tu singulis que
sedes tribuan-
tur

5. Tityo erosum
iecur ab aquila
singunt poetæ.

Ratione laesa,
saepe memoria

ipsum inuestigavi, quæ nã pars esset affecta, cui localia
adhiberem præsidia, prius videlicet vniuersi corporis
vacuatione præmissa, quod præceptum est in morbis
omnibus obseruandum. Deinde qua via & ratione in-
uenirem singula remediorum. Cæterum affectam
sedē eam ipsam existimaui, qua princeps animi vis cō-
tinetur. Medicamenta autem ea adhibenda esse, quæ
huius sedis dispositioni reluctarentur. Quum igitur hu-
ius inquisitionis gratia consuluissem epistolam quandā
ad Marsum, ab Archigene scriptam, in qua iubet, de-
prauata memoria, raso capiti affigi cucurbitulas, non
iniuria sanē inconstantiam hominis sum demiratus: q̃
nimirum neglecto corde (cui memoriā ipse, ceu opus
cognatum tribuit) ad caput remedia trāsferret. Nam
quid per immortales Deos ex affectorum locorum no-
titia (quam ipse ad medendi rationem ait maximē ne-
cessariam existere) consequemur vtilitatis, nisi ab ipsis
ad remediorū inuentionē ducamur? Adhæc si affectio
quæ oblaedit memoriā, existat frigida & sicca, nullū
vsum adferunt cucurbitulae admotæ: siue eæ incisa pri-
us cute, siue integra, administrentur. Siquidem detra-
ctio sanguinis, quæ fit, vbi scarificata prius cutis fuerit,
ad extremum ducit periculū. At citra vllam scarifica-
tionem cucurbitulae adhibitæ, solius excitandi caloris
gratia utiles esse censentur. Quippe attrahūt ad sese hu-
morem ex imo: id quod magnopere aridæ dispositiōi ad-
uersatur. Porro rationalem animæ vini in cerebro: vi-
rilem, irascibilem uē, in corde: appetitoriā deniq; in ie-
core sitam esse, nemini non persuasum existimo: id qđ
vel ex vulgariū sermone indies discere licet. Fatuū
siquidē aiunt carere cerebro: timido & pusillanimi, cor-
deesse. Tityo verò iecur ab aquila erosum, non solum
poetæ, verum etiam pictores, sculptoresq; fingunt. At
verò, quemadmodum si ratio lædatur, sæpenumero
contingit lædi memoriā: sic si memoria vitietur,

LOCIS AFFECT. LIB. III.

ratio ipsa quodammodo etiam labefactatur: utpote actionis vtriusque noxa procedente ab eadem dispositione. Quæ ubi vehementius intenditur, simul cum memoria ratio quoque omnino deperditur. Ac talis quidæ affectio stultitia vocatur. Sic in lethargo etiam, in omnibusque soporosis affectibus, utraque simul pereunt actiones. Quod autem affectus hi, à frigida intemperie oriuntur, quæ animales actiones omnino torpidas reddit, scilicet id vel ex animalibus ipsis, quæ per frigora latere coguntur, satis liquido constat: necnon ex frigidis tum medicamentis, tum cibis. Lactuca quippe, graues inducit somnos, si multam quis ipsius quantitatem ingesserit. Verum & capitis gravitates, quæ sine mordaci infestant dolore, somnum soporemque conciliant: quibus apoplegmatisimi magnifice opitulari videntur. Igitur ut capitis ardor vigilias, sic refrigeratio inducit soporem. Item biliosi calidi que morbi, vigilias, deliria, phrenitides: contra, pituitosi frigidi que, ignauiam soporemque efficiunt. Nam quod ad vigilias soporesque per morbos pertinet, calida frigidaque intemperies, primam sibi facultatem vendicat: altera verò ab hac, ad humiditatem ariditatemque refertur. Balneæ siquidem, eo quod madefaciant caput, soporiferæ sunt. Haud secus vini moderata portio, omnesque cibi humectantes. Ex ætatibus etiam, pueritia quidem, ob humorem est somnolenta. Senes verò ob ariditatem, vigiliis vexantur. Omnia igitur hæc argumenta esse possunt, ad animi ignauiam inducendam, humiditatem præter naturam obtinere secundas partes: frigiditatem verò priores. Cæterum ut humiditas sola, si abundet, longos profundosque somnos inducit: ita ariditas sola, vigilias. Quod si frigus cum humore intendatur vehementer, soporem stuporemque constituit: si ne hoc verò, memoriæ nocet, stultitiamque inducit. Quum itaque non solum in frigiditate humiditateque, verum etiam in ariditate & calore, non paruum secundum

139

lædi contingit
ut econuerso.

Stultitia quid.

Frigida intemperies animales actiones reddit omnino torpidas.

Lactuca soporem gignit.

Apoplegmatisimi quibus affectibus conferant.

Vigilias qui morbi inferant.

Balneæ cur soporiferæ.

Vinum modice sumptum inducit somnum.

Pueri cur somnolenti.

Senes cur vigilantes.

Stultitia unde oriatur.

*Actiões prin-
cipales.
Actiões mo-
rales.*

*Vigilans so-
por.*

*Caput quadru-
pliciter affici.*

*Stultitia est in-
tellectus amis-
sio.*

*Memoriae exo-
letæ, vel graui-
ter læsæ, causâ*

magis & minus, discrimen sit: nihil mirum, si multifaria inueniantur causæ quæ animales actiones lædere possint. Impræsentiarum autem, clarioris doctrinæ gratia, rationalis animæ actiones, principales: irrationalis verò, morales vocentur. Quum autem bifariam fieri contingat intemperies prædictas, duplex quoque erit vtriusque dispositionis modus: vnus quidem, in humidis siccisque humoribus: alter in corporibus solidis: si quando in eandem intemperiem cum mollibus, solidæ partes inciderint. Præterea quis ipsæ intemperies inter se sint contrariæ, * sit tamen ex ipsis interdum mixtum quoddam temperamentum: vt in vigilanti sompore, in quo pituitosus biliosusque humor exuperant. Ita in calidi frigidi que contrarietate, eosdem quoque modos inuenire licebit, tum per simplices intemperatias: tum per compositas ex ambabus. Quod si in solidis corporis partibus mixtam ex contrariis dispositionem fieri fateamur, tres sic prodibunt in vtraque contrarietate intemperies. Igitur huiusmodi affectus omnes capiti aduenire solent, sed inter se differunt, non solum missionis varietate, aut eo quod magis minusue intenduntur: verum etiam quia interdum afficiuntur ventriculi cerebri id genus intemperantiis: interdum vniuersa eius vasa: aut humiditas dispersa per corpus cerebri. Accedit ad hæc, quartus quoque modus, quum videlicet ipsum met corpus cerebri intemperatum redditur.

C A P. III.

Quorum igitur vel memoria, vel intellectus perit (intellectus enim amissio, stultitia est) somnos obseruare oportet. Præterea, vtrum excernant quippiam, vel ex naribus, vel ab ore, quod à capite defluat: an aridæ huiusmodi partes sint. Quippe ex iis dispositionem ipsam consequi cōiectura poterimus. Vbi igitur vel perit, vel grauius læsa est memoria, frigida est omnino intemperies cerebri. Quocirca calface

LOCIS AFFECT. LIB. III.

ne ipsum oportet. At verò exiccare, vel humedare, non necessarium est. Sed si humiditati copuletur, arefacere: si ariditati, madefacere. Cæterum si inter has medium obtinet, ipsum est conservandum. Interdum verò ubi principales actiones sunt læsæ, febris quoque accedit, ut in phrenitide, & lethargo. Interdum sine febre adest vitium: ut in mania, & melancholia: id quod modò per consensum: modò primaria affectione cerebro laborante, accidit. Etenim ubi propriis accidentibus exprimiuntur huiuscemodi vitia, permanentiaque sunt, nec aliis præcedentibus superueniunt, primogenia dicuntur esse. Vbi verò propriis accidentibus minimè limitantur, neque perpetuo permanēt, atque ad alias affectiones sequuntur, per consensum ipsa evenire dicimus. Nec interim latere nos debet, ubi quis lege consortii afficitur, fiatque adhuc affectio, quæ deletis efficientibus eam causis, ipsa quoque simul deletur. Sin autem consentientes partes permanentem iam habeant dispositionem, quis causa efficiens conquiescat, ipsa tamen permanebit affectio. Quòd autem in cerebro consistant omnes principalium animæ virium affectus, pro confesso habent omnes medici, qui studio veritatis tenentur: sicuti & quod omnes nervi qui voluntatis imperio audiunt, à cerebro ducant originem. Conuulso siquidem vniuerso corpore, omnes profectò autumant, talem quampiam affici partem, quæ ut in arbore caudex ramorum, sic ipsa sit communis omnium nervorum origo. Si igitur partes omnes quæ infra faciem sunt sitæ, conuulsæ sint, primas spinalis medullæ partes affectas esse putandum est: ac proinde illis opitulandum. Si verò simul cum vniuerso corpore facies quoque conuulsa videatur, non modò spinalis medullæ exortum, sed etiam cerebrum ipsum, à quo nervi faciei oriuntur, curamus. At verò si crura tantum, aut altera manus convolutione tentetur, totius membri convolutione nervorum,

141
esse intemperiem frigidam cerebri: quæ refrigeranda est.

Affectus primogenii, siue primarii, qui sunt: Affectus per consensum, qui dicantur.

Animæ principalium facultatum affectus, consistunt in cerebro. 6.
Nervus omnis a cerebro ducit originem.

Convulsio quo
differat a natu
rali motu.
Convulsio fit
ob plenitudinē
vel inanitionē.

2. Epilepsia est
convulsio uni
uersi corporis,
quæ ex tempo
rum accedit in
teruallis.

Epilepsia cōsi
stet in cerebro.
Epilepsia unde
gignatur.

quæ ad ipsum feruntur, principium affectum esse declarant. Cæterum, quum omnis motus à voluntate profectus, attractis musculis in eas quibus innascuntur, partes, fieri videatur: nec fieri possit attractio, nisi ad suam originem retrahatur musculus, constat convulsionem in convulsis partibus factam, hac sola ratione à motu naturali differre, & præter voluntatē fit. Porro ipsam convulsionem nervorum, ob plenitudinem vel inanitionem fieri quæ verissimè professus est nobis Hippocrates: id quod vel ex fidiculis instrumentorum (quæ ob utranque intemperiem ambiētis aeris, humidam nempe, & aridam, adeò tenduntur ut disrumpantur) liquidò constat. Si igitur convulsio fiat vel à labore, vel vigiliis, vel fame, vel solitudine, vel arida æstuantique febre, qualem est videri in phreniticis, causam eius ariditatem, inanitionemque, rectè putaveris. Sin verò temulento cuipiam, ac omnino pleno homini convulsio accadat, non ab re ipsam à contraria causa iudicabis ortum habuisse. Atqui inanitioni contraria est repletio. Iam comitialis morbus convulsio est omnium corporis partium, minimè quidem perpetua (ut in emprosthotono, opisthotono, & tetano) sed quæ ex temporum accedit interuallis. Nec solum hac re, sed mentis quoque & memoriæ, ac sensuum oblæsiōe à iam dictis convulsionum generibus differt. Vnde constat in cerebro hunc affectum consistere. Cæterum velox eius discussio, crassum humorem spiritus meatum in cerebri ventriculis obstruentem, hunc maximè affectum peperisse declarat: nervorum principio seipsum quatiente, quo excutiat id quod infestat. Itaque non ab ariditate, inanitioneue, sed à crasso & viscido humore, impediēte animalem spiritum, quo minus deferatur in corpus, hanc affectionem gigni, argumento est, quod subito & fiat, & solvatur. Siquidem brevi tempore fieri non potest, ut vel cerebrum, vel tenuior ipsius membrana, ad

LOCIS AFF. LIB. III.

tātam ariditatem perueniat, vt corio simile quippiam
 patiatur. In corpore itaq; cerebri, anima suam sedem
 sortitur: in quo etiā fit tum ipsa ratiocinatio, tum re-
 cordatio sensibilibus imaginum. Primum autem istru-
 mentum ipsius animæ, tum in sensibilibus actionibus
 vniuersis, tum in iis quæ à consilio & voluntate profi-
 ciscentur, spiritus est animalis, qui in cerebri ventricu-
 lis continetur: sed præcipuè in postremo: quis non cō-
 temnendus sit medius vētriculus: quem amplecti mul-
 tis rationibus cogimur: vt duos anteriores deferere.
 Satis tamen fuerit ad curationem, nosse sedem affectā
 esse ipsum cerebrum: atq; in eius ventriculis humorē
 crassum & viscidum comprehendere, nunc pituitosum,
 nunc melancholicum. Pituitosum in præsentia humo-
 rem appello, in quo humiditas, frigiditasq;: vt melan-
 cholicum, in quo siccitas & frigiditas dominatur. Ac
 pituitæ quidem vnum genus est, qđ quotidie vel screā-
 do, vel vomendo, vel emungendo educitur, vapore-
 so spiritu plenum: vt ne sensu quidem lateat ipsum esse
 dissimulare. Alia verò pituita, similis quidē videtur,
 licet fortassis non similis existat: qualis est tum cru-
 dus humor, qui in vrinis subsidet: tum is qui à Praxa-
 gora vitreus vocatur. Ex quo genere videtur esse &
 salina, quæ neq; fluida admodum sit, neq; aquosa.
 Verū salina non vnica duntaxat qualitate gustum so-
 let afficere, nedū vniuersa pituita. Sic atra bilis quoq;
 ob substantiæ varietatem nō obscuras differentias sor-
 titur. Nam alia ē veluti fæx sanguinis, quæ admodum
 spissa existit, fæcibus vini haud absimilis. Alia verò, q̃
 superior, essentiæ est multo tenuioris: atq; vomentib;
 ipsam & olfacientibus videtur acida. Hæc etiam attol-
 lit in bullas terram, eamq; radit, atq; fermentat. At il-
 la quam fæci vini similem esse dixi, in terram effusa nō
 inducit feruorē, nisi fortē in ardenti febre ipsam præ-
 affari contingat: neq; vlla etiam acida qualitate parti-

143

Anima colloca-
 tur in ipsius ce-
 rebri corpore:
 in quo & ratio
 cinatio fit, &
 memoria.

Animæ primū
 organū, est ani-
 malis spiritus,
 qui in cerebri
 ventriculis con-
 tinetur, sed præ-
 cipue in postre-
 mo.

Pituitæ diffe-
 rentiæ.

Atræ bilis spēs.

*Epilepsia fieri
a crassa pitui-
ta, vel a melan-
cholico succo
retento in mea-
tibus ventricu-
lorum cerebri*

*Melancholia
vnde oriatur.
Maniae causa
Phrenitidis dif-
ferentia.*

*Phreniticorum
insania quo ab
ardentium fe-
brium delirio
differat.
Delirium arden-
tium febrium
quomodo fiat.*

*Ori ventriculi
inesse acutiore
sensum quam reli-
quis corporis
partibus.
Consensus atque
necessitudo ee
cerebri cum ven-
triculo, vnde
inmorescat.
Hypochondri-
cos affectus quos
sequantur.*

cipat. Quare iudicio meo potius melancholicus aut suc-
cus aut sanguis, quam atra bilis, dicenda est. Igitur ut cras-
sus pituitae succus, ita hic quoque comitalem morbum
solet efficere, ubi in meatibus ventriculorum cerebri
retinetur: siue is medius sit, siue postremus. Vbi vero in
ipso cerebri corpore abundat, eam insaniam speciem,
quam Graeci vocant melancholiam, inducit. Quemad-
modum alter atrae bilis succus, qui praestata flava bile
nascitur, ferina gignit deliramenta, modo cum febre,
modo absque illa, in cerebri corpore abundans. Atque hac
ob causam phrenitis nonnunquam est mitior, ubi a pallida
bile ortum traxit. Interdum vehementior, ubi flava
bilis eam peperit. Deliria autem, quae per febrium vi-
gores accidunt, non propria cerebri affectione, sed per
consensum fiunt. Quamobrem sic delirantes, minimè
appellamus phreniticos: quia phreniticorum insania non
quiescit mitigato febrium vigore. * Quemadmodum
igitur phreniticoe febris unum quoddam ex symptoma-
tibus dispositionum cerebri iudicatur: sic ardentium febrium
symptoma delirium est: quod nimirum fit elatis ad cerebrum
multis vaporibus * calidis. Haud secus gignitur ea af-
fectio quae suffusioni est persimilis, a ventriculi disposi-
tionibus ortum trahens. Namque ventriculo cerebrum,
cerebroque ventriculus, suas affectiones transmittit: idque
propter nervorum a cerebro ad os ventriculi descen-
dentium magnitudinem: per quos etiam sensus huic
particulæ, quam ulli reliquarum corporis partium, acutior
est. Quocirca fracturas quidem capitis, ubi ad mem-
branas usque perveniunt, biliosus vomitus: capitis autem
dolores quomodocumque fiant, nausea stomachique mor-
sus consequitur. Hypochondriacas vero & flatulentas
vocatas affectiones melancholica comitatur tristitia:
haud secus quam acutas febres delirium: & * nonnullas
oris ventriculi dispositiones, affectio suffusioni persimi-
lis. Sic nervosis partibus inflammatis, promptius quam re-
liquis,

liquis, delirium superuenire solet: idq; ascendente ad caput, interdum per continuas partes solo calore: interdum spiritu vaporoso, uel fumoso, uel fuliginoso.

CAP.

III.

Igitur crassi humores q in cerebri substantia abundant, interdum ei ueluti instrumentali: interdum ut similari uocent. Quum enim meatus obstruuntur, ut instrumentali: quum uerò alteratur temperamētum, ut similari. Proinde rectē ab Hippocrate dictum est, Melancholici magna ex parte comitiali morbo afficiuntur: & contra, morbo comitiali laborantes, melancholici euadunt. Atq; horum utrūlibet magis accidit, pro ut uel in hanc, uel in illam partem infirmitas repit. Si enim in corpus, epileptici: si uerò in mentem, melancholici euadunt. Quum autem nō solum ab atra bile, sed etiam à pituita morbus comitialis oriatur, sciendum est, solum eum qui ab atra bile ducit originem, in melācholiā transire posse. Etenim quum anima ipsa, aut temperamentum actiuarum sit qualitatum, aut ab ipsarum temperamento mutetur: bilem ipsam ubi cerebro, ueluti parti instrumentali, nocet, ad cerebri corpus conuerti ait, id quod in obstructionibus fieri constat. Quum uerò temperamentum mutando, ei ueluti similari nocet, ad mētē eam repere dicit. Accidit autem cerebro, ut nonnunq̃ uniuerso in uenis sanguine melancholico effecto, ob cōmune uitium, ipsum q̃q; lædatur. Nōnunq̃ uerò, totius corporis sanguine prorsus innocuo, solus is qui in cerebro contentus est, alteratur: idq; bifariam fit. Aut enim aliunde in ipsum deriuatur: aut in ipso met melancholicus humor genitus ē: quum uidelicet internus calor aut flauam bilem, aut crassum atrūq; sanguinem, superassauit. Si igitur uniuersum corpus redundet melancholico sanguine, curationem à uenæ sectione auspicari oportet: si uerò cerebri tantum, æger tunc (quod ad hanc dispositio-

Cerebrum q̃ afficiatur ut instrumentum, & q̃ ut pars similis.

Melancholici magna ex parte epileptici fiunt, & e conuerso.

Atra bilis q̃ in cerebri corpus: & q̃ in animam repat.

Tomus. I I I.

K k k

Melancholicus
sanguis in qui
bus minime ha
beatur: & in q
bus omniū ma
xime accumu
letur.

**Cibi melācho
licum succum
gignentes.**

nem pertinet) sanguinis detractio non indiget: quis ob aliam causam sanguis detrahi possit. Vtrum uerò melancholicus sanguis vniuersum corpus, an solum cerebrum occupet, sic discernendum est. In primis uniuersi corporis habitum, qualis nam sit, accuratè cōsyderes uelim: meminerisq; q̄ molles & cādidi, & obesi, nequaquā humorem melancholicum possidēt. Macri uerò, & nigri, & hirsuti, & quibus latæ sunt uenæ, aptissimi sunt, ut huiusmodi in ipsis humor accumulet. Fit q̄ interdum, ut * admodum rubicundi, affatim melancholicum temperamentum contrahant: atq; post hos etiam flauissimi præcipuè uigiliis, & multis laboribus, & solitudine, & tenui uictu æducati fuerint. Cuius generis etiam hæ notæ existunt, si hæmorrhoids aliqua sit restricta: aut consueta alia sanguinis euacuatio: aut usus fuerit æger cibus melancholici succi. Porro qui sanguinem melancholicum gignunt, hi ferè sunt: caprina, bubalaq; caro, magisq; hircinæ & taurinæ: sed maximè asinorum & camelorum carnes: itemq; uulpinæ: & caninæ. Magnū ad huiusmodi sanguinis generationē momentum adfert etiam * leporis esus: sed multò maius aprorum. Limaces quoq; sanguinem melancholicum pariunt, si frequens sit eorum usus. Præterea omnium animalium terrestrium carnes sale conditæ: necnon aquatiliū carnes, ut thunni, balenæ, vituli marini, delphini, canis, atq; cetaceorum oīum. Ex oleribus autē, brassica ferè sola, gignere sanguinem id genus consueuit: quemadmodum & arborum germina, ubi vel muria, uel oxyhalme condiuntur: præcipuè lentis, terebinthi, rubi, canirubi. Leguminum uerò omnium maximè lentes inter melancholicos cibos annumerantur: mox furfuraceus panis, & qui ex typha & uitiatis seminibus factus est. Præterea uina crassa, nigraq; aptissima sunt, ut ex ipsis humor melancholicus fiat. Vetus etiam caseus, si supercalfactus in ipso corpore fuerit,

facile huiusmodi humorem procreat. Sunt etiam nonnulli, qui per febriles morbos contraxerunt melancholicum succum. Ad efficaciorē autem notitiā, non parē cōfert anni tempus, ac præterita, præsensq; ipsius constitutio: nec non regio, & laborantis ætas. His itaq; omnibus præmeditatis, si existimas in vniuersi corporis venis contineri sanguinem melancholicum, quo certiorē habeas notitiā, cubiti venam seca, præcipueq; mediam, quæ communis est, & ei quæ humeralis dicitur, & ei quæ per axillam ad manum ferī. Quod si tum fluens sanguis non videatur melancholicus esse, supprimatur cōfestim. Si verò talis appareat, vacua q̄tum pro laborantis corporis habitu satis esse coniecēris. Est præterea tertium melancholiæ genus, morbi comitialis exemplo, vbi ortum à uentriculo suscipit. Solentq; medicorum nonnulli hanc dispositionem, hypochondriacum, flatulentumq; morbum vocare. Quem sanè (vt Diocles testatur) sumpto cibo cōcoctū difficili, statim ructus acidus comitatur: cū eoq; flatus & æstus. Adhæc fluctuatio in præcordiis, non illi co, sed vbi cibos venter complexus fuerit. Interdum etiam ventriculi vehementes dolores, qui nonnullis ad dorsum vsq; extenduntur. Cæterū ægri cibis concoctis quiescunt: moxq; aliis ingestis, eadem reuertuntur symptomata: quæ interdum ieiunos, interdum et à cœna affligunt, ita vt ægri vomant cibos crudos, & pituitam subamaram, calidamq; & adeò nōnunq; acidam, vt dentes torpere videantur. Atq; horum plurima statim ab ineunte ætate eueniunt. Vt cūq; tamen acciderint, omnibus protelanī. Cuius morbi causam, calorem immoderatum venarum meseraicarum, obstructionemq; earundem, à crasso sanguine ortam, idē Diocles assignat. Videtur autem in ipso ventriculo p huiusmodi affectus, inflammatio quædam consistere: sanguis autem in parte inflammata contentus, &

Venā mediā
in cubito per-
tundendam iis
esse, qui sangui-
ne melancholi-
co abundant p
vniuersum cor-
poris habitū.

Hypochondria-
cæ ac flatulēt
melancholiæ,
(quæ a ventricu-
lo oriē) signa.

Hypochondria-
cæ melanco-
liæ causa.

Epilepsiam ali-
quando oriri a
ventriculo.

Melancholicos
nunquā deserit
timor.

Melancholico-
rum species va-
rie.

Atra bilis cur
timorem con-
ciliet.

Hypochondria-
cus morbus
dicendus.

crassior esse, & atra bili similior. Quo quidem exhalan-
te ad cerebrum, melancholica eueniunt circa mentem
symptomata. Frequentissimè etiam videmus, flaua in
ventriculo bile contenta, caput dolore affici: illa verò
eiecta per vomitum, illico dolorem compesci. Atq; in-
ter optimos medicos conuenit, non solum hæc accidē-
tia, verum etiam epilepsiam, aliquando capiti à ventri-
culo oriri. Caterum melancholicos vt nunquā deserit ti-
mor: ita eorum phantasmata præter naturā, non sem-
per eodem genere cōtinentur. Siquidem alius se testā
factum putauit: atq; iccirco obuiantibus cedebat, ne
collideretur. Alius, ne Atlas, qui mundum sustinere di-
citur, grauatus sub tāto onere, illum à sese excuteret,
atq; ipse cōminueretur cum eo, pertimescebat. Diffe-
runt porrò inter se melancholici, nam omnes timent,
mœrent, vitam damnāt, odio habent homines, sed nō
omnes mori cupiunt. Quippe hoc ipsum nōnullis me-
lancholiæ caput existit, quod pertimescunt mortem.
Sunt qui simul & mortem metuant, & mortem sibi cō-
ciscant. Quemadmodum igitur externæ tenebræ pa-
torem inducunt, sic atræ bilis color, mentis sedem te-
nebris similem reddens, timorem efficit. Siquidem tū
humores, tum ipsa temperies corporis, possunt animæ
actiones mutare: id quod à nobis est demonstratum,
in eo libello cui titulus est, q̄ mores animæ corporis tē-
periē sequantur. Ergo si circa ventriculum prima ince-
perint ipsius morbi symptomata, quibus auctis melan-
cholica sequatur affectio: deinde alui deiectione, vo-
mitu, proba coctiōe, ructibusq; leuetur is qui laborat,
hypochondriacum, flatuosumq; ipsum morbum voca-
bimus. Accidentia verò ipsius dicemus & mœsticiam,
& metum. Vbi verò propria melancholiæ accidentia
esse auctiora videntur: circa ventriculum autem aut
nulla, aut perexigua cernuntur: haud ab re existimaue-
ris, primitiuam in cerebro affectionem consistere, ob

atram in ipso bilem congestam. Quem morbum minime inueteratum, frequentibus balneis, victuq; humido & boni succi, nullo alio præsidio adhibito, ipse aliàs curavi. Nam ubi diuturnus ipse morbus est factus, fortiora remedia postulat.

Melancholiam recentem qua victus ratione curavit Galenus.

C A P. V.

MOrbus comitialis similiter ut melancholia, tribus clauditur differentiis. Verum omnibus commune est, quod afficitur cerebrum, siue primaria, affectione, siue consortii lege. Prima igitur differentia existit, ubi affectus in ipso consistit cerebro: id quod pluribus epilepticis accidit. Secunda, ubi ab ore ventriculi per consensum dispositio ascendit ad cerebrum, quemadmodum per suffusiones contingit. Tertia denique, fit raro, quum à parte alia quavis ipse affectus incipiens, inde, sentiente id ægro, ad cerebrum usque perrepat. Quale genus morbi ipse adhuc adolescens primum vidi in puero tertium decimum ætatis annum agente. Qui sanè narrabat, dispositionem ipsam à crure initium capere: mox illinc recta ascendere per femur & eminentes ei lumbos, ac per latus id, ad cervicem, donec perveniret ad caput: quod quum primum tangeret, ipsum haudquaquam sibi constare. Interrogantibus autem medicis, quale esset quod ferebatur ad caput, nihil habuit quod responderet puer. Alius tamen compos mentis dicebat, veluti frigidam quandam auram existere. Vnde ex duobus alterum Pelopi præceptori placuit: aut quod qualitas quædam, alteratis per continuationem partibus, aut spiritalis substantia transmitteretur: nec mirandum esse dicebat, tam validam vim esse humori, in affecta particula præter naturam genito, ut cum perniciosarum ferarum venenis componi posset. Etenim ubi phalangium momordit aliquem, quod vis parvum existat animal, existimare tamen debemus, venenum ex ipsius ore, primum quidem, in superficiem: dein verò in totum corpus deferri. Præterea marinæ

Epilepsie tres differentie.

Pelops Galeni præceptor.

Phalangii morsus.

Turturis mari
nae aculeus.
Scorpiōis acu
leus.

Scorpiōis ve
nenum refrige
rare.

Scorpiōis venena
tis bestiis par
ticulae, quomo
do sint curandae.

Epilepticae ab
altero crure ex
ortae curatio.

Epilepticae.

Singultus quā
excitetur.

Convulsionis
epilepticorum
causa.

turturis, sicuti & terreni scorpionis aculeus, quā in ex
tremam illam, acutissimamque partē, finiatur, vbi nul
lum foramen est, per quod venenum deiici possit: ne
cessum tamen est, ut excogitemus substantiam quan
dam inesse illi, aut spiritalem, aut fluidam, quā ut mo
le minima, ita facultate est quā maxima. Siquidem quā
nuper fuisset quidam ictus ab scorpione, videor mihi
esse (inquit) percussus grandine: eratque omnino frigi
dus, frigidusque sudore perfusus. Quippe vbi ex icta par
te per totam ipsam celeriter distributa fuerit veneni
vis, contingit eam, eodem rursus contactu, in singulas
subiectarum ei partium recipi: mox ex illis in alias con
tinuas, donec in aliquam peruenerit principem: quo tē
pore, mortis periculum instat. Ad hanc rem in primis
conferunt vincula partibus supernis iniecta, abscisioque
partium venenatarum. Noui equidem rusticum, qui
epoto ē viperis medicamēto, rescisso prius digito, eua
sit: sicuti & alium quendam, qui sola sectione, citra me
dicamen, est liberatus. Sed epilepticum illum puerum
medici quoque sanarunt, primò quidem vniuersum ei
corpus purgantes: dein medicamen ex thapsia & sina
pi, parti primò affectae adhibentes: ac supra illam me
dium membrum ligantes. Quod verò ad causam per
tinet, ob quam in huiusmodi per consensum affectibus,
epilepticae conuulsiones fiant: probabile sanè mihi vide
tur, quemadmodum frequētissimè singultum fieri vi
demus, affecto stomacho, ita hanc oriri dispositionem.
Etenim quum ventriculus ciborum mole grauatur,
aut vbi à corruptis cibis mordicus infestatur, singultu
haud dubiè corripit. Immo verò acris humor ipsum
ventriculum mordicans non singultum modò, sed con
uulsionem etiam, per vniuersum excitat corpus. Quo
eiectione per vomitum, illico conuulsio sedatur. Quo mi
nus mirandum est, si neruorum principium motu hu
iusmodi concutiat, ut à se expellat, quicquid fuerit

id, quod à parte primò affecta, ad ipsum trāsmittitur. Vbi verò deperdito sensu quis cōciderit, non acciden-
te motu, quo vel cōuelli, vel salire videatur, affectum
ipsum oriri à frigore censeo. Quo in genere cōtinetur
lethargus. Apoplexiæ autem, q̄ subito eueniat, aut fri-
gidum, aut crassum, aut viscidum quippiam, quod affa-
tim principes cerebri ventriculos impleat, non totius
substantiæ intemperiem, causam esse ē perspicuum: ve-
luti lethargi, phrenitidis, maniæ, melancholiæ, stulti-
tiæ, amissæ memoriæ, sensuum hebetationis, & resolu-
ti motus. Porrò in omnibus his affectibus, in quorum,
numero apoplexia cōtinetur, periculi magnitudinem,
ex nocumento respirationis coniciere oportet. Siqui-
dem in cunctis soporosis affectib⁹, & si corpus nec mo-
ueatur, nec sentiat, sola tamen spiratio quæ musculo-
rum * thoracem mouentium est munus, seruetur.
Porrò musculis vniuersis, principium motus ab innat-
is ipsis nervis accedit, qui à cerebro initium primariū
fortiuntur. Quāuis enim ex medulla spinali permulti
oriri nervi videantur, vni tamen quam habet illa, ce-
rebrum ipsi omnem suppeditat. Quum itaq; spiratio-
nem vehementer impeditam conspexeris, non parua
in cerebro morbidam dispositionem esse coniicies, p-
cipue in soporosis affectibus: qui omnes consistunt in
cerebro.

CAP. VI.

Affectus vertiginosus siue primariò, siue lege con-
fortii accadat (quod solet ob cōsensum ventricu-
li) ad cerebrum ipsum pertinet. Quo detenti, vel à mi-
nima occasione hebetantur: adeò, vt interdum cadāt,
si vel ipsi vnico duntaxat circuitu in gyrum agantur,
aut quippiam aliud circūrotari viderint. Est autem ra-
tioni consonum, huiuscemodi affectionem fieri, elato
per magnas illas arterias, quæ plexum retiformem cō-
stituunt, uapido, calidoq; spiritu, atq; cerebrum ipsum
replente. Fieri etiam potest, vt inæqualis intemperies

Lethargus.
Apoplexiæ cā.

Apoplexia o e
cupate, pericu-
li magnitudo
ex nocumento
respiratōis col-
ligi debet.
Nervi oriūtur
a cerebro, mu-
sculisq; princi-
piū motus lar-
giuntur.

Soporosos af-
fectus oēs cōsi-
stere in cere-
bro.

Vertigo ad ce 8.
rebrū ptinet.

Vertiginis cā.

9. Cephalæa qd.

cerebri, huiusmodi spiritum gignat. **CAP. VII.**Cephalalgia
et cephalæa di-
scrimen.

Cephalæa (qui affectus ad cerebrum etiam pertinet) est capitis dolor diuturnus, difficulterq; solubilis, q; à parua occasiōe vehemētes possidet accessiōes, ita vt qui eo torquet, neq; strepitū, neq; uocē, neq; luminis splendorem, neq; motū perferre possit, sed tranquillitatem, obscurumq; cubiculū quærat, idq; ob doloris vehementiam. Adhæc, accessiones huiusmodi, veluti in comitiali morbo, intermissiones habent, interceditq; tēpus, quo perfectè liberati videntur ægri.

Differt autem à cephalalgia, q; in hac nō vsq; adeò imbecillæ reddantur partes affectæ, vt in cephalæa, licet in utroq; affectu caput minimo negotio afficiatur. Sūt tamen nonnulli, quibus caput aptissimū est vt impleatur: atq; vniuersi quoq; corporis habitus ad ipsum implendum idoneus. Alii, omnes capitis partes aptas habent, vt afficiantur. Quibus, vbi vitioso victu vtūtur, accidit vt cephalæa arripiantur. Quo minus mirandū

Caput itra cal-
uariam dolen-
tibus dolor us-
q; ad radices
oculorum extē-
ditur.

est, si horum aliis membranæ cerebrum continentes, dolore afficiantur: aliis pericranium duntaxat. At quibus itra caluariam est dispositio, iis ad oculorum vsq; radices, ipse dolor extenditur: quod nimirum à cerebro, & ab utraq; membrana, necnon à vasis quæ in ipsis sunt, veluti germina quædam illuc deducātur. Sed & eorum quibus dimidia capitis pars dolore infestatur (vocantur autem ii hemicranici) alii extra caluariam, alii in capitis intimis partibus dolorem percipiunt. At verò dextram capitis partem à sinistra distinguunt sutura per longitudinem ipsius exporrecta. Sub qua, intra capitis ossa, linea medium cerebrum diuidens manifestè protenditur, ad quam etiam peruenit anteriorum duorum ventriculorum septum. Ea porro corpora suaptè natura idonea sunt, vt ipsis caput impleatur, in quibus vaporosus, calidusq; spiritus gignitur: aut quibus biliosa excrementa cumulantur

Caput quibus
impleat facile.

in ore ventriculi. Atqui spiritus, dolores tenuos pariunt: biliosa excrementa, dolore mordaci afficiunt.

Dolores à plenitudine iaducti, grauitatis sensum præ se ferunt. Quòd si rubor adsit & calor, calidos in cā eē humores est signum. Sunt quibus caput assidue dolet, vbi vel liberalius vinum igesserint, vel meracius: idq; magis, si suapte natura calidum fuerit. Præterea calidi odores omnes, atq; in uniuersum odorata omnia, capiti dolorem conciliant. Nōnullos autem ob sensus exuperantiam dolor infestat: quemadmodum in ore ventriculi accidit.

Odorata oīa conciliare dolorem capitis.

CAP. VIII.

AT verò, si aliquando per totum corpus, neruorum actio vitiosa redditur, ipsorum eē affectum principium cōstat: id quod ex sola dignosci potest anatomicè. Quū igitur oēs pariter nerui, tū sentiendi, tū mouendi vim amiserint, affectus is apoplexia appellat. Vbi verò alteri lateri, aut dextro, aut sinistro id accidit, resolutio nominatur, eius scilicet partis, in qua consistit affectus. Quòd si in aliquo membrorum idem euenerit, eiusdem resolutio dicetur. Cæterū omnes animātis partes sub ceruice positæ, quæ à consilio & voluntatis imperio moueri possunt, neruos habent qui eas moueant, procedentes ab spinali medulla. Porrò nerui qui mouent thoracem, ab ea spinæ parte quæ in ceruice est, exoriuntur. Si itaq; tota spina transuersim dissecta fuerit, omnes quæ sub ipsa sunt corporis partes, sensu motuq; priuantur: & per eam nimirum facultas sentiendi & mouendi pro arbitrio, deferatur à cerebro. Quòd si transuersim ad medium vsq; secundum longitudinem ipsa spina incidatur, non omnes suppositæ corporis partes, sed eæ duntaxat, quæ è regione sectionis sunt, resoluentur: dextra quidem, dextra spinæ parte dissecta: sinistra verò, sinistra. Videtur autem huiusmodi resolutionum aliquæ, faciem quoq; infestare: sed tum resolutum latus ad alteram faciei partem

Apoplexia qd Resolutio qd.

Nerui mouentes thoracē, a colli spina exoriuntur.

Spinæ læsionibus, quo pacto subditarum illi partium læsiones rīdeāt.

10.

Apoplexia om-
nibus actiōibus
animalibus noxā
infert.

Spiratio pes-
sima quā sit.

Apoplecticos
mori, q̄ priuē-
tur respiratio-
ne.

Resolutio prae-
cipue dī, vbi
motus periit.

Odoratorū sen-
sus in anterio-
ribus pficitur
cerebri finib⁹.

retrahitur. Quum igitur nerui qui in faciei partes di-
spersi sunt, à cerebro oriantur, sanè si earum aliqua si-
mul cum toto corpore resoluta sit, scire oportet reso-
lutionis dispositionem in cerebro ipso consistere. Vbi
verò illasæ permanferint, haud dubiè, spinæ initium
afficitur. Accidit verò nonnullis, vt faciei partes solæ
afficiantur, vt lingua, oculus, mandibula, & labrum.
Quippe nō omnibus ab vno loco principium influit :
quum ex diuersis cerebri partib⁹ suos neruos recipiāt.
Igitur apoplexia omnibus actionibus animalibus no-
xam inferens, cerebrum affectum esse manifestè decla-
rat. Discernitur autem magnitudo affectionis, ex no-
xæ quam spirationi infert, vehementia. Quum enim
naturalem ordinem plurimum egreditur, magnam :
quum verò paulūm impedimenti est, paruum in cere-
bro noxam esse, conicere oportet. Sanè omnium
pessima spiratio putanda est, quæ & intermittitur, &
magna cum violentia trahitur. Siquidem ob id contin-
git mori apoplecticos, q̄ spirare nō possint. At verò,
vbi pars aliqua conuulsa est, neruus ei motioni deputa-
tus, aut musculus, necessariò est affectus. Potissimum
autem dicitur resolutio neruorum, vbi motus deper-
ditus est. Vbi verò partium aliquarum sensus periit, eā
partem sensus expertem esse : resoluta in autem, non
vsq̄ adeò dicimus. Quāq̄ perinde est, vt quisq̄ eam
nominare voluerit, modò sedem affectam, simulq̄ il-
lius dispositionem inueniat.

CAP. IX.

Vbi olfaciendi vis læditur, non eorum meatuum,
qui in naribus sunt, sed vel anterior cerebri ven-
triculorum, quum aliqua intemperie laborant, est no-
xa: vel eorum meatuum, qui in ossibus colatoriis con-
sistunt, si aliquando obturentur. Siquidem odo-
ratorum sensus, in anterioribus perficitur
cerebri finibus, elatis ad ipsos, per fo-
ramina colatori ossis vaporib⁹.

GALENI PERGA

MENI DE LOCIS AFFECTIS.

LIBER QVARTVS.

C A P. I.



AT Verò oculorum interdum quidē
sensus, interdum motus, ac nonnunq̃
vtraq̃ functio resoluitur: idq̃; nunc
in altero nunc in vtroq̃ cōtingit ocu-
lo. Est quum solius palpebræ vel sen-
sus, vel motus læditur. Vbi igitur nul-
lo malo apparente in oculo, perierit facultas cernēdi,
neruo in ipsum descendenti à cerebro, causa tribuēda
est, nimirum vel inflammato, vel indurato, vel quomo-
docūq̃ aliter ob humorum affluxum læso, obstructio
ue secundum proprium foramen. * Quæ omnia acci-
dere illi tanq̃ organicæ parti, necessum ē. Nā tanq̃ pars
similaris, octo intemperiebus vexatur. Præter has cau-
sas exoluti oculorum sensus, ē alia, vbi nihil omnino,
vel exiguum admodum visifici spiritus à principio (qđ
in cerebro consistere putandū est) ad eos descenderit.
Si verò vteruis oculorum, motum duntaxat amiserit,
secundæ copulæ neruum, qui à cerebro oritur, mole-
stari, est necesse, ab aliq̃ videlicet eorū affectuū, qđ alteri
neruo, qui à prima coniugatione oriū, & cui soli meat⁹ cō-
spicius inest, nuper accidere diximus. Quia verò mu-
sculi oculum ipsum mouentes senario numero cōstāt,
ac præter eos alii quoq̃ adsunt, qui descendentes in
ipsum amplectuntur optici pori radicem, vt videlicet
oculum retrahant, & firmēt, nec mollis ille nervus, in
processu peruertatur aliqua ex parte, accidit sanē in-
terim, hoc ipso neruo nequaq̃ læso, musculorū aliquē,
aut in propria essentia, aut in neruo ad ipsum descen-

Visum quibus
modis exoluti
contingat.

Oculorum mo-
tum vnde pe-
rire accidat.

Opticis ner-
uis solis inesse
cōspicuos mea-
tus.

Oculo mouen-
do musculi
sunt sex tribu-
ti.

2.

Oculi quotu-
pliciter pos-
sunt perverti,

Oculis sursum
aut deorsum p-
uersis obiecta
videri dupli-
da,

Palpebre quo-
tupliciter, per-
uertantur.

Oculorum af-
fectus per con-
sensum orti.

Suffusiones quo-
differant a va-
poribus ad o-
culos a ventri-
culo elatis.

dente, contristari ab aliquo dictorum affectuum. Siqui-
dem singulis eorum musculorum, pars quædam nervi
à secunda coniugatione orti, transmittitur. Quñ itaq;
sex inueniantur mouentes oculum muscoli, si is quidē
qui ipsum ad superiora trahit afficiatur, tot⁹ oculus de
lapsus videbitur. Si verò is qui ipsum detrahare solet,
affectus sit, oculus sursum tractus cernetur. Sic si vitie-
tur minoris anguli musculus, ad maiorem: si verò hic
læsus sit, ad illum inclinat oculus. At si voluentium mu-
sculoꝝ quispiam sit resolutus, obliqua totius oculi con-
uersio ædetur. Cæterum resolutis musculis circundan-
tibus mollem neruum, procidet totus ocul⁹, atq; à sua
sede mouebitur. Porro quum oculi à sede sua deturbā-
tur, si ad alterutrum angulum peruersio fiat, innocua
permanebit cernendi vis. Si verò aut sursum, aut deor-
sum, aut in obliquum quoq; vertantur, quicquid ipsis
obieceris, id omne duplum esse videbitur. Ex musculis
supernam mouentibus palpebram (nā inferior immo-
bilis est) si is qui sursum eam retrahit, resolutus sit, la-
xam efficiet illam, adeò vt oculus aperiri non possit.
Si verò qui eam detrahunt (gemini enim hi sunt) exol-
uantur, oculus claudi non poterit. Quorum si alter affi-
ciatur duntaxat, ad oppositum musculus palpebra re-
flectetur. Hi sunt partium oculi peculiare affectus, qui
latentibus locis insident. Ac sunt præterea alii, qui ex
aliis partibus ei per consensum adueniunt: nempe aut
oris ventriculi, aut cerebri cognatione. Cuius generis
sunt symptomata suffusioꝝ visis similia. Cæterum visa
ob humorum in ventriculo contentorum vitium ob-
orta, vtriq; oculo similiter accidunt. Quæ verò p suf-
fusiones apparent, nec incipiunt simul in vtroq; nec
similiter. Præterea, si tribus quatuorue mensi-
bus suffusionis accidentia apparuerint, pupilla autem
pura splendidaq; cernatur, ab ore ventriculi nasci affe-
ctum ne dubites. Si verò non ita multum temporis in

tercesserit, quærendum est in primis, num ex quo incipit affectus, singulis diebus perpetuò hæc apparitio persuerarit. Nam assiduitas suffusionem portendit: intermissio autem, quæ malum à ventriculo prodierit, suspicionem excitat: id quæ; magis, si perfectè quis concoquens, nullum sibi visum apparere fatetur: ac multò magis, si quum apparuerint tales imagines, mordicus in ore ventriculi doluit: maximè verò, si post hæc, vomendo, eiecta re mordente, mitigata accidentia fuerint. Quin et, si à ventriculo symptoma id exoriatur, medicamine ex aloe potui dato, minimo negotio curatur, accedente simul proba coctione: Vbi verò altera pupilla tenebrosior, aut turbidior, aut non exactè pura aspicitur, suffusionis esse initium censendum est. Similia quoque suffusioni accidentia in quibusdam phrenitidis speciebus (affecto scilicet cerebro) sæpenumero euenire solent. Sunt etenim phrenitici quidam, qui de iis quæ oculis offeruntur, rectè (quantum ad sensitivam notitiam pertinet) iudicant: cogitando verò, à naturali iudicio aberrant. Alii rursus, cogitatione quidem falluntur minimè: sensibus, tamen hallucinantur, id quod mihi olim contigisse videtur, quum ardenti febre laborans, & floccos vellerem, & in vestibus festucas colligerem, id quæ; animo constans. Sunt præterea qui simul sensus & cogitationis vitio laborant. Porro vbi in cuiuspiam cerebro biliosus succus abundat, accedit quæ; febris ardens, ab illo oritur tunc fumus, veluti in lucernis ab oleo: qui, per vasa quæ ad oculum tendunt, delapsus, earum imaginum in ipsis esse causa censetur.

CAP. II.

IN lingua etiam, interdum motum ipsius, interdum sensum, interdum vitari quoque tactum cōtingit. Nontamen alio gustus, atque alio tactus nervo utitur. Siquidem nervi à tertia coniugatione orti, qui in linguæ pelliculam disseminantur, non solum tangēdi, sed

Hic a pica
cui affectui cō
ueniat,

Phreniticorū
varia sympto
mata.

Lingua recipit
ab iisdē nervis
tertiæ cōiuga
tionis, qui in il
lā descendunt,
simul gustū &
tactum.

Sensoria, quæ
qbus sensibus
sunt crassiora,
aut tenuiora.

Facies unde
suos nervos re-
cipiat.

Caros.
Sopor.
Apoplexiæ so-
lutæ solet pa-
ralysis succe-
dere.
Sopor fit affe-
ctis musculis
temporum.

gustandi etiam vim obtinent. Crebrius tamen læditur gustandi quàm tangendi facultas, quum ad gustum exacto iudicio sit opus. Etenim tangendi sensorium, crassissimum, ut cernendi, tenuissimum est. Auditus verò sensorium, ut in tenuitate à visu: ita sensorium gustus in crassitudine, à tactu secundum locum obtinet. Olfaciendi verò sensorium, in illorum quatuor medio consistit. Igitur quum posterior cerebri pars tam dextra, quàm sinistra, afficitur, ne apoplexia hominem rapiat, timendum est. Vbi autem altera tantum, in paralyin finiri solet: quæ interdum alteram solum linguæ partem motu destituit, illæ solum ipsius tum gustu, tum tactu: interdum partes sub capite constitutas, modò has, modò illas. Quum autem à parte anteriore cerebri facies suos nervos recipiat: à posteriore verò omnes partes quo sub capite sunt: à qua etiam oritur septima coniugatio nervorum, qui inserti in musculos linguæ, voluntarium illius motum perficiunt: non ab re quidè anteriore cerebri parte altera affecta, sola linguæ motio vitio carebit: reliquæ verò faciei partes omnes, in altera parte, dextra aut sinistra, sensu & voluntario motu destituentur. Quemadmodum si afficiatur posterior pars cerebri, reliquarum partium faciei incolumi simul & motu & sensu, solius linguæ motus vitiabitur. Quod si aliquando tota anterior cerebri pars afficiatur, supremum ipsius ventrè ei consentire necesse est: atque cogitandi quoque actiones vitiari. Proinde qui ita est affectus, nec sentit, neque movetur: spirandi tamen facultas haudquā in illo læditur: vocaturque hic affectus caros, siue sopor. Qui si vehementer spirationem opprimat, apoplexia nominatur. At solutæ apoplexiæ creberrimè solet paralyis succedere. Sopore verò finito, magna ex parte bona valetudo subsequitur. Fit autem sopor Hippocrate auctore, affectis musculis temporum, atque in acutis morbis. Inter soporem & apoplexiam, morbus comitialis.

LOCIS AFFE. LIB.III.

159

est medius: conuulsionem vniuerso corpori inducēs: sed in paralyfin non definit. Quorum trium morboꝝ, frigidus, crassusq; aut omnino viscidus humor est causa. Verum & in sopore, & in morbo comitali, vētres magis, cerebri corpus minus: in apoplexia vero, corpus magis affici solet. Atq; in sopore anterior pars magis: in apoplexia & morbo comitali, vtraq; afficitur. In catalepsi & vigilantī sopore, posteriora cerebri magis læduntur. Quum autem osse aliquo terebra perforato, medius ventriculus fuerit attritus, sopor hominem occupat: sed neq; conuulsione, nec difficili spiratione oborta: hæc enim apoplexiæ: illa morbo comitali est affinis: haud secus q̃ catalepsi, soporiq; seruata secundum naturam spiratio. Verum vt in sopore clauduntur palpebræ, ita in catalepsi manent apertæ. Iam vero vehementes dolores sopor sequi consuevit, concidente videlicet robore aialis spiritus: quod primum animæ instrumentum existit in vētriculis cerebri, indeq; fluens per nervos defert motum & sensum i vniuersas corporis partes. Igitur affectuum linguæ, alii q̃dem illi communes sunt, * ob commercium quod habet cum cerebro & nervis. Alii ipsius dūtaxat proprii censentur. Quæadmodū ergo consortii lege, per septimam neruorum coniugationem motus ipsi vitatur, sic sensus impediri potest per tertiam, quæ & mollis ē, & in pelliculam illius, sicuti septima in musculos, disseminatur. Quod verò ad proprios illius affectus pertinet, sicuti muscutorum eius, vt simularium, intemperatiæ motum impediunt, ita ambientis ipsam extrinsecus membranæ intemperies, & tangendi, & gustandi simul sensum vitiat. At instrumentalium affectionum speciem referunt inflammationes, scirrhi, oedemata, erysipelata, suppurationes, & alia id genus. De quibus quia visu & tactu discerni possunt, nihil in hisce commentariis dicemus. Vt autem de ipso auditu nonnihil

Epilepsia.

Cerebri corp^o magis affici in apoplexia, q̃ i morbo comitali, & sopore, in his autē ventriculos magis

Catalepsi detēti dormiūt apertis palpebris. Sopor consuevit sequi vehementes dolores. Animalis spiritus est primum instrumentum animæ.

Lingue proprii morbi qui sunt

Audiendi facultas unde possit lesionem accipere

Nervus tertia coniugatio in quas partes distribuitur.

Resoluto alicuius particulae musculo, pars ipsa in contrariam trahitur.

Latus musculi unde nervos recipiat.

inferamus sermoni, si illaeso apparente aurium foramine, sola audiendi facultas laeditur, nervum proprium esse affectum, licet existimare. Vbi verò reliquæ faciei partes simul cum functione audiendi laeduntur, in cerebro esse dispositionem præter naturam, est verisimile: ipso vel ut similari, vel ut instrumentali parte affecto. Memineris autem velim, temporum, maxillarumque musculis, item labris & narium pinnis, sensum & motum: linguæ verò, omnibusque oris partibus, sensum dumtaxat, à tertia cerebri coniugatione oriri: à secunda, oculorum musculis motum: ut à prima, oculis ipsis cernendi sensum suppeditari. Vbi igitur universæ particulae, quibus à tertia coniugatione inferuntur nervi, oblaesa in altera tantum parte videntur, communem nervum primario affectum esse putandum est. Si verò utraque simul partem laedi contigerit, non nervi proprius, sed loci cuiuspiam in cerebro, à quo nervi procedunt, est ipse affectus censendus: ac tunc sanè omnes vicinae partes simul affici consueverunt: proinde & quartæ & secundæ coniugationis nervi: unde sequitur ut oculorum quoque partes laedantur. Quod si unus dumtaxat vel musculus, vel nervus quoquo modo siue primaria affectione siue per consensum, affectus fuerit, pars ipsa in aduersum trahetur musculum. Nam resoluto musculo qui dextram partem labri mouet, ipsa ad sinistram flectitur. At si is qui sinistram mouet resoluitur, ipsa trahitur ad dextram. Haud secus & totam mandibulam, & narium pinnae, & genas, quæ à lato mouentur musculo, in aduersam partem flecti contingit. * At latus musculus, non recipit nervos à tertia coniugatione. Sed nervi à cervicis vertebris procedentes, in illum ferè totum disseminantur, exigua ipsius parte, sublimiori que, excepta, in quam deferuntur nervi à quinta coniugatione.

CAP. III.

Porro

Porrò vbi afficiuntur priores vertebræ spinæ, licet rarò, euenire tamen interdum angina potest, idq; in pueris magis q̃ in adultis: nimirū ob ipsas vertebras ad iteriora luxatas: quemadmodum Hippocrates ait, secundo de Popularibus morbis. Cæterum per huiusmodi anginas guttur nullo proprio affectu laborat. Quum autē spinæ partes, quo fuerint altiores, eo sint præstantiores, sanè quo affectio fuerit inferior primis duab⁹ vertebris, eò inferet multò minorem noxam. At nerui septi transversī sub quarta & quinta vertebra oriuntur. Ab eo autē solo sit spiratio * lenis, accedēte intercostaliū musculo actione, vbi vehemēntiori ē opus respiratione: quæ si vehementissima requiratur, supremos etiam musculos concurrere oportet. Porrò vbi vnica duntaxat vertebra, aut etiam duæ, aut tres, se se consequentes inuicē, distrahunt, ea parte spinā cauari cōtingit. Vbi uerò inter distractas vertebras, vel vna, vel plures, illæ sæ manserint, sic affectis gibbus accidere solet. At si in alterutram partem, vel dextram, vel sinistram, distrahatur vertebra, ibidem in obliquū spina torquebitur. Cæterum alia sequuntur symptomata, vbi proprio affectu laborat spinalis medulla: & alia vbi vna vel plures vertebræ afflicte luxantur. Nam quum proprio affectu spina ipsa affligitur, citra vertebrarum aliquam luxationem, si quidem in altera duntaxat parte afficiatur, omnium inferiorū corporis partium, quæ ē regione nocumenti consistūt, tam sensus q̃ motus læditur. Si verò vtraq; pars sit affecta, omnes particulæ, tam in dextra, q̃ in sinistra regione, ei quæ affecta est, subiectæ, similiter resoluuntur. At luxata, vel ad gibbum, vel ad concauum vertebra, fieri potest, vt nulla omnino partium inferiorum, vel in sentiendi, vel mouendi functione, aliquod vitium percipiat. Per angulosas tamen luxationes spinæ, subiectas omnes particulas lædi est necesse. Paulatim verò facta luxatio

Anginā aliquā ob vertebras luxatas accidere.

Spine partes altiores, præstantiores existere. Septum transversum solum perficere lenē respirationem.

Gibbus vnde accidat.

Spina proprio si laboret affectu quid accidat.

Angulosæ luxationes spinæ sunt nocentiores iis quæ in orbem, atq; paulatim fiunt.

Luxatiōes spi
nae obliquae.

Luxatio verte
brarum vnde
possit accide
re.

Anginae gene
ra quinque.

ne, atque in orbē magis, nihil notatu dignū patiunt par
tes quae cōmotae vertebrae subiiciunt. Sed in obliquum
luxatio, laedit oīno eas partes, ad quas nervi ex luxatis
vertebris procedētes, pueniūt: idque magis in ceruice: ī
thorace minus: sed multo min⁹ in lūbis accidere solet.
Si quē in ceruice, vertebrae iter se cōnexae, equaliter vtrāque
foramini pferūt vnde neru⁹ procedit: in thorace autē,
superior magis, inferior minus: sed in lūbis, tot⁹ nervus,
ex superna excidit vertebra. * Quare in eis transuer
sa vertebrarum luxatio, vnā secum trahens & medul
lam, & neruum, illa sum seruat naturalem ortū ipsius.
In ceruice autem, ex loco medio inter duas vertebrae
procedentes nervi, per obliquas luxationes, in e quī
dem parte, ad quam spina deflectitur, opprimuntur: in
altera verō, tenduntur. Rursus tensiones quidem, vbi
ingens quoque inflammatio accesserit, conuulsio comi
tatur. Ad compressiōes verō, earum partium ad quas
oppressus nervus descendit, sequitur resolutio. Igitur
per eas quas nuper diximus vertebrarum luxationes,
reliquae faciei partes omnes, neque in sensu, neque in mō
tu, noxam subeunt. Solae autem genae laeduntur, vt
quae mouentur à lato musculo. * At vertebrae solent
luxari, aut ob casum, aut ictum, aut tumorem: praeter
naturam, nervosa corpora vertebrae atque medullae co
gnata, extendentem. Vt autem in praesentiarum, ali
quid de angina dicamus, Hippocrates affectus omnes,
qui cum spiratione difficili, guttur aut fauces infestāt,
cynāchas, hoc est anginas appellat. Ac sunt quidem an
ginae genera quinque. Primum est, vbi inflammātur fai
ces: hoc est, internus oris locus, vbi & gulae & gutturis
partes extremae coeūt. Secundum est, vbi nec fauces,
nec reliquae oris partes, nec etiam externarum partiū
vlla inflammata videtur: laborans tamen suffocatiōis
periculum in gutture sentit. Tertium, vbi extrinsec⁹
circa fauces inflammatio apparet. Quartum vbi guttu

ris partes tam externæ, q̄ internæ, similiter inflamma-
tæ videtur. Quintum deniq̄, quum ad anteriores par-
tes, colli luxantur vertebræ. Id quod sanè contingit,
vel solis musculis qui cum ipsis communicant, tumore
præter naturam affectis: vel nato ibi tuberculo: vel gu-
la pariter vitiata: nonnunq̄ musculis quoq̄ qui gulam
gutturi iungunt, propriis q̄; aliquando gutturis muscu-
lis, qui ipsum aperiunt, oblæsis. Hi igitur affectus om-
nes difficilem respirationem efficiunt, minimè tamen
in discrimen suffocationis adducunt. At ægri & diffi-
culter deglutiant, & dolent, tum præcipuè, quum eis
potus per nares resilit. Nullo autem spiritalium instru-
mentorum, nec primariò, nec per consensum affecto,
fieri minimè potest, vt spiratio lædatur. Quocirca ex
sola spirandi specie, illico nonnihil & de affecta sede, &
de ipsa dispositione, conicere licet. Quippe si videatur
laborans, inter spirandum, totum mouere thoracem,
vt in parte quidem anteriore, ad iugulum: in vtroq̄ la-
tere, ad ceruicem: i parte posteriore ad scapulas vsq̄,
motus ipsius ascendat: tres ex huiusmodi spiratione
dispositiones significantur. Vna est flammea in corde,
& pulmone caliditas. Secunda, in altero spiritalium in-
strumentorum angustia. Tertia, facultatis musculos
mouentis debilitas. Quū igitur huiusmodi spiratiōem
conspexeris, in primis arteriæ pulsationem perpēde-
re oportet. Hæc enim quantus sit calor, indicat. Dein-
de spirationem ipsam expende, an multa, an frequēs,
an exufflando fiat. Postremò thoracē in pectore tãge,
quem si præter cætera, ardentē inueneris, iam omnes
copiosi caloris notas te habere ne dubita. Quibus ex
abundantia accedit faciei, oculorum q̄; rubor, capitis
ardor, sitis vehemēs, lingua arida, salebrosa q̄; Vbi ve-
rò incendii signis modum seruantibus, thorax dilata-
tur vehementer, angustiam in spiritalibus instrumen-
tis esse portēdit. Solet autem imbecillitas accidere spi-

4.

Caloris copio
si notæ.

Angustia spi-
ritualium i instru-
mentoru quid
indicet.

Spine vnde ac
cidere imbecil
litas soleat.

nae, interdum cerebri vitio, utpote à quo & sentiendi,
& mouendi facultatem recipit: interdum ipsa dunta-
xat spina primario affectu laborante, idq; ob peculia-
rem intemperiem, vel toti spinæ, vel diuersis ipsi⁹ par-
tibus aduenientem. Igitur ob ipsius imbecillitatem spi-
næ, omnibus thoracis partibus solet aer inspirari, vel
nullo ardente calore ægrum ad id cogente. Siquidem
vbi animans quiescit, viresq; validæ sunt, liberam re-
spirationem solum septum transversum efficere solet.
Vbi verò id ob imbecillitatem, spirandi munus perface-
re nequit, intercostalium musculorum tunc concurrat
auxilium. Quòd si præterea maiori animal egeat spira-
tione, tunc superni musculi omnes, quorum maximi
scapulas secum manifestè mouent, ad spirandi actionem
desiderantur. Cæterum tametsi per spiritalium orga-

Narium pinnas
dilatari p im-
becillitatē tho-
racis.

noe imbecillitatē tot⁹ thorax moueatur, dilateturq;
narium pinnae, dilatatio tamen thoracis est minor, q̃
in ardentibus febribus: in quibus, si vires valeant, * to-
tus thorax plurimum dilatari cōsuevit: minorq; etiā,
q̃ in angina, & dyspnoea, & peripneumonia. Quippe
hoc morbo affecti, & maxima, & frequētissima spira-
tione vtuntur. At quemadmodum ob infirmitatē om-
nium organorum respiratiōis, sic ob vnus quoq; par-
ticulae imbecillitatem, omnes thoracis partes dilatari
coguntur. In vniuersum autem, vnica pereunte actio-
ne, solum musculum qui ipsam efficere solet, aut neruū
ipsius, esse affectum, putandum est. At vbi plures actio-
nes vitiatæ sunt in diuersis locis, accidit interdum om-
nes musculos, quibus perficiuntur, ab aliqua communi
causa esse oblaesos. Fieri etiam potest, vt neru⁹ aliquis,
qui musculis illis communis est, afficiatur. Verum si ex
anatomie ad quam particulam porrigantur singuli ner-
ui ab spina prodeuntes didiceris, affectas sedes q̃ facillē
inuenies. Sic enim quum ex refrigeratione prima-
rum vertebrarum spinæ, à quibus quatuor nerui ad

caput ascendunt, vt pericranio sensum largiantur, cuiusdam olim caput afficeretur, affecta sede explorata, illiq; remediis adhibitis, eum subito persanauimus.

CAP. IIII.

AT verò sanguinem è vètriculo gulaq; vomitione: ex spiritalibus partibus, tussi: ex faucibus, & gurgulione, sreatur: ex ore, simplici expuitione expelli, apud omnes medicos in confesso est. Nos verò sanguinem qui à cerebro affatim descendebat ad fauces, tusiendo educi sæpenumero vidimus. Quippe subito gutturi irruens, tussim mouere potest. Quare diligenter oportet huiusmodi affectus distinguere. Cæterū contingit plerunq; vt vel erosa, vel exesa, vel rupta vena, sanguis tusiendo, affatim cōfertimq; eiiciatur. At si spumofum aliquid simul eductum fuerit, efficacissimum est indicium, ipsum educi à pulmone. Haud secus, si bronchi pars quæpiā, aut arteriæ, aut venæ tunica: aut etiam pulmonis ipsius caruncula reiiciat. Quippe nihil horum accidit iis, qui ex thorace sanguinem tusiendo producant. Iam verò nullus dolor infestat eos, quibus à pulmone sanguis erumpit: vtpote qui duos nervos per q̄ tenues à sexta nervorum à cerebro ortorum coniugatione recipit, extrinsecus per membranam ipsum continentem dispersos: qui intrinsecus haudquaquam per visceris profunditatem extenduntur. Verū thoraci multi ab internis: multi etiam ab externis partibus adueniunt nervi, quibus facile dolores percipi possunt. Præterea thorax quidem est musculosus & ossulentus: pulmo verò & latus, & tutus à contusione. Proinde thoracis dolores intēsiore sunt: pulmonis remissiores. Quum igitur dolente parte quapiā thoracis, sanguinem quis spuendo reiecerit, nec multum, nec rubrum, sed nigricātem, grumofumq; huic thorax primaria affectione infestatur. At sanguis affecto thorace, per pulmonem educitur: vt in suppuratis.

Sanguis quaparte solet excerni.

Sanguinis à pulmone reiecti, indicia.

Dolor non infestat eos quibus a pulmone sanguis erumpit.

Pulmonis dolores cur remissiores sint, q̄ thoracis.

Sanguis, affectio thorace, p pulmonē educitur.

Pulmonis vlcera ægre curationem recipere.

Sanguisugam posse esse in causa fluxus sanguinis.

Sermonis organa.

Vocis instra.

Vox qua ex causa pite, aut vitari possit.

affectibus pus, quod inter thoracem & pulmonem deprehenditur: ad eūdemq; modum, quod in pleuritide coloratum sputum emitti solet, per pulmonem excernitur. Porro vlcera quæ sanguinis reiectioni solent superuenire, in pulmone quidem, ægrè curationem admittunt. At in thorace disrupta vala, à quibus sanguis expuitur, magna ex parte conglutinantur. Inuestigandum verò est, num ob adhærescentē sanguisugam, vel in ipso narium meatu, vel i illa oris parte, qua ad nares foramiē tendit, sanguis aut emungat, aut screeat. Ex vetriculo ēt cruor, epota hirudine, euomit. Qui cruor tñ est tenuis, saniciq; speciē referens: siue is ex vetriculo, siue ex naribus, siue ex ore feratur. **CAP. V.**

Quod non sit eadem res, vox atq; sermo, neminem ignorare existimo. Vox siquidem vocalium instrumentorum est munus: loquela verò, eorum quæ sermoni sunt deputata: inter quæ lingua principatum obtinet: cui non parum conferunt & nasus, & labra, & dentes. Sic etiam vocis instrumēta sunt guttur, & ipsum mouētes muscoli, ac nerui qui à cerebro ipsis mouendi vim deferunt. Igitur si vel claudentes, vel aperientes guttur muscoli, immobiles reddantur, qui sic afficitur obmutescet. Vbi verò vel difficulter mouetur, vel palpitant, vel tremunt, vel aliter afficiuntur, pro affectionis ipsius modo, vox ipsa lædatur. Quod si alius quispiam ex mouentibus guttur musculis, quoquo modo lædatur, vitiabitur quidem vox, sed exiguum. Quippe sic affectus, neq; obmutescet omnino, neq; ita paruam habebit vocem. Vt autem ex musculis guttur mouentibus, p̄cipui habētur ii, qui ipsum & aperiunt & claudunt, ita ex vocalib⁹ neruis, ii quos recurrentes vocant: qui & ipsi, sextæ coniugationis pars sunt neruorum, qui à cerebro oriuntur: quemadmodum & alii, qui quidem per ipsum dispersi, differūt ab illis, eo q̄ à neruis sextæ coniugationis, non in cer-

nice, sed quum ad thoracis regionem peruenerint, separantur. Per vulnera igitur recurrentes nervi refrigerati, tantisper vocem impediunt, donec calfacti, naturalem temperiem recuperarint. Præterea vitari vocem * in acumen & magnitudinem haud obscure contin- git, vbi fauces etiam à suis musculis contendit & conti- neri non possunt. Item grauisimè leditur vox, quum membrana faucibus gutturiq; continua, multa humi- ditate rigatur. Quòd etiam destillationes eadem ratio- ne vocem rauam efficiant, nemo non intelligit. Ve- hemens quoq; exclamatio similiter vocem offendit. Cæterum quum gutturi musculi interni inflammantur, angina is affectus dicitur, quæ simul & vocem, & spirationem lædit. Idem quoq; in vniuersum facere solent omnes præter naturam tumores, siue in spirita- libus viis exoriantur, siue extrinsecus ipsas cõprimât. Sic enim gula quoq; vbi inflammatione est affecta, vt comprimat asperæ arteriæ tunicam, qua cartilaginũ ipsius extremitates, sigmoides dictæ, iunguntur, & spi- rationi, & voci, noxam afferre consuevit: quemadmo- dum & vertebrarum cervicis in anteriorem partem luxatio. Igitur oēs huiusmodi affectus voci accidunt, propriis ipsius instrumentis vicio aliquo laborantibus. Sunt autem affectus, alii quàm peculiari sua materia pri- uatur: quæ sanè est, generaliter quidem loquendo, ex- piratio: secundum speciem verò, efflatio. Quæ quidem fit, quum spiritus affatim foras effertur, concurrenti- bus ad hanc actionem intercostalibus musculis. Proin- de accidit, vt per vehementia thoracis vulnera, atq; omnino ipsius in altera parte resolutiones, in primis q- dem semispirans, ac mox animal semiuocale euadat: idq; per accidens. In apoplexia verò, sopore, morbo co- mitiali, vigilanti sopore, cõmuni ratione earum actio- num, quæ ab imperio voluntatis proficiuntur, vocẽ lædi contingit. His itaq; quinque actionibus consequẽ-

Recurrentes ner- ui refrigerati, vocem impe- diunt.

Vox in acumẽ & magnitudi- nem quã vitioẽ.

Vox vnde ef- ficiatur rauca.

Angina offen- dit vocẽ simul & respiratio- nem.

Voci qui affe- ctus incommo- dent.

Vocis materia est efflatio. Efflatio quo- modo fiat.

Actiōnes inter
se conuenien-
tes sunt quin-
q; circa respi-
rationem.

Exspiratio.
Efflatio.
Efflatio stre-
pens.
Vox.
Loquela.

tia quadam inter se conuenientibus, expiratione, effla-
tione citra strepitum, strepenti efflatione, voce, & lo-
quela: si earum prima lædatur, reliquas omnes lædi ne-
cesse est. Vltima verò læsa, reliquæ haudquaquæ lædunt.
At cum secunda, tres oblæduntur reliquæ. Cum ter-
tia, duæ vltimæ. Cum quarta, sola postrema. Atqui ex-
pirationem efficiunt vniuersi thoracem contrahentes
musculi: efflationem (quæ vehemens exspiratio est) in-
tercostales maximè: strepentem efflationem, si qui in
faucibus sunt: vocem verò ipsam, gutturis musculi ab-
soluunt. At lingua articulat in vocem distinguens, lo-
quendi vsum largitur: ad quam rem nonnihil cōferre
videntur dentes, labra, narium foramina, palatū, gur-
gulio, mediocrèq; ipsius linguæ vinculum. Quorum
aliquod si fuerit vitiatum, vitiari quoq; sermonem
ipsum contingit.

CAP. VI.

VT autem ad causas dyspnoæ explorandas rur-
sus hic sermo redeat, si videris aliquem respiran-
tem ægrè, ita vt inter respirandum, thoracis omnes
moueantur musculi, pectusq; etiam, vnà cum scapulis
attollatur, certè ex tribus vnum cōiicere oportet:
aut virium imbecillitatem, aut viarum spiritus angus-
tiam, aut vehementem in corde & pulmone calidita-
tem. Quāuis interdum duæ, ac nonnunq; (licet raro)
tres quoq; ex iam dictis causis pcurrere possunt. Atqui
tribus quidem simul coeuntibus, proximam mortem
timere oportet. Vbi verò duæ fuerint, difficile ē ægrū
seruare. Sed vna duntaxat infestante, peculiari opus ē
finitione, vt sciatur, seruabitur ne æger, an ipsi malo
succumbet. Igitur vbi vires dūtaxat fuerint infirmæ,
ad tria mouentium musculorum genera venire, eosq;
omnes ad motionem excitare solent: vno genere *
vehementer mouere nequeunte. Quippe si septū trās-
uersum solū, veluti quum secundum naturam se ha-
bet, sufficienter mouere posset, utiq; nec intercostali-

Difficilis respi-
ratio i qua oēs
thoracis mouē-
tur musculi, a
quibus causis
oriri possit, in-
uestigatio.

bus, nec superioribus musculis idigeret. Quoniam vero imbecillum est, omnes sensim commouet: sed nec frequentem, nec admodum raram actionem efficit. At plurimum aucto in spiritalibus instrumentis calore, omnibus quidem thoracis musculis agit animal: sed velox, frequens, & vehemens, est eorum actio, si citra virium imbecillitatem ipse calor infestet. Virium autem imbecillitatem, ubi non accesserit flammea caliditas, nec velox, nec frequens omnino comitatur motus: proinde non ita multum omnes thoracis partes potest distendere. Præterea, ubi ob plurimum calorem spiratio est difficilis, spiritus quidam calidus, feruidusque efflatur. Vbi vero ob solam imbecillitatem, * nulla facta per os efflatione spiritus per nares tantum emittitur. Quod si per inspirationem cuiuspiam narium pinnae manifeste * dilatatae videantur, id sane efficax roboris prostrati est indicium. Ob spiritalium vero instrumentorum angustiam, totus quidem thorax * plurimum, celeriter, atque frequenter distenditur. Cæterum qui sic laborant, * absque vlla efflatione expirant. Si vero simul conuenerint in spiritalibus instrumentis & calor, & angustia (quod solet in peripneumonia) tunc sane nec maxima, nec frequentissima, nec etiam celerrima spiratio sufficere potest: sed surgere tentant ægri: quæ sic melius eis thorax dilatari videatur. Similiter solent respirare & ii, quibus asperæ pulmonis arteriæ, plurima defluxione opplentur. At neque efflant, nec calidum emittunt spiritum. Purulentis etiam totus thorax attollitur: sed neque ab eis fit efflatio, neque spiritus emittitur calidus, nisi forte adurens febris accesserit. Verum ii quæ celerrime suffocantur: tum ob plenitudinem ipsam, tum quæ vires omnibus purulentis necessario imbecilliores reddantur. Contra autem per anhelantes affectus, humoribus crassis & viscidis in ipso pulmone impactis, permanere possunt vires robustæ & constantes. Adhæc

Narium pinnae manifeste dilatatae inter respirandum, robur prostratum indicant.

Recti qui spirare soleant.

Purulentis qualis fiat respiratio.

Purulentis cur quæ ocysime suffocentur.

Tuberculū in
puluone ortū,
qualem respi-
rationem effi-
ciat.

Aeris inspirati
quātitas in qui-
bus nā respon-
deat magnitu-
dini dilatatio-
nis thoracis: &
in quibus ne-
qua aq̃.

Inspiratio su-
blimis, quæ.
Spiritus ma-
gnus & rarus,
delirium indi-
cat.

Spiratio exi-
gua simul, &
rara quid signi-
ficet.

Spiratio fre-
quens quid in-
dicet.

Apnoea.

Animal nō posse
vivere spirati-
one priuatum.
Latentia ani-
malia.

tuberculum coctū difficile aliquādo fuerit in ipso or-
tum, thorax maximè dilatabitur, sed non trahet ita
multum spiritum, ob idq; crebro spirare cogetur, *
verū absq; efflatione; quæ sanè aucti caloris est pro-
pria. Magna porro interdum fit respiratio, ob magni-
tudinem dilatationis, quam thorax molitur: interdum
verò, ob inspirati aeris multam essentiam. Igitur qui-
cunq; sine aliqua spiritalium instrumentorum angus-
tiam, per febres ardentes difficulter spirant, his inspira-
ti aeris quantitas, magnitudini dilatatiōis thoracis pro-
portione respondet. Quibus verò, vel tumor vel an-
gustia sine flammæ calore in spiritalibus est, i his, tho-
racis quidem dilatatio fit maxima, id verò quod in-
spiratur, non solum dilatationem proportionē non as-
sequitur, verū etiam minus, q̃ secundum naturam
inspirari solet, attrahitur. Cæterum inspiratio ea quæ
ob virium imbecillitatem fit omnibus agentibus mu-
sculis, dicenda est sublimis, nō magna. Tam verò mul-
tus spiritus, & ex longis interuallis attractus (quemad-
modum inquit Hippocrates) delirium declarat. Spira-
tio exigua simul & rara, spiritalium instrumentorum
frigiditytem: frequens verò nō solum spiritalium, sed
eorum etiam quæ cum ipsis mouentur, vt hepatis, lie-
nis, ventriculi, & gulæ, latorem indicat. Est etiam alia
dyspnœæ species, quum veluti breui quadam quiete
intercipitur opus thoracis: idq; modò in inspiratione,
modò in expiratione, siue hoc accadat ob conuulsionē
musculorum thoracis: siue ob caloris copiam, cogē-
tis ægrum continenter vel inspirare, vel expirare. Est
& alius spiratiōis affectus, apnœæ, hoc est, priuatio spi-
rationis, vocatus: Qui tamen constare nequit. Nam vi-
detur esse impossibile, vt animal omni spiratione ex-
actè priuatum, in vita seruari possit. Quāuis animalia
ea quæ in cauernis delitescere consueuerunt, mouere
thoracem videantur minimè. Proinde coniicere oportet

tet, aut adeò exiguam adesse illis respirationem, vt ef-
fugiat sensum: aut animalia eiusmodi, tunc non indige-
re respiratione, sed transpirationem illis sufficere, quæ
fit arteriarum motu per vniuersum corpus. Fieri au-
tem contingit apnceam, minimè quidem affectis respi-
rationis organis, sed principio à quo illa reguntur.

Trāspiratio fit
per arterias.

C A P.

V. I. I.

V Erum enim uerò pulmo nunq̃ vehementi dolo-
re cruciatur: at grauitatis sensum, atq; aliquando
extensionem, vel ad pectus, vel ad spinam (quādoqui-
dem inde suspēduntur membranæ ipsum ambientes)
percipere potest. Sæpenumero etiā pulmone affecto,
ægri molestant angustia, atq; ob id crebro celeriterq;
respirant & thoracem vehementer attollunt, sed non
ita multum aerem attrahunt. Hæc si citra febrem acci-
derint, aut tuberculum, aut plenitudinem crassorum
humorum in eo consistere, ostendunt. Cæterum si in-
ter respirādum ægri minimè videant stertere, idiesq;
augeatur symptoma, crudi tuberculi ortum suspicari
oportet. Si verò stertendo strepitum fecerint, lentox
crassorumq; humorum, pertinaciter impactorū, mul-
titudinem, pulmonis brōchia molestare est indicium.
Quod si illico ab angustia sensu quis difficulter respi-
ret, fluxionem vel à cerebro, vel à vicinis sedibus, ir-
ruere in pulmonis bronchia significatur. Porro si vbi
vehemens putrescit pleuritis, remissa iam febris excā
descendit, in imo thoracis æger derelictam grauitatē
percipiat, ac per varios decubitus, maximè dum repē-
te ab vno in alterum latus conuertitur, aliquid tran-
fluere sentiat, puris multitudinem ibi contineri, conie-
ctura est certissima: præcipuè si nihil penè expuerit la-
borans. Si verò citra febrem serosus aut pituitosus hu-
mor subito in thoracis spatium defluēs, excitauerit spi-
randi difficultatem, æger tunc tenue sputum, idq; ab
initio quidem exiguum, sed cum vehementi tussi: vbi

Pulmo nunq̃
vehementi do-
lore cruciatur.

8

Tuberculum
in pulmone or-
tum, quæ indi-
cent.

Puris in thora-
ce contenti in-
dicia.

Pauca est magna tussi expuuntur dupliciter.

Pulmonis inflammatio. Pulmonis erysipelas.

Pulmonis interperiei æqualis & inæqualis indicia.

Rupta esse vasa in pulmone unde deprehendimus.

verò concoctum est, plus atq; crassius, & cum mitiori tussi expuere solet. Quippe bifariam accidere potest, ut vehementer tusiendo pauca quis expuat: nempe aut ob lentum, crassumue humorem: aut ob impensè tenuem. Siquidem tenuis humor quum subleuatus est, inter tusiendum à spiritu diuisus refuit: lentus verò, aut omnino, crassus difficulter effertur: utpote qui non tã facile à corporibus, quibus impactus est, abstergi, neq; à quouis spiritu, nisi à vehemente & multo, potest impelli. Igitur sputum quod neq; liquidum, neq; aquosum admodum fuerit, neq; crassum etiam, aut lentum, id facile efferri solet, maxime vbi vires validæ fuerint. Porro vbi cum spirandi difficultate, cui & angustia & grauitas coniuncta est, acuta quoq; febris incidit, is affectus est inflammatio pulmonis. At si intolerabile incendium fuerit, angustia verò, grauitatisq; sensus minor, erysipelas ipsum vexare censendum est. Vexatur etiam pulmo interdum inæquali, sicuti & æquali intemperie, citra humorum affluxum. Igitur inæqualis, tussim excitat: æqualis verò, si moderata sit, spirationis concinnitatē variat. Si autem vehemens, idq; vincente calore, frigidi aeris & potionis cupiditatem inducit, ac tractu temporis in febrem desinit. Per frigidam autem intemperiem, contraria euenire solent. Quippe si modum seruauerit, calidi aeris, & calide desyderium potionis excitat: si verò modum excedit, replet viscus ipsum fluxionibus. Ob ruptionem etiam vasorum, contingit sanguinem in pulmones transfluere, atq; excitare tussim. At ruptiones in eo deprehēdes, tum ex multo sanguinis effusione, tum ex magna, notabiliq; aliqua causa, quæ subito aduenerit. Sunt autē causæ prægressæ, casus ab alto, collisio, iracundia, exclamatio, atque alia id genus. Contingit quippe interdum vasa disrumpi, vbi non præmissa lenitione pulmonis per præcedētes exclamations, vehementer aliquis exclamare cō-

LOCIS AFFE. LIB. V.

173

tendit. Adhæc nulla extrinsecus manifesta adueniente causa, sanguinis abundantia potest in pulmone vas rûpere, si minimè extendi possit, aut ob frigus à vicinis contractum, aut ob innatam temperiem. At verò, vbi oscula referantur venarum, calidæ præcedunt semp dispositiones. Quæ verò eroso vase aliquo affatim accidunt sanguinis euacuationes, eas præcedere solêt exiguâ sputa, acresq; in pulmonem fluxiones à capite. Nô nunq̃ verò & pulmonis aliqua pars, aut crustula simul efferri videtur. Distinguitur autem vlcus pulmonis ab vlcere aspera arteriæ & gutturis, tum ob ea quæ cum sputo excernuntur: tum ob sputi ipsius quantitatem. Siquidem per vlcus pulmonis, plurimum sputi reicitur: à partibus autem illis exulceratis, admodum parû excernitur. Præterea pulmonû vlcera non comitat̃ dolor: ea verò quæ guttur & asperam arteriam infestât, dolorem quidem inducunt, non tñ nimis vehementē.

Pulmonis vasa a quibus rûpi occasionib' possint.

Pulmonis vlcus ab vlcere asperæ arteriæ & fauciu, quò distinguatur.

GALENI PERGA

MENI DE LOCIS AFFECTIS.

LIBER QVINTVS.

CAP. I.



DEINCEPS Autem symptomata quæ cordi primariò affectu, & per cõsensum accidunt, consyderanda. Cor igitur, innati caloris existit fons & origo: quemadmodum sensus & motus, cerebrum: ac hepar denique facultatis nutricatoriæ: à quibus sanè tribus principiis animal gubernatur. Cæterum animal omnino mori non potest, nisi prius ipsum cor afficiatur: ad cuius intemperantias inmodicas mors necessariò sequitur. Si

Cor innati caloris vrigo. Principia nos gubernantia. Animal mori non posse, nisi prius cor afficiatur.

Cordis tempe-
riē esse neces-
sariā cerebro
& hepati non
astit horum, illi.
Latentia nec
moueri, nec sen-
tire, nec ali.

Respirationi
quæ conferat.

Mortem cōtin-
gere posse ob
timorē grauē,
& voluptatem
immensam, atq;
etiā moestitiā.
Magnanimus
vir, ob nullam
animi pertur-
bationem suc-
cubuit vnquā.

quidem quum singulae partes peculiari temperie cor-
dis suas actiones pficiant, hac profectō pereunte, actio-
nes quoq; ipsarum perire est necesse: ac proinde cere-
bri etiam et iecoris. Horum verō temperie deperdita,
non oportet cordis simul actionem perire. Nam & si
sensu & motu volūtario sit destitutum animal: nec nu-
triat, veluti in latentibus euenit: nihilominus viue-
re ipsum posse, q̄diu cor illæsum permanferit, haud in-
ficiendum est. At verō si cor respiratione priuetur, ho-
minem illico perire est necesse. Porro ad ipsam respi-
rationem conducunt thoracis musculi, in quos nerui
à ceruicis medulla orti, motionis principium deferūt.
Qua quidem facultate motrice, quæ à cerebro influit,
musculi si priuent (vt videre est per vehementes apo-
plexias) perit opus respirationis. At verō, qua ratione
homines per somnum spirāt, reliquis musculis oībus,
præter eos qui ad thoracem pertinent, tunc feriantib-
us, eadem per minorem apoplexiam, atq; alios ei vi-
cinos affectus, spirare possunt. Verū per vehemen-
tes superni principii læsiones, tota spiratio resoluitur:
vnde cordis quoq; temperies corrumpitur, peritq; ne-
cessariō animal. Ex iecinoris etiam affectu mori aliquā-
do contingit: alia tamen ratione, * atrophia videli-
cet. Quare in huiusmodi affectibus vita potest longius
produci. Mori etiam contingit nonnullos ob syncopē
vitio stomachi ortam, ac vehementem dolorem, & ti-
morem grauē, ac deniq; voluptatem immensam.
Etenim quibus vitale robur infirmum est, animi verō
affectiones, ob imperitiam, fortes, iis facile animæ sub-
stantia resoluitur. Atq; horum aliqui etiam ob moesti-
tiam perierunt: sed non illicō. At vir magnanimus, ob
nullam animi perturbationem vnq; succubuit. Pro-
prio autem affectu laborare contingit cor, vel ob sim-
plicem intemperie, siue inæqualis, siue æqualis ea fue-
rit: vel ob inflammationem, vel erysipelas, idq; dū fie-

si incipit. Nam illico, ante quod augeantur huiusmodi affectus, animal ipsum corrumpitur. Quos sane affectus cardiaca sequitur syncope: quemadmodum stomachica eos, qui os ventriculi afficiunt. Hæ tamen etiam consentiente corde accidunt. Igitur exiguæ quidem cordis intemperantiæ, pulsus arteriarum, pro sua quæque natura, variant: maiores verò, per proprias quidem simularium partium intemperies, subitam mortem non inducunt: per eas autem quæ ad partes instrumentales pertinent, subito enecare possunt, sed præcedentibus signis quibusdam: quorum vnum ab Hippocrate est dictum. Qui sæpe & multum exoluuntur sine causa manifesta, ii repente moriuntur. Est præterea & alius affectus, palpitatio videlicet cordis, aut per se eueniēs, aut cum suspitione quadam, quod in humore cor ipsum moueatur. Inflammato autem manifestè corde gladiatores vidimus, haud aliter quod qui syncope cardiaca pereunt, obiisse. Si ad ventrem cordis, præcipueque sinistrum, aliquando penetraverit vulnus, protinus cum multo sanguine vitam exhalabit animal. Si verò non ad ventrem usque pertingat, sed in cordis substantia consistat vulnus, ex ita affectis aliqui, non solum ea die qua vulnerati fuerunt, sed sequenti quoque nocte potuerunt vivere. Qui oborta deinde inflammatione fuerunt extincti. Cæterum quod diu vixerunt, mentis compotes inuenti sunt. Vnde euidens testimonium sumere potest ea secta, quæ negat rationalem animæ vim, in corde consistere. Palpitatio autem visceris huius, plurimis per integram valetudinem accidere est visa. Quos omneis detractio sanguinis iuuat, vna cum extenuante victus & medicinæ ratione. Eorum tamen qui affecti sic fuerunt, nullus ad senectutem peruenit. Panniculus ambiens cor quomocumque affectus, nullum affert periculum, nisi ipso inflammatione affecto, cor consortii lege afficiat. Porro supercalfactum cor, spirationem efficit magnā,

Syncope duplex.

Repente mori quibus contingat. Palpitatio cordis.

Cor dis vulnus nisi ad ventrem usque peringat, non statim perimit animal.

Rationalis animæ vis non consistit in corde.

Palpitationi cordis conducit sectio venæ, tenuisque victus & medicinæ ratio.

Cor incalescens refrigeratque, qualem edat spiritum.

densam, & celerem: calidumq; semper spiritum reflat.
Contra refrigeratum, exiguam reddit spirationem,
& raram.

CAP. III.

3

Thorax, proprium respira-
tionis organum.
Thorax dolens,
exiguam den-
samq; edit re-
spirationem.

Similiter etiam thorax (proprium ipsius respiratio-
nis organum) aut primario, aut per consensum af-
ficitur: à cuius quidem affectibus necessario respiratio
vitiatur. Igitur ubi dolorificis affectibus infestatur,
exiguam densamq; reddit spirationem: id quod etiam vi-
cinis partibus, & iis quæ simul mouentur affectis solet
accidere. Quippe interdum læditur respiratio, thora-
ce non laborante proprio aliquo affectu, sed vel nervo
aliquo orto ab spina: vel spina ipsa affecta. Eorum ve-
rò affectuum qui proprie ad thoracem pertinent, qui-
dam in ipsius musculis: quidam in membrana costas luc-
cingente consistunt. Igitur intercostales musculi, qui
in ima parte consistunt, grauiori q̃ externi dolore ob
inflammationes cruciantur: facileq; membranæ sub-
ditæ suam affectionem communicant: quemadmodum
ubi ipsa primario aliquando affectu infestatur, interco-
staliū musculorum partes internæ, similiter ei con-
dolescent. Verum exquisita pleuritis fit, ubi succingēs
costas membrana primario affectu laborat. Proinde
dolor, vel ad iugulum, vel ad præcordia potest exten-
di: ad iugulum quidem, superioribus eius partibus: ad
præcordia verò, inferioribus inflammatis. Vehemens
quoq; febris, huiusmodi inflammationem sequitur: quia
sedes affecta & parum distat à corde, & cum pannicu-
lo inuolvente ipsum, ac septo transuerso, cognationem
habet. Iam verò inflammati intercostales musculi, mi-
nus: cingens verò membrana, magis & tendit, & indu-
rat arteriam. At in peripneumonia, nulla apparet talis
durities. Porro effusa in vacuitatem thoracis sanies, in
asperas pulmonis arterias recipitur, ac dein p̃tusi-
m excreta, naturam humoris qui peperit inflammationē,
declarat. Etenim si bilis abundat, pallidum, aut flauum:

si atra

Pleuritis ex qui-
sita qñ fiat.

Pleuritidi quæ
ad sint sympto-
mata

Sputorū diffe-
rentiæ, pro va-
rietate humo-
rum gignentium
pleuritidem.

si atra bilis, nigrum: si pituita, spumofum, & candidas: si sanguis, rubrum sputū reicitur. Quòd verò ex thoracis capacitate aliquid expuatur, hinc liquet manifestissimè, & si per vulnus thoracis penetrans, aqua multa infundatur, moxq; tusiendo expuatur, ager vel ex sapore nullam esse deprehendet. Præterea in eo ipso spatio, quod inter pulmonem atq; thoracem est, purulenti & pus p̄tinere, & ipsum tusiendo expuere, haud obscurè cernuntur. Nec verò defendi potest, sanguinè in ea vena quæ circa spinam est, cōtentum, regurgitare ad cor, vt inde ad pulmones feratur, quod ex Erasistrati sermone colligitur. Nam è cōtrariò, vena hæc, à dextra cordis auricula exorta, sanguinem secum defert, qui omnibus thoracis partibus, quæ circa octo costas * inferiores consistunt, alimentum præbeat. Etenim superiores quatuor non ab * ea, sed à vena perrepante ad iugulum, nutrimentum suscipiunt. Pus itaq; in thoracis capacitate cōtentum, expirationis tempore, in pulmonis asperas arterias transmittitur. Siquidè respirationis actio, ad ipsum thoracem pertinet, pulmone nullam propriam habente motionem. Quippe qui per consequentiam dilatato thorace, pariter ipse attollitur: eo verò constricto, spongiarū manibus compressarum exemplo, rursus in sese residet. Proinde thorax vehementer constrictus, humorem qui in vacuitate subdita continetur, in asperas eius arterias comprimit. Nisi verò thorax admodum vehementer pulmonem omni ex parte compresserit, humor in asperarū arteriarum ora recipi haudquā poterit. Quamobrè quo robustior fieret compressio, animali adiunxit tussim natura. Quæ naturale est symptoma, sternutatio, ni, singultui, & nausæ, consimile. Verùm quia viribus opus est, quibus excitetur huiusmodi naturale symptoma, contingit frequenter per suppuratos affectus interire ægros, viribus antea prostratis, & à validissima ce

Pus in thoracis capacitate contentū, expirationis tempore, i pulmonis asperas arterias transmitti. Pulmo nullam propriam habet motionē.

Tussis quorūdam animalū indita.

Tussis naturale est symptoma.

Pleuritidis in-
separabilia sym-
ptomata.

Incoctę pleuri-
tides.

Pseudo pleuri-
tis.

4. Phrenes.

Septū transuer-
sum separat
irascibilē aīe
facultatē (q̄ in
corde est) ab
appetitoria, q̄
inest iecinori.

lerrimaq; cōstrictione thoracis fiat tussis, quam vires
adeò imbecillæ præstare nequeunt. Porro inseparabilia
lateralis morbi symptomata sunt, febris acuta, dolor,
perinde ac si locus vel intendatur, vel pungatur: spira-
tio frequens & exigua, pulsus parvus, arteriam & du-
ram, & quodammodo tensam indicans, tussis magna
ex parte cum coloratis sputis, nonnunq; verò sine his.

Atq; has sanè incoctas vocant pleuritides, quæ vel ce-
lerrimè hominem rapiunt, vel longo temporis spatio
finiuntur. Sunt præterea alii lateq; cū febre dolores, p
quos spirationem exiguam reddi est necesse, sed nullū
sputum redditur: vt in ea re nihil à pleuritide sine spu-
to constante differre videatur. Verū hi faciliè ab illis
discerni possunt, quòd in his quidem nulla omnino tuf-
sis molester (quemadmodum in illis, qui absq; sputo in-
festantur pleuritide, in quibus sicca adest tussis) neq;
tensionem, neq; vllam duritiē pulsus referat, nec per-
inde acuta febre laborent, nec deniq; adeò difficulter
spirent. Sunt etiam nonnulli, qui extrinsecus presso ī
flammato loco, dolere sese fatentur. Atq; ii per sputū
purgantur minimè, quia ab initio nihil eius succi, qui
excitauit inflammationem, peruenire ad spatium tho-
racis consuevit. At inflammatione concocta, nisi pus
prius discussum fuerit, ad cutim vsq; atollitur, incidi-
turq;.

CAP. III.

TErminum quo thoracis pars inferior finitur, an-
tiqui phrenas vocarunt, fortè quia eo inflamma-
to mēs læditur. At Plato ipsum septum appellat, q̄ ira-
scibilem animi facultatem, quæ in corde est, ab appeti-
toria, cuius sedes est in iecinore, distinguat, separetq;.
Cæterum recentiores septum transuersum id noīant,
vt Aristoteles succincturam. Qui sanè musculus spira-
tionis instrumentum quum sit, non immeritò, si afficia-
tur, ipsam lædit spirationem. Antea tamen q̄ quis ob
affectum septum deliret, frequētem atq; exiguum: in-

festante verò delirio, multa varietate inæqualem spiritum reddit. Delirare tamen solent nonnulli, ob vitium consistens in ore ventriculi: sicuti per febres ardentes, pleuritidem, & peripneumoniam. At quæ ob septum transversum deliria oriuntur, non multum à phrenitide distant. Etenim per cæterarum partium affectus, & per ardentes febres, mitigari solet delirium, quoties morbus declinare videtur. Phrenitidis autem propria præcipuaq; nota est, ne in declinatione quidem febrium, delirium quiescere: quum nimirum non per consensum sub huiusmodi morbo cerebrum, sed primaria affectione laboret. Proinde paulatim affectus hic gignitur: nec repente subito, ut alienantur ægri, ut in aliarum partium affectibus: quin etiã prius quàm inualescat is morbus, præcedunt ipsum non pauca accidentia phrenitica: ut puta immensæ vigiliæ, aut somnus imaginibus variis turbatus, aut denique rerum omnium quæ faciunt agrestis quædam obliuio. Interdum etiam, qui phrenitici euadunt, maiori cum tumultu aut temeritate respondent, quum antea tamen fuerint mansueti. Atque ii omnes, potu exiguo utuntur. Nonnunquam occiput dolore infestatur. Quum verò ad phrenitidem iam proximè accedunt, oculi euadunt eis vehemèter squallidi, aut ex altero ipsorum acris lachryma effunditur, ac dein lipitudo innatat, & venæ intumescunt sanguine, sanguis quæ stillat è naribus. Quo tempore nihil quod exacte ad prudentiam pertineat, respondent, & floccos uellunt, & festucas carpunt, atque aridiori febre, cui non ita magna in alterutram partem mutationes accedunt, torquentur. Adhæc lingua quoque illis aspera est, nonnullique auditu falluntur, atque interdum iacent cogitabundi. Quinetiam dispositione dolorifica affecti, vel acius premente aliquo, eam haudquaquam sentiunt. Ergo hoc modo per cerebri affectum, paulatim phrenitis gignitur. Ab aliarum verò partium nulla, perpetuum delirium.

Mmm ii

Deliria quibus ex causis oriuntur.

Deliria ex septo transverso orta, non multum a phrenitide differunt. Phrenitidis nota præcipua quæ.

Phrenitidem præcedentia symptomata.

Phrenitidis instantis symptomata.

Delirium nullum perpetuum, excepto phrenitico, et quod oritur a septo transverso.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

Delirium septo
transuerso or-
tū, quō a phre-
nitide distin-
guatur.

rium oriri potest, dempto solo septo transuerso, cuius vitio excitatum delirium, parum à continuo distat: à phrenitide tamen distinguitur, & ex symptomatis, & ex sanguinis destillatione à naribus, ex ipsaq; spirationis specie. Siquidem spiratio phreniticorum è magna, & ex longis facta interuallis: inæqualis verò, vbi à septo delirium oritur. Cæteræ p̄cordia * reuelli, septi transuersi illico ab initio affecti, proprium indicium est: id quod affecto cerebro, posterius accidit: videlicet nō incipiente affectu, sed vbi formatus iam fuerit. Calor quoq; circa caput & faciem, vehementior est iis, qui ob cerebri vitium delirant.

CAP. III.

5. Oesophagus.
Stomachus.
Gulæ vsus du-
plex.

Gulæ tunicae
duplices, cur
sint datae.
Gulæ affectuū
genera duo.

Gulæ inflāma
tū indicia.

Illius partis quæ inter fauces & os ventriculi media est, & quæ oesophagus, stomachus, & gula dicitur, duplex est vsus. Vnus, q̄ veluti via sit eorum quæ deuorantur: alter q̄ circa vtrunq; progressum tam deuoratorum, q̄ eorum quæ à ventriculo in os reiciuntur, aliquid moliri videatur. Nam quum gemitus insint ei tunicae, altera ad cibi potusq; deglutionem vtitur: altera ad eam, quæ vomendo fit, expulsionem. Proinde rationi est consonum, duo esse affectuum ipsius genera: vnum quidem quod veluti viæ tum ingestorum, tum vomitione reiectorum ei accidit: alterum verò, quod ei, veluti vtriusq; actionis instrumento, euenire potest. Constat itaq; eorum duorum vsuum, alterum quidem semper esse necessarium: alterum propter occasiones quasdam. Igitur eorum symptomatum quæ gulam tanq̄ viam infestant, genus vnum est, quum ob tumorem aliquem præter naturam, angustior ipsius meatus redditur: alter, quum perficere proprias actiones nequit. Accedit etiam gulæ angustia ascititia, vbi à vertebris intrò luxatis comprimitur. Vbi verò gula inflammata, non à vicinis partibus conciliata, sed propria familiariq; angustia torquetur, grauisissimus tūc inter deglutiendum infestat dolor, accedēte quoq; perq̄

difficili transitu: præsertim si supinus, q̄ laborat, iacēs, deglutire quippiam conetur. Nam erecta figura transglutitio multo facilius perficitur. Nec verò puto late-
re vos, partium inflammatarum nullam non dolere, vbi suo munere fungitur: contra, mitigari dolorem, vbi ab agendo destiterit. Quum autem gula sentiendi facultate sit prædita, ipsam quoq̄, veluti auctarium in-
dicium, in vsum euocare oportet, quo plenius affectus illius dignoscantur. Quare iuuat ægros interrogare, quid nam deglutiendo sentiant. Quippe imbecillitatē nonnunq̄ percipere se fatentur, vt longo vix tempo-
ris spatio per gulam transeant ingesta. Interdum ea in media via hæere & coerceri aiunt. Horum primum, actionis infirmitatem: alterum, particulæ cuiuspiã an-
gustiam indicat. Verum vtriusq̄ differentias ex reliqs accidetibus intelligere licet. Nam in imbecillitate quæ ex sola intemperie citra tumorem sit præter naturã, ingestorum in transitu tarditas, & æqualis, & sine do-
lore, & in supino quidem decubitu, maior; ceruice ve-
rò erecta, minor, sine vlllo angustia sensu, accidere so-
let. Vbi verò cum tumore coniuncta imbecillitas est, unã quãpiam particulam angustiorē cæteris efficiet: atq̄ per eam ipsam tardior erit transitus. Quòd si tu-
mor fuerit inflammationis aut erysipelatis particeps, accedet ei dolor, & sitis, & multi caloris sensus, febris-
q̄ non admodum ardens, quæ siti proportionē haud-
quã respondeat. Si verò tumor aliquis ex non ita ca-
lidis fuerit, tum citra febrim, & calorem, & sitim, de-
glutitionis inæqualitas aderit, retentis cibis i parte ali-
qua. Porro affectus dolorificus gulæ, iuxta dorsum q̄q̄ sentitur, quum gula incumbat spinæ. Iam verò, si ob-
ruptum aliquod vas ipsius gulæ, sanguis aliquando vo-
matur, dolor statim sentitur iuxta locum vbi talis ru-
ptio contigerit. At reserato ore vasis, nullus percipitur
dolor, qua re, à ruptione atq̄ erosione vasis distingui-

Inflammatę om-
nes partes do-
lēt vbi suo fun-
guntur munere:
mitigatur do-
lor, vbi ab agē-
do destiterint.
Gulę sensu, cet-
indicio, eē vtē-
dum, ad digno-
scendos affe-
ctus illius.

Reseratio vasis
qua re a ru-
ptione atq̄ ero-
sione differat.

Vicus unde
fit.

6. Os ventriculi
quæ inferre so-
leat sympto-
mata.

Oris ventriculi
affectus prima-
rii.

Vinum albū,
modiceq; astri-
gens, uireis ad-
dit uentriculo,
& minime ten-
tat caput.
Picræ ex aloë
usus.

Hypochondriacæ melan-
choliæ sympto-
mata, & signa.

tur: ac præterea, q̄ neq; ictus, neq; casus hāc profusio-
nem præcesit, id quod rupto vase videre est. Quāq;
ob solam sanguinis plenitudinem, vasa interdum dis-
rumpi possunt. Quæ verò per erosionē fit eiection san-
guinis, vlcere præcedente contingit. Fit autem vlcus,
vel rupto vase, vel vitiosorum humorum influentia:
id qđ in cute q̄q; sæpenuerò accidit. **CAP. V.**

OS ventriculi (quod veteres ob accidentia quæ in-
ducit, cor nominabant) non solū syncopem,
sed conuulsiones, sopores, morbum comitalem, atq;
melancholiam inferre solet: nec nō symptomata, qua-
lia per suffusiones infestant. Quos quidem affectus om-
nes, consentientibus ei cæteris partibus, in ipso fie-
ri contingit. Quippe ad propriam eius rationem perti-
net, * tum fastidire, tum natantes cibos corrumpere.
Nam si cibi in ventriculi fundo firmentur, præcipuē si
suapte natura non faciliē corrumpantur, * neutrum
ex illis accidit. Porro quum grammaticus quidam
iuuenis, quoties vel nimis vehementer docebat, vel
cogitabat, vel esuriebat, vel irascebatur, morbo co-
mitiali, ob nimis acutum sensum oris ventriculi, corri-
peretur, tertia vel quarta hora panem optimē præpa-
ratum ei exhiberi iussi, solum quidem, si uon sitiret: si
verò siti cruciaretur, ex vino madidum, & quidem al-
bo, modiceq; astringente. Nam huiusmodi vinum,
vt vires addit ventriculo, sic minimē tentat caput, qđ
solent vina vehementia. Dein verò singulis annis bis,
aut ter, picram ex aloë ei exhibens (quod quidem me-
dicamen totum ventrem ab excrementis liberat, *
ipsumq; ad actiones proprias corroborat) ita restitui
homine, vt reliquum vitæ integra sanitate frueretur.
Complures etiam nō solū insomnia & somni tumul-
tuosi molestant, sed amentia quoq;, propter vitiosum
humorem, collectum in ore ventriculi. Iam verò flatu
lētum illum hypochondriorum morbum, omnes pro-

fessi sunt, tristitiam, desperationem, atque inæstetiam inducere, nihilque ad melancholiæ accidentia reliqui facere. Laborantes autem eo morbo, post cruditates, diutius accidentibus multò vehementius cruciantur: ac quidam ipsorum quoque splenetici fiunt. Quocirca coniciendum est, ex hoc etiam viscere vitiosam saniem in ventriculum relegari. Ergo ea accidentia quæ cerebrum afficiunt, vel oculos, vitiosorum humorum vaporatio nem sequuntur. At syncopa quæ vitio stomachi, hoc est, oris ventriculi, accidit, ob dolorum ipsius proprietatem exolutionem inducit, fortasse verò eius quæque intemperie ad cor pueniente. Quemadmodum ubi cor vehementer intemperatum est, vires agminatim cadunt, oportet. Similiter etiam citra, hoc est picæ, mulieribus accidit, ore ventriculi affecto. Nausea præterea, cardialgia, & singultus, inter huius partis affectus debet annumerari. Afficit autem ventriculi universa capacitas, similibus dispositionibus & os illius: cæteræ non pende vehementibus. At quia coctionis opus perficitur in partibus oris subditis, necessum est eas ipsas partes, quum malè dispositæ fuerit, cruditatis causam existere. Quod verò sanguis à iecinore atque liene effluens, uacuari per ventriculum possit, sanè de hac re latius alibi sumus dicturi.

CAP.

VI.

A T iecori duplex etiam genus morborum accidit, unum à sola intemperie, citra tumorem præter naturam: alterum, ubi unà cum intemperie, tumor quoque adest, ut inflammatio, erysipelas, scirrhus, inflatio, & obstructio à crassis & viscosis humoribus, in extremis vasorum partibus, quæ à vena portæ exoriuntur, facta. Verum in iis laborans gravitatem percipit in dextra præcordiorum regione. Quod si halituosus quoque spiritus, cui non pateat exitus, illic concludatur, non solum gravitas, sed tensionis quoque sensus sequetur. Meminisse autem oportet, octo numero musculos per

Mmm iiii

Syncopa vitio
oris ventriculi
accidens, quo-
modo vires ex-
oluit.

Citra sunt ore
ventriculi af-
fecto.

Nausea.

Cardialgia.

Singultus.

Sanguinem a ie-
cinore & lie-
ne vacuari per
ventriculum pos-
se.

Iecori duplex
genus morbo-
rum accidit.

Abdominis
octo musculi,
quatuor com-
prehensi con-
iugationibus.

Lecoris situs.

*Lecur inflama-
tum quæ indi-
cent.*

*Hepatis erysi-
pelate affecti
accidentia.*

abdominis regionem extendi, quatuor comprehēsos coniugationibus. Quarum prima ex musculis constat rectis, per totum carneis, à pectore ad pubis ossa protēsis. At reliquarum trium cōiugationum musculi, vsq; ad rectorum contactum, carnea substantia constant: vbi verò primū illos attigerint, in membranas nerveas degenerant. Horum itaq; musculorum coniugatio vna, quæ quidē reliquis est exterior, à thorace obliqua deducitur, in anteriores partes descendens. Altera huic opposita, ab infernis exorta partibus, obliqua ad anteriores ascendit. Huic tertia musculorum coniugatio subiicitur, qui trāsuersum habent positum, atq; peritonæo innectuntur. Rectorum igitur musculorum tumores præter naturam, oblongi, ac per totum extensi videntur: quapropter haud obscura est ipsorum dignotio: sicuti & eorum qui obliqui à thorace descendunt. At multò difficilior est notitia musculorum, qui iis sunt subiecti: difficillima verò transuerforum. Quā igitur iecur sub peritonæo à tribus ex illis musculis cōtegatur, fieri non potest, ut tactus aliquam ipsius notitiam præstet, nisi vel magna in ipso inflammatio oriat, vel incumbentes ei musculi, admodum extenuentur. Iecur tamē declarant affici, in dextera præcordiorum parte grauitas, dolor tota præcordia retrahens, atq; ipsius ad iugulum usq; extensio, exigua tusis, lingua color, i primis quidem ruber, deinde uerò niger, ingens cibi fastidium, inexplebilis sitis, vomitus tum synceræ bilis, tum ei^{us} quæ ouorum luteis assimulatur: quæ aliquando æruginis quoq; colorem refert. Alius quoq; astringitur, nisi vnā cum uisceris huius imbecillitate, inflammatio ipsa acciderit. Erysipelatis accidentia his ferè similia sunt. Sed insuper febris quoq; cum uehementissima siti laborantes, cruciat. Etenim, iecoris ac uentriculi flammeis dispositionibus ardentes febres solent superuenire, quas etiam excitari contingit.

in pulmonis inflammatione participe erysipelatis, * quæ admodum etiam per uniuersum corpus, ob putredinem biliosorum humorum inmodicè efferuescentium.

Verum quæ aut iecoris aut uentriculi occasione eueniunt, eæ febres, omnium sunt vehementissimæ, ac magna ex parte in marasimum degenerant. Quæ in simis iecoris partibus eueniunt inflammationes, ut magis quàm illæ quæ in eius gibbo fiunt fastidium, nausæ, uomitum biliosum, ac sitim ingentem inducunt: sic è contrario hæ, maiori quàm illæ inter spirandum dolore laborantem infestant: magisque tussim excitant, atque dolorem usque ad dextrum iugulum, adeò ut detrahi videatur, extendunt. Vtrique autem parti, quum dolor adest, nonnunquam nothæ costæ consentiunt. Soli verò iecinori est proprium, ut tumoris cumulum comprehendere habeat circumscriptionem. Quare durus in ipso circa principium tumor (quem scirrhom vocant) multò euidentiùs ob duritiem dignosci potest, quàm inflammatio.

At verò tractu temporis, quis magis crescat scirrhus, non tamen equè facillè deprehenditur, intercipiente scilicet indicium aqua inter cutem, quæ & illico scirrhum sequi consuevit, & nisi afficiatur hepar, gigni minimè potest. Non tamen semper ob primariam excitatur affectionem illius, & si hoc frequentissimè accadat. Etenim quia hepar facultatis sanguificatricis est instrumentum, consequens est, ut ipso uitiato, actio quoque eius vitietur. Accidit tamen interdum, ut ob intemperiem aliquius particulæ eæ, quæ aut per meseraicas, aut cauam venam, cum illo commercium habent, ipsum quoque refrigeretur. Porro simarum partium uenæ, ab ea quæ in porta est, exortæ, in tenuissimas extremitates finiuntur: ad quem similiter locum, aliæ quoque uenarum extremitates, à concaua uena in gibbas uisceris partes distributarum, perueniunt. Cibus igitur uniuerso corpori distributus, ex omnibus simarum partium uenis exi-

Febres ardentes a ventriculo, & hepate ortæ, in marasimum sepe degenerant. Simis hepatis inflammationis quæ ad sunt symptomatica.

Gibbis hepatis inflammationis quæ symptomatica oriatur.

Hepatis scirrhum illico sequi hydrops consuevit.

Hydrops gigni non potest, nisi afficiatur hepar.

Hepar est sanguificationis principium.

Venarum hepatis explicatio.

*Hidropis cau-
sa diuersæ.*

*Cibi desyderi-
um vehemens
inesse iis, qui-
bus os ventri-
culi fuerit per-
frigeratum.*

*Sanguis qñ in
bile mutetur.
Color corporis
quot modis vi-
tari possit.
Lienis, qñ he-
patis, vitia, ni-
giorem colo-
rem reddunt.
Essentia facul-
tatũ in p̃p̃riis
partiũ tempe-
ramentis consi-
stit.*

ens, ad gibbas partes per dictas extremitates transumi-
tur. In qua quidem uenularum consp̃iratione, nonnul-
li fieri obstructions existimant. Ergo ob refrigeratio-
nem iecinoris, in sanguinem mutari cibus non potest,
refrigeranturq; cum illo totius corporis uenæ. Sape-
numero etiam, nullo tumore apparente in iecinore,
æger aqua inter cutem corripitur, vel ob uitiũ lienis,
uel ieiuni, uel alicuius intestini tenuioris, aut mesente-
rii, aut pulmonis, aut renũ, aut ob imodicum hæmor-
rhoidum, aut mensium profluuium, aut ob suppressio-
nem menstruorum, aut ob alium uteri momētaneum
affectum. Ex intempestiua præterea frigidæ potatiõe
iecur affatim refrigeratum, statim aquam inter cutem
inducit. Ac sic affecti, uehementi ciborum desyderio
tenentur, quod solent omnes quibus os uentriculi fue-
rit perfrigeratum.

C A P. VII.

Porro utrum semper in morbo regio locus affe-
ctus sit hepar, an alia præterea dispositio hunc af-
fectum efficere possit, deinceps consyderandum. Siqui-
dem uidemus nonnunq̃ iecinore haud malè affecto,
per morbi iudicationem effundi pallidam bilẽ per uni-
uersam cutem. Quinetiam citra morbi iudicationem
interdum aliena quadã corruptione, qualis ob ferarũ,
morsum contingit, quandoq; sanguis in bilem mutat.
Fieri autem potest, ut iecinoris naturali temperie mu-
tata, humores huiusmodi uitio afficiantur, & quidem
citra obstructionem, aut inflammatiõe, aut scirrhu.
Ob splenis quoq; vitia, corporis color uitiat, sed mul-
to nigrior fit, q̃ ob affectum hepar. Quum igitur san-
guinis generatio hepatis munus existat, nullam sanẽ
aliam causam huiusce generationis dicemus esse, à fa-
cultate ipsius uisceris propria. Cæterum omnium fa-
cultatum essentia, in peculiaribus partium tempera-
turis consistit. Proinde si hepar ad aliquam octo intem-
perantiæ aliquando labatur, accidit facultati ipsius

noxa, quæ peculiariter illi intemperantiæ debetur. Igitur calidæ iecinoris intemperantiæ, quum contentos in ipso humores, tum eos qui suggeruntur per mesenterii uenas, adurunt, & assant: frigidæ autem, succos iam in ipso contentos, crassos, ad fluxumq; contumaces efficiunt. Quod uerò ad ipsum suggeritur, pituitosum, crudum, & semicoctum reddunt. Rursus aridæ intemperantiæ, sicciores crassioresq; humidæ uerò tenuiores, aquosioresq; humores efficiunt. Igitur quum alui sedimina, aquæ, in qua nuper mactatæ carnes fuerint ablutæ, similia uideris, iecur esse affectum existimabis. Nominantur autem præcipuè hepatica, quæ ob ibecillitatem ipsius deiiciuntur. Vt autem tenue excrementum & saniem referens, infirmi iecinoris gignere sanguinem non valentis: ita id quod simulatur fæci, superassantis sanguinem hepatis est indicium. At uerò nonnulli primo quidem, saniem, & cruenta quædam: dein tractu temporis, crassum ac melancholicum sanguinem, postremo atram quoq; bilem, atq; synceram, deiiciunt. Qui affectus interdum ob frigidam intemperiem, citra febrem, incipit: ac tunc quidem tenuis sanies excernitur: dein uerò progressu temporis, corrupto in uiscere sanguine, febris solet superuenire. Porro nonnulli eorum qui ob frigidam intemperiem laborare inceperunt, non solum non amittunt cibi cupiditatem, uerum etiam multo magis quàm antea appetunt. At calidas intemperies, nunquam comitatur cibi cupiditas, sed fastidium graue, sitis vehemens, febris insignis, atque prauorum humorum vomitus. Sciendum autem est, singulis nostri corporis partibus quatuor naturales facultates inesse: quarum prima appellat attractrix, quæ peculiare parti succos, alendi ipsam gratia, & appetere, & attrahere potest. Altera deinde est, quæ alteratrix dicitur, qua succus attractus, similis euadit ei, quæ nutritur, particulæ. Huic aliæ duæ ministrant: retentrix

Hepatis intemperantiarum singulis qui effectus tribuatur.

Iecore affecto qualia excrementa excernantur. Hepatica excrementa quæ dicantur.

Calidus intemperies nunquam comitatur cibi cupiditas. Facultates naturales quatuor inesse singulis nostri corporis partibus.

Facultatum singularum læsiones in hepate, quæ signa indicent.

Signū alicuius dī, quod ab eo proficiatur, tāquā a causa.

Partes aliquas purgari interdū per hepar.

Particula oīs agit secundum proprietatem temperamēti.

nempe, quæ suo munere fungitur, quando pars succū attractum concoquit, donec eum, in suam ipsius naturam conuerterit: & expultrix, quæ post absolutam coctionem, excernit id quod inutile est, atq; excrementum vocatur. Si igitur in iecinore attractrix facultas, quomocunq; afficiatur, cibum quem confecit ventriculus, atq; in chylum conuertit, relinquet, vt liquidus excernatur per aluum. Atq; hoc sanè ipsius facultatis affecta erit signum. Siquidem quicquid ab aliquo proficiscitur, tanq̃ a causa, id etiam esse illius signum constat. Vbi autem hepar integrè valet, mesarei venis veluti quibusdam manibus, quæ ex uentriculo ei cibū afferant, utitur. Cæteræ vbi vel inflammatio vel erysipelas afficit mesenterium, nō solum qualia per iecinoris imbecillitatem excrementa deiici consueuerunt, planè excernuntur, sed apparet etiam veluti ab inflammatione, sanies quædam illis admixta. Vt autem non potente ob imbecillitatem hepate succum à ventriculo attrahere, attractrix facultas afficitur: sic vbi retinere non valet, retentrix vis infirma putanda est: ob idq; primò quidem crueta sanies excernitur: dein crassior & faculentior. Similiter aliæ quædam excretiones contingunt, non quidem ob imbecillitatem, sed ob expultricis facultatis robur, ratione plenitudinis, idq; interdum per integram valetudinem. Sic plerunq; pars aliqua quum affecta est, per hepar purgatur, viribus ipsius iam robustioribus factis. Quemadmodum autem retentrix facultas, dū imbecillior est, ac rē quæ ipsam grauat retinere non potest, vis expultrix id quod infestat euacuat: sic infirma expultrice, retineri quædam res solent, facultate retentrice non vsq; adeò grauata. Nam in quolibet instrumento aliàs alia facultas vel fit fortior, vel imbecillior: facta relatione ad actionem. Etenim omnis particula, secundum temperamentum quod ei * perpetuò inest, agit proprietatem. Iam verò in-

LOCIS AFFE. LIB. V.

terdum etiam contingit, vt ob folliculi fellis imbecillitatem, ad se bilem minimè attrahere valētis, impurus vagetur sanguis per vniversum corpus, aliaq; oriatur morbi arcuati species præter illas, quas superius exposui. Qui folliculus sic etiam nonnunq̃ impletur, quem admodum vrinæ vesica, vt euacuari non possit, aut q̃ obstructus est, aut quia secretoria ipsius facultas est imbecillior. Veluti etiam quum obstructis aut ifirmis vas, quæ ab ipso extenduntur in hepar, biliosum humorem interdū attrahere non potest. Proinde excrementorum proprietatem in morbo regio cōsiderare, per q̃ necessarium est. Porro quibus citra febrim morbus regius accidit, vrgente in dextra præcordiorum parte grauitatis cuiusdam sensu, iis omnibus aperiens obstructions cibis & potibus, & medicamentis extenuatibus, deinde medicamentum quod bilem ducere possit, exhibens, eorum plurimos vna die sanitati restitui. Qui verò purgatione liberari non potuerunt, iis rursus valentiorē ad aperiendum data potione, medicamentum quod vehementius purgaret, exhibui: sic, ut sub purgationis fine, cœrulea magis q̃ flaua bilis cum acri mordacitate secerneretur. Atq; in iis conieci fellis folliculum similiter affici, vt solet vrinæ vesica, vbi magna humoris copia distenditur, quā excernere nequit, interdum ob excretorie facultatis imbecillitatē, interdum, quod ob grauem somnū, vel negotia quæpiam, ultra q̃ par est, vrinam supprimens, dein ab ea prosternatur, mirum in modū intenta. At folliculus fellis, * quum inuetur nihil ad excretionem à facultate animali, vnicum habet imbecillitatis principiu, veluti cætera quoq; naturalia instrumenta, à partibus intemperie ortum.

189
Morbi regii
causa.

Excrementorum
pprietas in morbo
regio cōsideranda.

Regii morbi
absq; febre in
uadentis curatio.

GALENI PERGA

MENI DE LOCIS AFFECTIS.

LIBER SEXTVS.

CAP. I.

Lien sanguine
alitur melan-
cholico.



LIEN Autem, quum ex hepate san-
guinem melancholicum trahat, quo
ipse postea nutritur, sanè si in eo fa-
cultas attractrix facta sit ibecillior,
sanguis ex iecore impurus in vniuer-
sum corpus transmittitur, ac proin-

de color nigrior euadit. Quin etiam exemplo hepatis,
sæpenumero ex se reiicit excrementa quædam: ita vt
per vomitum, cui nausea accedit, nōnunq̃ excernatur
melancholicus sanguis: qui interdū etiam solet per in-
ferna descendere. At huiusmodi vacuatiōe suppressa,
nonnulli melancholica tristitia afficiuntur, cibosq; auī
disimē concupiscunt: idq; præcipuē, si valde fuerint
acida, quæ excrementa ad ventriculum transferunt.
Si autem alia melācholici humoris corruptio accadat,
subuerti, deiiciq; appetētiam videbis. Quod verò indu-

L'ene idurato,
illicq; cōsentie
te iecinore, aq̃
inter cutē orit.
Regius morbus
permistus.

Frigida intēpe
siue exhibita,
solet aquā iter
cutem efficere
si præcipue vi-
tiosa fuerit.

Aquā inter cu-
tem gigni non
posse, nisi ad

rato ipso, aqua inter cutem effundi possit, consentien-
te iecinore, iam antea est dictum. Quin etiam laboran-
te aliquando utroq; viscere, regium morbum euenire
conspeximus, nigriore q̃ pro consuetudine subsequen-
te colore: ita vt videretur flaua bilis esse fuligini admi-
sta. Quemadmodum autem vitiosa aqua & frigida, *
si confertim & intempestiuē bibatur, solet aquam in-
ter cutem inducere (nocet enim sic ingesta interiorib;
partibus, maximē verò iis, quæ tum temporis fuerint
imbecilliore) sic ob refrigeratum vnā cum tumore
lienem, vtputa si adsit scirrhus, vel citra tumorem, vt
per iam nuper dictam aquæ potionem, aqua inter cu-

LOCIS AFFE. LIB. VI.

tem etiam euenire consuevit. Cæterum nisi ad hepar
vsq; ipsa refrigeratio peruenerit, aqua inter cutē sub-
sequi potest minimè.

CAP. II.

Dysenteria exquisita, intestinorum vlcus existit.
Qui sanè affectus, non gignitur affatim, aut subi-
tò, vt ille quem vitio hepatis accidere dixim⁹: sed pro-
tinus quidem ab ipsi⁹ initio, bilis mordax excernitur,
quam deinde interaneoꝝ abrasiones sequuntur: postea
verò paulum cruoris deici simul videtur, quando vi-
delicet ipse affectus iam esse dysenteria censetur. Quis
itaq; huiusmodi abrasiones solæ excernuntur, consy-
derandum est, num pingue quippiam simul cū eis deii-
ciatur. Ita enim vlcus in crassis intestinis consystere,
existimandum est. Vbi verò cruorem quoq; excerni
videris, intueri oportet, vtrum is reliquis excrementis
adeò permixtus sit, vt vniuersus vniuersis misceatur:
an pars eius aliqua reliquis supernatet. Etenim si admi-
stus sit, in superioribus: si verò supernatet, in humilio-
ribus intestinis vlcus esse portendit. Idem etiam & in
abrasis excrementis videre est, verum non ita manife-
stè, vt in cruore. Similiter crustula, quod nam intesti-
num sit ulceratum declarant, tum ex essentia proprie-
tate, tum ex modo, quo vel misceri reliquis excremē-
tis, vel vni eorum parti supernatare videntur. Nec ve-
rò mediocriter conducit ad curationem nosse in qua
intestinorum parte consistat vlcus. Nam si in superio-
ribus intestinis sit, ab epotis medicamentis præsidium
petendum est: sin verò humilioribus hæreat, clysterē
subiicere magis cōuenit. At huiusmodi dysenteria ab
iis quæ ab hepate profluunt, sic discernuntur. Nam ab
initio tenuis sanies sanguinis ab hepate excernit: dein
de aucto malo, crassus humor facibus vini haud absi-
milis. Præterea, in hepaticis excretionibus, nihil abra-
sum expellitur, atq; interdum duorum, aut trium die-
rum iteruallo, supprimitur euacuatio: dein rursus ma-

191

hepar refrige-
ratio peruene-
rit.

Dysenteria est
vlcus intestino-
rum.

Dysenteria
causa,

Intestinorum;
quæ nam exul-
cerata sint, cras-
siora ne, an te-
nuia, ab excre-
mentis digno-
scitur.

Intestinis su-
premis exulce-
ratis, epotis me-
dicamentis suc-
currere oportet: infimis, per
clysteres inie-
ctos.

Hepaticum flu-
xum a dysen-
teria quò disti-
guet oporteat.

Tinissimi descri-
ptio.

Colicū dolorē,
nephriticūq;
circa principia,
eandē fere me-
dendi rationē
desyderare.

Colici dolores
a nephriticis
quomō distin-
guantur.

Nephriticorū
vrinæ quales.

Colica excre-
menta qualia.

lum reuertitur, atq; excernuntur excrementa prioribus multò peiora. Id verò per intestinoꝝ vlcera haud quaꝫ apparet. Quippe in iis, neq; affatim, neq; ex longis temporis interuallis, laborantes deicere consueverunt. Porro vlcera quæ in recto intestino oriuntur (tinissimum vocant) vehementi quidem tensione, & præptæ deiciendi cupiditate infestant: paucis admodum sequentibus excrementis: quæ quidem ab initio pituitosa & pinguis: progressu verò temporis, etiam ramenti specie deiciantur: sed per totum morbi spacium, iis quæ à supernis descendunt, minimè misceri videtur. Iam verò, vt doloris colici, nephriticiq; distinctio, in initio difficilis est, sic circa id tempus, non ita magna præsidiorum differētia desyderatur. Cæterum & nausea, & vomitus per id genus affectus vrgent, sed multò grauiores, & magis assidui, dolēte colo. Euomūtq; ita laborantes pituitosa quædam, atq; corrupta: hæc in re longè superantes nephriticos: ac retinent etiam magis excrementa, ut ne statum quidem, neq; etiam ructum excernere possint. Sæpenumero veluti circūire videtur dolor, modò hanc, modò illam partem infestans. Nephritici verò dolores, eodem in loco stabiles, infestant iugiter. Quum itaq; dolor in loco fuerit altiore renibus, manifestum colicæ indicium portendit: si verò circa sedem renum infestet, vrinæ consyderandæ sunt. Nam nephritici ab initio dilutas purasq; reddunt vrinas: dein sequentibus diebus, crassum aliquid in ipsis subsidere videtur: dæmum arenosæ minguntur. At in colica, si quid ab aluo deicitur, id statuum quodammodo est, & sæpenumero aquæ supernatante consuevit, similem habens bubulo stercore consistētiam. Quin etiam cruciatus colici, q̃ nephritici, multò magis lenientibus mitigantur clysteribus. Atq; interdū euenit, vt frigido aliquo humore simul eiecto, illico quiescāt. Quare ipsum præsidium mitigans, erit etiam cura-

etiam cuciatum, atq; prognosticum. Nephritici etiā dolores, cum vrina exeunte lapide, simul & soluuntur, & locum affectum indicant. Vt autem persēuerante dolore vtraq; pars eisdem auxiliis indiget, sic tempore subsequente ad præservationem oportet diuersa p̄sidia adhibere. Quum autem omnia intestina ordine quodam à ventriculo ipso descendant, atq; omnium supremum ieiunum sit: deinde quod tenue vocatur: postea cœcum, quod vsq; ad isernas partes extendit: deinde colō, quod ad superiores reuertitur partes, ita vt sæpenumero hepar & lienem attingat: satis mirari non possum, quo pacto vehementissimos quosq; dolores, quacunq; in parte consistent, ab omnibus colorib; tribuantur. Igitur ob frigidum crassumq; , aut etiam humorem viscidum, aut ob flatulentum spiritum, in corpore crasso densoq; alicuius intestini inferioris genitum, sed egredi nequeuntem, excitari dolor consuevit: vehemens quidem, ob intemperiem atq; tensionē corporum in quibus hæret impactus: longus verò, q̄a difficulter vacuatur. At dolor ille acerbissimus, quem ileō, voluulum, & chordapson vocāt, sublimiores intestinorum partes infestat, adeoq; impellit ad vomitum, vt nonnulli sterco per os reddentes, miserrima tandem morte moriantur. A quo affectu vix aliquis vnq̄ euadere potuit. Itaq; non ab re visum est medicis antiquioribus, vel ab inflammatione, vel ab obstructione aridi stercois, oriri huiusmodi tenuium intestinorū affectum. Sunt & alia symptomata, quæ & intestinis & v̄triculo simul affectis euenire creduntur, vt quas lienterias cœliacas nominant, vbi materiæ ipsæ minimè mordaces existunt. Etenim ut mordaces ob mordēdi vim omnia intestina ad excretionem excitant, sic nō mordaces, intestinorum imbecillitatem sequuntur: quia retinere contenta ne exiguo quidem tempore possunt.

Intestinorum
ordo.

Dolor colicū

Ileos:
Voluulus.
Chordapson.
Voluulo laborantē vix aliquem euasisse.
Voluuli causa.

Lienteriacœ
liacæ.

C A P. I I I.

Nnn

3.

Igitur si nephritis repēte incidat, lapide notatu digno, uel in renum aliquo, uel i ureteris etiam impacto, dolorem excitabit haud absimilem colico: uerū distinguetur ab eo, per illa quæ in capite præcedenti accidere colo affecto iam diximus. Vbi uerò ex iis quæ in urinis resident, aut ex lapide excreto, discerni ipsi dolores possunt, quæstioni nullus locus relinquitur.

Nephriticus dolor cum horrore inordinato, ac febre et inordinata affligens, quā abscessum significet.

Renis exulcerati indicia.

Porrò ubi dolor alterius renis, cum horrore inordinato & uario, necnō inordinata febre affligit, si per proutum decubitus atq; in alterum lat^{us} permutationem, in ipso rene dolente suspensi cuiusdam ponderis sensum æger percipiat, abscessum iam concretum esse conuincere oportet. Quo concocto, pus mictum, ut laborantem à dolore liberat, sic ulceris in rene periculum affert: quod nisi illico cicatrice inducatur, ægrè curationem recipiet. At perseverantis ulceris notæ ex urina haud obscurè deprehenduntur. Adde q̄ laborans creberrimè in affecto rene dolorem sentit: atq; interdum cum urina exiguum pus ueluti ab ulcere excernitur. Similiter ramentum nonnunq̄ cum urina excerni uidetur: atq; interim sanguis quoq; qui erosi iam ulceris est indicium. Quanquā rupto aut reserato aliquo uase, sanguis potest etiam profluere. Verūm efficacissima exulceratorum renum est coniectura, si

Carunculæ cum urina excrete, efficacissimæ ulceratorū renū sunt notæ. Pili similia excrementa, quæ in urinis cernuntur, in uenis gigni.

exigua quædam carunculæ cum urina excernantur: utpote quas renum essentiæ partes, easq; ob uehementem ulceris erosionē auulsas esse, constat. At quæ unā cum lotio excernuntur pilis similia, probabilius mihi uisum est, ea in uenis, q̄ in renum capacitate, gigni: idq; ex crassa lentaq; materia, quam calor calfecit exiccauitq; cuius sanè affectionis per diuretica * speraui curationē futuram: nec unq̄ spes me fefellit. Iam uesica, ubi longo tempore acres per ipsam urinæ transeunt, ulceribus affligi solet. Est & alius renum affectus quo tenuis sanies sanguinis mingitur: cuius quidem existet

causa, aut ipsorum imbecillitas renum: aut maxima relaxatio eorum meatuum, per quos ex uena caua in renes percolatur urina. Atque ad renes quod pertinet is affectus videtur, quem alii matellæ hydropem, alii profuuium urinæ, alii diabetem, alii dipsacon vocant: qui Diabete.
certè quod rarissimè accidit. Quo morbo affecti, inexplabili siti vexantur. Quare & exuberanter bibunt: & reddunt totum id quod biberunt, minimè à sua qualitate mutatum. Hic igitur renum vesicæque affectus, similis est læuitati ventriculi, intestinorumque. Igitur ut ex ventriculo iecur per mesenterii venas, veluti arbores à terra per radices, alimentum ad sese trahit, sic etiam renes sibi quicquid in venis est aquosum, alliciunt. Cæterum vesica non trahit à renibus: quemadmodum neque Intestina non trahunt a ventriculo.
intestina à ventriculo: sed renes quidem per vteras Diabete causa est imbecillitas renum.
excernendo in vesicam mittunt: ventriculus autem in ieiumum, per intestinum ab Herophilo dictum dodecadactylum. Proinde diabetis causa, renum imbecillitas, non potentium diutius continere urinam, censenda est. Verum enimvero obiiciet aliquis, si imbecilli sint renes, quomodo fieri potest, ut urinam ad sese tam celeriter at trahant? Cui quidem respondere licebit: quemadmodum canina appetentia, in ventriculi ore consistens, Appetentia canina.
non potente ipso sustinere pondus deuoratorum, multa impetuosè ingerere, eademque celeriter excernere cogit: sic in renibus etiam serosi humoris cupiditatem, unam cum virium imbecillitate accidere. Vnde & humiditatem affatim trahere, & eam mox in vesicam pelle re, ipsi renes coguntur. Quod autem urinæ fluore repente euenire possit, læuitas intestinorum non possit, veluti nec canina appetentia, ob id fit, quia cupiditas qua cibum appetit venter, animale officium existit: quod, Appetentia animalis esse animalis opus.
citra sensum nostrum fungi nequaquam potest. Renum vero desiderium est naturale, neque ab ipso sensus nostri afficiuntur. Proinde quum ad statum peruenit, ne sen-

Sitietes vehemēter, quatuor accidētium discrimen a potione subire possunt.

Sitis ingentis causa.

Diabetes, proprius renū affectus est.

4.

Ischuria.
Stranguria.

sum quidem mouet, quemadmodum appetentia canina. Porro laborantes vehemēti siti, quatuor accidētium discrimen, a potione subire solent. Vnum, & quidem primum, vomitio est: alterum, velox per aluum excretio, aut fluore, aut laxitate intestinorum: tertium, quod potus diutius quam par est, in ventriculo manet: quartum denique est diabetes, siue vrinae profluuium. Occurrit interdum affectus alius diabeteri simillimus, & quidem ob ciborum multitudinem, qui nec crudi permanent, nec deiciuntur per aluum, nec plenitudinem gignunt, nec etiam probe alere possunt, sed discutiuntur, dissipanturque. Cuius ut crebrior est, quam displicere, euentus, ita faciliorem curationem admittit. Quippe si prius quam ad summum peruenerit, ipsum cognoueris, haud ita difficile curabitur. Atque is affectus, a celeri dissipatione ortus ducit, omnibus partibus attractricem, appetitricemque facultatem seruantibus. At vero ingentis sitis, quae citra diabetem accidit, causa est ventriculus, aut calida, aut sicca, aut utraque intemperie laborans: maximè vero os ipsius: proximè ventriculo hepar, sed maximè pars eius sima: simul inflammatis meseraicis venis, & ieiuno, & ventriculo, atque cum gula, pulmone. Quarum partium incendium marcor ut plurimum comitatur. Diabetes itaque proprius renum affectus existit, qui caninae in ore ventriculi appetentiae proportionem respondet, accedente praeterea retentricis facultatis imbecillitate.

C A P. I I I I.

Vesicae superueniunt symptomata, partim communia ceteris, veluti omnes ipsius praeter naturam tumores, dolores, & quae hos gignunt dispositiones: partim ipsi propria, ut ischuria, hoc est vrinae retentio: stranguria, hoc est stillicidium vrinae: praeterea immoderata vrinae profusio. Quae quidem euacuationes vesicae, ceu meatu vruntur, ipsa haudquaquam affecta. At vero stillicidium vrinae, si ob vrinae acrimoniam fiat, sym-

LOCIS AFF. LIB. VI.

27

ptoma vesicæ est, affectus verò minimè. Si verò aut ab ulcere, aut ab ibecillitate procedat, * in vesicæ affectu consistit. Cæterum quum ab intemperie vesica fit imbecillior, propria ipsius actio læditur, quæ est urinæ excretio: ad quam animal excitari solet, quum vel à multitudine contentæ in ipsa materiæ vesica grauat: vel à mordacitate conuellitur. Quin etiam instrumentales affectus, interdum imbecillitatem inducere possunt: præterea omnes intemperantiæ, præcipueq; illæ, quæ sæpe nonnullis eueniunt, quum frigore corripuntur. Adhæc, ischuriæ symptoma superuenire solet vesicæ, tanq̃ meiendi instrumento: interdum quidē, quum circa id quod in ea continetur, contrahi nō potest, vt ipsum exprimat: interdum etiam, obstructio inferiori meatu, aut à crassis humoribus, aut à lapide impacto. Atq; accidit nonnunq̃ vel ab inflāmatione, uel ab alio id genus tumore, ut angustior reddat̃ meatus, uel etiam omnino obstruatur. Sciendū autem est, non vesicæ, sed meiendi munus veluti etiam deiiciendi, nō intestinorum officium pendere à uoluntatis imperio. Quippe vesicæ officium vnicum * est, contractio. At musculus qui urinæ meatum in circuitu ambit, in origine ceruicis vesicæ positus, instrumentum est, cuius opus ab electione excitatur. Similem quoq; & actionē & vsum habet musculus, qui recti intestini partem extremam ambit. Proinde ipsis resolutis, neq; urinā vesica, neq; alius stercora, retinere potest: sed præter uoluntatem, * vtraq; paulatim effluunt. Quare suppressio urinæ fieri nequit ob affectum spinæ, aut nervorū ab illa in dictos musculos exortorum (quod nonnulli putarunt, credentes vesicæ officium à uoluntate pendere) sed ipsius inuoluntaria excretio. Atqui ut nonnulli, tum urinarum, tum excrementorum alui deiectionem, totam ab electione procedere existimantes, hallucinati sunt: sic rursus alii, his è diuerso, totū hoc

Stillicidiū vris
ne qñ sympto
ma vesicæ, &
qñ affectus ei
proprius exi
stat.

Meiēdi munus
nō vesicæ, pen
det a volunta
tis imperio.
Deiiciendi mu
nus, non intelli
norum, est vo
luntarium.

Musculus uesti
cæ atq; sedis,
agit secū dum
voluntatis im
perium: quib
resolutis, excre
menta retineri
non possunt.

Nnn iii

Ischuria quando accidat.

Urinæ suppressæ causæ.

Grumos i corpore præter naturam contentos, quæ sequantur symptomata.

opus naturale putantes, ab scopo aberrant. Etenim cibi à ventriculo in ieiunum transmissio, tota naturæ opus est: voluntatis autem, extensio digiti. At alui deiectio, & urinæ redditio, utroque instrumento propriis suis facultatibus operante, perficitur. Rectum enim intestinum, atque vesica naturali facultate utuntur: musculi verò, ea quæ animalis & uoluntaria vocat. Quippe musculi qui solent cohibere fluores, ab opere quiescunt, abdominis musculis munere suo fungentibus: maximè verò mediis. Quum igitur vesicæ corpus ita fuerit affectum, ut quod in ea continetur, exprimere nequeat, urina suppressitur, uocaturque symptoma id ischuria. Accidit etiam interdum, propter ipsius sensum obtusum, ut non reddatur urina: citra tamè expultricis facultatis læsionem: nimirum si proprii vesicæ nervi afficiantur, nervis musculi cervicem eius constringentis, munere suo fungentibus. Qui quidem si resoluantur, urina præter uoluntatem excernitur. Ob spinæ etiam luxationem ad interiora, suppressi aliquando urina consuevit: orta uidelicet phlegmone in affecta particula. Quemadmodum vertebri ad externas partes luxatis inuito urinam profluere uidimus, ob resolutum nervum musculi vesicam ipsam claudentis. Retenta èt longo tempore urina, vel ob somnum diuturnum, uel ob negotia urgentia, ipsa vesica extenditur, atque urina suppressitur, contractrice facultate propter tensionem immodicam, læsa. Præterea ob sanguinis grumum & pus crassiusculum, interdum retinetur urina. In pueris etiam, quos lapis in vesica cruciabat, uidimus sæpe numero ipsam urinam suppressi. Eos itaque, resupino figurato corpore, ad eum percussimus, ut à meatu lapis dimoueretur. Cæterum grumos vocatos, non solum eos qui in vesica, sed multo magis illos quoque qui in intestinis, ventriculo, atque thorace nonnunquam continentur, animi defectio, & color pallidus sequi solet: pulsus verò

paruus, obscurus, & frequens apparet: laborāsq; ipse, cum anxietate resolvitur. Sunt autem ad intentionem affectæ sedis, non solum præsentia symptomata, sed præterita etiam inuestiganda. Non nihil etiam confert quæritatem puris (si quando excernatur) & misturâ eius cum vrina, considerare. Nam si pus cum lotio exactè permistum sit, à supernis alicunde partibus effluit. Si verò sine vrina excernatur, in vesica consistere suppurationem indicat. Sed quod mediam inter hæc conditionem servauerit, id à renibus descendisse, certum indicium est. Similiter expendendum est, si rupta vomica, cum notis affecti loci, vlcis aliquod quoq; signū appareat. Nā & hoc, aut exactè, aut mediocriter, aut omnino nihil cum vrina miscetur. Atq; vocatum quidem ramentum, vlcis: essentia verò proprietas, affectæ partis proprium indicium est. Quippe partes à vesica auulsæ, lamis: à renibus verò, sunt carunculis similes. Similiter vbi ex sublimioribus pars aliqua affecta est, excrementa cum vrinis eiecta intueri, & ea suspectarum partium essentia comparare oportet. Igitur cum vrina expurgantur gibba hepatis partes, atque omnes quotquot his superiores existunt: per aluum verò pars iecinoris sima, intestina, ventriculus, lien. Præter has aliæ quædam sunt purgationes, sed raro, ut quæ thorax & pulmo per aluum purgatur: quæ sub septo transverso sunt positæ partes, per vrinas. Vidimus et nos pulmonis vomicam expurgari similiter per vrinam: reiecto videlicet pure, à pulmone quidem, per laeuam arteriam, in sinistrum cordis ventriculū: à corde autem, per arteriam magnam, ad renes: atq; illinc tandem per vteras ad vesicam. Etenim ut à concaua uena, ita ex magna arteria, rami ad renes descendunt.

C A P. V.

Vteri affectuum plurimæ differentia existunt. Si quidem mulierum quæ hystericis dispositionib;

Pus si cum vrina excernatur mixtionem ipsius esse considerandam.

Ramentū est signum vlcis. Essentie proprietatis affectæ partis indicium est. Partes a vesica auulsæ, lamis, a renibus sunt carunculis similes. Partium singulæ per quæ regionem purgatur.

Pulmonis vomica aliquando per vrinā purgari.

Arteria magna ramulos mittit ad renes

Vteri affectuum plurimæ differentia

Nnn iiii

Respiratiōem
perisse oīno,
aut nō prorsus
quibus modis
deprehendat.
Spiratio a vi-
ta separari nō
potest: nec a re-
spiratiōe, ipsa
vita.

Respirationis
usus.

Latentiū aiali
um calor, mo-
tu cordis & ar-
teriarū seruat.

Trāspiratio p
arterias.

Vteri suffoca-
tio quibus pre-
cipue accidat.

Vteri suffoca-
tio ob retenta
mēstrua, vel co-
hibitum semē
solet accidere.
Semen mulie-
ris quale.

corripiuntur, aliæ quidem sine sensu immobiles iacēt,
cum obscuro paruoq; pulsu, vel omnino sine vllō pul-
su. Aliæ autem sentiūt, atq; moueri possunt, integraq;
ratione fruuntur, sed tamen deliquio animi, difficiliq;
spiratione laborāt. Aliæ deniq; crura simul & brachia
contrahunt. Porro nonnulli ad explorandum num pe-
nitus respiratio perierit, flocculos lanæ carptæ, suspē-
di coram naribus iubent. Alii poculum aquæ plenum
ori ventriculi imponunt. Quippe immotum omnino
seruari humorem aiunt, si spiratio tota sit intercepta.
Etenim in confesso est & spirationem à vita, & uitam
à spiratione separari non posse: adeo vt viuentem nō
spirare, & spirantem nō viuere, sit impossibile. Quod
si in animalibus, quæ in latebris delitescunt, nulla ap-
pareat respirationis nota, neq; ob id mirari debemus,
quum videlicet ea animalia sint frigida. Quippe maxi-
mus vsus respirationis est, vt intimus calor & refrige-
ratione & ventilatione seruetur. Quare haud ita diffi-
cile fuerit perpendere, exiguum illum calorem in eis
derelictum, arteriarū cordisq; motu seruari: quæ actio
à quibusdam medicis transpiratio vocatur. Similiter
etiam pereunte ob uteri affectum spiratiōe, quoniam
vniuersum corpus refrigeratur (id quod perspicuum
est) fieri potest, ut * nullo attracto per os spiritu, aut
reddito, transpiratio, quæ per arterias fit, perseueret,
licet adeo interdum exigua, vt sensum omnino effu-
giat. Accidit autem vteri suffocatio magna ex parte
uiduis mulieribus: iis præsertim, quæ quum antea pro-
bè repurgarentur, parerent, atq; virorum congressu
fruerentur, his omnibus postea priuātur. Quare veri-
simile est, ob retenta mēstrua, vel semen cohibitum,
eiusmodi mulieres vteri dispositionibus infestari: idq;
fortasse magis ob semen retentum. Nam quum mulie-
re semen humidius atq; frigidius sit, ipsum excerni
oportet, præsertim si copia redundet. Nec secus etiam

LOCIS AFFE. LIB. VI.

201

in viris. Sunt quippè nonnulli eorum, quos protinus à iuuentute, concubitus imbecilliores reddit. Alii nisi assiduè coeant, capitis grauitate infestantur, cibos fastidiunt, febribus sunt obnoxii, deterius coquunt & appetunt, ac deniq; torpore, pigritia, ac melancholicis accidentibus molestantur. Proinde ex retento semine, q̄ ex suppressis menstruis, videtur mihi lōgè maior noxa euenire posse corporibus, eorum presertim, qui suapte natura vitiosis abundāt humoribus pleni q; sunt, & in otio educati: qui q; quā antea nihil fecissent ad libidinem reliqui, affatim continere cœperunt. In quibus sanè conicio naturalem excernendi ipsum cupiditatem, læsionis causam existere. Etenim quum tale & tantum ipsam semen euaserit, neminem non ad sui excretionem vi quadam stimulat. Ob id q; planè cōstat, modestos uiros, non ob voluptatem, sed ut ab impedimento præseruentur, indulgere libidini, perinde ac si nulla sit ei coniugata voluptas. Ita Diogenem Cynicum narrant, virum alioqui mortalium omnium (quod ad continentiam pertinet) constantissimum, libidini tamen nauasse operam, non à coniuncta illi voluptate, veluti bono aliquo, illectum, sed ut noxam, quæ à retento semine prouenire solet, arceret. Eum nāq; meretrix adire pollicita, quum diutius cessaret, ipse manu pudendis admota, semen excussit, ac venientem dein mulierculam remisit, inquiens. Manus hymenæum celebrando præuenit te. Sic etiam arbitror animalia omnia excitari ad coitum, non quòd existiment voluptatem boni cuiuspiam speciem præ se ferre, sed ut semen, qđ retentum ipsa molestat, excernant: haud secus q̄ deiiciendi stercoris, excernendæq; vrinæ desyderio suapte natura mouentur. Fieri autem potest, ut profluentibus menstruis, retineatur in viduis semen, grauisimaq; inducat symptomata. Nec sanè cuiuspiam mirum videri debet, si exiguus humor in vna parte cō-

Semen retentū
nōnullis uiris,
quæ sympto-
mata inducat.
Semen retentū
q̄ menstrua q;
bus inferant
grauiora sym-
ptomata.

Libidini indul-
gere multos
modestos vi-
ros, valetudi-
nis gratia.
Diogenes Cy-
nicus.

Animalia oīa quo
pactō excitent
ad venerem.

Phalāgii ictus.
Scorpiōis ictus.

Torpedo ma-
rina piscatoris
manum red dīt
torpidam, per
medium tridē
tem.
Heraclius la-
pis.

Veneno extin-
ctos, quō distin-
guem⁹ ab aliis
qui ob prauos
corporis suc-
cos intereunt.

Afficiendę rei
aptitudo maxi-
mā obtinet vī
ad exipiēdum
affectum.

tentus, tantorum accidentium sit causa: quum à pha-
langii ictu, affici totum corpus videatur: exiguo vene-
no per minimū foramen iniecto. Præterea scorpionis
ictus breui admodum tempore grauissima symptoma-
ta inducit, quīs in illius aculeo foramen nullum uidea-
tur. Rationi tamen est consonum, vt vel à spiritu quo-
dam, vel tenui humiditate iniecta accidentia illa profi-
ciscantur. Sunt qui putant res quasdam solo tactu per
qualitatis vim, ea quæ ipsi vicina sunt, alterare pos-
se: idq; planè uideri in marina torpedine aiunt: utpote
cui tam uehemens sit potentia, ut per piscatoris tridē
tem transmissa ad manum alteratione, totam reddat
repente torpidam. Similis etiam facultas inest Hera-
clio lapidi. Ferrum siquidem, quod tetigerit, ei adhæ-
ret. Deinde si aliud, id quod primò tactum fuerit, teti-
gerit, similiter ut primum illi inhærebit. Ac sic dein-
ceps. Porro idem affectus oriri possunt & ab humori-
bus in corpore putrescentibus, & ab epoto ueneno.
Ii tamen qui uenenum hauserunt, ab iis qui aliter sunt
affecti, discerni possint. Quum enim homo suapte na-
tura probis succis abundans, ac * salubri secundum
omnia usus uictus ratione, repente moritur (vt letali
assumpto ueneno fieri contingit) deinde corpus aut li-
uens, aut nigricans, aut varium apparet: aut diffluens,
* aut grauem reddit odorem putredinis, hunc uene-
nū sumpsisse aiunt. Igitur si eiusmodi affectibus nos in-
festari fateamur, qui ex nobismetipsis accepto sue ori-
ginis impetu, similes sint iis q; epoto ueneno eueniunt,
nihil mirum fuerit, si etiam vitiatum semen, aut men-
struum, huiusmodi, quum retinetur, aut putrescit in
corpore, graui symptomata inducat: iis præsertim, q;
vt afficiantur, sunt apti. Siquidem quantā vim habeat
afficiendę rei aptitudo, in canibus licet videre. Quum
enim reliquorum animalium nullum rabie arripiatur,
solus canis eo affectu corripitur, tantaq; fit in ipso hu-

LOCIS AFFE. LIB. VI.

morum corruptio, vt vel solum eius sputum, si huma-
num corpus contigerit, rabiem excitare sit potens. 2303
Canis solus ra-
bie corripitur:
eiusq; sputum
rabie excitare
est potens.
Quòd verò ad gignendos vteri affectus maiorem vini
habeat semen, q̄ menstruū retentū, vel ex hoc liquet,
dum q̄ supprimuntur menses mulieribus coniugatis,
& si pluribus accidentibus infestentur, nunq̄ tamē aut
spiratione priuantur, aut animæ deliquio laborant, qđ
solent nonnullæ viduæ, licet æquē vt antea, aut paulò
minus, quod pertinet ad menstrua, purgentur. Quæ
sanè symptomata Plato exponere cupiēs sic in Timeo Plato.
edidit. Ea pars quæ in mulieribus & vterus & vulua
nominatur, quum sit animal auidum generandi, si in-
tempestiuē, diuq; infœcundū māserit, admodum in-
dignatur, erransq; per totum corpus, ac meatus spiri-
tuum obstruens, respirareq; non sinens, in extremam
anxietatem adducit, & alios morbos complureis exci-
tat. Hæc Plato. Cæterū illius agitatiōis vteri, quam
mulieres percipiunt, non est causa ascensus eius vsque
ad regionem diaphragmatis, vt nonnulli putarunt. Nā
si aliquid ex vtero videatur ascendere, id perexiguū
est. Sed vteri ipsius tensiones esse potius in causa dixe-
rim, cur tangentibus obstetricibus, modò sursum, mo-
dò retrahi ī latus videatur. Nam simul cum vtero, cer-
uicem quoq; ipsius retrahi necesse est. Quum igitur ad
vterum multa admodum venarum ora perueniant,
per quas ex cōcaua vena sanguinem attrahere potest,
* sanè ob plenitudinem tum earū, tum vinculorū, quæ
ex illis depēdēt contingit vterū sursum, aut etiam ad la-
tus retrahi. Siquidem omnis conuulsio fit, aut à pleni-
tudine, aut ab inanitiōe. Plenitudo quippe repleta cor-
pora & in latum, & in profundum extendit, sed longi-
tudinem reddit breuiorem. Quo autem breuiora fiūt,
eò magis ad suam originem retrahuntur. Dum itaq;
descendens sanguis ad uterum, ingredi ad ipsius inter-
nam capacitatem non potest, aut quia crassior est, q̄ ut

Vterum non
ascēdere ad re-
giōē diaphra-
gmatis p̄ vteri
suffocationes:
sed tū ipsum,
tū ipsius vasa
tēdi qua ratio
ne uidetur va-
gari.
Conuulsio oīs
fit aut a pleni-
tudine, aut ab
inanitiōe.

vasorum ora permeare possit, aut quia clausa sunt orificia, multiplicatus in venis, eas extendit: atque vicina ipsis vincula niadefacit: ad quorum omnium tensionem, continuò vterum retrahi est necesse. * Qui si vndiq; trahatur æqualiter, recta erit & sine inclinatione ipsius transmutatio: sin verò inæqualiter, ad partē vehementius trahentem intenditur. Non ergo veluti animal errabundum aliàs ad alium locum discurrit in mulieribus vterus, sed ab extēsiōe retrahitur. Quòd si quispiam dixerit, vteri corpus tunc minimè affectū esse, sed peruersione laborare, haud absurda is dixisse videbitur. Igitur peruersiones vteri, eo quem diximus modo, ad suppressa sequuntur menstrua: eas tamē ob hoc, accidentium quæ in animalis corpore apparent, causas esse, nequaquā putandum est. Quæ verò citra peruersionem, aut menstruorum retētionem, viduas molestant noxæ, hæ ob retentum semen euenire putantur. Cæterum pro multitudinis, qualitatis ue ratione, tum menstruorum, tum seminis, aliàs aliæ accidentiū species oriri solēt. Etenim noxia causa vniuersum corpus refrigerare potente, adeò vehemēter omnes partes refrigerantur, vt & respiratio, & arteriarum pulsus sensu deprehendi nō possint. Quæ si vel crassa fuerit, vel acris, conuulsiones: si verò atræ bilis naturam referat, mœstitiā inducet: quæadmodum animi quoque deliquia, & ad fortes extensiones, & refrigerationes, & oris vetriculi affectus, subsequi cōsueuerunt. Porro si mulier nec prægnans, nec puerpera, lac possideat, mēstrua ei defecerunt. At nullo in mammis lacte apparente, menstrua suppressa hisce notis deprehenduntur. Grauitas totum corpus infestat, nec non fastidium, atq; inæqualis horror. Quòd si citra horrorem inæqualitas aliqua fuerit, atq; fastidiū, appetatq; mulier quædam aliena, vt exempli gratia, extinctos carbones, iube vt obstetrix vteri cervicem tangat. Nam

Vteri peruersiones ad suppressa sequuntur menstrua.

Noxæ quæ absq; vteri peruersione viduas molestant, ob retentum semen oriuntur.

Menstrua defecerunt mulieri cui lac inest: nec prægnati, nec existenti puerperæ.

LOCIS AFFE. LIB. VI.

si citra duritiem clausa inueniatur, eam prægnantem esse coniicies. Si verò etiam durities adsit, affectum aliquem in vtero esse portendit. Oportet itaq; speculari obstetricem, ad quam partem vel declinet, vel retrahatur vterus: nam in ea parte affectam vteri sedem esse, coniicies. Atq; in quibusdam foeminis, eius partis dolor cum grauitate nonnihil potest significare: quinetiã in coxam dolor interdum trãsit, & crus ipsum, quod è regione est, per incessum claudicat. Quòd si longiori tempore supprimantur menstrua, nullamq; medicus mulieri vacuationem promoueat, tumor aliquis præter naturam, in ilibus interdum oritur, ostendens nimirum ex internis partibus quampiam esse inflammata. Nonnullis panus in extrema ilium parte excitatur, veluti viris quoq; eodem in loco nõnunq; oriri solet. * Qui panus in quadam muliere fuit suppuratus, adeò vt opus fuerit sectione. * Iuxta hanc ipsam partem vidimus colon intestinum & suppuratum, & sectum: interdum ignorantibus medicis imperitis quid' nam inciderent: interdum intelligentibus quoq;. * Cæterum quoties suppurari contigit colum, semper facile curationem recepit: vteri verò sectiones, ægrius conglutinantur. Itaq; symptomata huiusmodi consueverunt sequi suppressa menstrua: ac præterea lumborũ & colli, & sincipitis dolor, qui ad oculorum vsq; radices extenditur: item febres ardentes, & nigricantes urinae: cum rubra quadam sanie, perinde ac si aquæ, i qua nuper mactatæ carnes ablutæ fuerunt, fuliginem quis miscuisset. Quibusdam vrina aut difficulter redditur, aut omnino supprimitur. Quòd si per alium quempiã corporis locum sanguis effluerit, aut inflàmatio, aut erysipelas excitetur, an menstrua purgentur interrogare debes. Siquidem nihil horum accidere solet, integre repurgatis. Quum verò immodicè, vacuantur menses, color sequitur fœdus, pedes molli tumore

2305
Menstruis deficientib⁹ quo pacto deprehēdemus an sit grauida mulier, necne.

Colon intestinum suppuratum interdum iuxta bubones.

Suppressos menses quæ sequantur symptomata.

Menstrua fluctuant immodice quæ sequantur symptomata.

Profluuij mulie-
bris causa.

attollitur, corporis robur prosteritur, vitiatur cibo-
rum tum concoctio, tum cupiditas. Sed accidit inter-
dum foeminis muliebri vocatum profluuium, vel vte-
ro haudquaquam affecto, quum videlicet vniuersum
corpus per ipsum interdum purgatur: quemadmo-
dum per renes quoque aliquando solet vacuari. Id verò
potissimum fit, si mulier laxis sit carnibus, & pituito-
sa. Atque id quod excernitur, nonnunquam rubra sanies est:
interdum aquosa, & sup pallida. Quod si purus fuerit
sanguis, qualis ex dissecta vena profuit, diligenter ani-
maduertere oportet, numerosio sit aliqua in vtero. Ea
verò magna ex parte in ceruice potius quam alibi contin-
gere solet: discerniturque per excretam saniem, si fue-
rit profunda: si verò circa os ceruicis constiterit, non
solum per hanc, sed per tactum etiam cognosci potest.

Praegnantibus si
extenuentur mam-
mae, abortus
sequitur.

Atque praegnantibus quoque, quum ora venarum in cerui-
ce aperiuntur, excernunt sanguinem. Ergo si mulieri
vtero graui, subito extenuentur mammae, abortus se-
quitur. Atque geminos ferens, si altera mamma extenuetur,
alterum amittit: & omnino si dextra mamma ex-
tenuata est, marem, si sinistra, foeminam ædet. Mares

Mares continen-
tur dextris.

Foeminae conti-
nentur sinistris.

siquidem dextris, foeminae magis continentur sinistris uteri
partibus. Atque raro aliter accidit. Si mulier promptè
quidem conceperit, dein secundo, aut tertio, aut quar-
to impregnationis mense, foetum eiecerit, circa vteri
acetabula humorem pituitosum abundare, atque iccir-
co venarum arteriarumque eius loci ad ora vasorum in
vterum descendantium, nexum debiliorem esse, conii-
ciendum est, ut foetum ob grauitatem ferre nequeat,
sed abruptatur facile.

C A P.

V I.

6.

Colis vlcus vn-
de d. prehenda-
tur.

AT COLIS VLcus deprehenditur ex dolore infestan-
te ipsum: necnō ex iis, quæ familiaria vlceri, vna
cum vrina purgantur. Cæterum hæc, ab iis quæ à vesi-
ca excernuntur, miscellæ modus distinguit. Nam quod

LOCIS AFFE. LIB. VI.

ex cole defluit, in primo statim exitu excussum, urinā præuenire consuevit. Quod verò à vesica emittitur, urinæ admistum videtur. Quin etiam assiduè inter me iendum mordicus dolent pudendorum vlcera: præcipuè quum vel crustula, vel sordibus solutis, pura remanserint. Porro gonorrhœa est seminis assidua excretio, & inuita, quæ fit cole haudquaquã extenso. Priapismus verò est permanens colis tumor extensio, ue in longitudinem atq; circulum, nullo stimulante ad libidinem aut desyderio, aut acquisito calore, vt quibusdam consuevit accidere, qui supini decumbunt. Igitur quemadmodum omnia corporis nostri excrementa, duobus modis vacuantur (interdum enim à continetibus ipsa corporibus excernuntur, interdum sponte profluunt, eo quòd ob imbecillitatem ab ipsis retineri nequeant corporibus) ita de semine quoq; dicendum est. Nam in huiusmodi omnibus, ut excernere tempestiuè, ita continere, naturæ est officium. Verùm secretio fit, aperto fluxionis meatu: ac reliquo conceptaculi spatio & contracto, & ad apertum iam meatum, quicquid intus continetur, pellente. Retentio verò fit, quum clausus manet meatus, & contentum à continente haudquaquam impellitur, sed potius per contractionem comprehenditur, & retinetur. Hoc modo contenti in canis instrumentis humores, per integram valetudinē naturaliter & excernuntur, & retinentur. In illis autē qui præter naturam se habent, retentio quidē, ob excretriciis facultatis imbecillitatem: excretio verò, ob retentricis infirmitatem euenit: vel ob dispositionem aliquam, quæ haud secus q̃ naturalis ipsa excretoria vis, partes mouere possit. Id quod in seminariis vasis videre licet, vbi quis vel comitiali morbo, vel conuulsione violenter fuerit correptus. Cæterum videmus alias quoq; partes, ut manus, pedes, aut digitos conuelli, modò simul cum totius corporis cōuulsione: mo

2507

Excreta a cole
& vesica, quò
discernenda.

Gonorrhea est
seminis assidua
profusio, & in
uita, quæ fit co
le haudquaquã
extenso.
Priapism⁹ qd.

Excrementa
corporis, duo
bus modis va
cuari.

Excretio quò
fiat.

Retentio vt fiat.

Semē excerni
inuito per con
uulsiones.

Gonorrhœa in
strumentorum
seminis est af-
fectio.
Priapismus, co-
lis est accidēs.

Colem a spiri-
tu intendi.

Glandem pe-
nis, semper ma-
gnitudinē can-
dem servare.
Partes omnes
citra doctrinā
aggrediuntur
propriās fun-
ctiones.

do ipsis solis affectis. Quare minimè præter rationem fuerit etiam in seminariis vasis, & quidem interdum solis, eiusmodi excitari dispositionem, quemadmodum & gonorrhœam: quæ vrinæ, quam quis inuitus emit- tit, proportionè responderet: quum retentricæ uidelicet facultatem resolui contigerit. Gonorrhœa igitur in- strumentorum seminis est affectio, non pudendorum, quibus cœu via per quam excernatur, utitur semen. Priapismus verò planè colis est accidens: quanquā ad ar- terias eius potest referri: utpote quæ solæ interdum huiusmodi habeant præter naturam dispositionem, quali affici consueuerunt, quum naturaliter totus co- les intenditur. Atqui à spiritu ipsum in tumorem at- tolli, manifestè patet iis, qui celeritatem eius, & quum iterum residet, perpendunt. Quippe nullus humor tam subitam in alterutram partem mutationem efficere posset. Quum igitur pudendi corpus sit vndique fistulo- sum, facile à vaporoso spiritu per arterias affluente, ubi quis libidinis impetu stimuletur, aut dum ob supi- num decubitus calfacti sunt lumbi, extenditur: glan- de ipsius semper magnitudinem æqualem seruante, quæ fistulosus in ipsam nervus non ingrediatur. Natura etenim corporis partes fingens, perficiensquæ, fecit ut ipsæ citra doctrinam, proprias actiones aggredierent. Quippe omnium quæ à consilio & voluntate pendent actionum instrumenta, esse per se docta videntur: ani- maliaquæ omnia simul atque genita sunt, & spirant, & vo- cem edunt. Quare mirum esse non debet, genitales partes, eas actiones, quarum gratia à natura sunt insti- tutæ, protinus ab initio cognoscere. Vterus siquidem, quum semen genitale conceperit, donec fuerit perfe- ctus foetus, exactè clausus permanet: perfectio verò foe- tu, plurimum aperitur, ac deinde sic apertus excludit. Populares autem hæc, propter crebrum euentum, con- temnunt: utpote, qui nihil quod re vera sit admirabile, sed ea

sed ea duntaxat, quæ rara vident, prosequuntur admiratione. Quid autem in rerum natura, potest admirabilius contingere, quàm quod nouè perpetuis mensibus clauditur os uteri adeò exactè, vt ne specilli quidè acumen admittat: perfecto autem fœtu, vsq; adeò distèditur, vt totum animal per ipsum egredi possit? Ne igitur dubites pudendorum vim per se doctam esse: vt fistulosum hoc, neruo sumq; corpus, vbi ad coitum insurgit animal, à naturali facultate, quæ ipsum potest attollere protinus distenda. Cuius rei simile, & in corde, & arteria planè videre est: nisi quod horum motus perpetuus existit, quia necessaria nobis est eorum actio: fistulosus verò neruus, non semper mouetur, sed quum vsus requirit. Quum ergo sic fuerit extensus, sequitur atq; illum replet ex arteriis spiritus: quemadmodum pulmo thoracem, ob eam quam habet ad ipsius motum consequutione. Atq; eam actione, satius est, vt ad neruū, quàm ad arterias referas: quum præsertim omnes functiones, ex propria partium essentia, nō ex earū situ, provenire, rationi cōsonum sit. Arteriæ itaq; nullam aliā in pudendo habēt actionis vim: quàm in vniuerso corpore: licet calfactis lumbis par sit, vt arteriæ calidiores reddantur, & magis etiam pateant ipsarum ora. Quamobrem non exiguam tunc spiritus essentiam, in fistulosum neruum effundunt: qui paulatim impletus, eum extendit: ita vt tota ipsius essentia consistere in fistuloso neruo videatur. Ex dictis igitur constat, vel ob arteriarum ora immodicè patefacta, vel vaporosum spiritum in fistuloso neruo ortum, priapismum oriri. Cæterum ab vtrisque ipsum fieri posse existimo: crebrius tamen ob arteriarum ora patentia. Porro medicamenta excitandæ tentiginis vim obtinentia, tum epota, tum pubi lūbisq; admota, calida omnino, ac flatulenta sunt: quemadmodum contraria omnia, minimè flatus excitant, ac potius refrigerant, quàm calfaciant. Sunt præterea

Populares eam quæ raro vident, prosequuntur admiratione.

Priapi tensio-
nem ad neruū
potius referen-
dam esse, quàm ad
arterias.

Lumbis inca-
lescentibus, ar-
teriæ penis ca-
lidiores red-
duntur.

Penis essentia
tota in neruo
fistuloso consi-
stet.

Priapismus vni-
de oriatur.

Medicamenta
excitandæ ten-
tigni qualia
existant.

Alimenta vene-
nera.

Priapismo qui
soleant vexari
plurimum.

Cantores olim
q̄ nostro sæcu-
lo erant longe
cōtinentiores.
Pudēda castis
reddi exilia
& rugosa.

Ignauia robur
excluit.
Exercitatio vi-
res augere so-
let.

Mammæ.

alimenta quædam, quæ, quod plurimum gignant se-
minis, excitare ad libidinem possunt. Iam verò, qui
quum plurimo semine abundant, à concubitu absti-
nēt, ii interdum priapismo vexari solent, præsertim si
veneris imaginibus molestantur, nec studeant, vt mul-
ta exercitatione sanguinis abundantiam dissipent. At

cantores & athletæ, qui iam inde ab initio nullam vi-
tæ partem venereis illecebris contaminarunt, nullam
admittentes eiusmodi uel cogitationem, uel imagina-
tionem, iis pudenda & exilia, & rugosa fieri, ve-
luti senibus, consueuerunt. Siquidem præter cætera
quæ accidere solent iis, qui protinus iuuentute prima
immodicè sese permiserunt libidini, id etiam euenit,
vt horum locorum vasa, amplius patentia, maio-
rem ad se sanguinis copiam alliciant, & coeundi cu-
piditas magis increascit. Ignauia siquidem (vt inquit

Plato) excluit : proprii autem officii exercitatio,
robur augere solet. Sic mammæ quoq̄, in iis
quæ nondum imprægnatæ fuerunt, con-
tractæ permanent: in aliis verò à par-
tu infantulos suos lactantibus,

uastissimæ euadūt, atq̄ ita

magnæ permanent

lac fundentes,

q̄diu foe-

tum lactauerūt:

quo ablato, haud ita


multò post, à lactis genera-
tione desistunt.

G A L E N I P E R G A

M E N I D E D I F F E R E N T I I S

F E B R I V M L I B E R . I .

C A P . I .



PROPRIAE Ac maxime principales febrium differentiae sunt, quae sumuntur ab ipsa febris substantia, quae in calore praeter naturam consistit. Ut si dixerimus, febrium aliae quaedam mordaces: aliae vero sunt mites. At reliquae differentiae, ab accidente aliquo deducuntur. Ut quum

Febrium differentiae maxime principales sunt, quae sumuntur ab ipsa febris substantia,

Febrium differentiae ab accidenti desumptae.

dicimus, febrium aliae pallidae, aliae rubae, aliae liuidae. Porro differentiae caloris praeter naturam, & ex eo quod magis & minus, & ex materia in qua calor acceditur, & ex modo motus eiusdem caloris, sumuntur. Sunt autem omnino evidentes, quae in eo quod magis, aut minus, calor est accensus, consistunt. Quo in genere differentiae, consueverunt medici magnam ac parvam febrem vocare, improprie quidem rei quali nomen quanti tribuentes. Quae vero a caloris materia ducuntur, maxime propriae differentiae caloris praeter naturam sunt. Atque haec sane ternario numero ambiuntur. Nam aut incalcescit ipsius cordis corpus: aut qui continentur in ventriculis eius humores: aut sola quidem aerea spiritalisque substantia sufficienter incaluit: humores autem & solida corpora, incalcescunt quidem adhuc, nondum autem sunt calefacta. Mista siquidem est in arteriis omnibus,

Febrium differentiae sumptae a materia cui haeret calor praeter naturam, sunt tres.

O o o ii

Aeream substantiam esse mixtam per omnia sanguini.

Tenuis substantia facilius alteratur quam crassa.

spirantibus per infinita foramina, aerea substantia sanguini: ac nihilo minus in corde ipso, ceu * confluxibili & cōspirabili cum vniuersis arteriis. Incipit itaq; hic præter naturam calor, quē nominamus febrem, aliās ex alio eorum, quæ nuper diximus: spargitur autem, atq; vnā cum patiente afficit duo reliqua genera. Facillima igitur ab humoribus ad spiritum caliditatis transumptio: non æquē autem promptē vnā cum spiritu: accenduntur humores. Corpus etiam solidum, humoribus atq; aeræ substantiæ facilius impartitur calorē, q̄ ipsum ab eisdem suscipiat. Omnis siquidem substantia tenuis, promptius alteratur q̄ crassa. Est autem tenuissima quidem aeris: crassissima verò corporum solidorum: media humorum substantia existit. Cæterū solidas partes, continentia: humores, contenta: spiritus, impellentia appellauit Hippocrates.

C A P.

I I.

Ephemerarum causæ.

Pestilenti morbo correptos, fugiēdos esse.

Tabidos, & putridum exspirantes, esse abigendos.

Febres quæ occasione accendant.

QUod igitur ex laboribus, ira, tristitia, solis ardoribus, frigore, vigiliis, cruditate, ebrietate, & crapula, nonnulli febricitare cernantur, omnibus ē in confesso: quemadmodum etiam, q̄ pestilens aeris constitutio febres conciliet: quodq; periculosa sit conuersatio cum laborantibus pestilenti morbo: quum nimirum is non secus sit contagiosus, q̄ scabies aut lippitudo. Sed neq; tutum est cum iis qui tabe correpti sunt, conuersari: neq; (ut summam dicam) cum illis qui spiritum putrem reddunt. Iam verò, qui consueta exercitia omiserint, & aliis morborum generibus, & febribus maximè corripitūtur. Plethora etiam, vitiosi cibi, medicamēta, estusq; circa canis syderis ortū, atq; alia id genus complura, similiter febres accendunt.

C A P.

I I I.

Elementa corporum, quæ.

IGitur calidum, frigidum, humidum, atq; siccum, corporum elementa existunt: ex ipsorumq; temperaturis primi constituuntur morbi: quorum vnus ē

DIFF. FEB. LIB. I.

febris, ubi in corde quædā præter naturā caliditas generatur. At differentię calorıs, à triplici differētia materię desumebantur. Siquidem uel in ipso corpore cordis, uel in humoribus, uel in spiritu, calor præter naturam accenditur. Præincipiunt autem causę quædam notissimę, in omni febrium constitutione, quatenus dictum est. Sed neq; sat est, si calor aliquis dicatur esse præter naturam, adhuc ut dici febris mereatur. Oportet siquidem prius ut cor illo incalescat, alioq; calor à sole aut ab igni inductus febris esset dicendus. Porro iracundia est ueluti feruor quidā, ac motus vehemens potentię irascibilis, in corde* delitescens. Simul autem cum eo feruore calfit aliquando spiritus: aliquando substantia sanguinis. Quod si ita contigerit, ut ea corpora quę in se adniserunt caliditatem, longo eam tempore retinere sint apta, licet motus cordis sedetur, in hisce tamen permanset calor præter naturam, atq; inde hominem febricitare est necesse. Huiuscemodi autem febris habet originem à motu atq; feruore naturę caliditatis. Quę autem ex tristitia fit, ex solo motu, non autem ex feruore gignitur. At illius quę labores sequitur, principium est musculorum, neruorum, copularum, & articularum motus immoderatus. Ea si quidem primò, calorem quendam concipiunt. Dein verò continuatim calor ascendit ad cor: ac tunc homo necessariò febricitat. Quę autem ex densitate cutis accenditur, febris, qualis maximè constipatis atq; astrictis corporibus accidere solet, mordaci effluxu in corpore coaceruato, contingit. Semper enim corpora animalium distantur: idq; duplici modo: nempe effusis ad exteriora vaporosis fuliginosisq; superfluitatibus: ac rursus intus attracta refrigerante ac ventilante natium calorem aerea substantia. Quum igitur uehemens aliqua causa cutim ipsam condensans, meatus angustiores reddiderit, sæpius in plethoricam disposi-

Ooo iij

213

Febris ē calor præter naturā in corde accensus.

Causę procatartice.

Iracundia quid.

Febris ab iracundia qñ gignatur.

Febris orta à tristitia.

Febris ab exercitio immodico.

Febris a cute densata.

Diffuari aialia corpora duplici modo.

*Astitione cur-
tis, quō febris
sequatur.*

*Cruditatē pa-
tietium, qui nā
facile i febres
incidāt: & qui
ægre.*

*Febres oriri so-
lent ob obstru-
ctiōes meatū.
Putrescunt fa-
cile, calida &
humida, si con-
clusa in calidis
locis nec diffle-
tur, nec refrige-
rentur.
Plenitudo ad-
mires.*

tionem incidit corpus: si & uapidum & optimum, quā effluit, extiterit. At si fuerit mordax & acre, nonnunquam febre corripitur: quo tpe etiam calor maximè auget, refrigerio extrinsecus adueniente priuatus. Acris autē ac mordax superfluitas * effluit iis, qui aut natura vitiosos habent humores, aut prauis cibis vtuntur, aut sæpius cruditate vexantur: maximè si post eiusmodi cibos aquam vitiosam biberint. Idem his quoque accidit, qui supra modum laborant, aut vigilant, aut cogitant, aut medicamina acuta iugiter sumunt. Eorū igitur qui cruditatem patiuntur, ii quidem qui prauis succis redundant, ac malè diffiantur, aut intempestiuè laborāt, aut balneis superfluis vtuntur, facile corripiuntur febribus: Qui verò boni habitus sunt, itegreque diffiantur, & quiescunt, regionemque ventriculi & hepatis calfaciunt, impossibile est, vt febricitent. Nam in eisdem residet ventriculi & hepatis partibus, quicquid corruptum est, ac paulatim coquitur, redditurque optimum: sicuti & iis qui se motibus vehementioribus torquēt, aut æstiuo sole, aut balneis calidis dulcium aquarum vtuntur, quicquid vitiatum est, recipitur in corporis habitū. Quibus verò corrupti cibi descenderunt in ventrem, * eos febris nō corripit, nisi ob alias causas: veluti si defatigati sint ob crebriorem deiiciēdi necessitatem: aut ventrem inflammatio tētauerit. * Porro per obstructions meatuum, & humorum constipationes, ob putredinem solet febris oriri. Promptissimè namque putrescunt omnia calida & humida, in calidis locis contenta, nisi diffuari ipsa & refrigerari contigerit. * Quin etiam in altera plenitudine quæ ad vires dicitur, succi cito ad corruptionem deueniunt, * quum nec vincantur, nec concoquantur à facultate, vtpote imbecilla existente. Propterea autem quicūque cibi glutinosi atque crassi sunt, * ii ratione putredinis magis morbifici existunt: quādoquidem succi ex ipsis

geniti, longè promptiores sunt, vt & in meatibus hæ-
reant, & impingantur. At acres & attenuantes cibi, q̃
mali succi sint, febres etiam accendunt. Partes etiam
quæ experiuntur inflammationem, ratiõe putredinis
similiter febres inducunt. Impactus siquidem ĩ eis qui
iñfluit humor, si natura calidus sit, nec diffletur, actu-
tum putrescit. Si igitur fluxiõe ipsam exquisitè ama-
ra bilis pepererit, caliditas erysipelatosã partem occu-
pat: si verò sanguis, phlegmonosa: at si ex vtriusq̃ mi-
scellaneus humor, vel sit erysipelas iñflammatiõis par-
ticeps, vel inflammatiõ erysipelatis: nomen quidẽ ab
humore excellente suscipiens: cognomen autem ab al-
tero. In hisce autem omnibus consortii lege febris ac-
cenditur. Nã proxima pars calefactæ particulæ, simul
cum ea calfit, donec ad cor * dispositio ipsa peruene-
rit. Etenim in carbunculis id quod continuum existit,
similiter concalescit. Fiunt autem ex sanguine qui-
dem satis calido, & ad atræ bilis naturam, propter ad-
ustionem, conuerso. C A P. I I I I.

C Alidiores aeris ambientis status, per inspirationẽ
quidem manifestè cor calfaciunt: corpori autem
extrinsecus circũfusi, totum ipsum calidius reddunt:
sed præsertim arterias: vt quæ ipsius substantiæ aeris
ambientis aliquid ad se alliciant: * cum quibus omni-
bus affici etiam cor est necesse: & quum calidius impẽ-
dio fuerit, ipsum primũ atq̃ præcipuè, calorem fe-
brilem suscipere, ac dein vniuerso corpori communi-
care. Pestilentis autem febris, iñspiratio aeris vitiatĩ &
putridi maximè esse in causa videtur. Fit aliquando
etiam ob eos qui sunt in corpore humores ad putre-
scendum paratos: quum exiguam aliquam occasiõe
ad febris originem ab aere ambiente acceperit aĩal.
Aeris autem putredo accidit, vel ob cadaverum multi-
tudinẽ minimè crematorum: vel ob lacuum, vel pa-
ludum æstiuo tempore euaporationẽ. Cæterum nulla

O o o iiii

Inflammatæ par-
ticulæ, cur fe-
bres succedat.

Caliditas ery-
pelatosã, &
phlegmonosa,
quæ infestent.

Carbunculĩ ori-
untur a feruen-
te & melacho-
lico sanguine.

Aer impendio
calidior, quid ĩ
corpora nostra
moliatur.

Pestilentis fe-
bris cã est iñpi-
ratio aeris vi-
tati & putri-
di: necnõ vitio-
sus succus in
corpore, ad pu-
trescendum ha-
bilis.

Causam nullā
posse agere,
absq; patiētis
corporis apti-
tudine.

Pestilēti febre,
quę corpora fa-
cile, & quę dif-
ficillime corri-
piantur.

Aeris constitu-
tio calida &
humida, pesti-
feris est mor-
bis obnoxia.

Corpora con-
sistentia cau-
sis morbisicis,
facile corripū-
tur.

Corporum di-
spositiones dis-
similes.

Corpus cōtra
pestilentē aurā
debet reddi pu-
rissimū, ac ma-
xime tum per-
spirabile, tum
causæ præpo-
tenti contra-
rium.

Pestiferæ fe-
bres oēs a pu-
tredine oriun-
tur.

causarum sine patientis aptitudine agere potest. Alio-
qui ex æquo omnes afficerentur ab eadem causa. Quæ
igitur vitiosis succis redundant corpora, obstructa q;
sunt, atq; inerti victus & exercitii ratione educata fue-
runt, ea sanè per pestilentes constitutiones ambientis,
statim à prima inspiratione initium putredinis sumēt,
ac plurimum in malo prouehentur. Quæ verò contra-
rio modo disposita, nonnulla quidem nihil: nonnulla
verò adeò exiguum læsionis percipient, vt minimo
negotio reuerti ad naturalem habitum possint. Iā ve-
rò, quum aeris temperatura, ad caliditatem atq; humi-
ditatem immodicam fuerit conuersa, pestilentes mor-
bi exorientur: qui ea tantum corripient corpora, quæ
vt afficiantur, prompta & idonea erunt. Etenim ea cor-
pora, quorum dispositiones cōsentiunt causis morbi-
cis, facillimè contaminantur: quorum verò renitunt,
ac reluctantur, quantum viribus ac magnitudine con-
trarietas valet, tantum inuicta cōtingit permanere ea
corpora. Quum enim corporū dispositiones dissimiles
ac multiformes existant, quædam facilè alterantur ac
patiuntur à causa in ipsa operante: quædam insupera-
biles atq; impassibiles permanent: quædam ægrè pa-
tiuntur. Est autem ipsius medici opus, correctiuum er-
rorum omnium, qui circa humanum corpus contin-
gunt. Quare in iis omnibus prima esse debet, atq; com-
munis intentio, vt corpus q̄maximè purum sit, ac per-
spirabile: secunda autem: vt præpotenti causæ aduer-
setur, q̄maximè fieri poterit. Nam quibus horum con-
traria insunt, corripuntur celeriter, acerrimeq; labo-
rant,

C A P. V.

Igitur omnes pestiferæ febres à putredine originē
ducunt. At ephemeræ, minimè putredinē humorū
sequuntur. Sed qui quidem ex solis incendio febri-
tat, ab agentis causæ caliditate affici natura est aptus.
Qui ex ira, huic feruorem quidem fieri caloris qui in

corde consistit, est necessarium: non tamen etiam putredinem. Sic & ei qui supra modum exercitatus est, vehementior calor præter naturam sine humorum putredine in corpore accenditur. Cui autem cutis astricta est, quam prius acriores superfluitates expirarent per eam, postea quæ sunt retentæ, coacervatæque, in febre incidit, nulla interueniente humorum putredine. Porro quæ tumoribus inguinum superueniunt febres, omnes (authore Hippocrate) perniciosæ sunt, exceptis ephemeris. Sunt si quidem quædam febres è genere ephemerarum, superuenientes tumoribus inguinum: quæ quidem ab eis differunt quæ ex humorum putredine eueniunt, quæque vel in aliquo viscerum, vel in cavis & maximis vasis radicem habent suæ generatiōis. Quandoquidem quæ inguinum tumoribus ephemeræ superueniunt, concalfaciunt semper partes vicinas donec usque ad cor febrilis calor pueniat: quod tamē putrida fuligo non peruenit: sed ibidem, in loco inguinis circumscripta remanet, sola alteratiōe per continuum facta, atque usque ad cor ipsum extensa sola caliditate. In putredine autem quæ aut in visceribus, aut in magnis fit vasis, quidam veluti fumus, ex putrescentibus succis ad ventriculos cordis attollitur. Præterea in tumoribus inguinum omnes simul, collectique humores putrescunt, siue per vnum, siue per duos continuos dies: utpote in vno eodemque loco compacti: at qui in visceribus sunt, vasisque magnis, quum perpetuo fluant, suoque contactu vicinos ad putredinem trahant, spatio temporis putridum calorem accendunt.

C A P. V I.

Humorū autem putredo, quæ in vasis fit, similis est ei quæ in inflammationibus abscessibus, atque tuberibus accidit, duplex existens secundum genus. Nam aut fit vincete natura: aut omnimodo superata: aut adeo imbecilli reddita, ut nullam amplius in pu-

Ephemeræ
oēs fieri nulla
intercedente
putredine.

Ephemeræ su-
peruenientes tu-
moribus ingui-
num, quomodo
a putridis dif-
ferant.

Putredo hu-
morū quæ in
vasis fit, contin-
git dupliciter

Pus laudabile
quale esse de-
beat

Vrina optima
ab humoribus
putrescentibus,
qualis.
Vrina pessima,

Ephemere oēs
oriuntur a pro-
catartica cā.

Ephemerarū
vrina & pul-
sus qualis.

Ephemerarū
calor ē perpe-
tuo suavis.

treſcente excremento ad optimum moliri poſſit tranſmutationem: quod quidem tertium genus putredinis ex duobus primis conſtat. Per abſceſſus igitur, integrè ſuperante natura, optimum conſicitur pus, aſpectui album & craſſum, & quaq; verſum ſibi ſimile: læue autem tangenti, ac minimè fœtidum. Nam ſi ſemiputridum fuerit, tertium in tali tranſmutatione genus, quod paulo ante diximus, fit: quodq; ſecundū magis & minus, varias differentias ſortitur. Quotcunq; autem in abſceſſibus putredinis ſunt differentię, totidem & in febribus quę ex putredine ſuccenduntur, ſunt eorum quę in vrinis apparēt, formę varietates. Optima verò vrina quę ex putreſcente humore perſcitur, qui adhuc concoctionem à continenti vaſe ſuſcipiat, eſt quę albam, læuem, æqualē, & minimè fœtidam habet hypotaſim. Peſſima autem eſt, quę i om nibus maximè contrario modo ſe habet. Quę verò intermedia exiſtit, q̄tò ad alteram propius acceſſerit, tantò aut melior eſt, aut deterior.

G A P.

V I I.

Porrò febrium ephemerarum hoc unum eſt præcipuum atq; inſeparabile indicium, q̄ ab aliqua manifesta cauſa p̄ncipienteq; (quam procatarticam vocant) oriatur. Non eſt tamen id ſignum earum proprium. Nam & aliarum quędam, à cauſa manifesta gi gnuntur, quę nimirum præceſſit. Inſeparabile verò ac proprium ephemerarum eſt, vrinę ſtatim prima die concoctio: pulſusq; ad magnitudinem & celeritatē effatu dignam accedens: ita vt frequentia à proportione deficiat ſecundum externam quietem. Eſt autem & magis inſeparabile & proprium, q̄ nullo modo ad celeritatem ea pars pulſus, quę dicitur ſyſtole, tendit: & ſi aliquando contingat hoc, minimum ac vix perceptibile exiſtit, parumq; à naturali tenore mutatum. Sed & caliditatis ſuauitas, proprium atq; inſeparabile eſt.

huiusmodi febrium indicium. Inseparabile quoque, æqualis atque incompressus ascensus, in calore simul & pulsibus: non tamen proprium, quum & aliis quibusdam adsit: sicuti etiam consistente febre mediocritas. Neque enim hoc etiam est ephemerarum proprium: quum eis maximè inest. Proprium præterea, inseparabileque ephemerarum indicium est, cum sudore, aut rore, aut aliquo optimo vapore inclinatio, quam sequatur integritas. Atque hæc quidem est communis ephemerarum febrium dignotio. Earum verò quæ ex aduerso ab ephemeris distinguuntur, quædam in putredine humorum consistunt: quædam solidas animalis particulas occupant. Atque has sanè Medici febres hæcticas appellarunt, vel quia firmæ atque fixæ, perinde ac habitus, sunt: vel quia corporis habitum comprehenderunt: sic enim partes solidas vocitant. Primum autem & proprium, non tamen inseparabile, putridarum febrium est signum, quod nulla procatactica causa eas antecedit: id quod neutri aliorum generum inest. Quandoquidem ephemeræ omnes oriuntur à procatacticis. Hæcticæ autem, quando sine his gignuntur, minimè ab initio inuadunt. Vbi quis igitur citra manifestam, præincipientemque causam coepit febrere, scire oportet eius febris causam in humoribus esse. Interdum tamen aliqua ex procatacticis causis sui ratione febrem accendit ephemeram: succedit autem altera ex putredine humorum, ubi quod afficitur corpus & impurum, & superflui humoris colluie redundans fuerit. Successionis autem ipsius, una quidem propria inseparabilisque dignotio habetur, quod febris ephemera ad integritatem non desinat. Continuit vero aliquando, ut per vigorem ephemeræ, ac multo magis per declinationis initium, signum aliquod permutationis cernatur: videlicet si ea tranquillitas absit, quam adesse oportebat. Initium autem sumere à rigore febrem, ubi nec insolatus, nec præcessit aliqua refrige-

Ephemerarum inclinatio accidit cum sudore vel rore.

Putridæ febres.

Hæcticæ febres occupant solidas corporis partes.

Putridas febres nulla procatactica antecedit causa.

Putrida febris quando succedat ephemera.

Ephemeræ permutari in putridam, quibus dignoscetur indicium.

**Putridarum fe-
brium calor ē
mordax & a-
cris.**

**Putridis febr-
ibus adesse ve-
locē systolem.
Putridarū fe-
brium pulsus.**

**Putridarū vri-
nae, quales.**

**Februm nulli,
quatenus fe-
bri adest pul-
sus durus.**

ratio vehemens, putridarum febrium est proprium si-
gnum: non tamen inseparabile. Siquidem non inest pu-
tridis omnibus rigor: sicuti neque horror. Præterea in-
æqualitas pulsuum atque coloris, siue in principiis, siue in
augmento contingat, huiusmodi febrium est signum
proprium, sed ne ipsum quidem inseparabile. Multo
autem minus inseparabile existit, quæ accessiones ipsæ
habeant plures veluti insultus: id quod superexacerba-
ri vocamus: quemadmodum & pulsuum compressio:
quæ putridarum febrium est propria (nisi alicuius sym-
ptomatis ratione citra febrem ea accadat) non tamen in-
separabilis. Maximum etiam earum febrium quæ à pu-
tredine oriuntur indicium est, mordacitas & acrimo-
nia caloris, quæ perinde ac fumus nares & oculos, sic
ipsa erodere tactum videtur. Sed in principiis quidem
accessionum, ut in quibus calor adhuc suffocatur, su-
perfluitatesque succenduntur intus, non statim ea quali-
tas, ad mota manu, discernitur. At per moram, prædi-
cta caliditatis species effertur ex penitioribus partibus.
Proprium præterea inseparabileque putridarum febrium
est signum, velocitas systoles, quæ manifestum quidem,
in crescentibus febribus: non obscure autem in inci-
pientibus & consistentibus fit. Comitatur autem has
febres, in initiis quidem, pulsus parvus ac velox: quum
verò consistunt, velox simul & magnus. Sic & quæ cir-
ca externam quietem versatur frequentia, in huiusmo-
di febribus deprehenditur manifestè. Cuius similis neque
in ephemeris, neque in hecticis cernitur. Maximum ve-
rò & harum febrium indicium existit urinae cruditas:
earundemque est proprium, imbecilla concoctio. Neque
enim unquam magnū aut effatu dignum concoctionis in-
diciū per huiusmodi febres in primis urinis appa-
ret, si excipiamus eam, quæ fit ex ephemeris febribus
permutationem. At verò pulsus durus nullius generis
febrium quatenus febres sunt, est aut proprius, aut in

separabilis. Comitatur tamen magna ex parte hec-
 ticas febres: nonnunquam verò etiam duo genera alia, sym-
 ptomate aliquo interueniente. Quippe durities acci-
 dit arteriarum tunicis, aut ob congelationem, aut ten-
 sionem, aut siccitatem. Congelationes igitur, vehemē-
 tes algores efficiunt: tensionem verò, inflammatioēs,
 & duri tumores, & neruorum dispositio inflammatio-
 nibus correspondens. At siccitatem, euacuationes diu-
 turnæ, & longi temporis fames, & diutinæ febres ar-
 dentes. In vniuersum autem, quæcunque solidas anima-
 lis particulas vehementer exiccant, sicuti & hec-
 ticæ febres, arteriarum duritiem efficiunt.

Durities unde
 accidat arte-
 riarū tunicis.

C A P.

V I I I.

AT verò hec-
 ticæ febres magna quidem ex parte
 ardentibus febribus solent superuenire, vsque adeo
 productis, ut humorem in corpore cordis cōtentum
 absumpserint: quanquam fieri etiam potest, ut magna ad-
 huc eius portio seruetur. Cæterum illæ non tantum he-
 cticæ sunt, sed etiā tabidæ. Quæ verò manente adhuc
 humiditate gignuntur, ubi cordis occupauerint cor-
 pus, hinc maximè succenduntur, quemadmodum lu-
 cernæ flamma ex ellychnio. Alio autem modo fe-
 bres hec-
 ticæ oriuntur, ubi statim ab initio inua-
 dentes, similem ortum cum ephemeris habent: videlicet
 aut ex ira, aut tristitia, aut lassitudine insigni, aut ardo-
 re solis contractum. Quæ igitur sic gignuntur, non ad-
 modum ægrè curantur. Quæ autem peruenerunt ad
 tabem, iis, ubi iam exquisitè consistunt, & iamdu-
 dum inceperunt, ut medeamur est impossibile. Si-
 quidem earum natura calida est & sicca: quum per
 eas tale quid perpetiatur cor, quale lucernæ ellychniū,
 dum plurimum est exustum. Differt autem tabida fe-
 bris à tabe, siue marasmo. Marasmus siquidem etiam
 absque febre in decrepita ætate solet accidere, extincto
 nativo calore: id quod nihil aliud existit, quam mors, quæ

Hec-
 ticæ ma-
 gna ex parte
 ardentibus
 solent
 superuenire.
 Tabidæ fe-
 bres.

Hec-
 ticas fe-
 bres interdum
 ab initio inua-
 dere, similem
 cum
 ephemeris ha-
 bentes genera-
 tionem.
 Hec-
 ticarum non
 nullas quidem
 facile: alias æ-
 grè curatiōem
 recipere.

Marasmus.

Tabida fe-
bris a tabe,
quō differat.

ferē sine sensu doloris, ac secundum naturam, ex sicci-
tate contingit: sicuti & iis qui præter naturā tabescūt,
altera species marasmi accidit, quæ à Philippo ex mor-
bo senectus vocatur. Tabida verò febris, non tantum
sicca, sed etiam calida est passio.

C. A. P.

I X.

Tabidæ fe-
bris indicia.

Hectica igitur quæ in tabem incidit, febris, cogni-
tu promptissima atq; facillima existit. Nam pri-
mū pulsū atq; calorem perpendas tactu, videbis ocu-
los immodicē concauos, ac veluti in foveas quasdam
reconditos, exhansto iam vniuerso ipsorum humore:
ita vt osium, quibus palpebræ cohærent, eminentiæ
cernantur. Sordes præterea in ipsis siccae ostendūtur,
& quædam veluti squallida dispositio, qualis maximē
inest iis, qui toto die sub solis ardore per puluerē iter
longum fecerunt. Quin etiam in eis est coloris flos vi-
talis extinctus: frontisq; & faciei cutis, rigida, ex sicci-
tate, & squallida. Adhæc sic affecti, frequenter palpe-
bras contrahunt, dormitantium instar: non tamen af-
fectus eorum est somnus, sed potius vigilandi impotē-
tia. Præ macie etiam sunt illis collapsa & concaua tem-
pora: nihilq; in eorum corporibus cernitur præter cu-
tim atq; ossa. Pulsus autem tenuis, durus, debilis, atq;
frequens apparet. Caliditas verò, quum primū ad-
mouetur manus, languida est: paulatim autem, a credi-
nem, atq; erosionem ostendit: ac magis, quum plus tã-
gendo immoraberis. Porro marasmus tunc incipit,
dum cognatus humor, qui in mediis partium similariū
spatiis inspersus est, & ex quo primū vniuersæ par-
tes nutriuntur, periclitatur circa corpus cordis non
amplius adesse. Quandiu enim pars aliqua humo-
ris illius conseruetur, solum febris hectica existet: non
dum etiam tabida. Vbi verò res eò discriminis iam p-
uenerit, vt nihil ex tali humore supersit, tunc exquisita
tabes existet. Est autem hecticarum omnium disposi-

Marasmus quā
incipiat.

Tabes exquisi-
ta quā dicitur.

tio difficilis, vbi præterierit principii tempus: quod nō dierum aut horarum numero, sed ipso dispositionis modo determinandum est. Cæterum quum naturalis temperies cordis primū inuerti inceperit, neq; natiua humiditas protinus dissipatur, neq; virtus laborat plurimū: sed primò fit veluti quædam efferuescētia ipsius humiditatis: quo tempore facilè est eiusmodi febrem sanare, tanq̃ nihil adhuc virtute perpeſsa. Tantū autem virtus laborat, quantum siccitas & caliditas in ipso corde inualuerit. Iam verò, quæ febris æqualiter ab vtraq; distat, ab ea scilicet quæ exquisitè tabida existit, & ab illa in qua nihil est adhuc tale, mediani quodammodo se habet ad curationem, dubio ad partes ambas momento inclinās. Quæ autem tabidæ proximior existit, est vicinior periculo: quum quæ alteri primæ magis adhæret, non paruum salutis spem possit nobis promittere. Fingamus igitur aliquem eē correptum febre, quam præcesserant conspicuæ & procatarticiæ causæ. Si enim febris ipsa ad sequentem diem extendatur, neq; integrè desinat, neq; exaspere tur magis, ariditatem tamen maiorem in corpore repræsentet, talem hecticam fore tibi suspicandum fuerit. Quod si & in tertio die sine cibo permanere voluerit æger, doneq; tertianæ accessionis præterierit horas suspectas, nihilq; effatu dignū priori accesserit febre, aut imminutum fuerit, sed tantummodo quædam exiguæ reliquæ primæ febris procedant, permaneantq; cum ariditate corporis, & caliditate, quæ primo quidam tactu miris sentiat, processu verò, acris, mordax & sicca: huiuscemodi febrem hecticam esse existimandum est. Maximum verò & indubitatum erit eius naturæ indicium, si cibum homini post suspectas horas obtuleris. Statim siquidem vna vel altera hora post cibum exhibitum, quicumq; ægrotantem tetigerint, alteram febris accessionē opinabūtur adesse. Oī-

*Hectice febris
inuestigatio.*

Hæcticas febres post sumptum cibum, excandescere, exacerbantur æqualiter.

Hæcticas febribus nulla adest accessio.

Synochos febribus est tota vna febris continua.

Hæctice omnes pusillæ & equaliter semper a principio usque ad finem existunt.

Tabidarum febrium proprium est siccitas.

Hæcticas sæpe absque siccitate consistere.

Febri cuiuscunque alterati pulsus post cibum, in magnitudine atque velocitatem.

bus namque hæcticis febribus hoc proprium inseparabileque adest indicium, scilicet quod allato cibo accendatur calor, pulsusque ad magnitudinem & velocitatem augetur, sic ut videatur oborta esse incompressa quedam accessio: hoc est libera ab omni inæqualitate, qualis comitari alias febres solet. Nam tametsi in aliis non nullis febribus huiuscemodi insultus incompressi cernantur, ii tamen absque cibo solent accidere. In febribus autem hæcticis, nunquam aliqua accessio conspicitur, sed perpetuo cernitur vna febris continua, ut illa quæ synochos appellatur. Ea tamen quandam veluti flammam plurimam admoventi manum possidet occurrentem: pulsusque ædit celerrimos, frequentissimos, atque maximos. In hæcticis autem febribus, neque multa occurrit caliditas, pulsusque tanto minores, rariores, atque tardiores sunt iis, qui per synochos fiunt, quanto etiam caliditas ipsa est minor. Commune itaque omnibus hæcticis febribus est, quod pusillæ, & semper a principio usque ad finem æquales existant. Proprium autem est tabidarum siccitas. Nam sine siccitate sæpius hæcticæ febres consistunt, quam minimè in tabem degenerant. Iam cæteras febres quæ incompressas accessiones sortiuntur, omnino compressio aliqua comitatur, dum cibus ingestus fuerit in accessionis principio. Hæcticis autem, post cibum assumptum, quedam veluti inconcussus insultus fieri contingit: qui tamen non est accessio: sed incrementum caloris, atque promotio pulsus in magnitudinem atque velocitatem, qualis cuiuscunque alteri, post cibum solet accidere. Quamobrem alteratio ipsa tandiu perdurabit, donec distributus cibus appositusque, humectauerit cordis ariditatem. Postea verò corpus ad pristinum reuertetur statum, in quo antea quam cibus exhiberetur, conspiciebatur. Quod si rursus nutrire velis, vel in diuersis temporibus, senties semper calorem post cibos adauctum: pulsus autem (ut dictum

dictum est) alteratos: utpote quibus idem videtur accidere, quod calci & lapidibus calefactis: quorum nimirum caliditas arida per aquæ affusionem, ab humida substantia nutritur. Humida enim caliditas, quæ sicca, vires habet non parum euidentiores. At verò siccam in hecticis febribus esse caliditatem, quas consequitur tabes, hinc constat, quod nullus eorum qui habitu corporis sunt humidiori, statim ab initio huiusmodi febre correptus fuerit. Quicumque autem sunt natura sicciores, ac præsertim si temperiem etiam calidiorem fortiantur, vitamque elegerint in laboribus, vigiliis, curis, tenuique victus ratione, hos statim ab initio solet hectica febris inuadere, ex ira, vel tristitia, ac magis æstate, statuque temporis calido & sicco, ac loco præterea con simili. Ac terminus talium hecticarum principii est, si eo tempore, quo solent ephemeræ ad integritatem desinere, non solum istis nihil tale accidat, sed siccitas et manifeste intendatur. Alter verò cuiusdam veluti ipsius augmenti, atque integræ perfectionis terminus, est tertiæ diei accessio. Nam si tunc nec altera accessio superuenerit, neque ægrotus absque febre fuerit, adaucta insuper siccitate, proculdubio hic hectica febre laborat: quæ progressu temporis cito ad tabidam conuertetur, nisi recte curetur. Terminus autem permutatio nis ipsius ad tabem est, dum pulsus debilis simul atque durus sentietur, qui quidem necessario etiam erit paruus & frequens: non tamen propterea febris dicitur tabida: sed ob id potius, quod debilis atque durus existit. Debilitas siquidem, vehementem sequitur febris interperantiam: durities autem, ariditatem. Si igitur huiusmodi affectus cor occupauerit, hinc febre tabida necessum est animal laborare. In eandem verò incidunt febrem ex ardentibus atque acutis febribus plures, qui recte curati non sunt: quique quum egerent potione frigida, non solum eam non biberunt, sed nullum etiam

*Hectica statim
ab initio, quæ
prehendantur.*

*Tabida febre
tunc laborabit
animal, quum ca-
lor hecticus iam
ipsum cor oc-
cupauerit.*

Tabes quibus
soleat superue
nire.

Tabes corrip
cor quibus ex
causis possit.

Hæticam mi
sceri interdum
cum putrida.

Febris ex info
latu.

Febris ex cute
astricta.

aliud refrigerans medicamen applicuerunt thoraci et
scordis. Quin etiam hepatis ac vetriculi inflammationi
bus, nisi recte curentur, tabes superire consuevit: affe
ctione ipsa cordi communicata. Si quidem tabe corri
pitur cor, interdum quidem ex se ipso: sicuti per excā
descendit, vehementesq; atq; diurnas tristitias: non
nunq; verò ex ardentibus febribus: aliquando autem
ex pulmonis ac thoracis affectibus: ac p̄sertim ex em
pyemate & phthisi: atq; adeò, ex diurnis nobilium
partium inflammationibus. Similiter in liēteria & di
arrhœa, si vel ab initio statim, vel progressu tēporis,
febris inuaserit, tabidæ postea febres succedūt. In vñ
uersum autem, quando cūq; præexiccatum cordis cor
pus febrilem caliditatem susceperit, & quæ cum diffi
cultate extinguatur, tabida occupatur febre. Quare
& quum arteriæ circumstantibus partibus calidiores
sentiuntur, maximum sunt hæticarum febrium indi
cium. Vbi igitur sola per seipsam consistit hætica fe
bris, perspicua est, an sit absolutè hætica: an simul &
marasmodis. Vbi verò hætica febris vnā cum putri
da coit, longè difficilior cognoscitur: quāuis ex arteria
rum p̄seuerante calore, motusq; celeritate & frequen
tia, eam discernere possumus.

C A P.

X.I.

Porrò qui ex feruore solis inciderunt in febri, his
cutis magis ad calorem & siccitatem, q̄ pulsus
ad febrilem vergit dispositionem: nam & minus siti
bundi sunt iis, qui æqualem habent caliditatē: & q̄ pri
mum manus admouetur, ingens calor percipitur. Cō
tra res se habet in iis, qui ex cute densata & astricta la
borant: nam in eis reaccenditur calor. At qui ex feruo
re solis ægrotāt, his maximè deuri caput videt: plusq;
ex balneis frigidis vtilitatis & delectationis percipiūt.
Oculi quoq; in eis rubicundiores & calidiores cū qua
dam ariditate videntur, si quidē sine grauedine ac de

stillatione affligantur. Est autem minus calida cutis iis qui ex frigidity febricitant: corpusq; eis in maiorem tumorem attollitur: ac nullus in fronte squalor, qualis illis qui ex insolatu febricitant, sine plenitudine capitis. Siquidem magna ex parte his solet caput reple-ri, nisi quis purum, materiae q; inutilis expers corpus possideat. Solis quippe his caput calferi contingit, si-
ne aliqua plenitudinis noxa.

Febris ex fri-
gidity.

G A L E N I P E R G A

M E N I D E D I F F E R E N T I I S .

F E B R I V M . L I B . I I .

C A P . I .



SUPEREST autem nunc, vt de dif-ferentis febrium quæ ex humorum putredine oriuntur, similiter differamus: id q; vbi admonuerimus prius, non sat esse (quemadmodum multi opinantur) ad omnium febrium generationem si in corpore anara bilis redundet. Alio-qui laborantes arcuato morbo, ad vnum omnes ma-ximis corripentur febribus: id quod nequaquam contin-git, priusquam bilis quæ in illis copiosissima est, computre-scat. Absurdum etiam est credere, in quartanis & quo-tidianis febribus exquisitis, acervari bilem amarā, quemadmodum in tertianis, atq; in caufonide: quum in illis nullum talis succi vestigiū adsit. Etenim febres tertianæ magna ex parte in corporibus natura magis biliosis fiunt, in ætate vigenti (quæ omnium biliosissi-ma est) tempore æstiuo (in quo dominatur is humor) in locis præterea quæ calidam & siccam temperiē pos-

Tertianæ fe-
bres quibus na-
turis magis
sunt familiare

Ppp ii

Quotidianæ
febres quibus
naturis magis
sunt familiares

Tertianæ sunt
a flava bile cō
putrescente.

Quotidianæ
sunt a pituita.
Quartanis fe-
bribus quæ o-
rigine pſtent.

Rigor qualis
tertiariis, quar-
tanisq.
Intermittentiū
februm, & cō-
tinuariū disci-
men.

Intermittentiū
februm tres
differentiæ.
Continuarum
spēs duplex.

sident, in similiq; aeris ambientis constitutione, ac bre-
uiter, in homine q laborib⁹, curis, vigiliis, æstu, tenuis
victus ratione, eademq; calida & sicca, ac deniq; medi-
caninum calfacientium & exiccantiū immodico vsu
fuerit commaceratus. Quotidianæ verò, naturis in q-
bus pituita superfluit, sunt familiares: in hyemeq; præ-
cipue, atq; in omni locorum & temporum statu frigi-
diori atq; humidiori, gignūtur. Ex ætatibus porro, se-
nilem atq; puerilem infestant magis: præsertim si acce-
dat otiosa vita, quam crapulæ comitantur: atq; etiam
si post pituitosos cibos, quispiam balneis vtatur. Neq;
etiam ii qui quotidiana febre tenentur, amaram euo-
munt bilem, nec per ventrem inferiorem aut sudores
illam excernunt, quod in febribus contingit tertianis.

Hæ siquidem flava bile putrescente gignūtur. At quo-
tidianæ ex pituita: quemadmodum quartanæ ex atra
bile ducunt originem. Proinde corporum naturæ ma-
gis ad atram bilē proclives, ex ætatibus, præcipue de-
clinans: ex anni verò temporibus, maximè autūnus,
ac breuiter victus vniuersus frigidus atq; siccus, quar-
tanis febribus originem præstant. Quare & rigor qui
vtrunq; genus febris antecedit, haudquaq; similis est:
* sed qui in tertianis quidem accidit, representat sen-
sum causæ efficientis, veluti rei cuiusdam pungentis,
ferientisq;. Qui verò in quartanis, tanq; refrigerantis.
Porro febres intermittentes, quæ nimirum ad integri-
tatem desinunt, ortum habent ab humore qui per om-
nes corporis partes suo motu defertur. At in p̄tinuis,
humor delitescit atq; continetur in venis.

C A P.

I. I.

Intermittentium igitur tres sunt omnes numero
dñg, quotidiana, tertiana, & quartana: quotidiana
quidem, ex pituita: tertiana autē, ex flauæ bilis: quar-
tana deniq; ex atræ putredine propagata. Continua-
rum autem quæ ex flava bile proueniunt, duplex spe-

tes habetur: vna quidem, earum quæ appellantur synochi: quarum vniuersum tempus vnica accessio existit, à principio vsq; ad finem extensa: altera verò earum quæ idem cum genere nomen habent, cōtinuæq; dicuntur, atq; in pluribus * particularibus circuitibus continentur. Earum igitur quæ appellantur synochi, tres differentię connumerantur. Nam earum quæ dā à principio ad finem vsq; perseuerant æquales: quæ dā paulatim augentur: aliæ decrescunt, atq; minuuntur. Vnde nonnulli primas quidem homotonas acmaasticasq;: secundas epacmaasticas: tertias paracmaasticas: hoc est vniformes, inualescentes, & decrescentes, nominant. At continuarum duæ sunt differentię primæ. Siquidem earum nonnullæ quidem, tertio quoq; die inualescunt exasperanturq;: referentes naturam tertianæ febris: aliæ verò etiam die intermedio exacerbationem faciunt: Neutræ tamen harum ad integritatē desinunt. Earum igitur continuarum quæ die intermedia accessionem faciunt, nonnullæ quidem formam quotidianarum seruant, duas inuicem accessiones simillimas conficientes: aliæ verò, quum duas dissimiles faciant, simillimam primæ tertiam efficiunt: atq; secundæ quartam: instar duarum tertianarum progredientes. Hæ igitur, ex bilioso magis: alteræ verò quæ singulis diebus similem accessionem faciunt, ex pituitoso humore consistunt. Est & tertium genus febriū continuarum, quæ perrarò, tamen eueniunt, quarum accessiones quartanarum figuram progredientes ostendunt: nec desinunt tamen integrè. Quemadmodū autem febris tertiana aliquando fit duplex, & aliquā triplex: sic hæc etiā non duplex modò, sed triplex potest euadere.

C A P.

I I I.

QUæ igitur à flaua bile per sensibiles corporis partes delata oritur febris, ea cum rigore inuadit, atq; ardētis febris similitudinem gerit, & bilio-

Synochi uniuersum tps est unica accessio.

Synochorum tres differentie.

Homotone febres.

Acmaastice feb.

Epacmaastice feb.

Paracmaastice feb.

Continuarum duæ dñæ.

Cōtinuā quartanam reperi ri perraro.

Tertianæ feb. symptomata.

Ppp iii

*Tertianæ ex-
sita quæ.*

*Accessiones fe-
brium quæ fa-
ciant breuior-
es, longiores
que.*

sis vomitibus, aut deiectionibus, aut sudoribus, vel ho-
rum quibusdam, vel omnibus simul, soluitur. Huius
febris accessio duodecim ad summum horarum æqui
noctialium interuallo finitur. Vocamus autem ipsam
exquisitam tertianam, quæ in temperatura laboran-
tis biliosa, & anni tempore, & regione, & victus ratio-
ne calidis & siccis consistit. At verò copiosior bilis, ea
quæ patuca est, longiorem facit accessionem: tenuis au-
tem, crassa breuiorem. Sic & vigor, maior quidem,
breuiorem: imbecillior autem longiorem. Præterea
corporis dispositio, rara quidem, breuiorem: densa ve-
rò longiorem. Tempus autem intermissionis in hac fe-
bre, nullum habet humoris putrescentis ex pulsu per-
ceptibile indicium, in die, aut nocte, quæ consequitur
accessionem. Quum verò parumper succenditur, vix
agnosci potest in primis diei aut noctis subinde sequen-
tis partibus. Manifestius autem circa fines ipsius diei
uel noctis: atque adhuc manifestius die proxima, quæ vi-
delicet antecedit accessionis diem vel noctem. In illa
verò iam signum euidentius apparet, ac multo etiam
magis accessione iam incipiente: atque adhuc plus, inua-
lescente febre. Quum verò iam consistit, minus quàm
quum augebatur: multo quæ; minus ubi iam declinauerit.

C A P. I I I I.

*Quotidianæ
febris descri-
ptio.*

Est & alia exquisitæ simplicitatis febris, quæ ex pu-
trilaginosa pituita ortum habet, per sensiles à na-
tura partes impulsæ. Incipit autem à refrigeratione ex-
tremorum, & horrore magis quàm rigore. Cum difficul-
tate per eam accenditur calor, ac longum consumit tē-
pus, dum inualecendo peruenit ad summum. Quoniā
verò is ex quo cōstituitur humor, frigidus ē & humi-
dus, ac præterea lentus & tenax, iccirco ægrè accendi-
tur, ac tardè mouetur, sæpius quæ; in foraminibus hæret.
Opprimit autem atque aggrauat aliquando virtutem:
vnde inæquales ac debiles magis, paruos quæ; efficit pul-

sus, quum primū accessiones inuadunt, atq; in primis incrementi partibus. Fiunt & in biliosa febre circa accessionum principia, singuli quos diximus pulsuum affectus: in ea tamen statim desinūt: cætera verò, nec non inæqualitas, plerunq; tali febre inuadente nō adsunt. At postq̃ cessauerit rigor, nō multum post calor accenditur, veluti ignis effulgens, purusq; , omnis fumosæ fuliginis expers. Pituitosi autem humoris caliditas, ignem humidum ex accensis lignis viridib; refert. Iccirco & * exiguæ euacuationes ab ipso, & accessionis spatium longius producit: neq; intermissionis tēpus est adeò vt in tertiana syncerum, sed humoris putrefacti seruat indicium. Attamen quum exquisitè suā naturam seruauerit, pleriq; & mihi non rarò videtur habere puram intermissionem. Hæc febris naturas cōsequitur corporum & tempora, & loca, & status, artesq; , & victus rationem, aliāq; omnia prorsus alumina pituitæ. Accenditur autem singulis diebus, etsi minus calida sit, q̃ biliosa tertiana. Hæc enim, quū humorem habeat minimo negotio inflammabilem, facileq; quicquid ex eo efferbuerit, totum propter subtilitatē in accessione expurgetur, ad puriorem quandam integritatem terminari videtur: atq; exiguum quoddā vestigium post paroxysmū, putridæ caliditatis relinquere. Quæ autem ex pituita febris accenditur, in accessionum declinationibus nō expurgatur integrè, neq; parum relinquit eius quod veluti succendi videtur: ac proinde intermissio eius longè deterior est: ac secundæ accessionis multo magis festinat insultus.

C A P.

V.

Tertium febrium intermittentium genus est exquæ sita quartana, quum ex solo atræ bilis humore gignitur, qui frigida & sicca constat temperatura. Succedit autem paulatim, velut lapis aliquis, aut corpus similiter frigidum atq; siccum. Vbi verò aliqua ex eo

Tertianæ & quotidianæ discrimen penes sensum caloris.

Quotidiana accenditur singulis diebus, quia in accessionum declinationibus nō expurgatur integre, vt exquæta tertiana.

Quartana exquæ sita gignit ab atræ bile.

Ppp iii

Quartanarum
rigor, qualis.

Rigorē absq̃
febre aliquan-
do ex pituita
ortum fuisse.

flamma fuerit accensa, nihil fumidum, aut semicōbu-
stū in accessiōe relinquit: atq; iccirco ex hoc humore,
q̃ ex pituita plures euacuatiōes oriunt, intermissio q;
exquisite pura videtur: quandoquidem quicquid atrę
bilis accensum fuerit, exhauritur atq; discutitur. Quā
obrem in sic affectis talis est rigor, qualis iis, qui vehe-
menti gelu frigescent. Hanc autem febrem necessariō
antecedunt, quæcunq; atram bilem accumulāt. Cæ-
terū accessio ipsius, quod quidem ad longitudinem
ptinet, similis est tertianæ: nōnunq̃ etiam & longior,
quum videlicet exquisita persistit: nempe à frigidiori
humore producta. Pro multitudine autem & qualita-
te humoris, vigore & imbecillitate potentiæ, necnon
ipsius ægrotantis dispositione, per omnes febres solet
longitudo accessionū variari. Si igitur neq; putrescat,
neq; vehementer per partes sensiles deferatur, melan-
cholicus humor, nunq̃ efficiet exquisitum quartanum
circuitum. Iam verò, regii quidem morbi passiōibus,
diurni melācholicisq; splenis affectus, & colores ī to-
to corpore fœdi: herpetibus verò atq; erysipelatibus,
quæ ex flaua bile gignuntur, cācri & phagedænæ pro
portione quadā rñdent. Verū neq; in his, neq; in aliis
atrę bilis affectibus necessariō febricitant, nisi prius
atra bilis putrescat. Semper quippe natura suis viribus
freta, quicquid * optimum reddi potest ex succis, id
nutriendis partibus conatur assimilare: excernere au-
tem, quod talem correctionem non recipit. Quòd si
quando ob occasionem aliquam id ipsum nequeat ex-
pellere, necessum est, vt diutius delitescens in animalis
corpore, corrumpatur. Sicigit iis qui morbo regio,
atq; atrę bilis passiōibus infestantur, quando biliosi
humores superabūdantes, diutius corpus obsederint,
febris superuenire consuevit. Sed neq; ob redundan-
tem pituitam, febris vnq̃ accenditur, nisi prius compu-
truerit. Ob pituitam autem visum est sæpius, quod ita

possibile arbitrabant veteres, oriri absq; febre rigore.

C A P.

V I.

EX genere quotidianarum est febris quam Hepialam vocant, vbi simul & febriunt, & rigent ægri, atq; eodem tempore in toto corpore vtrunq; sentiunt affectum. Oritur autem hæc febris, ab humore illo, quem vitreū Praxagoras vocat, quicq; est species quædam pituitæ, satis frigidus atq; tenax existens. Siquidem omnis frigidus atq; humidus succus, ad pituitæ appellationem refertur. Cuius tamen plures sunt differentiæ. Est namq; vna species pituitæ, vsq; adeo frigida, vt quā detinetur alicubi, dolores acerbissimos excitet. Atq; hæc sanè vitro fuso est persimilis. Est & alia pituitæ species haudquā exactè frigida, quam pleriq; cum secreta expuunt: sensibilem habens dulcedinem. Accedit tertia species pituitæ, quæ sentitur expuentibus acida: estq; min⁹ frigida, q̄ quæ dicitur vitrea: magis verò q̄ dulcis. Præter has species, est salsa aut ob putredinem, aut ob serosæ humiditatis mistionem. Ex qua quidem febricitantes, non rigent, sed tantummodo horrent. Acida verò ac vitrea pituita, si per partes sensiles deferatur, rigores citra febrem inducit. Quod si modica aliqua in ipsis fiat putrefactio, febrem Hepialam conciliant. At si vehementius putrescant, rigor quidem antecedit, febris verò sequitur, à multitudine caloris frigida materia deuicta. At putrescente dulci pituita, rigor minimè antecedit febrem.

C A P.

V I I.

Porrò si pituita putrescens misceatur amaræ bili, duplex vt causa, sic etiam dispositio iungetur. Alter siquidem humor afferet quotidie accessionem: alter verò tertio quoq; die. Itaq; alter quidē dies, duas accessiones habebit: alter verò, vnam duntaxat: nisi accessionum tempora sibi mutuò cohæreant: cohærētibus siquidem, fiet vna febris confusa, quæ neq; puræ

Hepiala ē ex genere quotidianarum.

Hepiala oritur a vitrea pituita.

Pituitæ quatuor species.

Hepialam fieri etiam a pituita acida.

**Tertianæ feb.
& quotidianæ
mistarum, qua
suor coniuga-
tiones.**

**Amphimerina
febris.**

**Hemitritæus
cōstat ex quo-
tidiana conti-
nua, & intermit-
tente tertiana.
Hemitritæum
inuadere cum
horrore.**

**Hemitritæi du-
plex generati-
onis modus.**

tertianæ, nec quotidianæ formam præ se se feret. Quo-
niam verò vtriusq; febris duplex species est, quatuor
ex ipsis fient coniugationes. Vna quidem, in qua ter-
tiana quotidianæ intermittenti miscetur: altera, in qua
tertiana quotidianæ continuæ iungitur. Tertia, in qua
quotidiana intermittens tertianæ cōtinuæ miscetur:
quarta deniq; in qua permiscetur quotidiana cōtinua
tertianæ continuæ. Harum verò nuper dictarum con-
iugationum omnium, duæ sunt differentiæ: quum ali-
quando quidem in eandem horam accessiones occur-
rant: nonnunq; verò diuersis temporibus superueniāt.
Cæterum ex accessionis forma, nō ex periodorum si-
mili proportione, cognoscenda ipsa febris venit. At
quæ singulis diebus accenditur atq; intermittit febris,
ea amphimerina, hoc est simpliciter quotidiana vocetur.
Quæ verò, intermissionem non habet, continua
quotidiana dicatur. Idem etiam & in aliis febribus est
faciendum iudicium. Iam verò, ex quotidiana conti-
nua, & tertiana intermittente, hemitritæi natura con-
stat. Quum igitur tertianæ insultus cū rigore inuadat:
quotidianæ autem continuæ, sine rigore: sanè si ambæ
in vnam horam (quod interdum per hemitritæum cō-
tingit) conspirent ex æquo, febris cōflata ex vtraq;
horrorem præ se feret, rem quidem rigore minore:
sed maiorem refrigeratione. Quo circa dimidiam he-
mitritæi portionem vtraq; illarum febriū (dico quoti-
dianæ continuæ, & intermittens tertianæ) occupa-
bit. Est autem hemitritæi duplex generatiōis modus.
Nā aut illarū febrium accessiones in vnam eandēq; ho-
ram coeūt, q; altera quidem anticipet, atq; altera pro-
rogetur: vel statim ab ipso initio ambæ febres miscen-
tur & confunduntur. Quæ igitur fit, in vnum tempus
conspirante vtraq; accessione, vnum dūtaxat hemitri-
tæi naturæ paroxysmum sortitur: altera autem om-
nes, à principio ægritudinis, vsq; ad finem: quæ febris

maximè ab omnibus hemitritæos vocatur. Qui autè intermittētis tertianæ & quotidianæ continuæ formam per se cognorit, faciliè complicatas per symptoma propria distinguet. Porro quæ nā ex eis complicatis citius sit habitura finem, ex ipsarum specie, accessionis prolixitate, magnitudineq; præterea ex more, motu, reditu periodorum, necnon ex concoctionis & cruditatis indicis, coniecturandum.

CAP.

VIII.

Febbris igitur, quæ ex intermittēte tertiana, & quotidiana continua, composita est (quā hemitritæū vocamus) aut flauam bilem habet exuperantem: atq; ob id, in ea fiunt tertianæ febris accidētia maiora: aut hæc quidem parcior, pituita verò abundātor existit: ob idq; quotidianæ continuæ affectus firmiores: aut neuter horum humorum alteræ vincit, sed ambo æqui pollere videtur: id quod in exquisitis hemitritæis, hoc est semitertianis, contingit. Ergo si in missione ipsa præualuerit febris tertiana, horridior sit tota febris, & nō nihil sibi in inuasiōe rigoris associat. Confestim verò & feruidior est huiusmodi febris, & incendii plus habet, magisq; ad summum festinat: & aliquid bilis per vomitum, aut per aluum, aut per sudores excernitur. At si altera ex pituita febris sit præpotentior, tunc frig⁹ vehementius extremas occupat partes, & pauci adsunt horrores, ac pulsus magis, & diutius comprimitur: tardiusq; accessio inualefcit, ac longum post tempus consistit: non tamen aut sitim, aut magnum adfert incendium: nec in ea, vt in alia, bilis excernitur. Itaq; in hemitritæo exquisita, quæ ex æquali duarum febrium (quandoquidem humorum duorum) temperatura est composita, veluti pugna quædam inter varios affect⁹ oritur: quum æger nonnunq̃ inualefcēte febre tertiana, atq; ad cutem humores pellente, incalescat vehementi⁹: remorante interim reuellenteq; intrò ipsi⁹

Hemitritæus
exquisita quo
modo consti-
tuatur.

Hemitritæus
non exquisita
quando dicat.

Hemitritæus ē
continua.

Continuæ feb.
nec horrorem,
nec rigore fa-
ciunt.

Hemitritæi or-
tus.

motum febre quæ ex pituita ortum habet: * quum
nimirum is humor sit tardi ac difficilis motus, frigida
& lenta existens materia. Dicitur autem hemitritæus
febris nō exquisita, vbi aut bilem, aut pituita n habet
vincētem. Est & alia secunda copula, commistio q; dua-
rum febrium, tertianæ scilicet & quotidianæ, ambarū
intermittentium: quæ similem quidem nuper dictæ ac-
cessionem facit: hoc tamē interiecto discrimine, quod
hæc quidem intermittatur, atq; necessario ad integri-
tatem desinat: quodq; die secūda cum rigore, aut hor-
rore, sola quotidiana febris inuadat. Quamobrem hu-
iuscemodi febris nō est dicēda hemitritæus, si quidem
ex numero continuarum hemitritæus existit. At si in
vtrōq; genere hemitritæus consistat, non hæc tātūm,
sed multæ p̄terea aliæ febres, hemitritæi dicentur. Cæ-
terū minimē ex duabus continuis, quarum altera ex
bile, altera ex pituita oriatur, potest hemitritæus pro-
duci. Quandoquidem hæc commistio, febrem horri-
dam, & quæ multas habeat reduplicaciones, nō facit.
Nam quum omnis febris continua, sui quidem ratiōe,
si exquisita fuerit, neq; horrorem habeat, neq; rigo-
rem: certē quæ ex ipsis componitur, haudquā horri-
da fiet. Necessum igitur est, si horridus simul atq; con-
tinuus sit hemitritæus futurus, ex duabus ipsum febrī-
bus generari: quarum altera sit intermittens: altera ve-
rō continua. Proinde tertiana mista quotidianæ conti-
nuæ, hemitritæum producit: quam febrē neq; vtrāq;
continua, neq; vtrāq; intermittens efficere pōt. At verō
si quotidiana intermittens, misceatur tertianæ conti-
nuæ, oriri poterit continua simul atq; horrida febris.
Hæc tamen contrario modo se habebit q̄ prior: quo-
niam continuitatem quidem, ex bile obtinebit: horro-
rem verō, ex pituita: reduplicatiōes autem, ex pugna
mutua: ac tunc p̄sertim, quum humores æquas vires
habuerint. Porro quæ de biliosa & pituitosa febre si-

mul mistis conscripsimus, ea transferentes ad * melancholicam, poterimus ipsius cum utraq; illarum cōmitionem & confusionem similiter coniecturari. Voco enim complexionem, dum inuadunt differentibus horis: confusionem verò, si eodem tēpore inceperint, Tres itaq; simul febres complecti quispiam & confundere poterit, ipse per se, ex iis quæ diximus, contemplationem exorsus. Nam horum omnium principiū, fons, atq; elemētum est, singularium febrium formā, atq; figuram exquisitè cognoscere: id quod perfacile existit, quum tres tantum existant numero: nēpe quæ ex amara bile, & quæ ex atra, & quæ ex pituita gignitur. Quare singulæ duas habent differētias, continuæ scilicet intermittētis: ita ut omnium quæ ex humorum putredine ortum habent, fiant sex numero differentia. Quod si quæ alia accesserit particulatim p̄ter has differentia, ea vel ex multitudine humoris, vel ex quantitate vel qualitate putrefactiōis, ac p̄terea ex modo morus, & particula in qua putredo consistit, habebit originem. Iam verò, quæ intermissionem habuerint minorem febres, nempe accessione ipsa in longi⁹ tempus producta, eæ sanè extensæ vocantur: quæ tamen in eo q̄ magis aut minus, varias dñas recipiunt. Ex accessionis aut & intermissiōis spatio, opportunū ad exhibendum cibum tēpus, cognoscit. CAP. IX.

Quam autem oriri soleāt ephemeræ, sanguine nō putrefacto, sed tantummodo calefacto: inuestigandum nobis iam est, si putrescere illum aliquando contingat, quæ nam species febrium gignatur. Porro ab aliena caliditate exoriri putredinem, rectè professus est Aristoteles. Vocat autem alienam, externā: non familiarem, neque natiua n. Hæc siquidem coquere nata est: illa verò corrumpere, * quod est putrefacere. * Incalescit autem externo calore sanguis, & in solari deustione, & pestilenti aeris statu, atq; in febrib⁹

Febrium complexio, & confusio quid.

Putridarum febrium vniuersæ dñæ simplices, senario numero ambiuntur.

Ephemeræ interdum oriri a sanguine calefacto. Putredo ab aliena produci-
tur caliditate. Calor natiuus coquere: alienus corrumpere est natus.

Sanguis quando exteino calore icalescat.

Sanguis in inflammationis particulis duplici de causa corrumpitur.

Febres a putredine sanguinis ortas, simplices esse quod ab aliis humoribus.

Sanguinis supra modum affati partem pinguiorem inflammata: crassiorem, in atram bilem conuertere, atque vnaquaque ipsarum pro natura sua febres accendere.

Febres ortas ex permutatione sanguinis in alios humores mitiores ceteris putridis esse.

Febres putridas ex tactu diiudicandi ratio.

vniversis, quacunque ex ea nascentur. Vbi vero in aliqua corporis parte sanguis plurimus accumulatus, eiusdem partis vim superat, corrumpi consuevit: praesertim si in paruis vasis propter crassitudinem constipetur, aut ob multitudinem impingatur: quemadmodum videre est in vniversis inflammationibus: in quibus sane duabus de causis ipse sanguis corrumpitur: & quia scilicet non diffilatur, & quia a natura non vincitur. Nonnunquam itaque sanguis in inflammationis particulis subire potest putredinem: ex qua simplices quidem, quam ex aliis humoribus febres oriuntur: similem tamen accessionum proportionem seruantes, qualem tertianae febres ostendunt. Sic enim in iis qui laterum inflammationes patiuntur, est obseruatum: quo tempore maxime rubidum expuunt. Quod si sanguis supra modum affetur, pars quidem eius subtilior, ac pinguior, omnino in flauam bilem conuertitur: crassior autem, in atram quod in iis tumoribus, qui carbunculi appellantur, videre licet. Igitur pro varietate humorum in quos conuertitur sanguis, febres fiunt, sola bonitate vel malitia differentes. Illae siquidem quae sanguinis consequuntur transmutationem, sunt simplices, tum in reliquis, tum in caliditatis qualitate mitiori. Nam & si se plurima manui tangenti offert, est tamen omnino mitis, sicuti quae in balneo contrahitur. Semper enim multitudo febrilis caliditatis, in multitudine effluxus consistit. Quod vero tangenti manui calor molestus sentiatur, id prouenit ex humoris acredine. Si igitur calor & vapidus, & minus insuauis videatur, a sanguine proficiscitur. Qui vero molesti, rodentes, atque mordaces existunt, consequuntur vtriusque bilem. At vbi in primo occursum, aliquid magis vaporosum, quam acre, se repraesentat manui: sed per moram paulatim crescit mordacitas, eaque admodum inaequalis, perinde ac si per cribrum excolari videatur: ex pituitae putredine oriri talem febrem ne

dubites. Indaganti autem mihi, cur in febribus aliis calor æqualis occurrat: quæ verò ex pituita orti habet, talem caloris inæqualitatem ostendunt, tenacitas & pituitæ crassitudo, quæ dissolvitur ægrè, visa esse in causa. Siquidem ex eo humore, sicuti ex aliis omnib⁹, ea pars prima omnium expirat, quæ iã attenuata fuerit: vix autem attenuatur, quod valde crassum existit. Quod si etiam natura frigidum fuerit, tunc difficultas augetur: ac proinde nō totus humor, nec ex omni parte æqualiter, sed ex illa tantum, in qua putredo inualuerit, efflatur: atq; attenuatum effertur.

C A P.

X.1.

Solent autem per circuitus affligere, quemadmodum febres, alii etiam morbi particulares: ut lipituidines quædam, nonnulliq; aurium, capitis, necnō articulorum dolores. Vt igitur per hosce affectus videre licet, venas quidem in partibus quæ exacerbantur in tumorem attolli, atq; inflammationem augeri, doloresq; intendi, ac deniq; affluxum materiæ inutilis ad exteriora fieri: sic etiam in interiorib⁹ oportet imaginari ea omnia, quæ quum minimè cadāt sub sensum nostrum, eandem tamen cum illis perpetuò analogiā fortiuntur. Itaq; in laterum & pulmonis inflammationibus, circa accessionum quidem principia, tumores crescunt: in declinationibus autem, euaporāt, & submittuntur. Porro alibi à nobis est proditum, esse quatuor naturales potentias, à quibus dispensantur tum plantæ, tum animalia. Quarum prima quidē est, sinitium attractrix: secunda, eorundem recentrix: tertia post has, alteratrix: quarta deniq; alienorum expultrix. Duplex autem est in omnibus rebus alienum: alterum quidem, qualitate: alterum verò, quantitate. Aceruatur autem hoc, ob earum potentiarum quæ in membris sunt, vel imbecillitatem, vel robur. Etenim si æquè valentes ipsæ partes extiterint, & meatus qui

Pituitosæ, feb. Cap. 9.
cur inæqualitatem caloris tactui obiciat

Affectus infestantes per circuitus.

Naturales potentie a quibus dispensantur, tum plantæ, tum animalia sunt quatuor. Aliæ num duplex. Excrementa, quæ aceruati contingat.

Sanitate quan-
do fruatur me-
bra.

Excrementa
semper a for-
tioribus ad p-
tes omniū im-
becillimas tru-
di.

Febres ex he-
pate accense.

inutilem materiam deducunt, secundum naturam se habuerint, tunc membra sanitate fruuntur. Vbi verò plus assumptum fuerit, quàm alterari possit, omne id quod superfluum est, à virtute expultrice trusum, excernitur. Quòd si hæc imbecilla fuerit, in eodem residet loco: ac si multum sit, grauat, distenditque: sin acre, exedit, ac mordet: sicuti & quod calidum est, calfacit: quod frigidum, manifestè refrigerat. Solet autem sæpe excrementum ab aliis in alias partes trāsfluere: fortiori- bus nempe id semper à se pellentibus: suscipiētib; au- tem imbecillioribus. Qui motus non cessat, donec in eas quæ omnium imbecillime sint, oberrans humor inciderit. Hinc verò ad fortiores relabi est impossi- bile. Idcirco per plethoras atque cacochymias, imbecillio- res particulæ, infestari solent variis fluxionum affecti- bus. Nihil igitur mirum, vel cerebrum, vel vniuersum caput, excrementum in se collectum, ad partes imbe- cilliores expellere, veluti ad aures, oculos, tempora, labra, dentes, malas, palatum, gingiuas, gurgulionem, paristhmia, aut denique ad glandulas illic consistentes. Quòd si ex his nihil imbecillitatem patiatur, ad pectus, pulmonem, fauces, gulam, ventriculū, ipsa fluxio de- labitur. Sicuti igitur causa talium omnium morborū sæpenumero est caput, ita & eas quæ in iecinore ac lie- ne fiunt inflammationes, aliquæ partes vicinæ, vel et ex remotioribus aliqua vna, vel plures, generant, au- gent, immittunt, ac per circuitum exasperant. Qui igitur nescius non fuerit, primam inflammationis origi- nem, ex fluxione in hepar incidente, suum ortum tra- xisse: ac quæ deinceps exacerbetur, causam in ipsa parte patiente consistere, utique is non mirabitur in febribus quæ accenduntur ex hepate, ordinis proportionem. Constat autem materia inutilis interdum quidē (qua- tenus dictum est) impulsā ad infirmiores particulas: in- terdum ab illis attracta. Etenim calor natura est aptus ad conciliandas

ad conciliandas ac recipiendas fluxiones. Proinde in corporibus plenis, aut in quibus excrementa redundāt, magna portio ad eas defluit partes, quæ icaluerint vehementius. In iis autem quæ superfluitatibus vacant, admodum pauca. Non parum verò & ad partes dolentes humoris solet confluere. Videntur itaque manifestè fluxionum causæ, quæ ex ipsis partibus laborantibus originem trahunt, esse duplices: quarum altera est in ipsis accensa caliditas: altera excitatus dolor. At verò, quod melius sit, aut deterius, quod influit, ex partibus mittentibus pēdet: quod plus, vel minus, tum ex iis quæ mittunt, tum ex eis quæ recipiunt. Hæ igitur sunt differentię fluxionum, quæ sine partiū, quæ fluxiones admittunt, imbecillitate consistūt. Aliæ verò, & propter harum imbecillitatem, & propter earū robur, quæ excrementa transmittūt. Cæterum omnes quæ citrà vulnus, & contusionem, partibus adueniunt inflammationes, ex recrementis quæ à fortioribus membris propulsantur ad infirmiora, gignuntur. Vbi autem constipata excrementa in particula inflammata putruerint, calor quidam præter naturam accenditur, qui ab inflammato membro in alia illi vicina, atque ab his in alia, successione quadam, extenditur: donec ad cor aliquādo ipse calor perueniat. Porro vbi superfluitas quæ ab vna in alteram partem transfertur, adeò copiosa & vitiosa est, ut facultatem recipientis particulæ opprimat, dissoluatque, sic ut iam nequeat vincere, quæ antea vincebat, tunc certè necessum est, ut ipse etiam putrescat sanguis: idque ratione duplici, * & quia humori, qui à proprio calore non vincitur, nihil amplius superest, nisi ut in putredinem transeat: & quia cum superfluitatibus putrescentibus simul ipse putrescit. Quod si nec tanta, nec tam vitiosa ipsa superfluitas existat, ut facultatem omnino dissoluat, atque feriari compellat, semiputris, ac seminitiatuſ in tali statu reddetur sanguis:

Fluere solent
humores ad
dolentes parti-
culas.

Inflamatis par-
ticulis quō su-
perueniat fe-
bris.

Sanguis quā ne-
cessario pu-
trescat.

Excrementa
fouent calorē
præter naturā
quemadmodū
signa ignem.

Febres per cir-
cuitus moueri,
vnde accidat.

ob commercium quidem putrescentiū excremento-
rum, ad putredinem raptus: tātum verò in natura sua
perseuerans, quantum ab ea, quæ exornat ipsum potē-
tia, vincitur. Vt cunq; verò res habeat, qui i prima pu-
tredine accenditur calor, acrior atq; mordacior ē eo,
qui naturalis existit. Tantum autem augetur, quantū
natura superfluitati suppeditat. Hæ siquidem ad eum
qui ab ipsis calor augetur, ferè similem quandam ra-
tionem habent, quam ligna ad ignem. Etenim hæc mi-
nimè in infinitum vsq; tempus ad alterationem suffi-
ciunt: sed est quidam transmutationis terminus: quum
tādiu possint exuri, q̄diu aliquid natiui caloris habue-
rint. Qui vbi consumptus ex toto fuerit, tunc ardere
iam desinunt: & quæ supersunt reliquæ, cineres appel-
lantur. Eodem igitur modo putrescentium humorum
caliditas permanet, donec prorsus fuerint assati. Parū
autem reliquiarum terrestrium restare ex humoribus
est verisimile, quoniam in eorum substantia humidum
& non siccum præualet elementum. Quum itaq; fer-
uentes in putredine humores à calore extenuentur,
substantia ipsorū, vbi febres consistunt, atq; declinant,
in ambientem aerem discutitur: superfluitas autē, vel
exigua remanet, vel nulla penitus: ex crassioribus quī-
dem humoribus, pauca: ex serosioribus verò nulla.
Quòd si nullam imbecillitatem pars inflāmata contra-
xerit, neq; iterum superfluitates accedant, ægritudo
finietur, nec rursus homo febricitabit. At si illæ nūttā-
tur denuò, aut ne mittantur quidem, sed adsit sola po-
tentia imbecillitas, hominem secundo febrire est ne-
cesse. Fingamus enim, primum quidem validam esse
particulæ facultatem: interim verò easdē in partibus,
quæ prius transmiserunt, acervatas esse rursus super-
fluitates, & quātitate, & qualitate pares, iis quas antea
immiserant: certè nemini dubium est, quin eodē quo-
que circuitu ad eas expellēdas versus imbecilliora mē-

bra, mouebuntur ipsæ immittentes partes. Siquidem vis excretoria, tunc primum excitatur ad proprium opus, quando aut multitudine superfluitatam grauat, aut qualitate pūgitur. At verò quum ī lippitudine quæ per circuitus accedit, medici qui se ocularios vocant, semper oculis negotium facessant, nos aliquando purgatione, aliquando balneo, interdum meri portione, interdum missione sanguinis, atque interdum clystere vſi sumus. Qua industria nonnunq̄ statim est subsequuta sanitas: nonnunq̄ post curationem capiti adhibitam. Nam quādiu humor qui ad caput confluit similis fuerit, eadēque dispositio capitis, tandiu superfluitates æquali tempore, & similes & æquales aceruabuntur: similes q̄; oculorum exasperationes orientur. Quod igitur contingit in oculis, idem in pulmonis, cerebri, laterum, & aliarum partium inflammationibus accidere potest, si illis quæ superfluitates trāsmittunt, sint eodem tempore imbecilliores. Mirandum autem non est, si non iisdem stas temporibus eadem excrementa aceruentur. Nam quum is qui pro alimento sanguis defertur, non semper vsquequaq̄ sit similis: nec item nutriendarum particularum eadē dispositio: alii aliud sufficit tempus ad colligendam tantam superfluitatem: à qua quidem vbi primum membri natura læditur, cogitur eam tanq̄ alienum onus protrudere. Sed neque ob accessionum imparitatem mirari oportet. * Nam si non eadem est nec species, nec multitudo superfluitatum, non oportet eas similiter omnibus aut accendi, aut discuti. Nam quæ plura & frigidiora, tenacioraque & crassiora excrementa sunt, faciunt accessiones longiores. Quæ autem pauciora, calidiora, & subtiliora, breuiores. Præterea, rarior quidem corporis habitus, breuiores sui ratiōe accessiones reddit: densior autem, longiores. Quinetiam potētia robur, minus diuturnas efficit accessiones: imbecillitas autē,

Excretrix facultas quando moueatur.

Lippitudinem accedentem ꝑ circuitus quō curatit galen⁹

Accessionū imparitas vnde accadat.

Accessiōes longiores aut breuiores fieri, vnde accadat.

Accessio longissima a quibus fiat.

Accessio breuissima quando contingat.

in longius tempus producit. Longissima itaque accessio fiet, ob materiae inutilis multitudinem, crassitudinem, lentorem, facultatis imbecillitatem, ac meatuum angustiam. Breuissima autem, propter materiae inutilis subtilitatem, paucitatem, potentiae vigorem, ac laxitatem meatuum. Quum igitur primae accessionis tempus adeò breue fuerit, ut antequam superueniat secunda, iam prima quieuerit, omne id temporis spatium, quod secundae principium, & primae finem iteriacet, sine febre est. Si verò secunda inuadere anticipauerit, priusquam omnino prima soluatur, nihil interuenit medium. Hoc autem fit, quum facultas membri recipientis superfluitates, sanguinem in se contētum, quemadmodum antea conuincit. Quòd si quando imbecillior reddatur, non solum materia inutilis, sed sanguis etiam cum ea corrumpetur & putrescet, ex eoque accendetur febris: atque hinc orietur aliud principium earum, quae per circuitum fiunt, accessionum. Si igitur caliditas ab excrementis orta, etiamnum perseueret, duplex febrium seinuicem complectentium species gignetur. At si illa cessauerit, membri verò fluxionem recipientis dispositio remanserit, quaecumque de parte mittente prius exposuimus, eadem de hac quoque intelligantur. Nam et ipsa aliquas in se superfluitates gignet: idque duplici ratione, quemadmodum illa: & quia vitiosum sanguinem continet: & quia facultas eius est imbecilla. Eodem modo si ex aliqua quauis causa membri vis adeò debilitetur, ut is qui adiacet sanguis, illi sit potius oneri, quam nutrimento, continget ut corrumpatur: aut si calidior sit, putrescat. Nam si frigidus fuerit, & pituitae naturam gerat, non subito, sed tempore ad eandem veniet dispositionem. Porro si eas quae in ipsa genitae fuerint superfluitates, nequiuert particula aut coquere, aut ad aliam partem detrudere, tale sibi ipsi febriendi principium constituet, quale ea quae transmittit alteri, affert. Nequit

autem aliò superfluitates transmittere, aut ob propriã imbecillitatem, aut propter recipientis robur, aut deniq; ob constipationes meatuum, quæ fieri à lentis & crassis, & multis humoribus consueuerunt. Quæcūq; autem naturales meatus obstruxerint, hæc necessario putrescunt tempore, atq; etiam in causa sunt, ut in ea parte multitudo coacervetur excrementorum, cuius solitam euacuationem & diffationem prohibet. Vnà igitur cum illis putrescunt & alia quæ postremo acervantur: statimq; simul omnia in membro febrilem caliditatem accendunt. At verò, ubicunq; accendit atq; augetur caliditas, illuc ab aliis partib⁹ sanguis solet cōfluere. Quo igitur tempore confluit, illas quidem priuari sanguine est necessarium: quod verò patitur membrum, grauari & distendi: ipsumq; confluentem sanguinem alterari: & q̄ aliis quæ iam putruerunt superfluitatibus permisceatur, & quod diffari, utpote impatiū, non possit. Proinde fit, ut instar lignorum humidiorum quæ super exiguam flammulam proiciuntur affatim, succendatur. Quod totum est accessionis principium. Vbi autem caliditas iam materiam cōuicerit, id tempus augmentum vocatur. Vbi verò calore per vniuersum corpus disperso, inflammati humores ad summum feruorem peruenerint, id accessionis tempus, dicitur consistentia. Hinc igitur, si humores fuerint tenuiores, potentia robusta, corpus rarum, maxima humorum putrescentium pars, in sudorem resoluta euacuatur. Sin verò hi crassi fuerint, & vis expultrix infirma, necnō meatus angusti, nihil quidem defluit sensibile: sed id solū, quod ita est extenuatum, * ut in subtilioris vaporis naturam transierit. Atq; id sane tempus declinatio appellatur, humorū efferuescentium diffatus quidam existens. Cæterum quum in parte adhuc remaneat affectus, necessum est, in ipsa aliam gigni superfluitatem: quum nimirum id quod denuo

Excrementa
cur neqat ps
vna mittere
ad aliam.

Accessionis fe
brilistempora
describuntur.

Declinatio ac
cessionis febr
lis, est humorū
efferuescentiū
diffatus:

Affectio ptis
duplex.

Accessionum
circuitus quan
do desinent, &
quando perse
uerabunt.

Sanguis putre
scens, in alia na
turam transit.

Circuitum or
dinem que per
uertant.

ad ipsam trahitur alimentum, non conficiatur exquisi
tè vniuersum. Quæ quidem superfluitas rursus à pu
tridis excrementis in parte relictis, necnon proprio
ex vitio, initium putredinis suscipit: quūq; satis calue
rit, rursus ad ipsam influit, quemadmodum antea, ex
reliquis animalis partibus sanguis: ac sic eodem rursus
modo, principium, ascensus, status, & declinatio, alte
rius fit accessionis. Nec hoc per circuitus desinit fieri,
q̄diu in particula gignente superfluitates perseuerarit
affectio: quæ quidem existit duplex. Altera quidē, im
becillitas partis, à qua superfluitates gignuntur: alte
ra, quæ ex iisdem quotidie genitis ducit originem. Im
possibile autem est, solui remanentem illam dispositio
nem, si vniuersum corpus multis ac variis excremen
tis refertum fuerit, ac multò etiā magis, si his accedat
omnium, per quos excrementa membri excernūtur,
astrictio meatuum. Sanitas autem succedet, si & mea
tus aperti sint, & facultas vegetior, & corrigatur affe
ctus partis, vniuersumq; corpus nec multis nec vitio
sis humoribus opprimatur. Nā q̄diu hæc pdurauerint,
tādiu accessionum circuitum perseuerare est necesse.
Quemadmodum in mulieribus accidit, in quibus q̄diu
æquales ac similes menstruorū causæ persisterint, idem
circuitus seruabitur. Earum igitur febrium, quæ p cir
cuitum accessiones faciūt, nescio an aliqua fuerit no
bis omīssa causa: aliarū autem quæ carent ordine, non
nullæ ex transmutatione humoris, nonnullæ ob vict
errorem, ad talem dispositionem deueniunt. Maxime
autem transmutatur, atq; in alteram transit naturam
sanguis, dum putrescit. Nam pars quidem ipsius vna
fit flaua bilis: alia, nigra. Quantum verò in agrotantiū
corpore humores mutantur, tātum etiam accessionū
circuitus. Quæcunq; autem circa victus rationem er
rata ab agrotantibus fiunt, ordinem circuituum per
uertunt. Sæpe verò, ob complicationem circuituum,

quæ à medicis ignoratur, videntur absq; ordine accessiones ægrotantibus fieri. Reliquum est id febrium genus, quæ synochi nominantur, quarum vniuersum tempus vnica accessione finitur: quæ vel semper i eodem vigore persistit, vel minuitur, vel augetur, donec finitur. Hæ verò omnes ex tali causa ortum habent, qualem Praxagoras existimabat, humorum videlicet in caua vena putrefactionem. Quanq; absolutior & verior hic erit sermo. Quæcunq; per circuitus aliquos ægritudinum accessiones fiunt, ex membrorum dispositionibus ortum habent: quæ vel mittunt, vel recipiunt, vel generant, vel attrahunt superfluitates. At quæ circuitum non habent, in his nulla est corporis pars, quæ precipue sit offensa. Qui autem in venis & arteriis omnibus continentur humores, præcipue qui in maximis, & plurimo calore abundantibus delitescunt, aut ob aliam quauis causam, quemadmodum in ephemeris, aut ob putrefactionem feruentes, febrem accendunt synocham: quæ à principio vsq; ad finem nullam habet intermissionem: ac tãdiu perseverat, hominemq; deurit, donec humores ipsam gignentes, aut cõsumantur penitus, aut coquantur, aut vtrunq; patiantur.

Synocharum vniuersum tempus vnica accessio est.

Circuitus facientes inorbi, ex membrorum dispositionibus vniuersi oriuntur.

Synochæ generatio.

GALENI PERGA

MENI DE MARASMO,

SIVE TABE.

LIBER VNVS.



MARASMVVS Est viuētis corporis interitus præ siccitate. Quum autem interitus bifariam dicatur, tũ de eo qui fit, tum de eo qui iam factus est, sanè secundum prius significatum oportet appellationem accipere. Similiter etiam marasmus, hoc est ta-

Marasmus est viuētis corporis interitus præ siccitate

Marasmus est duplex,

Qqq iiii

Viuentium genera tria.

Tabes quorū esse affectus dicatur.

Interitus modi sunt quatuor. Elementa viuentium sunt quatuor.

Tabes simplex quæ dicatur. Tabes cōposita quæ.

Tabes simplex inediis solet su peruenire.

Tabes cōposita quibus su peruenire con sueuerint.

Tabes fieri nō potest, nisi animantis principii affectu sit.

bes dupliciter dici poterit, nempe quum iam aliquid tabuit: vel quum adhuc tabescit: de qua quidem significatione secunda, impræsentiarum nobis est sermo. Porro quum genera viuentium sint tria, videlicet animalia, stirpes, & semina, ac propter hæc etiam fructus: tabem quidem esse horum affectum, propriè loquentes dicimus, quāuis per translationem & cæteros etiam interitus, quum ex siccitate proueniunt, cōmuniter tabem appellent. Quum igitur primi & simplices modi quibus omnia viuentia intereunt, sint quatuor, si quidem & elementa substantiæ eorum quaternio etiam numero ambiuntur, tabescere sanè ea dicimus, quæ ex siccitate intereunt. Quod si hæc tantum habeant, quæ siccentur, altera verò contrarietas quæ inter calidum & frigidum intercidit, intra suos terminos maneat, simplex ea tabes erit. At si vel caloris vel frigoris accedat immoderatio, iam modus is interitus, duplex & cōpositus erit. Simplex itaq; tabes inediis solet superuenire, tam eorum qui inediā sponte tolerant, quàm eorum qui præ alimentorum penuria, fame conficiuntur. Illa verò cui frigus accessit, solet senibus euenire, vel etiā illis, qui malo quodam affectu senectuti simili detinentur. Ea autem quæ cum calore est, in febribus locum habet, quæ hecticæ nominantur. Nec verò impræsentiarum de partibus loquimur, quæ ex aliquo symptomate arescunt: sed potius quum totum corpus hoc se habuerit modo. Quo circa, si tabes affectio est vniuersi corporis, ea fieri nequit, nisi animantis * principium etiam affectum sit. Quin etiam fieri non potest, ut alius affectus totum ipsum animal occupet: ab alio verò principium ipsius detineatur. Ac proinde necessum est, ut in tabidis, ipsius cordis corpus arescat. Quocirca si inuenerimus causas omnes, quibus cor arescere possit, facile tunc nouerimus, an omnes tabidi insanabiles sint: an ex iis aliqui potius sanari queant. Optimum autem

huius instituti principium erit, si perscrutati fuerimus omnes causas senectæ: quandoquidem ea inter omnes tabes usque adeo euitari minimè potest, ut esse secundum naturam videatur. Siquidem ineuitabilia sunt omnia naturæ opera: utpote habentia necessarium suæ generationis ordinem. At non eo modo dicimus senescere esse secundum naturam, quo ali, & augeri (sunt enim hæc naturæ opera: senectus autem non opus, sed affectus quidam necessario consequens illa) verum hoc nomine, quod nullum unquam sit visum animal, quod ortum fuerit, quin idem sit senio obnoxium. Quanquam non defuit nostris his temporibus philosophus quidam, qui librum edidit, quo docebat, quia quis posset ratione seruari penitus senii expertus. Qui tamen, postea quam ad octogimum usque annum produxit vitam, adeo gracilis & exiccatus effectus erat, ut verè faciem illam exprimeret, quam descripsit in libro prænotionum Hippocrates. Num igitur propter id siccescunt tum animalia, tum plantæ (quod nonnulli affirmant) quia insitus animantibus calor, veluti ignis quidam, ex ea materia in qua accensus est, suum incrementum sortitur? Etenim illi semper affixus est, nec unquam inde seiungi potest, unde etiam sua omnia habet. Plantæ igitur, animantiaque omnia, quæ diu recens genita sunt, admodum humida existunt. * Quamvis calor (ut illi aiunt) in ipsis tunc veluti suffocatus, obrutusque, præ humoris copia, vix se potest exerere: nimirum caliginosus, tardus, ad motumque piger quum sit. Postea verò ipsam humiditatem progressu temporis superat, & cuiusque materiæ præest: quo tempore iam purus æthereusque redditus, suas omnes expeditè functiones ædit. Itaque usque ad ætatem vigoris relucet, augeturque: cuius magnitudo quam plurimum tunc attollitur. Mox verò inopia alimenti contingit, ut contabescat paulatim: atque id ipsum existit senectus. Sed & paulo post extinguitur penitus, id quod mors est.

Senectus uitari non potest.

Ineuitabilia esse naturæ opera.

Naturæ opera quæ.

Senectus quid Senio anima, lia orta eẽ omnia obnoxia.

Calor noster quomodo augeatur & minuatur in corpore.

Senectus quid. Mors quid.

Flammā ignis
non esse cont.
parandum cū
calore aīalium
Caloris nostri,
& flamme quę
igni inest, dissī
militudo.

Caloris opera.

Calorē natium
esse naturam.
Calor qui ge-
nuit corpora,
perimit nos.
Senescunt ob
innatum calo-
rem corpora.

4.

Nihil ex nihi-
lo fieri.

Hic itaq; sermo omnibus ferè tam philosophis, quàm medicis recentioribus placet, licet verus omni ex parte non sit. Hallucinantur nanque dum flammam ignis omnino cum calore animalium conferunt: idq; minimè animaduertentes, quod ortus flammæ est ex materiæ interitu, de qua ea est accēsa. Animalia verò, non sic suum, ab eo qui illa effinxit, insitū habuere calorem: sed potius vt ab eo augerentur, regerenturq;. Nec vllum est tempus, quo innatus is calor per vniuersam eam materiam non diffundatur, vires non modò eas continens, quibus animal format, verum & alias præterea plures. Quippe & alimentum attrahit, & materiam dispensat, apponit, vnit, assimilat, omniaq;, vt in summa dicam, circa sibi congenitam materiam perficit, contrā q̄ flamma faciat. Nam quæ vnq; flamma, materiam cui annexa est, adauget? vel quæ etiam materiæ potius alimenta assimilat, q̄ eam sibi? Et quæ tot excogitauit modos, vt eam tueretur materiam? Itaq; quum illi iidem natium calorem esse naturam fateantur, non rectè faciunt flammis eum comparantes. Nā quod ait Hippocrates, eum calorem nos interficere, qui genuit corpora, certè si liber illæ referri ad Hippocratem debeat, locus is requirit expositionem. Verum siquidem est, corpora ob innatum calorem senescere, interireq;: modus tamen, quem isti aiunt, verus nō est. Neq; enim vt flamma ligna, ita innatus animantibus calor, eorum corpora absumit. Quod fortassis exemplum illis congrueret, qui ob febrilem caliditatem intereunt. Porro natura, quæ tum animalia, tum plantas procreat, omnino corporeum aliquod principiū, ad illorum generatiōem assumit: quum nihil sit, quod vnq; possit sui ortus initium habere, ab eo, quod penitus est non ens. Inde verò exorsa, semper in eum scopum ordinatè tendit, quem in ea procreatione statim ab initio sibi proposuerat. Id autem est, perfectum il-

Iud reddere, quod ab ea gignitur. Sanè perfectum est, quando nulla suarum functionum deest illi. Ipsarum autem functionum, complures durioribus instrumentis egent. Vnde postea fit, ut multæ in animantibus particulae duræ euadant. * At principium generationis ipsarum, contrà quàm in animali perfecto, necessum est ut sit molle, ut & aptè compingi, efformariq; possit, & ad omnia tractabile se suo conditori exhibeat. Ac proinde, quicumq; semen sit durum, mollis tamen planta æditur: moderato nimirum quodam humore prius macerata, ut pro semine fiat natura. Itaq; si opus est, ut generatio animalis à substantia molli sua habeat exordia, quæ ut absoluitur, ita durefcit: necesse utiq; fuerit, ut in prima elementorum, vnde illa constituuntur, temperie, tum humidum, tum siccum præpolleat. Cæterum humidum quidem ipsum est aqueum: siccum autem, naturaliter aut est terreum, aut igneum. Fieri verò minimè poterat, ut statim à primis exordiis, plus terreni cōmiseretur: quum opus esset, principium animalis fore humidum: reliquū igitur solum est igneum, quod in prima animalis generatione & formatione, obtinet principatum. Si igitur fieri posset, ut natura, quum animal, vel plantam, ad consistendi vigorem perduxerit, aliam rursus elementorum dispositionem, proportionem viribusq; æqualem, apponeret, sic tantummodo sua illi fabrica posset expers tam senii, quàm interitus perdurare: si tamen custodiæ sapientis alicuius viri mox demandata fuisset: alioqui, si malam adhibuisset victus rationem, ab interitu immunis non esset. Nunc verò postea quàm prima elementa generationis tam animalium, quàm plantarum, nec transferri, nec transmutari possunt: iccirco necessum est, post consistendi vigorem corpus semper siccescere, quàmuis non amplius egeat, ut id ipsum patiat: quum iam illi vsui non sit, ut siccescat. Verum ætas

Principiū generationis particularum, cur necessario sit humidum.

Siccescere necessario corp⁹ post consistēdi vigorem.

Senectus ab inclinante etate, nō genere, sed maginatione differt.

Seniū nec euitari nec sanari potest.

Actas vniuersa post vigorem est frigida & sicca,

Senes ab inclinantibus, quibus notis distinguī possint

§.

Gerocomice.

Vite terminus uacuitas cordis est ab actiōib⁹

Senectuti quare ratio ne possit obfistī.

Senium detineri potest, ne cito ingruat: idq; humectate adhibita victus ratione.

inclinationis, quæ siccitatem quidem, quāuis exiguam, habet, multos latet: ac si nondum aliqua tabes sit. Senectus autem, quæ ab ea non genere sed tantum magnitudine differt, facile deprehendi potest. Hæc igitur causa est, quæ vniuersam animantibus tractu temporis siccitatem præstat: perspicueq; ostendit senium nec euitari, nec etiam sanari posse. Etenim vniuersa ætas, quæ vigori succedit, frigida est & sicca. Manifesti autem fines, inter eorum ætatem qui iam declinant, & eorum qui senescunt, humidorum est excrementorum exuperantia. Vnde quidam decepti, statuerunt senium esse humidum. Cæterum & omnes actiones statim in his fieri imbecilliores, manifestè videri possunt: atq; etiam via ad mortem, quæ latebat in inclinantibus, iam omnibus fit conspicua. Quamobrem senectutis tabes nequit vlla ratione dissolui: licet ipsam plurimum remorari possimus: quod munus ad gerocomicem, hoc est ad artem senum curatricem, spectat. Quæ quidem hoc sibi proponit, vt quoad eius fieri potest, obfistat, prohibeatq; quo minus ipsum cordis corpus eo usq; areseat, vt ab omni opere vacet. Siquidem vitæ terminus vacuitas cordis est ab actione: quū impossibile sit mori animal, quandiu cor sua actione moueatur. Quare si possit substantia corporis ipsius cordis humidior fieri, vel per Iouem etiam iecinoris, poterit senectuti obfisti. Si verò nemo ē, qui queat iecur vel cor humidiora reddere, q̄ ipsa sint ex sese, sed potius semper tempore procedente ea necesse est indies sicciora fieri, cum eisq; arterias & venas: senium quidem prohiberi non potest: potest tamē detineri, ne cito ingruat: idq; humectante adhibita victus ratione: qua nimirum augere possumus illam humiditatem, quæ in corde, iecinoreq; est dispersa. Quum autem cor (cui valentissima est attractrix facultas) sit origo pulsuum & arteriarum, quemadmodum venarum atq; sanguinis hepar,

M A R A S M O L I B.

contingit utique, ut hæc viscera nunquam moderatis alimentis destituatur, nisi quum valida sanguinis penuria universum occupaverit corpus. Vnde ubi corpus ex longo morbo extenuatum fuerit, putandum non est, cor quoque, atque etiam iecur, esse pro aliorum proportionem extenuata. Cæterum vera tabes, similiter partes omnes occupat, propterea quod etiam principia ipsa. Atque hæc tabes in ætatibus quidem, est senium: in iis vero quod propter naturam affecti sunt, febris tabifica, & alia præerea affectio, quam senectam ex morbo commodè appellaverimus, idque longè melius quam Philippus, qui eam etiam tabidam febrem nominat. Nam neque febris unquam huiusmodi erit affectus, ubi cor frigidius redditum est, quam ratio naturæ postulet. Quod autem per eum affectum sit talis ipsius cordis temperies, indicio est pulsus rarus & parvus, similiterque spiratio rara simul & parva: nec non qui expiratur aer, minimè calidus. Quæ sanè tabis species sit, febribus ob intempestivam immoderatamque refrigerationem, in eam transeuntibus. Est & alia tabis species quæ dicitur torrida, sicuti & tertia, quæ syncopalem appellant, quarum illa quidem, ortum habet à calore, febribusque ardentissimis: maximè vero ubi habitus fuerit siccior: hæc autem gignitur, quando iis qui correpti fuerint deliquio animi, ubi vehementiam periculi effugerint, aliquid ex eo affectu remanet ita, ut adhuc defectum illum animi sapiant. Est autem duplex ipsa extenuatorum affectio: una quidem, ubi is humor solidorum corporum perit, qui eorum proprium est alimentum, & præterea molliores carnes liquatæ sunt: altera vero, dum solidiora etiam corpora sunt exiccata: quæ utique & prima, & similia appellantur. Hæc igitur nequit curari, sicuti nec senectus. Altera vero, periculo quidem non caret: non tamen eo usque, ut nullo modo curari possit. Igitur humectare oportet tres illas species tabis iam dictas: & hoc

253

Cor est origo pulsuum & arteriarum.

Hepar est sanguinis origo & venarum.

Tabes vera cur ex æquo omnes partes occupet.

Tabes, quæ ex morbo senium appellant, non est tabida febris.

Senium ex morbo quo intro ducatur.

Tabes torrida unde gignatur. Tabes syncopalis quando accidat.

Extenuatorum affectio est duplex.

Tabes incurabilis quænam sit.

6.

Tabes vniuer
sæ quō sint cu
randæ.

Exiccatos ma
nifeste videtur
reficere bal
neum.

Balnei vsus.

7. Februm tres
differentiæ ge
neralissimæ.

Putridis febr
bus, post con
coctionem hu
morū, balneū
opitulatur.
Hecticis febr
bus quibus aliæ
non copulatur
balnea quouis
tpe conferunt.

Ephemereque
dam cum he
cticis habent
necessitudinē:
quibus aqua ē
intrepide pro
pinanda.

est illis commune: quippè quæ communem siccita
tem sortiantur. Sed earum vna, eget vt calfiat: ea
nimirum, quam comparauimus senectuti. Altera
verò, quam esse torridam diximus, refrigerari postu
lat. At tertia, quæ habet animi deliquium cōiunctum,
si nondum facta sit, sed etiamnum fiat, ita vt humidi
tas solidis membris innata absumatur, miscellaneam
curationem desyderat. Conspicuè autem humectare
reficereq; exiccatos videtur balneum: vt faciliè possu
mus in iis obseruare, qui æstate sub sole vel iter faciūt,
vel alio quopiam modo exercentur, aut exuruntur.
Hos enim omnes, atq; etiam eos, qui siticulosi sunt, hu
midos reddit, & siti liberat. Sed & alios omnes quacunq;
modo exiccatos, siue ex vigilia, siue ex curis, siue ex
venere, siue ex eduliis, vel medicamentis exiccanti
bus, siue ex ira, hos inquam omnes madefacere fo
uereq; balneum videtur. Quum autem sint tres diffe
rentiæ febrium generalissimæ, in præsentia quidem
omittamus diarias: conuertamus verò sermonem ad
eas, quæ ab humoribus proficiscuntur, & ad illas etiam,
quæ quod in habitu sint, hecticæ nominantur. Illis igi
tur, quæ ex putrescentibus humoribus accenduntur,
si concocti ii fuerint, balneum remedio est. Hecticis
verò quæ solæ consistunt, nec aliud quodpiam genus
febris secum habent, balnea quouis tempore confe
runt. Sin autem illæ secum febrem aliam habuerint,
ex iis quæ ab humoribus pendent, quum ii concocti
iam fuerint. Eadem etiam tempora putandum est ef
fe commoda, ad propinandam frigidam: præterq;
quod si in hoc aberraueris, id minimè fiet sine ma
gno incommodo. At balnearum vsus in iam dictis fe
bribus, procul est ab omni periculo: nisi fortitan vi
rium imbecillitas sit suspecta. Cæterum quædam ex
diariis febribus, cum hecticis communionem quandā
sortiuntur: quæ sanè statim in prima die exactè discer

ni nequeunt, sed circa secundam, vel omnino tertiam. Quo tempore, vbi quis primum eas nouit, intrepidè offerre aquam frigidam poterit: quum nimirum tunc & vires validæ sint, nec desit adhuc corpori sanguinis copia. Vbi verò immoratæ diutius fuerint, tunc sanè vires imbecilliores redduntur, & sanguis exiguus fit: vnde duplex ex potu frigidæ sequi solet incommodū. Primum, q̄ interim dum aquam bibunt, percutitur & refrigerescit aliquod membrum. Deinde, q̄ qui aquam exhibent, nisi debitam mensuram sint assequuti, præter alias particulas, illam etiam refrigerabunt, in qua est situm principium generationis febris. Vbi verò supra q̄ par sit, cor refrigerescit, si natiuam suam adhuc humiditatem seruet, vires concidunt. Si efficiatur siccus, ab eo affectu arripitur, qui similis senio existit. Sed eodem ipso tempore, quo primum signa febrium hecticarum fuerint conspicua, expedit vt refrigerantia medicamenta adhibeant extrinsecus, & super ipso febris * foco, & origine. Porro cor primum, si plus e quo incalascit, hecticam febrem affert. Dein verò iecur: hoc tamen non habet ex se, perinde vt cor, sed ob id, quòd illud secum in consortium trahit. Mox verò ventriculus: & post hunc, quæcunq; alia, consortii lege, possunt secum cor calfacere. At pulmo, hecticam febrem non gignit, propterea quòd hoc viscus humidum est, & per inspirationem assiduè refrigeratum, non facillè in similem occasionem incidit. * Vt plurimum autem secundum reliqua viscera febris hectica gignitur, infuso bilioso humore in ventrem ipsius loci patientis. Quum itaq; sola febris constitit, absq; vlla alterius morbi mistura, balneum exposcit, non secus ac cæteræ siccitates, quæcunque vel calidæ fuerint, vel frigidæ. Nam id sanè mirum balneis inest, quòd tam calidis prosint, quàm frigidis siccitatibus: quemadmodum & illud, quòd eos

Frigidæ potus in hecticis quæ incommodæ inferat.

Hectica febris cognita, refrigerantia esse extrinsecus ad mouenda cordis, Hepar ventriculusq; qua ratione febrē hecticam inferat.

Pulmo cur hecticam feb. nō gignat.

Hectica febris qua ratione sint reliqua viscera oriatur.

8. Balnea tam ca- siticulosos efficiat, qui sitis sunt vacui: à siticulosus ve-
lidis, q̄ frigi- rò, sitim abigat. Quandoq; tamen cum hectica, tabifi-
dissecitatibus caq; febre, adest etiam erysipelatosus affectus: qui exi-
conferunt eosq; git, vt prius cibo & potu, & iis etiam quæ apponuntur
siticulosos red- terius, refrigeretur. Quo tēpore omnino est super-
dūt, q̄ siti sunt sedendum à balneo: frigida autem confertim in ipso
uacui, atq; siti morbi vigore viriliter exhibenda: à cuius tamen vſu
a sitibūdīs abi-
gunt.

Hecticæ cui abstinendum est in principio, nisi nos forſitam ipſe co-
eryſipelatosus gat ægrotus, quippe qui ſit aſſuetus potui frigidæ, nec
affectus ſit cō- ſitim perferre velit. Exterius autem ſunt applicanda
iūctus, curatio. ea quæ refrigerent. Quæ ſi nihil profecerint, cogendi

vt illa etiam intra corpus aſſumant. Præcipuè verò il-
lis proſunt molles lactucæ, recentesq; ſolummodo in
frigida aqua demerſæ, ac ita aſſumptæ: vel ſi pla-
cet, prius aceto diluto intinctæ. Extrinſecus etiā ei-
dem lactucæ ſucc^o vtiliter adhibetur: ſicuti & ſemper-
uiuæ, & intibi. Præſtantiffimum verò ad id etiam eſt,
medicamen confectum ex ſucco vuæ acerbæ, necnon
portulacæ, cui parum albæ farinæ miſceatur. Quod
quidem exceprum duplici linteo, præcordiis eſt præte-
dendum, donec tepere ſcēre incipiat. Dein verò, ipſo abla-
to, alterum admouendum eſt. Nonnunq̄ iis & oleum
immaturum miſcemus, vel roſaceum, præſertim ve-
rò, ſi aliquid inſlāmationis detinuerit præcordia. Scien-
dum tamen eſt, fieri non poſſe, vt vbi eryſipelatoſa vi-

9. Hectica exq̄ſi- ſceris diſpoſitio conſtiterit, ea ſit febris exq̄ſitè hec-
ta nec princi- ca. Siquidem exq̄ſitè febris hectica eſt, quæ nullum
pium, nec aug- habet particularis acceſſionis principium, nullum in-
mentū nec ſta- crementum, nullum vigorem, nullam inclinationem.
tum nec decli- Solummodo autem hecticæ febres poſt aſſumptum ci-
nationem par- bum, perinde vt calx, inſperſa aqua, efferueſcūt. Quod
ticularis ac- incrementū ſi abſtuleris, ſemper æquales permanent.
ceſſionis forti- Tabi igitur torridæ, quæ ab ardentibus febribus ſuā
tur, ſed tātū- ducit originem, obſiſtitur remediis refrigerantibus:
modo poſt aſ- que tum exterius ſecundum locum affectum admini-
ſumptum cibū- ſtrantur:

strantur: tum interius accipiuntur. Quū verò senectus quæ ex morbo est, inuaserit, ea quidem quæ absoluta est, nequit curari, quæ autem nō est perfecta, eò tamē accessit, vt ferè iam facta sit, hūc solum habet curatio nis scopum, quem refectionem, & nutritionem vocamus. Nam corpora solida, dum arescunt, cibis sanat. Quum autem alimentum omne, non ipsum per se deferatur ad alendas particulas, sed potius ab eis trahat: ob ariditatem verò, atq; frigiditatem, in tabidis sint illæ ad trahendum inualidæ, semimortuæq; , utiq; alimenta desyderant, quæ facile possint attrahi: vt imbecillitatem attrahētium virium, suppleat promptitudo materiæ. At ea sunt tractu facilia, quæ tenuioribus partibus constant, suntq; natura calida: quæ sanè cum difficultate nutriunt: quum alimentum omne debeat esse crassum & lentum, vt & permaneat diu, nec facile possit dissilari. Quare aliquod inuestigandum est, quod in mediocritate consistens, mediocriter vtraq; possit persistere. Ac mihi sanè nihil ad hæc omnia lacte videtur persistantius: præcipuè si quis ore apprehensa mamma muliebri, lactet. Quod si id fieri nequeat, bibat saltem lac asininum, dum adhuc calet, temporeq; breuissimo aeri expositum fuerit. Quæ quidem alimentorum ratio tribus illis speciebus marcoris conuenit. Quin etiam ptisana & alica illis ex usu sunt: aceto tamen condiri debent, vt facilius distribuuntur. Porro mel, vt frigidioribus affectibus prodest plurimum, sic calidioribus obest summopere. Quare torridæ quidem febri inimicissimum ē: iis autem qui senili affectui expositi sunt, vtilissimum. At illis qui tabescunt ex defectu animi, nisi obftet ventriculi ratio, poterit coctum vel solum, vel aliis intermixtum cibis offerri. Opportunus balnei vsus, optimum erit auxilium etiam ad alimentorum distributionem. Erit tamen administrandum, vbi cibus concoctus fuerit, nec longior inedia præcesserit. Iam &

Tomus. III.

Rrr

Tabi torridæ
qua ratione ob
sistatur.

Seniū ex mor
bo absolutum
quidem, est in
curabile: non
absolutum au
tem, est cibo
instaurandum.
Solida corpo
ra dū arescunt
cibis sanat.

Tabidæ ptes
qualia alimen
ta postulent.

Alimenta tra
ctu facilia q.
Alimentū om
ne cur esse de
beat crassum
& lentum.

Lac muliebre
statim ex mā
mis suctum cō
modissimū es
set tabidis nu
trimentum.

Lac asininum
tabidis vtile.

Ptisana.

Alica.

Mel cui mar
cori sit vtile.

Balneum quā
do administrā
dum tabidis.

Vinum cui ta-
bi conferat.

vinum potus, vt summopere frigida tibi prodest, sic
torrida fugiendus est. At ea quæ in animi defectu con-
sistit, sicuti affectus medius & miscellaneus est, sic in hoc
mediam rationem obtinet.

G A L E N I P E R G A
M E N I C O N T R A E O S
qui de Typis siue circuitibus scripserunt.
L I B E R V N V S.

Periodus.
Circuitus.
Typus.
Ordo.



Accessionē fu-
turam cogno-
scere, in febrī-
bus est maxi-
me vtile.

VBI Quid specie idem, rursus æqua-
li sit tēpore, totum ipsum curriculū,
Græci periodum, siue circuitum: at-
que inter eos nonnulli typum etiam,
atq; ordinem vocant. Cæterum quā
nihil vtilius sit, præsertim in febrīb^{us},
q̄ futurarum accessionum principia prænosse, is pluri-
mum ægro proderit per totum ipsi^{us} morbi spatium,
qui nominum disputatiōe neglecta, statim à morbi ini-
tio, artificiali quadam coniectura poterit id ipsum asse-
qui. Quod si quis prima statim die peruenire ad talem
cognitionem non possit, poterit certè secūda, vel ter-
tia, vel quarta. Si quis verò sit, qui neq; in hac, morbi
speciem nouerit, is non exiguam artis partē ignorat.
Etenim tum alia, tum febrium accessiones, vel quoti-
die, vel tertio, vel quarto quoq; die inuadunt. In q̄ plu-
rimis siquidem morbis, vbi sanè maximè vtilis sit fu-
turæ accessionis prænotio, ea vel alternis diebus fit,
vel quotidie, ī paucis verò quibūdā per quartum. Qui
verò præter has tres periodos, & quitanā, & sextanā,
& septimanā, aliasq; innumeras esse arbitratur, p̄terq;
q̄ inania producant, infinitosq; cogūtur dare periodo-
rum cōplexus, nunq̄ poterūt futuram accessionē præ-

noscere. Porro quis fuerit huiusce attonitæ sectæ author primus, ignoro: dicā tñ, qñ primū illā explicari audiuerim. Decefferat paulò ante de vita Antoninus: q Adriano in imperio successerat. Regnabat aut Seuerus, qui seipm nomine mutato, Antoninū appellauit.

Lucium verò, quem Imperii participem fecerat, Seuerum appellauit. Cæterum præstat illorum absurditatis ne meminisse quidem, Pythici præcepti memores, esse parcendum tempori. Nos verò in præsentia diem, tempus id vniuersam dicimus quòd diem atq nocte cõplectitur. Qua ratione dicunt annū constare diebus tercentis & sexaginta quinq, & quarta vnius parte.

Horæ itaq quatuor & viginti, diem absoluunt: duos autem, octo & quadraginta: tres duo & septuaginta.

Typis autem nomina indita sunt, non ex diebus ipsos complentibus, sed ex accessionum reditu. Tertianā quippe appellamus, vbi accessio tertio quoq die inuadit, duobus interim absolutis: quartanam, in qua videlicet quarto: in hac quoq tribus iam perfectis: & in aliis quoq secundum eandem rationem. Si igitur periodum inueneris typi alicuius, quatuor continentem completos dies, illum quintanam dices. Neq enim est idem accessionem quinto oboriri die, et esse quinque dierum circuitum. Siquidem numerus horarum periodicarum, qui inter duo initia accessionum est medijs, considerandus est: atq ex illo typus februm metiendus. Sic enim dicimus quotidianum typum sortiri horas. 24. Tertianum. 48.

Quartanum. 72. Quintanum. 96.

Quo similiter pacto cæteri perficiuntur, ex horarum, 24.

multiplicatione.

Rrr ii

Antonin⁹ Imp.
Adrianns Imp.
Seuerus mutato nomine uocatus fuit Antoninus.

Lucius fuit appellatus Seuerus.

Tempori esse parcendum.

Dies quod tempus sit.

Ann⁹ ex quot diebus cõstet.

Horæ.

Tertianā quæ dicatur.

Quartana quæ dicatur.

Typus februm unde metiendus sit.

Februm intermittens typi singuli, quot expleantur horis.

GAL. PER. DE
G A L E N I P E R G A
 M E N I D E T Y P I S.
 L I B E R V N V S.

2. Typus accessio-
 tionum quid.
 Periodus accessio-
 tionum quid.



Typis caren-
 tes febres.

3. Typorum dif-
 ferentiæ.
 Typi primi.

Typi secundi.

Typi perma-
 nentes.

Typi mobiles

Typi pleptici.
 Typi hysterici
 Typi simplices
 Typi cōpositi.

TYPVS Est ordo intensiōis & re-
 missiōis: periodus verò, est tempus
 intensiōis & remissiōis: qđ in mor-
 bis existit. * Pauci autem ex affecti-
 bus carent typo: vt atrophia, neruo-
 rum resolutio, elephantiasis, & qui-
 cunq; his proportione respondent. Plurimi verò affe-
 ctus typum quidem præ se ferunt, verum rarius. Por-
 rò omnium maximè, febres typos admittunt, iis con-
 tinuis exceptis, quæ vel remittunt nunq̃, vel inordina-
 tæ existūt. Typorum itaq; alii quidem sunt primi, alii
 verò secundi: alii permanentes, alii mobiles, alii simpli-
 ces, alii cōpositi. Primi igitur sunt, qui breuē habent
 inuasiōem, longam autem remissiōem: quales ter-
 tiani & quartani existunt. Secundi verò, qui longam
 habent inuasiōem, breuem autem remissiōem: vt
 quotidianus & valde extensus semitertianus. At per-
 manentes sunt, qui iisdem horis perpetuò inuadūt, re-
 mittuntq; . Mobiles verò, qui diuersis semper horis ac-
 cedunt. Ex quibus qui præueniunt, & celerius horas
 præoccupant, proleptici: qui verò tardius morantur,
 hysterici nominantur. Simples sunt, qui vnum tan-
 tum modo insultum faciunt: cōpositi, qui ex pluribus
 inuasiōibus & remissiōibus constant. Cæterum cō-
 positorum quidam ex homogeneis, idest genere simi-
 libus: quidam verò ex heterogeneis, hoc est, dissimili-
 bus, constant. Ex genere quidem similibus, quam quo-
 tidianus typus, exempli gratia, simplex, duplici quoti-
 dianio implicatur: aut duplices tertiani, aut tres tertia-

ni existunt: vel rursum duo & tres quartani. Ex diuersis autem genere, quum quotidianus, exempli causa, tertiano connectitur: aut tertianus quartano. Etenim quotidianus est, qui quotidie vnam inuasionem longitudine commensuratum, vnamq; similiter remissionem efficit. Tertianus aut, qui tertio quoque die, vnam inuasionem & remissionem similiter commensuratam adducit. Quartanus denique, qui quarto quoque die suam inuasionem & remissionem molitur. Atque eadem intelligentur de quintano & septimano, & si quis alius typorum ordo inuenitur. Porro quotidianum consequi typum humiditas habitus, vomitus pituitosi, sitis non admodum intensa, totius corporis grauitas, somnus grauis atque profundus, pulsus magnus, rarus, & laxus, facies subliuida, laxa, & permollis, & quae multam praeseferat materiae tum prauitatem, tum mutationem. In hoc etiam typo splen durior euadit. Quod si protrahatur diutius, tremuli & veternosi sopores sequuntur: & thoracis fluxiones, & aquae inter cutem affusiones. Potissimum autem hi stomacho male affecto constituuntur. Tertianum vero comitatur sitis intensa, aestus, acres atque biliosi vomitus, inedia, inquietudinesque. Vt plurimum autem rigores hunc praecedunt: nonnunquam vero etiam refrigeratio. At pulsus in his qui tertiano typo vexantur, paruus & frequens subsequitur. Noctes, quae accessionis dies praecedunt, molestae admodum sunt. Vbi autem morbus producit, non amplius molestae existunt, sed febrem ipsam compescunt. Qui vero ita febricitant, quandoque a tertiano in semitertianum transeunt. Hic autem tertianus typus, omnium minime vexat: praesertim si aestate fuerit contractus. Quod sane indicauit Hippocrates dicens. Tertianae exquisitae septem circuitibus, quod longissimum est, iudicatur. Raro autem diuturna fit, nisi desinente autumno, aduentanteque hyeme gignatur. Urinae sunt flavae, nec non

4.
Typus quotidianus.

Typus tertianus.

Typus quartanus.

Typum quotidianum quae consequuntur.

Quotidiana laborantibus febre induratur lien.

Quotidianus typus ventriculo male affecto constitui solet.

Tertianum typum quae consequuntur.

Hippocrates.

*Hemitriteo ad
esse quæcunq;
comitantur ter
tiam.*

*Hemitriteorū
typorū ppria.*

*Hemitrite⁹ ty-
pus est ferus,
periculūq; vn-
decunq; por-
tendens.*

*Hemitriteus
quibus magis
sit familiaris.*

*Hemitriteus
aliquando in-
termittit.*

vigiliæ infestant. Omnia autem quæ comitant tertiam, eadem & semitertianæ contingunt, quum eiusdem generis ambæ participes sint, tertio quoq; die molientes remissionum & accessionum repetitiones. Proprium autem semitertianorum typorum existit inuasionum extensio, & q̄ plerunq; cum refrigeratione, & statu nondum completo, rursus accessiones infestent. Atqui semitertiana periculum semper minatur, eo q̄ non solum os ventriculi & nervosas partes attingat, & i vniversum eas adhuc, quæ media compositione consistunt, verumetiam veterinosos inducat sopores, & cum deliriis vigilias annexas: nonnunq̄ & resolutiones, quas syncopæ comitatur: linguam etiam validè siccet, atq; animi defectum efficiat, ea quæ sunt in profundo vehementius commouens. Vt autem summatim dicam, typus hic ferus est, periculumq; vndecunq; portendens. Quandoq; autem primo die constituitur, quemadmodum cæteri typi: interdum verò & à secundo & tertio incipit. Oritur autem nonnunq̄ à tertiana producta: nonnunq̄ etiam solutus, in tertianam degenerat: interdum verò & in duas tertianas et quotidianas, ob longitudinem inuasionis, dirimitur. Plerunq; autem, quod attinet ad naturas, virilem corripit: quòd ad ætates, florentem maximè: quod verò ad anni tempora, in autumno præsertim: quando & valde periculosus existit. At non perpetuò continuus est, sed & intermittens quandoq; inuenitur. Habet autem & tres quo ad eius magnitudinē differentias. Alia siquidem semitertiana ē exigua: alia media: & alia magna. Exigua igitur est, quæ circa vigintiquatuor horas torquet. Media, quæ circa triginta sex. Magna quæ circa quadraginta octo: quæ & cōtinuæ febris est propinqua. Porro Agathinus à relatione ad tertianam, semitertianam fieri cēset. Etenim, tertio quoq; die vtriusq; sunt inuasiones. Quartanū verò typum rigores qui-

dem validi consequuntur, & vomitus pituitosi, & lē-
 nis inflammatio, & tumor: nonnunq̃ & abolita appetē-
 tia, & saluæ copia. Interdum etiam ex contrariis appe-
 titus intensus. Quandoq̃ & tussicula simul adest, si cor-
 poris habitus corrumpatur. Idcirco typi quartani diffi-
 cilē solubiles sunt, cæterisq̃ omnibus diuturniores: ita
 ut vsq̃ ad biennium perdurent. Quum autem inuale-
 scit quartanus typus, ipse sibimet complicatur, ut
 duas & tres quartanas efficiat, aut ad aliquam etiā de-
 ueniat cōtinuitatem. Rursus verò quum moderatior
 fit, in vnā conuertitur. Interdum autem & ob sym-
 ptomata quæ complicantur ipsis, adeò periculosa hu-
 iusmodi febres euadunt, ut ad phthisim tandem, aut
 ad aquæ inter cutem affusiones perducant. Frequen-
 tiores autem sunt q̃ aliis temporibus in autumno po-
 tissimum: quo etiam tempore soluuntur ægrè. Quæ
 verò æstate fiunt, omnium minimè infestāt: & magna
 ex parte aliis præcedentibus morbis superueniūt inor-
 dinatē. Quandoq̃ etiam, sed raro, ab initio cōsistunt.
 Cæterum pulsus eis qui tertiana laborant, nō tantum
 magnitudine exiguus fit, q̃tum iis qui vexātur quarta-
 na: neq̃ vsq̃ adeò in tumorem attollitur, quātum illis
 qui quotidiana occupantur. Namq̃ in hoc typo, pulsuū
 quædam mediocritas inuenitur. Est autem quandoq̃
 & in accessionum initiis rarior eo qui secundum natu-
 ram est. Verum præter has tres, inueniuntur etiam fe-
 bres, quæ typicos dierum motus seruant: sicuti & aliæ
 typorum prorsus expertes, præter vnā. Quæ igitur
 seruant typicos dierum motus, vel ante horas con-
 suetas corripiunt, vel retardant. Fiunt autem inor-
 dinatæ, sed præter motus formam. Quare interdum
 præoccupant: interdum tardius morantur: at citra or-
 dinem vtraq̃: præter id tamē q̃ modò inordinatē mo-
 ueant, modò sistāt, nusq̃ autem ordinem habeant, vbi
 etiam à nullo impediuntur: verum manente semper

Typum quar-
 tanum quæ cō-
 sequantur.

Quartani typi
 accurata de-
 scriptio.

Quartane ra-
 ro ab initio in-
 ciunt.

Rrr̃ iiii

dierum figura, quam solæ particulares inordinationes comitentur. Quæ verò omnino typoꝝ expertes sunt, & præter omnes modos enumeratos, & adhuc citra dierum ordinem sunt. Quædam enim inuasiones adducunt: quædam existunt prorsus inordinatæ. At speciei huius differentias plures esse contingit. Licet itaq; modo prædicto cuiq; speculari, necnō utcunq; voluerit, prædictorum typorum proprietates complicare.

5. Typi admittē-
tes duplicatio-
nem qui sunt.
Quotidianus
duplex.
Tertianus du-
plex.
Quartanus du-
plex.

Quotidianus
typus tertiano
iunctus.

Quotidianus
typus quarta-
no iunctus.

Quotidianus
typus tertiano
& quartano iū-
ctus.

Tertianus ty-
pus quartano
iunctus.

Tertianus ty-
pus quartano
& quintano
mixtus.

Porro ex typis duplicantur ii, qui primi appellantur: ut quotidianus, tertianus, atq; quartanus. Quotidianus itaq; duplex est, qui diebus singulis similiter bis inuadit, & bis remittit. * Duo autem tertiani sunt, qui per singulos dies diuersis accessionebus sibi inuicem succedentibus, tertio quoq; die apprehendūt. Quartani verò, quum die vno salubri succedēte, duobus deinceps sequentibus diebus contingat febricitare, in singulis inuasionum horis seruatīs figuris, quæ nimis ex quaternario circuitu sunt æstimandæ. Quotidianus verò tertiano adiungitur, quum primo quidem die, bis inuadit, & bis remittit: die autem sequenti, semel: tertio verò, rursus similiter primo. Quartano autem quotidianus miscetur, quum primo quidem die, bis inuadit: duobus sequētib; semel: quarto verò die, bis: primo similiter. Porro quotidianus, tertianus, atq; quartanus, inuicem commiscētur, quum dies quidem prima tres habet inuasiones, & totidem remissiones: secunda, vnā: tertia duas: quarta tres: quinta vnā: sexta duas: septima rursus tres: atq; in reliquis diebus idem cum primis ordo seruetur. Tertianus autem quartano iungitur, vbi prima dies duas inuasioes adducit, totidemq; remissiones: secunda verò nullas omnino: tertia vnā: & quarta vnā similiter: quinta vnā: sexta nullam prorsus: septima duas: atq; in sequentibus pari modo. Commiscentur adhuc tertianus typus, quartanus, & quintanus: quum scilicet primo die accessiones conti-

gerint: secundo quieuerint: & tertio tertianus, quarto quartanus, quinto verò tertianus simul & quintanus inuaserint. Sed aliter etiam quodammodo huius typi inuasio contingit, in eundem nihiminus typi ordinē incidente tertiani cum semitertiano coniugatione.

GALENI PERGA

MENI ARS MEDICINALIS

CAP. I.



TRES Sunt omnes doctrinæ quæ ordini inherēt: Prima quidem, ex notatione finis, quæ per resolutionem fit. Secunda ex compositione cōstat, eorum quæ per resolutionem inuenta fuerunt. Tertia ex definitionis dissolutione, cui nunc incumbimus. Ex quibus sanè primā, quæ oritur à finis notione, & ex qua omnes artes via quadam atq; ordine cōstituuntur, neminem antè nos scripsisse comperimus. Hic itaq; definitiuam faciemus doctrinam: quæ quātū ab ea quæ ex resolutione consistit, & dignitate, & ipso docendi ordine linquitur, tantum & ad totius compendium, & ad singulorum memoriam præstare inuenietur. SuffICIENTER siquidem, ac facillimè commendantur memoriæ vniuersa, ex definitionis dissolutione. Quoniam totius artis capita in se optima definitio complectitur: quam quidam substantialem appellant: ex aduerso distinguētes eam ab aliis, quæ notionales vocantur. Illæ siquidē, ab iis quæ accidunt rebus definitis: hæ verò ab ipsa eētia p̄stituunt.

Doctrinæ ordinatæ sunt tres,

Doctrinā a finis notione ortam nemo arte Galenum exposuit,

Doctrina definitiua vtitur Galenus in arte medicinali.

Definitio optima, in se capit totius artis complectitur.

Definitio est duplex: substantialis & notionalis.

QVID SIT MEDICINA. CA. II.

Medicina est scientia salubrium, & insalubrium, & neutrorum. Nomen autē scientiæ communiter,

Medicina est
scientia salu-
brium, insalu-
brium, & neu-
trorum.

Salubria que
dicantur.

Insalubria que
sint.

Neutra, quæ.

non propriè, accipere oportet. Porro salubre ipsum, & insalubre, & neutrum, vñquodq; tripliciter dicitur: hoc quidem, vt corp⁹: hoc autem, vt causa: hoc verò, vt signum: Etenim corpus quod natura suscipere sanitatem est aptum, & causam quæ eadem efficere aut conseruare, & signum quod potest indicare, hæc omnia salubria Græci appellare consueuerunt. Eadem ratione & susceptiua morborum corpora, & eosdem efficietes, conseruantesq; causas, & signa indicantia, in salubria vocant. Nec aliter corpora neutra, causas, signa'ue dixerunt. Cæterum secundum quidem primam rationem, atq; præcipuam, causarum salubrium est Medicina scientia. Propter eas autem, & aliarum: secundo autem loco, insalubrium: & tertio neutrarum. Et post has eodem modo corporum, primò quidem & hîc, salubrium: secundo loco, insalubrium: tertio, neutrorum. Itidem & de signis dicendum. In actionibus autem prima quidem est corporum cognitio, quæ habetur ex signis: post hæc, earum quæ in ipsis cognitio causarum.

QUOT MODIS DICATUR EF-
FECTIVVM, INDICATIVVM,

& susceptivum.

Cap. III.

Simpliciter dici
modis duobus

Neutra dici
tripliciter.

Sed quoniam & effectivum, & indicativum, & susceptivum, dupliciter vñquodq; dicitur, hoc quidem simpliciter, hoc verò vt nunc, nosse oportet, amborum esse medicinæ scientiam. Ipsum verò simpliciter, duobus dicitur modis: & quod semper, & quod vt plurimum: de quorum utroq; Medicina pertractat. Neutra verò, & causa, & corpus, & signum, & quod simpliciter dicitur, & quod vt nunc, tripliciter vñquodq; appellatur: hoc quidem, quia neutrius contrariorum est particeps: hoc verò, quia vtriusq; atq; hoc deniq;, quia aliquando huius, aliquando illius. Horum autem ipsorum secundum, rursus duobus dicitur modis: aut

quia vtrunq; cōtrariorum ex æquo participat: aut qā aliquando plus alterum. Primū igitur de corporibus ipsis dicemus, qualia nam sint, & salubria, & insalubria, & neutra: post hæc de signis & causis differemus.

DE CORPORE SALVBRI. CA. IIII.

Salubre simpliciter corpus est, quod ab ipso naturæ ortu bonam temperaturā sortitur in simplicibus ac primis particulis: estq; in his quæ ex illis constāt instrumentis commensuratum. Salubre verò nunc est corpus, quod in præsentī est sanum. Est verò & hoc, eo tempore quo sanum existit, bonam habens temperaturam & commensurationem: non tamen optimā: at sibi propriam. Ipsius verò salubris simpliciter corporis, semper quidem est tale, quod optimē temperatum ac maximē commensuratum existit: vt plurimū autem, quod à constitutione optima, non valde admodum deficit.

Salubre simpliciter corpus quod sit.

Salubre vt nunc, quod sit corpus.

DE CORPORE INSALVBRI. C. V.

Insalubre verò simpliciter corpus est, quod ab ipso ortu naturæ, vel in consimilibus partibus malam temperiem possidet: vel in instrumentalibus incommensurationem: vel vtrūq; vitium. Insalubre verò nunc, est illud, quod eo tempore, quo tale dicitur, ægrotat: vel in consimilibus prauam temperaturam: vel in instrumentalibus incommensurationem: vel vtrūq; vitium tunc habens. Est verò & semper insalubre, quod ex ipso naturæ ortu vel pessimam temperiē possidet in simplicibus & primis particulis omnibus, vel in aliquibus, vel in iis quæ obtinent principatum: vel in instrumentalibus incommensuratum existit: idq; vel in omnibus, vel in nōnullis, vel in illis quæ principatum obtinent. Vt multum verò insalubre est corpus, quod ab huius quidem vitio recedit: nōdum tamen mediocritatem attingit.

Insalubre simpliciter corpus, quod sit.

Insalubre vt nunc, quod sit corpus.

DE CORPORE NEVTRO. CA. VI.

Neutrum cor-
pus quid sit, iux-
ta primum si-
gnificatum.

Neutrum iux-
ta secundum si-
gnificatū quid
sit.

Neutrum iuxta
tertium signifi-
catum quid.

Quoniam verò & neutrum corpus dicebatur tri-
pliciter, vnum quidem, quod neutrius erat ex-
tremæ dispositionis particeps: aliud, quod vtriusque:
aliud quod aliquando huius, aliquando illius: iuxta pri-
mum significatum, neutrum erit corpus, quod exqui-
sitè medium est, & saluberrimi, & insaluberrimi cor-
poris: & huius, hoc quidem simpliciter tale, quod ab
ipso naturæ ortu, ita est constitutum: hoc aut ut nunc,
quod in præsentī tempore, exquisitè medium existit,
& saluberrimi, & insaluberrimi corporis. Ipsius verò
simpliciter, semper quidem tale est id, quod in omnib⁹
ætatibus perdurat tale: ut multum autem, quod non-
nullas recipit mutationes. At iuxta secundum signifi-
catum, neutrum erit corpus, quod ab ipso ortu natu-
ræ, contrariarum simul est particeps dispositionum:
aut scilicet in vna parte, aut in duabus differentibus.
In vna quidem, si secundum alteram oppositionem ef-
fectuarum qualitatum bonam habuerit temperiem:
vel etiam secundum vtranc⁹: sed in formatione, vel
magnitudine, vel numero partium, vel situ, deliquat:
aut cōtrā, in his quidem rectè se habeat, vel omnib⁹,
vel quibusdam: peccet autem in ipsa temperie. In dif-
ferentibus verò partibus, & iuxta omnes oppositiōes
potest quicq̃ simul esse particeps contrariorū. Et sem-
per quidem est tale, quod per omnes ætates in eodem
perseuerat statu. Ut multum verò, quod aliqua ex par-
te euariat. Ita etiam, & nunc neutrum erit corpus iux-
ta secundum significatum, quia vel parte in vna, hæc
quidem sibi salubria sunt, illa verò insalubria: vel ī dif-
ferentibus ita afficitur partibus. Iuxta tertium signifi-
catum, neutrum erit corpus, quod aliquando quidem
salubre, aliquando verò insalubre existit. In vno autē
tempore, quod ita est neutrum, * exactè quidem cō-
sistere nequit: latius verò si accipiatur, potest.

DE SIGNIS SALVBRIBVS. CA. VII.

A R S M E D I C I N A L I S

Sunt autem ex signis salubria quidem, quæcunq; præsentem indicant sanitatem, & futuram prænunciant, & præteritam memoriæ subiiciunt. Insalubria verò, quæ & præsentem indicant ægritudinem, & futuram prænunciant, & præteritam memoriæ subiiciunt. Eadem ratione neutra dicuntur, quæ neutram dispositionem ostendunt, prænunciant, & memoriæ subiiciunt: quæq; partim quidem salubrem, partim insalubrem dispositionem indicant: & quæ aliquando quidem salubrem, aliquando verò insalubrem: & hæc quoq; secundum tria tempora, veluti salubria & insalubria, appellatur. Dicuntur autem nonnunquam à vetustioribus Medicis hæc omnia, signa prænunciatiua, quæ sint præsentium & præteritorum indicatiua. Porro usus non parvus ex prænunciatiuis atq; indicatiuis accedit: minor autem ex his quæ memoriæ subiiciunt.

DE SIGNIS OPTIMAE CONSTITUTIONIS. CAP. VIIII.

Salubrium autem corporum dignotiones sumendæ sunt ab iis quæ secundum essentiae rationem eis insunt: & ab his quæ necessario sequuntur ipsa functionibus atq; symptomatis, quæ propriè accidentia appellantur. Ab essentia quidem ipsa, eorum quæ optimam habent constitutionem, commensuratione: consimilium quidem, in caliditate, frigiditate, humiditate, & siccitate: instrumentorum verò, in quantitate ac numero eorum ex quibus constant: ac præterea formatione, situ partium singularum, & totius instrumenti. Ex his verò quæ necessario consequuntur consimilia: quantum quidem ad tactum attinet, à mediocritate quæ in molitie & duritie consistit: quantum verò ad aspectum, à colore optimo, & leuitatis, atq; hispiditatis mediocritate. In functionibus à perfectione, quam ipsarum esse virtutem dicimus. Ab iis verò quæ instrumentarias sequuntur partes, à commensuratione & pulchritudi-

269

Salubria signa quæ sint.

Insalubria signa quæ sint.

Neutra signa quæ sint.

Signa prænunciatiua, indicatiuaq; esse utiliora iis, quæ memoriæ subiiciunt.

Salubrium corporum dignotiones unde pendendæ sint.

ne omnium totius corporis instrumentorum: ac præterea, ab earum quæ ipsis insunt, virtute operationum. Optimæ igitur constitutionis corporum signa indicatiua sunt hæc. Eorum autem, quæ ab ipsa deficiunt, & adhuc tamen salubria existunt, nonnulla quidem in cōsimilium temperatura vitium aliquod paruum habent: nonnulla verò in instrumentariorum vel omnium, vel aliquorum commensuratione, & hoc quoque perexiguum. Sunt quæ in vtriusque vitium aliquod habeant. Vitiis verò genera, eadem sunt his quæ virtutem perficiunt: temperatura quidem in cōsimilibus: numerus autem, & formatio, & magnitudo, & situs instrumentariis: vtriusque verò communis vnitas, quam ipsorum continuitatem vocamus. In his autem ipsis generibus sunt corporum insalubrium vitia, secundum vtriusque salubritatis significatum. Terminus autem qui vtriusque distinguit, est operationum læsio sensibilis. Etenim quæ simpliciter insalubria sunt corpora, distinguuntur ob id, quod facile à causis morbificis superantur: & quoniam in vigore operationum deficiunt plurimum. In medio autem salubrium & insalubrium collocantur ea, quæ neutra exquisitè appellantur: & cum latitudine quadam. Quo fit, ut rota sanitatis latitudo in tres partes, quarum singulæ latitudinem habent non paruum, diuidatur. Erit autem prima quidem salubrium corporum: secunda neutrorum: tertia insalubrium. Post hæc deinceps sequuntur quæ iam ægrotant corpora: quæ Aegrotantia sensibilibus operationum læsionibus distinguuntur. Hæc autem omnia sensu diiudicantur, non ipsa natura rerum. Signa itaque sanorum corporum, siue ea salubria, siue insalubria, siue neutra existant, quantitate distantiae differunt: duobus inuicem contrariis terminis à nobis constitutis, optima videlicet constitutione corporis, & nuper genito morbo: ac deinceps considerantibus, vtri eorum sint viciniora, quæ ad examē corpo-

Insalubria simpliciter corpora facile a causis morbificis superantur.

Sanitatis latitudo vniuersa in tres partes diuiditur.

Aegrotantia corpora a cæteris sensibilibus operationum læsionibus distinguuntur.

ra veniunt. Quæ enim proximiora sunt optimæ constitutioni, salubria: quæ verò ab hac longi⁹ distant, atq; ad ea quæ iam ægrotant, magis accedunt, insalubria: quæ autem intermedia, atq; æqualiter ab vtriusq; distare videntur, neutra existunt. Optimæ igitur constitutionis corporis indicia explicauimus. Eorum verò quæ ab ipsa deficiunt, totidem sunt numero genera quæ in magis & minus secari possunt.

Salubria & insalubria corpora, quomodo discernenda.

QVOT SVNT DIFFERENTIAE

partium.

C A P. I X.

Partium vniuersæ differentia sunt quatuor. Siquidem earum nonnullæ principia quædam existunt: aliquæ ab ipsis originem habent: aliquæ neq; aliarum gubernationi p̄sunt, neq; aliunde gubernantur: quum insitas habeant à natura potentias, à quibus reguntur. Quædam verò sunt, quæ insitas simul & aliunde emanantes sortiuntur. Principia igitur sunt, Cerebrum, Cor, Hepar, atq; Testiculi. His verò, & originē debēt, & famulantur, nerui quidem & spinalis medulla, Cerebro: Cordi autē, arteriæ: Hepati, venæ: vt testiculis seminaria vasa. Quæ autem à seipsis, gubernantur, sunt Charitago, Os, Copula seu ligamētum, Membrana, Adenes, Adeps, & Caro simplex. Reliquæ verò partes, quum vnà cum istis habeant ex seipsis regimen, arteriis, neruis, & venis insuper indiguerunt. Capillorum autem atq; vnguium neq; regimen vllum est, sed generatio tantummodo.

Partiū vniuersæ differentia sunt quatuor.

Principes partes sunt cerebrū, cor, hepar, atq; testiculi.

Capilli, vnguesq; minime gubernantur, sed gignuntur duntaxat.

DE SIGNIS CEREBRI. C A. X.

Cerebri autem naturam, quinque indicatorum genera ostendunt. Primum quidem, totius capitis dispositio. Secundum, sensibilibus operationum virtus & vitium. Tertium, actiuarum. Quartum, earum quæ principatum obtinent. Quintum deniq; naturalium. Est & aliud sextum genus præter hæc dicta, alteratio quæ extrinsecus aduenit. Porro totius capitis disposi-

Cerebri naturam quinque indicatorum genera ostendunt.

tio, ex magnitudine ipsius atq; figura sumitur: necnō ex capillis.

DE PARVITATE ET MAGNITVDI
NE CAPITIS. CAP. XI.

Caput magnū
quando sit bo
num indiciū.

Capitis natu-
ralis figura
qualis nam ef-
se debeat.

Paracephalis.
Labdoides
futura.
Cerebellum ē
principiū spi-
nalis medulle.

PAruum igitur caput vitiosæ cōstitutionis cerebri proprium indicium est: magnum verò, non neces- sariò indicat bonam cerebri compositionem: sed si qui- dem ob insitæ virtutis robur, quæ multam ac optimā materiam afformarit, eueniat, optimum signum ē. At si ob materiæ rātū multitudinem, haudquaquā bonum. Distinguēda verò sunt hæc, & ex figura ipsa, & ex his, quæ ab eo habent ortum. Ex figura quidem, si sit con- cinna: semper nāq; hoc, bonum signum existit. Ex iis autem quæ ab eo ortum habent, si cervici validæ insi- deat, aliisq; osibus optimè constet: atq; omnis præte- rea substantia boni sit habitus, ac robur habeat inten- tum. Propria autem capitis figura est, veluti si excogi- tares sphæram exquisitè rotundam ex cera constru- ctam, paulatimq; vtrinq; depressam. In hac enim ne- cesse est, vt posteriores * prioresq; ptes plus gibbæ fi- ant, q̃ sphæræ conueniat: quæ verò vtrinq; cōsistunt, magis rectæ. Quòd si ea quæ secundum occiput emi- nentia, aliquatenus minuatur, simul intueri oportet nervos, atq; cervicem, vnā cum osibus aliis. Nam si secundum naturam constiterint, materiæ defectu, nō virtutis imbecillitate, cōtingit. Illis verò nō rectè se ha- bentibus, principium est debile. Vt plurimū verò exi- stit optimum signum figura concinna parencephali- dis, quā nonnulli medici posterius cerebrum vocant, vt est re vera posterius, distinctum labdoide futura. Est verò hæc pars principium spinalis medullæ, ac pro- inde nervorum omnium, per totum corpus animalis, actionibus subseruientium. Ipsa siquidem cerebri pars posterior, p seipsam, paucos admodum sensitivos pos- fidet nervos: plurimos autem actiuos. Anterior verò contrā

contra, sensitivos quidem plurimos: actiuos autem p
paucos. Quare vbi vtraq; fuerit optimè affecta, robu
stas habebunt eas, quæ ab ipsis pendent, deriuationes.
Egdem quoq; distinctiones faciendæ sunt ad partes ca
pitis anteriores, quæ etiam ad posteriores: earūdemq;
paruitatem, magnitudinem, & figurā, necnon sensus
ibi collocatos, visum, gustum, & odoratum, expende
re oportet. Siquidem sese inuicem indicant, attestan
tur q; & quæ à principiis oriuntur, principii virtutem
& vitium: & principium ea quæ ab ipso nascuntur.

Principia & en
quæ ab illis o
riuntur, sese in
uicem attestan
tur, & indicat

DE OPERATIONIBVS OBTINEN
TIBVS PRINCIPATVM.

C A P. XII.

E Arum autem operationum quæ obtinent princi
patum, virtus ac vitium sunt ipsius principii seor
sum tantummodo indicia. Voco autem operationes
principatum obtinentes, quæ à solo principio proue
niunt. Sagacitas igitur, subtilem cerebri substantiam
indicat. Tarditas verò intellectus, crassam. At discendi
facilitas, formarum facile susceptiuam. Memoria, sta
bilem atq; firman. Difficultas discendi, formarū non
facile susceptiuam. Obliuio, fluidam. Mobilitas in opi
nionibus, calidam: vt stabilitas frigidam.

Principalium
animæ actionū
singule, quid si
gnificent.

SIGNA BONAE TEMPERATURAE
CEREBRI. C A P. XIII.

S I quidem cerebrum sortiatur bonam primarum
quatuor qualitatum temperiem, omnia quæ dixi
mus, habebit quā moderata. Excremēta quoq; quæ
ab eo expurgantur, moderatè se habebunt: atq; ab iis
quæ extrinsecus alterādo occurrant, nequaquā lædetur.
Talibus igitur capilli capitis, quum adhuc sunt infan
tes, subruffi: quum verò pueri, subflauī: quum iam ado
leuerint, flauī sunt: mediūq; inter omnino crispōs * &
lenes. Nec verò caluescunt facile.

SIGNA CALIDI CEREBRI. C. XIII.

**Cerebri calidi
indicia.**

Signa calidi cerebri sunt, in iis quæ circa caput consistunt, rubor & calor maior, & quæ in oculis visuntur venæ, conspicuæ magis. Capilli quoque in his statim in lucem editis * celeriter generantur: & quum plurimum in calore à mediocri temperatura recesserint, nigri, & robusti, & crispi sunt: quum verò non multum, subflavi quidem ab initio fiunt, deinde nigricant: ac progredientibus ætatibus, caluitium patiuntur: eoque magis, quo temperies plus æquo calidior fuerit. Excrementa verò quæ per palatum, & nares, & oculos, & aures purgantur, pauca & concocta ipsis existunt: si integra sanitate fruatur. Si verò eis caput repleatur, plura quidem in ipsis excrementa, sed non concocta, gignuntur. Implentur autem, aggrauanturque eorum capita, à calfacientibus tum cibus, tum potibus: necnon ab odoribus, iisque omnibus, quæ extrinsecus nobis occurrant: in quorum numero est aer circumfluus: ac tunc præcipue, si non solum natura calida, sed etiam humida, ipsa corpora extiterint. Breuib. autem somnis huiusmodi temperaturæ contentæ sunt, nec profundis admodum.

Cerebrum calidum a quibus facile impleatur.

Calida & humida corpora somnis brevibus sunt contenta.

SIGNA FRIGIDI CERE- BRI. Cap. X V.

Cerebri frigidi indicia.

Cerebro frigidoprediti facile a frigidis causis lædunt. Cerebro frigidoprediti somnolentiores sunt.

Frigidioris verò quod oporteat cerebri indicia sunt, plura in propriis meatibus excrementa. Capilli recti, rufi, stabiles, & qui longo post natiuitatem tempore nascuntur tenues, atque ab initio male nutriti. Porro quibus tale cerebrum obtigit, facile à frigidis causis læduntur: quo sanè læsionis tempore destillationibus, & grauedinibus corripuntur. Sed nec partium quæ iuxta caput sunt calor magnus aut rubor: nec oculorum venæ illis conspicuæ insunt. Sunt autem quodammodo somnolentiores.

SIGNA SICCI CERE- BRI. Ca. XVI.

Cerebri sicci indicia.

Siccioris autem cerebri indicia sunt paucae superfluitates effluentes, & sensuum perspicacitas. Sunt

autem ad vigilias prompti, & capillos habet robustos, crispas potius quam rectos & qui celerrime eis genitis innascuntur. Cito autem caluescunt.

HVMIDI CEREBRI INDICIA.

C A P. XVII.

Humidioris vero cerebri indicia, capilli plani: quodque minimè calui fiant: sensus turbulenti: multitudo excrementorum: somni multi & profundi. Atque hæc quidem simplices sunt intemperies.

Cerebri humidioris indicia.

SIGNA CALIDI SICCIQUE

cerebri.

C A. XVIII.

Qui calido & sicco sunt cerebro, superfluitatibus carent, sensibus vigent, plurimum vigilant, atque cito fiunt calui. Prima autem capillorum generatio in illis celerrima est, ac plurimo alimento abundans. Capillos vero habent nigros & crispas: tangentibusque caput sentiuntur calidi, rubicundi que sunt, usque ad consistentiam ætatem.

Cerebri calidi & sicci indicia.

SIGNA CALIDI ET HVMIDI

cerebri.

C A P. XIX.

Si vero humiditas caliditati iungatur, sed parum utraque qualitas mediocritatem superet, adest color bonus, calorque, & quæ in oculis sunt venæ, magnæ. Præterea excrementa plura, & mediocriter cocta, & capilli recti, & sufflavi: nec facile calui fiunt. Implentur vero, atque aggrauantur eorum capita à calidis. At si humectentur, tunc multo magis: & præcipue ubi multitudine excrementorum redundant. Quod si plurimum caliditas atque humiditas creuerint, iis caput est morbis obnoxium, excrementisque abundans: ac facile à calfacientibus & humectantibus lædit. Proinde Auster semper talibus aduersatur: atque optimè in Aquilone se habent. Ii non diu vigilare possunt: & quum se ad somnum conuerterint, simul graui somno tentantur & vigiliant & somnia habent imaginationibus plena. Visus est eis

Cerebri calidi & humidioris indicia.

Cerebro calido & humido præditis, ut aduersatur Auster, sic confert Aquile.

Sss ii

turbulentus, nec satis sensibus vigent. Pro ratione attem ipsius qualitatis in mistione excellentis mediocritatem, solent etiam signa ipsa excellere.

SIGNA FRIGIDI ET SICCI

cerebri. Cap. X X.

Cerebri frigidi & sicci indicia.

F Rigidæ verò & siccæ cerebri intemperantiæ, frigidum & minimè coloratum, sui ratione, caput efficiunt. Qui autem sic sunt affecti, in oculis nullas habent venas conspicuas, facileq; à frigidis causis læduntur. Quare & inæquali sanitate fruuntur.

DE SENSIBVS. C A. X X I.

Sensus autem eorum, in iuuentute quidem, omnes vigent, atq; omni vitio carent: sed progrediente ætate, cito marcescunt. Vt autem summatim dicam, omnia quæ ad caput pertinent, celerrimè illis marcescunt. Quamobrem cito cani fiunt. Capilli verò ipsis quidem genitis, vix exeunt, & malè nutriuntur, & rufi sunt. In progressu autem ætatis, superante magis frigiditate caliditatem, q̄ siccitate humiditatem, non caluescunt. Contra verò, si contigerit siccitatem quidem plurimum dominari humiditati: frigiditatem verò parum calori, calui fiunt hi.

SIGNA CEREBRI FRIGIDI ET

humidi. C A P. X X I I.

Cerebri frigidi & humidi indicia.

Humidæ verò, & frigidæ cerebri temperaturæ, graues somnos conciliant, sensuum hebetudinē pariunt, vim excrementorū accumulāt: caputq; reddunt frigori & plenitudini obnoxium. Sic affecti, destillationibus & grauedinibus facillè corripunt: at minimè calui fiūt.

DE OCVLIS. CAP. XXIII.

Oculorum temperamēta quō dignoscantur. Oculi a similibus temperaturæ sue causis

Qui oculi tangentibus manifestè calidi apparēt, & facillè ac crebro motu mouentur, & venas latas habent, ii calidi omnes sunt: frigidi verò, his contrarii. Et humidi quidem, molles, multaq; humiditate referti: sicci verò, duri simul & aridi. A similibus autē

ARS MEDENDI

377

fur temperaturæ causis facile offenduntur : iuuantur
verò, à modico cōtrariorum vsu . Sed hoc quidem cō
mune in omni cuiuscunq; partis temperiei dignotio-
ne meminisse oportet.

læduntur faci-
le : iuuantur ve-
ro a modico
contrariorum
vsu.

DE MAGNITVDINE OCULO-

rum.

Cap.

X XIII.

Magnitudo oculorum quidem, vbi concinnitas
adsit, & operationum virtus, multitudinem be-
ne temperatæ substantiæ ostendit, ex qua sunt
conformati. Quæ si desint, multam quidem substan-
tiam, non tamen bene temperatam indicat.

Oculorum ma-
gnitudo quid
indict.

DE PARVITATE

oculorum. CA. XXV.

Paruitas verò oculorum, adiuncta quidem concin-
nitate, atq; * operationum virtute, paucam qui-
dem, sed bene temperatam substantiam ostendit, ex
qua sunt conformati. Si verò inconcinnitas adsit, atq;
functionum vitium, paucam simul atq; viciosam mate-
riam demonstrat.

Oculorū par-
uitas quid si-
gnificet.

DE COLORE OCVLORVM.

C A P.

X X V I.

Glauci oculi, qui pura humiditate, ac non multa p
fulgent, tales sunt, ob splendidi luminis abundan-
tiā. Contrā verò, nigri, & qui intermediā naturā ser-
uant, causas quoq; intermediās sortiuntur.

Oculi glauci
& nigri vnde
siant.

DE GLAUCEDINE ET NI-

gredine oculorum.

CA. XXVII.

Glaucus igitur ocul⁹ fit, vel propter magnitudinē,
vel propter splendorem crystallini humoris, vel
propter situm prominentem, vel propter tenuis &
aquei humoris, qui in pupilla existit, paucitatem, & pu-
ritatem. Omnibus autem his in vnum coeuntibus,
fit glaucissimus oculus. Si verò aliqua adsint, aliqua de-
sint, tunc maior minor ue glaucedo contrahitur.

Glaucedinis
oculorum cau-
sa.

Niger verò oculus fit, aut ob paruitatem crystallo-

Nigredinis o-
culorū causa.

Sss iii

dis, aut propter profundum situm, vel quia splendidus ac fulgidus exquisitè non est, vel quia tenuis humor, vel superabundat, vel impurus existit, vel propter vnā ex hisce causis, vel propter omnes fieri consueuit. Tenuis igitur humor, quo magis ad aquæ naturā accedit, & superabundat, humidiores ostendit oculū: quemadmodum si crassior ac minor fiat, sicciores. Crysalloides autem humor, si quidem durior existat, sicciores efficit oculos: si verò mollior humidiores. Sic & si plus modico tenuem humorem excefferit, sicciores: si relinquatur ab illo, contrarium.

DE CORDIS TEMPERATURIS.
CAP. XXVIII.

Cor frigidissimum erit calidius calidissimo cerebro.

V Nāquāq; partem calidiores aut frigidiores dicimus, non alicui rei alteri, sed ad seipsam, eam comparantes. Sic enim utcūq; extiterit cor natura frigidissimum, multo sanè calidiores temperiem sortietur calidissimo cerebro.

SIGNA CORDIS CALIDI. Cap. XXIX.

Cordis caliditatis indicia.

C Alidioris igitur cordis, * q̄ pro naturali symmetria, indicia quædam sunt inseparabilia, & propria, magnitudo respirationis, pulsus velocitas, & frequentia: audacia, & ad actiōes natura prompta. Quod si multum in caliditate excefferit, tunc furibunda quædam iracundia, & temeritas adsunt. Est autem his thorax hispidus, & præsertim pectus, & quæcūq; hypochondriis partes proximiores. Magna verò ex parte calidi cordis temperies vniuersum corpus calidum reddit, nisi hepar vehementius obstiterit. Est præterea & latitudo thoracis, caliditatis indicium, nisi & hîc quoq; cerebrum plurimum reluctetur, cui spinalis medullæ magnitudo proportionē respondet. Tantæ verò erūt magnitudine vertebræ, quanta spinalis medulla: quare & spina vniuersa. Compingitur autem thorax ad eam spinæ partem, quæ iuxta metaphrenum, hoc est

Toracis latitudo quæ sit caliditatis indicium.

dorsum, cōsistit, tanq̃ ad nauis carinam. Quare neces-
sario eius longitudo æquabitur dorso. Latitudo verò,
erit pro vertebrarum ratione : quando ad proportio-
nem crassitudinis earum fuerit compactus. Quum ve-
rò cordis caliditas superās perflauerit ac dilatauerit in
primò sui ortu thoracem, erit eiusdem caliditati pro-
portione respondens. Quare quū caput paruum, tho-
rax autem latus extiterit, maximū hoc tibi fuerit cor-
dis caliditatis indicium. Quum verò magno existente
capite, paruus fuerit, propriissimū hoc tibi sit cordis
frigidioris signum & argumentum. Si verò capiti fue-
rit proportione respondens, tunc aliis signis de corde
distigues, ex ipsi⁹ thoracis amplitudine nihil iudicans.

SIGNA CORDIS FRIGIDI.

C A P.

X X X.

IN frigidiore verò corde pulsus minores existunt,
q̃ modo naturæ conueniat. Non tamen necessario
tardiores, vel rariores. Respiratio autem, si quidem tā-
to thorax minor extiterit, quanto cor frigidius, pulsi-
bus erit proportionalis. Si verò maior fuerit, q̃ pro fri-
giditatis portiōe, non solū minor, sed etiam tardior
& rarior ipsa respiratio erit. Sic affecti sunt, naturali-
ter timidi, pusillanimesq̃, atq̃ tardi: pectusq̃ gla-
brum sortiuntur.

Cordis frigidi
indicia.

SIGNA CORDIS SICCI. Cap. XXXI.

COr autem siccus, pulsus duriores efficit: iramq̃
non promptam excitat, sed ferinam, quæq̃ faci-
lè compesci non possit. Magna aut ex parte sic affectis
vniuersum corpus siccus existit, nisi hepar obstiterit.

Cordis sicci
indicia.

SIGNA CORDIS HUMIDI.

C A P.

X X X I I.

Cordis verò humidioris signa, pulsus molles, &
mores ad iram quidem procliuēs, sed talem, quæ
sedari possit: at vniuersum corpus humidius existit,
nisi hepar obsistat.

Cordis humi-
di indicia.

Sss iiii

SIGNA CORDIS CALIDI

& sicci. Cap. XXXIII.

Cordis calidi
& sicci idicia.

Calidi & sicci cordis, pulsus duri sunt, magni, veloces, atq; frequentes: similiterq; respiratiões, magnæ, veloces atq; frequētes. Multo autem magis ad velocitatem ac frequentiam vergunt, thorace cordi non aucto proportionaliter. Sic affecti, præ cunctis, pectus habent maximè hirsutum, & hypochondria. Ad actiones autem sunt prompti, iracundi, & * celes, moresq; præ se ferunt tyrānicos. Sunt etenim ad furorem faciles, inexorabilesq;.

SIGNA CORDIS CALIDI

& humidi. CAP. XXXIII.

Cordis calidi
& humidi in-
dicia.

Si verò caliditas cum humiditate præcellat, minus quidem eis quos antea diximus, hi sunt hirsuti: ad actiones verò nihilo minus prompti: non tamen ferus ipsis est animus, sed ad iram tantum proclivis. Pulsus verò magni ac molles, velocesq; & frequētes existunt. At respiratio, si thorax quidem cordi fuerit proportionalis, eandem cum pulsibus speciem servabit. Si verò minor extiterit, rāto illis velocior, atq; frequentior erit, quanto & thorax minor extiterit. Quod si multa facta fuerit eversio in ipsa temperatura, atq; in humiditate præcipuè, præter ea quæ diximus, contingent etiam ex putredine morbi: his, qui in ipsis fuerint, humoribus corruptis ac putrefactis. Expirationes autem maiores fient, ac velociore inspirationibus: necnon arteriæ contractio velox.

SIGNA CORDIS HUMIDI

& frigidi. CAP. XXXV.

Cordis frigidi
& humidi in-
dicia.

Qui humidior & frigidior sunt corde, pulsus molles sortiunt: minimeq; audaces, sed timidi & segnes existunt. Tales etiam possidēt glabrum pectus: minimeq; iracundiam cōservant, ad quam etiam non sunt admodum prompti.

ARS MEDICINALIS

281

SIGNA CORDIS FRIGIDI

& sicci. CAP. XXXVI.

Frigidius verò atq; siccius cor, pulsus quidem duriores reddit & paruos: respirationem autem, si quidem thorax paruitatem cordis frigiditati proportionalem habuerit, moderatam. si verò maior extiterit, raram & tardam. Hi verò præ omnib; minimè ad irascendum sunt prompti: quum autem coacti fuerint irasci quibusdam, retinent iracundiam. Habent autem maximè omnium pectus glabrum. * Cæterum quæcunq; de moribus, siue nunc, siue quouis alio sermone explicata sunt ad temperaturæ cognitionem, sciendum est, ea non de optimis morib; aut vitiosis, qui ex philosophia hominibus adueniunt, sed de insitis vnicuiq; naturalibusq; à nobis exposita fuisse.

Cordis frigidi & sicci argumenta.

Mores ipsi sunt duplices, nempe ciuiles, & naturales, siue insiti.

SIGNA CALIDI HEPATIS.

CAP. XXXVII.

Hepatis calidioris indicia, venarum latitudo, flaua bilis abundantior: in consistente verò ætate, etiam atra: calidior ipsis sanguis atq; eadē ratione vniuersum corpus, nisi cor obstitit. His venter & hypochondria hirsuta.

Hepatis calidi indicia.

SIGNA HEPATIS FRIGIDI.

CAP. XXXVIII.

Frigidioris verò, angustia venarum, pituita abundantior, sanguis frigidior, adeoq; totius corporis habitus, nisi calefiat à corde. Venter illis glaber est, atq; hypochondria.

Hepatis frigidi indicia.

SIGNA HEPATIS SICCI.

CAP. XXXIX.

Siccioris autem, sanguis quidem crassior, & minimè abundans: venæ duriores & totius corporis habitus siccior.

Hepatis siccioris indicia.

SIGNA HUMIDI HEPATIS.

CAP. XL.

Hepatis humi-
di indicia.

Humidioris autem sanguis quidem copiosior, hu-
midiorq; atq; venæ molliores: ita verò & vniuer-
sum corpus, nisi cor reluctetur.

SIGNA CALIDI ET

sicci hepatis. CAP. XL I.

Hepatis calidi
& sicci indicia

Calidioris verò simul ac siccioris hepatis sunt indi-
cia, hypochondria plurimum hispida, sanguis cras-
sior & siccior, flaua bilis plurima: consistente autē eta-
te, etiam atra: venarum autem latitudo & durities. Sic
verò & vniuersum corpus se habet. Nam quæ ex cor-
de caliditas originem duxit, potest obtundere eā, quæ
ab hepate nascitur, frigiditatem: sicuti & frigiditas ca-
liditatem. Siccitatem verò nō potest humidius cor ad
habitum contrarium perducere. At media inter has
quæ dictæ sunt, ea quæ ab hepate humiditas nascitur.
Magis enim à cordis siccitate superat, q̄ siccitas ab hu-
miditate: minus autem à caliditate: adhuc verò multo
minus à frigiditate. Hæc enim inter omnes qualitates
quæ eueniunt ab hepate, facillimè superatur. Vbi igitur
in vnum conuenerint vtriusq; principii tempera-
ruræ, totum exquisitè secundum illas afficitur corpus.

SIGNA HEPATIS CALIDI

& humidi.

CAP. XL II.

Hepatis calidi
& humidi si-
gna.

Humidius autem, ac simul calidius hepar, minus q̄
dem q̄ calidius & siccus hispida hypochondria red-
dit. Plurimum vero sanguinis, & venas amplas, habi-
tumq; calidiorē, & humidiorē facit, nisi obstiterit
cor. Si verò amplius in ambabus qualitatibus à natu-
ræ modo recedat, à morbis q̄ ex putredine, ac vitiosis
humorib⁹ sūt, sic affectus minimo negotio corripit: p̄-
sertim si plurimū augeat humiditas: caliditas verò, nō
ita. Sin autē contra, minimè humorum vitio laborat.

SIGNA HEPATIS HUMIDI

& frigidi.

CAP. XL III.

Hepatis humi-
di & frigidi in-
dicia.

Humidius autem atq; frigidius hepar habet hypo-

chondria glabra, sanguinem verò, accedentem ad pituitæ naturam gignit, cum venarum angustia. Sic & reliquum afficit corpus, nisi à corde ad contrariâ transferatur naturam.

SIGNA HEPATIS FRIGIDI
& sicci. CAP. XLIIII.

Frigidius & siccus hepar, parum sanguinis, & exiguas venas exhibet corpori: ipsumq; frigidius reddit, & hypochondria glabra, nisi & hic cor dñetur.

Hepatis frigidii & sicci indicia.

SIGNA CALIDAE, FRIGIDAE,
humidæ, & siccæ tēperaturæ testiculorū. C. XLV.

Temperatura verò testiculorum, calida quidem, proclivis ad venerem, masculorūq; productrix, atq; fœcunda. Eadem celerrimè genitales partes obsepit pilis. Frigidior verò, contraria efficit. At humida, multo & humido semine abundat. Sicca, paucum & modicè crassum generat semen.

Testiculorū tēperaturas significancia.

SIGNA CALIDAE ET SIC-
cæ tēperaturæ testiculorum. Ca. XLVI.

Calidior verò & siccior, crassissimum semen habet, & fœcundissima est, ac celeriter ab initio proterius ad coitum excitat animal. Sed & his genitales partes citissimè hispidae fiunt: atq; omnes quæ circunculant, supra quidem, vsq; ad umbilicum: infra verò, vsq; ad media femora. Petulca igitur est, & ad libidinem prona, cuiuscemodi temperatura: statim verò satiatur, & si cogatur offenditur.

Testiculorū calidorum & siccorum indicia.

SIGNA CALIDAE ET HUMIDAE
temperaturæ testiculorum. Ca. XLVII.

Sin autem caliditas humiditati iūgatur, hirsuti quidem tales minus: plus verò semine abundant: non tamen plus cæteris appetunt, sed minori detrimento præter modum venereis indulgent. Quod si caliditas & humiditas abundanter exuperaverint, non sine detrimento à venereis abstinant.

Testium calidorum & humidorum indicia.

SIGNA HUMIDAE ET FRIGIDAE
temperaturæ testiculorum. Ca. XLVIII.

Testium frigidorum & humidorum indicia.

SI verò frigidiorē & humidiorē temperaturā testiculi habuerint, partes circumpositæ glabræ sunt, & tardè rem exercere veneream incipiunt, nec proni ad actum huiuscemodi sunt. Aquosum verò & tenue ipsis est semen, infœcundumq; & fœminarum generantium, vel omnino non generans.

SIGNA FRIGIDAE ET SICCAE
temperaturæ testiculorum. Ca. XLIX.

Testium frigidorum & sicciorum indicia.

AT frigidior & siccior temperatura, similis quidē in reliquis est antedictæ: crassius tamen in ipsa semen existit, atq; paucum omnino.

DE TOTIVS. CORPORIS HABITU. C.L.

Musculorum substantia ex quibus cōstet.

TOtius corporis habitus in illis maximè consistere dicitur partibus, quæ primæ oculis subiiciuntur. Sunt verò hæ, muscoli, qui omnia ambiunt ossa, existentes quædam carnes compositæ, ex prima & simplici carne, & præterea fibris, quibus innascuntur. Propria siquidem musculorum substantia constat ex his duobus. Quæ verò ad ipsos vasa pringunt, veluti riui quidam sunt, qui non substantiam complent, sed eis subministrant, ut in vita permaneant.

SIGNA MODERATÆ TEMPERATURÆ. Cap. LI.

Temperamenti moderati indicia.

MOderatæ temperaturæ indicia secundum totū animalis habitum, sunt, color quidē ex rubeo & albo commistus capilli: flavi: & ut plurimum mediocriter crispi: carnositatisq; mediocritas in qualitate & quantitate. Medium nanq; est exquisitè ac veluti Polycteti regula huiuscemodi corpus, inter omnes excellentius: cui ad quod ipsi & dicantur, & cognoscantur.

DE CORPORE CALIDIORE. C.LII.

Temperaturæ calidioris indicia.

QUæcunq; autē in caliditate à medio recedunt, non tamen in humiditate, vel siccitate, hæc,

quantum ad carnosum genus attinet, videntur quidem tangentibus calidiora tantum, quantum & eorum temperatura calidior. Tanto vero magis hirsuta sunt, quanto & calidiora, & minus pinguedinis habent. Colorem autem rubrum, & capillos nigros sortiuntur.

SIGNA FRIGIDAE TEMPERATURAE. Cap. LIII.

Rigidioris autem temperaturae indicia sunt, pilorum priuatio, pinguitudo, & occursans frigiditas. Color autem, una cum capillis rufus, & ubi frigiditas excefferit, liuidus quodammodo existit.

Temperaturae frigidioris indicia.

SIGNA SICCAE TEMPERATURAE. Cap. LIIII.

Siccior temperatura tanto gracilior & durior est bona temperatura, quanto maior est siccitas.

Temperaturae siccioris indicia.

SIGNA HUMIDAE TEMPERATURAE. Cap. LV.

Humidior autem temperies, carnosior atque mollior existit.

Temperamentum humidioris indicia.

SIGNA CALIDAE ET SICCAE TEMPERATURAE. Cap. LVI.

Calidior simul & siccior, magis hirsuta, necnon calida & dura existit: itaque pinguedine caret, tenuisque est, & capillos nigros sortitur. Si vero multum in caliditate excellat, color quoque niger illi adest.

Temperaturae calidae & siccae indicia.

SIGNA CALIDAE ET HUMIDAE TEMPERATURAE. Cap. LVII.

Calidior autem & humidior temperatura, mollior & calidior, & carnosior tanto existit bonae temperie, quantum & utrisque qualitatibus aucta fuerit. Quod si plurimum augeatur, cito similiter a putredinis corripitur morbis. * Si vero parum quidem humidior sit, multo autem calidior, molliores quidem parum huiusmodi sunt, iis qui bonam habent temperiem, & magis carnosius: non parum vero hirsutiores,

Temperaturae calidae & humidae indicia.

& tangentibus etiam non parum calidiores. Nigri verò eis sunt capilli, & caro pinguedine caret. Sin autem paulo quidem calidior, multo verò humidior, mollis his caro est, & multa: colorq; miscellaneus, ex albo simul & rubeo: tangentibusq; paulo calidiores apparent. In summa autem, omnibus tēperaturæ coniugationibus semper excellentis qualitatis indicia eminebunt.

SIGNA FRIGIDAE ET HUMIDAE

temperaturæ. Cap. LVIII.

Temperaturæ
frigide & hu-
midæ indicia.

Frigidior autem atq; humidior temperatura, si parum quidem utraq; augeatur, capillis nuda est & alba: mollisq; & crassa, & pinguis. Si verò magis excesserit, reliqua quidem sunt secundum proportionem qualitatum auctarum: color autem, una cum capillis, rufus. Quemadmodum si plurimum utraq; augeat, lividus. Si verò qualitatum augmentum inæquale fuerit, eius quæ superaverit, indicia eminebunt.

SIGNA FRIGIDAE ET SICCÆ

temperaturæ. Cap. LIX.

Temperaturæ
frigide & sic-
cæ indicia.

Si autem frigiditas una cum siccitate augeatur æqualiter, natura durum, ac tenue, & glabrum corpus sic affecti sortiuntur, ac tangentibus frigidum: pinguedo tamen ipsis, & si graciles sint, per carnes dispersa inest. Capilli autem & color, frigiditatis modum, ac proportionem sequuntur. Vbi verò calida & sicca temperatura, per decrementi tempus, in frigidum & siccum labitur habitum, graciles hi tunc fiunt, & duri: atq; atrabilis in eis dominatur: & ob id nigri simul, hirsutiq; evadunt. In uniuersum autem, si membrum facile frigesit, vel frigiditatis, vel raritatis est signum: si verò non facile, vel caliditatis, vel densitatis. Si à desiccantibus offendatur, atq; aridum & siccum, nec facile mobile fiat, siccitatis: quemadmodum & si ab humectantibus grauer se habeat, humiditatis. Porro pauca simul & dura caro, membrum siccus efficit: multa autē & mol-

lis, humidius. Sic & intermedia spacia corporum similarium, ut plus vel minus humidæ substantiæ in se continent, vel crassius, vel tenuius, vel humidius, vel siccus membrum ostendunt: humidius quidem, ubi subtilior & plurima est humiditas: siccus verò, ubi crassior simul & minor. Ipsæ enim solidæ partes, quæ verè solidæ sunt, ac primæ, nullo modo effici humidiores possunt: intercepta autem in ipsis spacia, hac vel illa humiditate complere, possibile est. Hoc verò est proprium partium similarium alimentum, quod ex appositione fit, & non per vasa attrahitur.

Solidas partes non posse vltimo modo humidiores effici. Solidorum corporum alimentum quod sit.

SIGNA SICCI VENTRICULI. C.LX.

Ventriculi indicia sunt, eius quidem qui natura sicciior existit, si celeriter sitibundi fiant, & paucus eis potus sufficiat: à plurimo autem aggrauetur: fluctuationibusque infestentur, aut superfluitet id quod abundat, cibusque delectentur siccioribus.

Ventriculi sicciioris indicia.

SIGNA HUMIDIORIS

ventriculi.

Cap. LXI.

Humidioris autem, si neque sitibundi fiant, & super abundans humidum facile tolerant, & cibus humidioribus gaudeant.

Ventriculi humidioris indicia.

SIGNA CALIDI VENTRICULI. C.LXII.

Calidior verò natura ventriculus, melius quidem concoquit, quæ appetat: & multo magis quæcunque sunt dura, & non facile alterationem suscipiunt.

Ventriculi calidioris indicia.

Nam quæ facile alterantur, in eo corrumpuntur: gaudetque calidis potibus, ac cibus: nec à frigidis ullam percipit noxam, si modicè ipsis utatur.

SIGNA VENTRICULI FRIGIDI. C.LXIII.

Frigidus natura ventriculus, ad appetendum quidem, plurimum viget: ad concoquendum autem, minimè: tales præsertim cibos, qui & frigidi sunt, & non facile alterationem suscipiunt. Cito itaque in ipso accescunt: ac proinde acidis ructibus talis ventriculus

Ventriculi frigidi indicia.

*Intemperies
morboſæ, a na-
turalibus intē-
perantiis, quo
differant.*

abundat plurimum : gaudetq; frigidis, ſed ab eorum
uſu immodico offenditur. Sic & ea quæ extrinſec' fri-
gida occurrant, nequit longiori tpe tolerare: quæadmo-
dum neq; calidus calida. Malæ verò tēperaturæ, quæ
morbi ratione ventriculum occupāt, hoc differunt ab
iis quæ naturales exiſtunt, quoniam contraria, non at-
tem ſimilia, appetunt, quemadmodum naturales.

DE SITIA CORDE ET pulmone proſecta. Cap. LXIII.

*Sitis a vifceri-
bus thoracis
aberta, quō di-
ſtinguenda ab
illa quā excita-
uit venterculus.*

NEc verò tantum ventriculus ſitibundos, mini-
meq; ſitiētes reddit, & frigidi, calidiq; potus ap-
petētioreſ, ſed ea quoq; viſcera quæ in thorace
ſunt, vt cor, atq; pulmo. Cæterum qui ob horum ſi-
tiunt caliditatem, plus inſpirant, & longius expirant :
atq; æſtum in thorace percipiunt : non ſicuti qui ven-
triculi ratione in hypochoſtndriis caliditatem patiunt.
Præterea bibentes, non ſtatim quieſcunt, & frigidus
potus magis eorum ſitim reſtinguit. Refrigerat autē
eoſdem, & frigidi aeris iſpiratio : quæ nihil illos iuuat,
qui ventriculi ratione ſunt ſitibundi. Sic qui contrario
modo ſe hñt, ſenſibiliter à frigida inſpiratiōe lædunt.

SIGNA PVLMONIS FRIGIDI. C. LXV.

*Pulmonis fri-
gidi indicia,*

ET hoc maximum ſit frigidi pulmonis indicium.
Vt enim frigidum inſpirantes, manifeſtè dolorē
ſentiunt, atq; frigiditatem, ita & caliditas eſt ipſiſ-
ſima. Sed & pituitoſa excrementa tum loquentes,
tum tuſſientes reiiciunt.

SIGNA PVLMONIS SICCI. C. LXVI.

*Pulmonis ſic-
cioris indicia
Vocem raucā
quæ efficiāt.*

Pulmonis autem ſiccitates excrementis vacant,
& pituita: vocemq; claram efficiunt: quæadmodū
humiditates obſcurā eam reddūt, ac raucam. Et
quum vehementius aut acutius loqui ſtuduerint, tunc
intercidunt excrementa.

N DE VOCE. Cap. LXVII.
Non tamen ipſa vocis magnitudo à caliditate, ſi-
cuti neq;

cuti neq; paruitas à frigiditate oritur, sed altera quidem, asperæ arteriæ latitudinem sequitur, & vehementiorem efflatum: paruitas verò, à contrariis procedit causis. Quare nec semper, nec primò, sed ex accidenti, & solas naturales temperaturas, non autem aduentitias, vocis magnitudo aut paruitas sequit. Quia enim talia instrumenta, temperaturæ ratione sunt facta: ad hæc autem consequitur huiuscemodi vox: ob id nimirum contingit ex voce de naturali temperie rōcinari.

Vocis magnitudo & paruitas ad quæ cōsequantur.

DE LENI ET Aspera voce. C.LXVIII.

NAm lenis vox, arteriæ lenitatem cōsequitur, sicuti & aspera asperitatem. Lenitas igit arteriæ, moderatam temperiē sequitur, vt asperitas siccitatem. Asperitas quippe fit, à duri corporis inæqualitate. Arteriam verò duram, simularium partium, ex quibus cōstat, siccitas efficit: at inæqualem, dispersæ in eisdem humiditatis defectus.

Vox lenis asperaq; quid consequatur.

DE VOCE ACUTA. Cap. LXIX.

Eodem modo neq; acuta naturaliter vox, sine angustia faucium, nec grauis, sine latitudine fieri potest. Angustia igitur ab insita atq; innata frigiditate nascitur. Latitudo autem à caliditate. * Porro cuiusq; facultatis virtus & vitium, à temperie ipsa, ceu à causa præcedente, exoritur. (Veniſſa 70. 71. 72. 73.)

Voci acutæ, grauiq; quæ requirantur. Virtus vitiq; cuiuslibet facultatis a temperie ipsa exoritur.

DE HOMINE PITUITO-

so bilem vomente.

Cap. (L X X.) 74.

VIdi equidem hominem, cuius totus habitus pituitam præ se ferebat: quotidie tamē biliosum euomebat humorem. Censui itaq; inspiciūda alui excrementa esse: in quibus minimè apparebat bilis. Quare coniectura quadam comprehendi, eum meatum, qui biliosum humorem egurgitat, non minimā ipsius partem ad * inuū orificiū ventriculi, quod græci pyloron vocant, effundere: vt in quibusdam animalibus cernitur. Plurimum itaq; ad eorum quæ latēt sensum

Bilem cur pe-tuitosi nonnulli assidue vomant.

cognitionem conducit, ea quæ ex sectionis inspectiōe
habetur peritia, operationūq; atq; vtilitatū inuentio.

QVOMODO COGNOSCANTVR

ægotantia corpora.

Cap. LXXI. 75.

Aegrotantes,
particulas di-
gnoscenti rō.

VBi igitur iā corpora ægotant, ipsorum partes
quæ quidem subiiciuntur sensui sunt dignoscen-
dæ, ex eorum quæ insunt eis secūdam naturam,
permutatione, in magnitudine, colore, figura, nume-
ro, situ, & ea quæ est secundum duritiem, mollitiem,
frigiditatem, & humiditatem differentia. Quæ autem
visum effugiunt, ex operationū lesionibus, aut iis quæ
excernuntur, aut doloribus, aut tumoribus præter na-
turam, aut horum quibusdam, vel omnibus.

DE SIGNIS PATIENTIS

cerebri.

Cap. LXXII. 76.

Cerebri mor-
bi quō digno-
scendi.

Igitur cerebri ægras dispositiones, aut ex desipien-
tiæ speciebus, aut sensuum, aut imaginationum læ-
sionibus, aut actuum qui secundum electionem fiūt,
aut ex iis quæ excernūtur per palatum, vel nares, vel
aures, aut ex dolorum, qui ei eueniunt, differentiis, co-
gnoscere oportet.

SIGNA CORDIS PATIENTIS.

Cap. 77 LXXIII.

Cordis morbi
vnde noscant.

QVæ verò in corde fiunt, ex difficilis anhelitus
speciebus, & tremulis motibus, qui ipsi contin-
gunt, & pulsibus quoq; eius & arteriarum,
& ex iræ excandescens celeritate, vel tarditate, &
ex febribus, & refrigerationibus, & in colore differē-
tiis, eisq; quibus conficitur, doloribus.

SIGNA PATIENTIS HEPATIS.

Cap. 78 LXXIII.

Hepatis affe-
ctus vnde sint
cognoscendi.

QVæ in hepate fiunt, ex defectu humorum atq;
abundantia, & ad id, quod præter naturam est,
euerfione, & colore malo. Sed & ex gravita-
tibus, & tumoribus, & doloribus, non modò his qui in

A R S M E D I C I N A L I S

291

eo ortum habent, verum & ex illis, qui confortii lege
proueniunt: vt per aliquam difficilis respirationis, aut
etiam tussis speciem.

S I G N A P A T I E N T I S

uentriculi.

Cap. (L X X V.) 79

Sic & ventriculi affectus agnoscitur, vbi in conco-
ctione, & appetitu humidi vel sicci alimenti, vel su-
perfluitatum excretionem delinquitur. Nec secus ex
singultibus, eructationibus, nauseis, vomitibus, & ipsis
eorum quæ vomuntur, speciebus.

Ventriculi af-
fectus quo pa-
cto deprehen-
dendi.

S I G N A P A T I E N T I S

thoracis.

Cap. (L X X V I.) 80

Thoracis dignoscuntur affectus ex spirandi diffi-
cultatibus, tussibus, & doloribus qui in ipso fiunt:
& ex eorum quæ cum tussi expuuntur, differen-
tia. Sic & asperæ arteriæ ægritudines, spirationes diffi-
ciles, & tusses, & dolor in loco, & quæ expuuntur, &
voci offensiones ostendunt. In vniuersum autem, ex
tumore, dolore, operationum læsione, & excremen-
torum differentia, omnium partium affectus noscun-
tur. Tumores igitur præter naturam, in inflammatio-
nibus, scirrhis, atq; iis quæ vocantur œdemata, explo-
randi sunt. Dolor autem, quemcūq; obsederit locum,
aut solutam cōtinuitatem, aut subitam alterationem
indicat. Soluitur autem cōtinuitas incisione, exesio-
ne, fractione, & tensione. Alteratur verò substantia, à
caliditate, frigiditate, humiditate, & siccitate. Triplici
ter autē læditur operatio: aut quia debiliter, aut quia
vitiōse, aut quia nullo fit modo. At verò quæcūq; ex
cernuntur, nonnulla quidem sunt, veluti partes locoꝝ
patientium: nonnulla verò, ceu excrementa. Etenim
quæ in ipsis naturaliter continentur, singula propriam
facient indicationem.

Thoracis affe-
ctus vnde sint
dignoscendi.

Dolor quid in
dicet

Solui vnitas
quot modis
possit.

Operatio tri- 81
pliciter lædit.

Excretorum
differentiæ.

S I G N A F V T V R A E A E G R I -

tudinis.

Cap. (L X X V I I.) 82

T t t ii

Morbui futu-
rum signa in-
dicantia, ex neu-
trorum gene-
re existunt.

Ægritudinem
futurā indican-
tium signorū
natura duplex

Eorum autem indicia, quibus ægritudinis pericu-
lum imminet, mediam formam habent, inter ea
quæ sanis, & ægrotantibus accidunt. Siquidem sa-
nis omnia secundum naturam sunt: præter naturam
verò ægrotantibus, quatenus ægrotant. In confinio
autem horum, indicia neutrorum consistunt. Quocir-
ca, dispositiones corporum, quæ casura in morbum
videntur, sunt ex neutrorum genere: simulq; etiam, quæ
ipsa indicant signa. Primò siquidem hæc, sanitatē ostē-
dunt: secundò autem ægritudinem. Ac proinde eadē
signa, secundum habitudinem, quæ ad aliquid est, neu-
tra & insalubria dicuntur: quæ quidem præsentem di-
spositionem ostendunt, neutra: quæ verò futuram præ-
monstrant, insalubria. Eadē verò ratione, & quæcunq;
ægrotantibus signa salutaria apparent, dicuntur qui-
dem salubria, quia futuram sanitatem ostēdunt: ægra
autem, quatenus præsentem indicant ægritudinem.
Nec in ambiguo est, q̄ quæ sunt utrorunq; indicativa,
neutra dicantur, secundum vnum quoddam neutrius
vocabuli significatum. Quum igitur eorum signorum
quæ futuram ægritudinem indicant, duplex sit differē-
tia, prius ea pertractemus, quæ quantitativis, vel qua-
litativis, vel temporibus, non autem propriis specie-
bus, ab eo quod secundum naturam, evariant: veluti ci-
borum appetentia intenta, vel dissoluta, vel quæ non
servat consuetum tempus, aut quæ ad edulia non vsi-
tata fertur. Ad hoc etiam genus pertinent excretiões
cibi superfluitatum, quæ aut pauciores, aut plures, aut
humidiores, aut duriores existunt. Sic humidiorū ex-
crementorum vel defectus, vel præter consuetudinē
abundantia: aut in colore, aut in consistentia varietas,
aut in excretionis tempore. Præterea vigiliæ plures,
somniq;: aut non consueto tempore obiti. Eodem mo-
do potus pluris, aut paucioris, calidi, aut frigidi inso-
lens appetitus: venereorumq; immodica, aut intem-

pestiua concupiscentia. Adhæc plures aut pauciores su-
dores his qui sunt opportuni, & ad motus torpor:
vel si moueri tentauerint, tarditas, exolutio'ue insi-
gnis. Huc pertinet mēstruorum suppressio, vel immo-
dica, aut diminuta euacuatio. Similiter de fluxu hæ-
morrhoidum est distinguendum. Quòd si non eadem
quæ prius ex cibo potuq; voluptas capiatur, est futu-
ræ ægritudinis signum: quemadmodū hebetudo men-
tis sensuumq; minimè naturalis, aut obliuio insolita:
somnia'ue turbati imaginibus. In summa verò, quæ-
cunq; secundum naturam inerant, hæc quidem supra
modum aucta: hæc verò imminuta: hæc temporibus
quibusdam, aut qualitatibus, aut quantitibus immu-
tata, futuros morbos prænunciant. Porrò morsus vē-
tris, vel in ore ventriculi, vel in aliquo intestinoꝝ, aut
quum aluus subducitur, aut quum vomitus excitatur,
aut quum mingitur, siue alius aliquis dolor mediocris,
ex genere quidem existit eorum quæ pter naturam:
non tamen qui sic se habent ægrotare dicuntur: sicuti
nec qui capite grauantur, aut dolent, aut vigilāt: quū
nondum solitæ ipsorum impediuntur operationes.
Hic siquidem in huiusmodi operationibus terminus
est. Atq; iccirco in eo qđ ad aliquid, eandem dispositio-
nem ægram atq; neutram dicemus. Nam pro vigore
potentiæ, quæ vel facilè sustinet, vel vincit, vnaquæq;
ex his quas antea diximus, vel morbus est, vel disposi-
tio neutra. Sic & quæcunq; in sensibus, non in eo quod
magis aut minus inuicē differunt, sed toto genere sunt
præter naturam, signa morborum existunt, qđ diu mo-
dica fuerint, ac nondum sufficiunt hominem a consue-
tis operibus amouere. Ea autem contingunt, vbi sen-
sus ipsi, circa sensibilia propria palam hallucinantur.

Morbos futu-
ros prænniāt
quæ, a naturæ
ordine recesserunt.

SIGNA CORPORVM

ægotantium. Ca. (LXXVIII.) 83

Tct iii

Signa salubria

Signa pernicio-
sa.Excrementa
quid indicent.Decretoria ac-
cidentia.Salubrium cau-
sarum differen-
tia duplex.

AT quæ iam in ægrotantibus signa videntur, nonnulla quidem salutem: nonnulla mortem portant. Ac prima sanè, salubria: secunda verò, genere quidem ægra: secundum speciem autem, perniciofa dicuntur. Sumuntur autem, ut dicamus vniuersaliter, ex operationum virtute ac vitiis: secundum partem verò, ex particularium operationibus: quarum genera prius diximus. Porro excrementa, quandoquidem coctionis & cruditatis signa continent, fieri non potest quin omnino significet, aut naturam materiei, aut materiam naturæ, aut neutrum alteri dominari. Salubria igitur signa dicuntur, superante natura: insalubria verò deuicta. Neutra autem, quæ pugnas habent æquales. Cæterum quæ manifestam coctionem indicant, ex salubribus sunt: sicuti quæ cruditatem, ægra. Quæ verò neque coctionem nec cruditatem, ex neutrorum natura existunt. Sunt verò & neutra, quæcumque nunc quod hoc, nunc verò contrariū significant: veluti de nigrati digiti. Ac talia sanè sunt decretoria accidentia.

DE CAUSIS SALUBRIBVS,
insalubribus atque neutris. 84. Ca. (LXXIX.)

QVoniam verò causarum hæ quidem salubres, hæ autem insalubres, hæ denique neutra: primum de salubribus differemus. Cæterum quando quidem nonnullæ earum conseruatrices, nonnullæ effectrices existunt: suntque & tempore & dignitate priores conseruatrices, ab illis nobis est auspicandum. Quoniam igitur non vnum tantum sit sanum corpus, sed plura, in eorum singulis, propria erit causa conseruatricis. Si quidem omnis causa, in eo quod ad aliquid, est. Hic igitur denuo sumendum initium ab optima corporis constitutione: & quæ illi salubria sint, considerandum. Eorum autem inuentionem ipsius rei natura indicat.

QUOT MODIS ALTERETUR corpus. 85. Cap. (LXXX.)

Secundum quot igitur corpus nostrū alteratur mo-
dos, tot causarum conseruatricium genera habebit:
quas liquet etiam correctrices existere. Alteratur
autem corpus, à nonnullis quidem, necessario: à qui-
busdam verò non necessario. Necesario enim alterāt
quæ nulla ratione euitari possunt: non necessario au-
tem, reliqua. Nam aerem quidem ambientem semper
attingere, comedere, bibere, vigilare, & dormire, est
necesse: ensibus autem, & exitalibus feris occurrere,
non item. Quare iuxta primum causarum genus ver-
satur pars corporis conseruatrix: circa secundam autē
minimè. Quot igitur sint ea quæ ex necessitate corp⁹
alterant, distinguentes, proprium in singulis eorū cau-
sarum salubrium genus inueniemus. Inest igitur vnū
ex ambientis aeris adhæsu. Alterum ex motu & quie-
te totius corporis & singularum particularum. Tertiū
ex somno & vigilia. Quartum, ex his quæ assumunt.
Quintum, ex iis quæ excernuntur & retinentur. Sex-
tum, ex animi affectibus. Ex his itaq; necesse est aliquo
modo affici corpus. Ab aere quidē ambiente, quia vel
calfit, vel frigeſcit, vel exiccatur, vel humectatur: vel se-
cundum horum patitur coniugationem: aut in tota al-
teratur substantia. Ex motu verò & quiete, quū vtraq;
motum exceſſerint, aut calfactum, aut frigeſactū, aut
humectum, aut exiccatum, vel aliquid secundum ho-
rum patiens coniugationem. Sic & ex somno & vigi-
lia ipsum pati est necesse, iuxta eandem rationem. Præ-
terea & ex animi affectibus, & ex iis quæ assumuntur,
aut excernuntur, aut retinentur. Hæc siquidē omnia,
partim quidem euidenter, partim verò per alias cau-
sas medias, alterant corpus, & sanitatem corrumpūt.
Omnia igitur nunc dicta genera, materiæ quædā sunt
salubrium causarum. At vsu opportuno adhibito, cau-
sæ fiunt conseruatrices, atq; salubres: si verò à modo
aberrauerint, redduntur insalubres. Quo circa, singu-

Conseruatrices
cæ quot sint.

Corpus neces-
sario alterātia,
q̄ sint, & quot
numero.

Aer cur nos a-
ficiat.

Motus.
Quies.

Somnus.
Vigilia.
Animi affect⁹.

Salubriū cau-
sarum materiæ
quæ sint.

Intentiones cir-
ca salubre in-
salubreque sunt
qualitas exi-
gendorum &
quantitas.
Occasio tps.

Mediocrитatis
termini in iis
quibus vitior
opus debet.

Natura opti-
ma, quantum
appetit tantum
concoquit.

la earum rerum, quandoque salubres, quandoque insalu-
bres sunt: quum ad aliquid referantur. Quippe ubi mo-
tum corpus desiderat, exercitatio quidem salubris:
otium verò insalubre existit. Quum verò eget quiete,
otium salubre est: insalubris autem exercitatio. Eodem
modo de cibis & potibus, ac de aliis omnibus statuen-
dum. Horum namque singula, quando ut necessitas cor-
poris exigit, cum mensura, & opportuna qualitate adhi-
bentur, salubria fiunt. At quum citra omnem necessi-
tatem, ac præter modum afferuntur, insalubria. Atque
hæ duæ sunt circa salubre & insalubre intentiones: rei
scilicet, quæ adhibetur, qualitas, & quantitas. Non est
autem rationi consonum, etiam temporis occasionem,
quæ in iis quæ dicta sunt, continetur, veluti tertium ali-
quod ab eisdem diuersum, introducere. Nam si tanta
& tali re allata egeat corpus, nemini dubium est, quin
etiam in tempore opportuno afferatur. Siquidem idē
temporis occasio est nata, quæ fluxile & transmutabile
mortale corpus quum sit, pro modo transmutationis,
alia alio tempore auxilia postulet. Optimæ igitur cor-
poris constitutioni, quum circumfusus aer optimè tem-
peratus fuerit, omnium earum rerum, de quibus nu-
per sermonem fecimus, quantitas moderata conueniet.
Quum verò aer à temperie recesserit, tantum illas à me-
diocritate euariare oportet, quantum fuerit aeris ab opti-
ma temperatura recessus. Hiverò mediocritatis termi-
ni existunt: in aere quidem ambiente, ut neque horreat
propter frigus: nec sudet propter æstum. In exercitiis
autem, quum primum lassari cœperit corpus, confe-
ssim quiescere. At in cibis, coctionis perfectio, & excre-
mentorum modus, in quanto & quali conueniens. Aequa-
lis verò in his quodammodo est coctioni appetitus.
Optima quippe natura, quantum appetit, tantum etiā con-
coquit. Sic & somno modum ipsa natura præfinit his,
qui optimam corporis constitutionem sortiuntur: nam

si tunc à somno excitantur, quum corpus ampliori q̃te non eget. Quumq̃; talem victus rationem adhibuerint, nullum est in eorum excrementis delictum, quæ vel per ventrem, vel vrinæ meatum, vel per totū corpus vacuantur. Liqueat igitur ipsos cauere debere ab immodicis animi affectibus: ab iracundia videlicet, tristitia, furore, timore, & inuidia. Hæc siquidem alterant, atq̃; à naturali statu corpus immutant.

DE VENEREIS. Cap. (LXXXI) 86

Veneriorum verò iuxta Epicuri sententiam, nullus est vsus salubris. Re vera autem confert, si tantum interualli in eorum vsu adhibeatur, vt nec resolutio aliqua percipiatur, & ipse seipso homo, quodammodo leuior factus, ac melius spirare videatur. Tempus autem ad vtendum opportunum, quum in omnium rerum circumstantium exquisita mediocritate corpus fuerit cōstitutum: vbi scilicet, nec supra modum plenum, nec vacuum extiterit: aut in calore, aut frigore, aut siccitate, aut humiditate excesserit. Quod si aberrare contigerit, paruus sit error. Melius autem illi calefacto magis q̃ frigefacto, & pleno q̃ vacuo, & humecto potius corpore, quàm exiccato, vti veneris. Horum autem singulorum quæ dicta sunt, qualitas, in * optima corporis constitutione est eligenda: exercitii quidem, in quo totius corporis partes, æqua proportionem mouentur ita, vt non aliæ quidem vltra modum fatigentur: aliæ verò citra. Cibi autem & potus optimam habeāt temperiem. Eadem in reliquis est ratio habenda. At si ab optima constitutione aliquid defecerit corpus, non autem vehementer, & hæc quæ ipsius sanitatem conseruant causæ, ad proportionem mutabuntur. Sed quum multa sint huiusmodi corpora, per singula genera est seorsum dicendum. Quod igitur in partium simularium temperie euariat, instrumentarum autem partium seruat commensuratio-

Veneris quatenus sit salubris.

Veneris tempus aptum quod sit.

Optime constitutæ naturæ omnia requiri mediocritas.

Exiccātia cor-
pus quæ sint.

Similia simili-
bus eē adhibē-
da dum serua-
re corporū tē-
peramenta est
animus.

nem, duplicem habet salubrium causarum formam : alteram quidem, earum quæ ipsius conseruant temperiem : alteram verò, earum quæ ad optimam transferunt. Quæ itaq; ipsius temperaturam conseruant, tantum à causis optime temperatæ naturæ distabunt, quā & totius corporis temperatura ab illa euariabit. Calidiora siquidem corpora, calidiorem victus rationem postulant : frigidiora autē frigidiorē : sicciora sicciorē : & humidiora humidiorē. At secundum coniugationem, calidiora & sicciora, calidiorem simul atq; sicciorē : eadem in reliquis quoq; coniugationibus proportionē seruata. Rectē siquidem causarum vtetur materia, qui naturales earum potentias agnouerit : videlicet, q; motus, alimenti penuria, vigilix, excretio, & omnes animi affectus, corpus exiccant : at quæ hisce contraria existunt, humectant. Ita verò, & calfacientia, & refrigerantia vitæ instituta, & ciborum, ac potuum, vt q; simpliciter dicam, omnium quæ corpori afferuntur, materias quis noscens, atq; potentias, salubribus vtetur causis, similia similibus adhibendo, si quidem eandem in qua acceperit, seruare corporis temperiem sit animus. Quod si permutare, atq; ad melius eā traducere studeat, alterum est hic salubrium causarū genus, his quidem quas nuper diximus, contrarium : æqualiter verò declinans ad alteram partem à bene tēperatis & mediis, quæ optimis naturis conueniunt. Calidior siquidem & siccior temperatura, à calidioris ac siccioris victus ratione, ad exactissimum bonæ temperaturæ habitum non transfertur. At taliū erit vsus necessarius, quæ tantum eis quæ probè temperata existunt, frigidiora atq; humidiora sint, quā & naturā naturam, in caliditate & siccitate superabat. Nam tale causarum genus insitas corrigit intemperantias. Alterum verò de quo supra diximus, temperaturam conseruat. Est autem vtriusq; vicissim apud medicos vsus

necessarius. Nam quum plurimum suppetit otii, corrigere oportet, ac sensum ad meliora transferre. Neque enim natura patitur repentinās alterationes. Homine autem occupationibus necessariis districtum, in eodem præstat habitu conseruare. Porro quæ similem habet in omnibus corporis partibus intemperiem, eadem egent procuratione: dissimili, quæ dissimilem.

Intemperantiæ
quæ ad melius
sunt traducendæ
& quando sic
conseruandæ.

D E C A V S I S S A L V B R I B V S

partium instrumentalium. Cap. (LXXXII.) 87.

Instrumentariarum autem partium causæ salubres, quatenus & hinc ab optima constitutione delinquit, ita & inuicem distabunt. Aliæ namque sunt salubres erroribus qui in formatione consistunt: aliæ iis qui in magnitudine, vel numero, vel positu. In formatione igitur plures contingunt errores: nam & figura partis, & si qua in ea cavitās est secundum naturam, vel meatus, vel orificium, vel asperitas, vel lenitas, si quidem parum à naturali symmetria recesserint, salubrium corporum retinent appellationem: si verò amplius, insalubrium. Quod si tantus fuerit recessus, ut operatiōi afferat detrimentum, iam ægrotare dicentur: Secundum quantitatem autem, excessus atque defectus ad easdem ducit differentias. In numero verò, siue vna, siue plures, quæcunque ex similaribus partibus fuerint, aut deficiant, aut superabundent. Ex hoc genere etiam sunt, quæcunque in nobis substantiæ præter naturam consistunt. Reliquum est aliud genus, quod ad situm cuiuslibet simplicis attinet partis: in quo & ipso quatuor sunt omnes differentiæ. Prima quidem, quæ optima existit. Secunda, quæ parum euariet, ob idque salubre adhuc efficit corpus. Tertia quæ insalubre, quando amplius à modo recesserit. Quarta quæ iam ægrum recessu plurimo reddit. Quæcunque igitur partes in figura delinquant, veluti quæ blasæ, varæ, & obliquæ appellantur, hæc quum foetus nuper natus atque tenellus est, formatione & li-

Errores in formatione, quotupliciter consistere possint.

gatura, ad naturalem habitum traducuntur. At si iam aucto infante, ad duritiem peruenerint, emendari non possunt. Sic errores quidem qui ad cavitatem attinent, quum adhuc augeri perseverant, correctionem admittunt. Quum autem iam ad ultimum peruenerint, nullus est remedio locus. Cavitates igitur quiete atque alligatione paruae reddunt: magnae vero, partium operatione & retentione spiritus. Sic & quaecumque foramina, oraque. Et quidem, quae naturalem magnitudinem partes exuperant, quiete, ac commoda ligatione, minores redduntur: augentur autem, & naturali motu, & frictione moderata, & quibuscumque aliis plus sanguinis conciliare valentibus. Deficientes autem partes, quaecumque ex sanguine duxerunt originem, corrigi quidem non est impossibile. Quae vero ex semine, propemodum impossibile existit. Licet tamen aliquando loco earum alias facere, quae usum haud dissimilem praestent. Earum vero omnium natura opifex est. Medicus autem minister. Porro quae numero excedunt, iis ablatio, causa salubris existit. Inspicere vero oportet, in quibus id fieri possit. Nam si impossibile appareat, transponere tentandum est. Eadem est & eorum, quae in situ vitia sunt, emendatio. Nec vero in ambiguo est, quod duo saepius aut tria vitia, eandem partem comprehendere. Reliquum est id morbi genus, quod similibus & instrumentalibus partibus existit commune, unitatis diuortium.

Partes ex sanguine cretas, posse corrigi si deficient: ex semine autem ortas ut instaurentur esse fere impossibile. Naturam esse opificem generationis particularum. Medicus naturae minister.

88.

DE CAUSIS SALUBRIBVS

ceu ad eos, qui morbo tenentur. Ca. LXXXIII.

Alubrium causarum, aliae quidem occurrunt * in temperiei iam genitae: aliae illi quae in generatione consistit: aliae illi, quae futura est. Igitur harum quae sunt postremae, haec quidem in praeseruatiua artis parte continentur: haec vero in salubri. Primae autem illae inter omnes, in curatiua tantummodo. At illae quas inter utraque collocauimus, in praeseruatiua simul & curati-

A R S M E D I C I N A L I S.

301

ua. Siquidem factam iam ægritudinem, curare oportet: eam verò quæ nondum adest, sed futura est, prohibere ne fiat, ab ea quæ est in corpore dispositione. Eius autem quæ adhuc fit, quod quidem factum est, curare expedit: quod verò futurum, prohibere ne fiat. Prohibetur autem, sublata ea dispositione, * quam sequi morbus natura est aptus. Talis etenim dispositio, causa antecedens dicitur. At facta iam ægritudo curabit, soluta ea dispositione, à qua primum læditur naturalis functio. Quam sanè ipsam dispositionem, morbi causam vocamus.

D E C O M M V N I S S I M A I N-
tentione curatiua. Cap. (LXXXIIII.) 89.

C Vratio verò vnum præcipuum cõmunissimũq; habet scopum, nempe tollendæ dispositioni contrarium. Ex hoc siquidem genere sunt causæ illæ omnes, quæ sanitatem efficiunt. Particulatim verò, ex vnicuiq; dispositioni contrariis. Calido igitur affectui, causa frigida contraria existit: frigido autem calida: eademq; in cæteris proportionem. Etenim si omne immoderatum præter naturam est: moderatum verò secundum naturam: necesse est omnino, vt immoderatum ab immoderato cõtrario, ad mediocritatem trahatur. Cæterum secundum potetiam, non secundum imaginationem, calfaciens refrigeransq;, & alia id genus, sunt accipienda. Fingamus itaq; in humoribus putrescentibus febrem accedi. Indicatio in huiuscemodi affectu, est euacuatio simul & alteratio: hæc quidem, quæ putredinem finiat, manente adhuc substantia: euacuatio verò, quæ totam ex corpore substantiam putrem educat. Sed dicta quidem alterationis species cõcoctio existit. Euacuationes autem fiunt, & per sanguinis emissionem, & clysteris vsum, & per vrinæ vias, atq; eam, quæ per cutim fit, transpirationem: ac præterea, per eam quæ fit ad partes oppositas attractione,

Curationis scopus.

Immoderatum
omne est præter naturam.

Febris putridæ
indicatio duplex.

Alteratio putri-
um humorum
concoctio est.

Euacuationum
species.

atq; ad alias propinquas deriuationem. Nam & ad hoc ipsum genus p̄tinet citare menstrua, hæmorrhoides q; aperire, ac deniq; expurgare per palatum & nares. In vniuersum autem, si vnāquaq; prius effectricem causam resciderimus: dein verò ad illam quæ ab eadē causa facta est, ægritudinem accefferimus, causarum salubrium inuentionem habebimus. At secūdum compositas intemperies, ex simplicibus compositio, cōmonstrabit salubria præcepta. Etenim si decem quidē gradibus ad caliditatem maiorem ea quæ naturæ conueniat, labatur corpus: septem verò ad siccitatem maiorem: tunc salubrem causam in huiuscemodi affectibus esse oportebit, decem quidem gradibus frigidiorē: septem verò humidiorē. Quòd si particula affecta in penitioribus locis sit sita, machinari oportet isuper ta-

Affectus in al
to sitos, vehe-
mentiorē me-
dicamentivim
requirere, quā
ex sua ipsi na-
tura postulent.

le remedium salubre, cuius vis nequaquā in itinere antea exoluatur. Si itaq; calidius esse oportuerit eo quod est moderatum, non solum tantam habeat caliditatem, quā exigit morbus, sed vltra eandē mensuram, tantum adiiciatur, quantum ex situ, vt pertingere possit ad locum patientem, sit necessarium. Si verò frigidior, non simpliciter tantum frigiditatem oportet augere, sed & materia quoq; prius animaduertēda est. Si enim crassa sit, non admodum poterit penetrare ad profunda. Sed potius contrarium præstabit effectum, spissando superficiem, atq; densando. At si tenuioribus partibus cōstet, poterit sanē plurimum subire profundum. Idem in humectantibus atq; exiccantibus accidit: in quibus crassitudo & subtilitas partium substantiæ inspicunda venit. A situ itaq; loci, inuenit indicatio salubre remedium. A formatione autem, & situ simul, quando effluxus sensibiles, atq; ad alium locum foraminibus patentes habuerint, aut his omnino caruerint. Quos enim effluxus ad principales efferri partes cognouerimus auertemus, atq; ad illas impellemus, quæ

Auertendos ef-
fluxus esse a
partibus prin-
cipalibus, ad
ignobiliores,

A R S M E D I C I N A L I S

303

minimè principatum obtinent. Porro causarum quæ intemperaturam efficiunt, curatio fit per euacuationem. Nam ipsæ intemperaturæ, sola alteratione sanantur.

C V R A T I O S O L V T I O N I S

continui in parte carnosa. Cap. (LXXXV)

Continuitatis autem solutionis curatio, intentionem quidem habet vnionem, quæ in partibus quædem instrumentariis impossibilis est: in similaribus verò, non semper possibilis. Quandoque verò, sicuti in carnosiss, sanitas conglutinatione perficitur. Ipsam verò antecedit si vulnus maius extiterit, partium applicatio distantium, quæ ex formationis genere existit.

Vt autem hæc ipsa firma & stabilis fiat, alligatio cogens in vnum, & fibulæ, & suturæ, vtilis sunt. Coalescere autem facit ea quæ distant inuicem, ac pristinam restituit, vnionem, ipsa natura. Nostrium verò opus est primò quidem applicare extrema distantium partium. Secundò autem, quæ in vnum coacta sunt, sic conseruare. At tertio, cauere, ne quid labris interciderat vlceris. Quarto denique, ipsam partis substantiam conseruare salubrem, id quod per mediocriter exiccantia fiet. Hæc igitur est solutæ cōtinuitatis curatio: quum ipsa sola seorsum in carnosa parte consistit.

D E S O L V T I O N E C O N T I

nuitatis in osse. Cap. (LXXXVI)

A fractio est in osse continuitatis diuortium: quod quidem quātum ad intentionem primam, insanabile est: quo verò ad secundam, quodammodo recipit curationem. Prima igitur intentio est coalitus partium, qui ob ossis duritiem fieri non potest. Secunda, alligatio, quæ fit, callo supernato partes fractas circumligante. Calli autem generatio, qua quidē ex materia, & à natura fit, est & ad alia communis. Quatenus verò formam ossi vicinam habet, ex eiusdem fit alimento. Molle verò & puerile os, coalescere

Vnio i partib⁹ instrumentariis solutis est impossibilis.

Vnionem carnis solutæ, præcedant.

Vnionem præstat natura.

Solutæ partis substantiā conseruare mediocriter exiccantia.

Fractura quod pertinet ad intentionem primam est incurabilis.

Calli gñatio.

Ossa puerilia coalescere possent.

Fractio ossis si-
mul affici mu-
sculos.

Fracturae sani-
tas fit callo ad-
ueniente.

Fracturae qua-
lis victus ratio
conueniat.

Punctura nervi,
cur ad excitam-
dā cōuulsionē
sit prompta.

Puncturae cura-
tio.

Cani curatio
vulceris.

potest: sed perrarō fit talis affectus, quin associetur al-
teri. Magna enim ex parte adiacentes muscoli, vnā cū
corporibus aliis, per fracturam ossium patiuntur. Quo
circa & curationis intentio oritur duplex: quarum al-
tera quidem, circa ossa: altera verò, circa corpora ad-
iacentia versatur. Quum igitur fracturae sanitas, callo
adueniente fiat: ad huius autem generationem, proprii
ossis alimenti superfluitatem naturae suggerere oport-
eat, quae quidem superfluitas in qualitate & quantita-
te debet modum seruare: talis certe victus ratio adhi-
benda est, quae influxurum ossibus sanguinem tantum
ac talem praeparet, qualis & quantus generando cal-
lo sit opportunus.

DE PUNCTURA NERVI, & tendonis. Cap. 92. §. XXXVII.

Nervi verò & tendonis punctura propter sensus
vehementiam, & quoniam haec pars principio
continuat, prompta est ad excitandam cōuul-
sionem nervorum: ac tum praesertim, quum nil ex-
trorsum expirat: obcoecato cutis vulnere. Aperiendū
est igitur, atque excicandum substantia tenui, quae vsq;
ad ima nervi oblaxi possit descendere. In simplicibus
igitur huiusmodi affectib⁹, salubrium causarum for-
ma talis existit. In compositis verò complicatur vlce-
ribus: prima quidem cavitās: quae non differentia vlce-
ris, sed est alterius aegritudinis genus, in quo facta est
substantiae iactura. Curatio autem in morbo dupli-
ci, duplicem exigit intentionem. Nam continuitatis so-
lutio, vnitatem: substantiae autem iactura, generatione
indiget. Quod aut primo quidem hunc affectum oport-
eat sanare, ac dein vnitatem restituere tētare, ipsa na-
tura rerum nos docet. Vbi verò repletum vlcus iam
fuerit, ad aequalitatemq; perductum, cute inducendū
est: id quod si fieri non possit, saltem carne, quae cuti vi-
cina sit, communiendum. Est autem huiusmodi, quae
& sicca

A R S M E D I C I N A L I S.

& sicca, & calli similitudinem præ se fert. Ad cicatricē igitur inducendam, necessaria exiccantia erunt, ac sine mordacitate astringentia medicamēta. Sic & si fordities aliqua fuerit adnata, intentio abstergerendi erit. Præterea si inflāmatio aliqua, vel attritio, vel scirrhus, vel tumor mollis & laxus, vel intemperies vnā cum vlcere adsint, prius quidem eorum curationi insistentum est, ac dein ipsum vlcus curandum.

305
Cicatrici inducendæ, siccantia desiderantur.

Vlceri si adsit tumor hic prius curandus est, quæ succurrant illi.

D E S P E C I E B V S M O B O R V M

qui iuxta formationem cōtingunt (C.LXXXVIII.) 93.

QUod verò ad figuræ permutationem pertinet, in iis sanè qui adhuc crescunt, possibile est plurimarum partium peruersionem corrigere: in eis autem, qui iam sunt aucti, minimè. * Scopus igitur in iis quæ curationem recipiunt, est in contrarium peruersionis adducere. Si verò fractione aliqua non rectè cōformata, alicuius membri figura vitiata fuerit, cui substantia callosa innasci præuenerit, si quidē hæc adhuc recens extiterit, perfringere os compactum, oportet, ac rursus rectè afformare. Deinde callum superinducere.

Peruersi membri curatio.

D E O B S T R U C T I O N E. (Cap. LXXXIX.) 94.

Est verò & obstructio ex eodem morborum genere fit quæ ex crassis & lentis humoribus: vnū & ipsa scopuui habens morbo ptrarium, videlicet apertionem. Causæ autem salubres sunt abstergentia & incidentia medicamēta. Quæ verò fit ab stercore duro, intersepiente intestinum, obstructio, primum quidem habebit duritiei remedium, ex humidis pinguibusque clysteribus. Postea dæmum ab acribus euacuationem exposcet. Quæ autem à lapide fit in vesica, subito quidem, illius transpositionem requirit: integræ verò sanitatis gratia, incisionem, & extractionem. At humiditatis quæ præter naturam cōtinetur sanatio, in * exacta totius euacuatione consistit: quemadmodum etiā

Obstructionis curatio.

Lapidis in vesica curatio.

*Pectoris ex-
crementa edu-
ci cum tussi a
medicamentis
tenuantibus.*

*Diuretica qua-
lia esse debeant*

*Cauticis in quibus
utendum
medicamentis.*

in suppuratis. Immodica autem repletio, immodica euacuatione curatur. Quaecumque igitur in pulmone vel pectore continentur, * educuntur quidem per tussim, sed à medicaminibus extenuantibus. Quaecumque verò in hepate, vel venis, vel arteriis, vel renibus, aut per urinam, aut per * inferiorem ventrem. Sed per urinam quidem, ab iis quæ vehementer extenuant: per ventrem verò, ab eis quæ attrahendi, aut aperiendi ora vim habent. Quaecumque in superiori ventre comprehenduntur, per vomitum: sicuti quæ in inferiori, per subductionem. At quaecumque sub cute, per sectionem, vel ignem, vel adurentia medicamenta. Sic aliquando etiam, quaecumque in aliqua naturali cavitare, ut in thorace. Ut autem summam dicam, quicquid præter naturam in aliquibus partibus continetur, eius sanationis intentio, est ablatio: vel si fieri hæc non possit, transpositio. Quæ verò non sunt ex genere præter naturam, at quantitate damnantur, in his scopus detractio existit. At inuentio eorum, quæ ad ipsorum sanationem perducunt, partim quidem ex affectu, plurimum verò ex ipsis affectis particulis sumitur.

DE ASPERITATE ET LÆUITATE. Cap. 95 (XL).

*Aspera quibus
sint læuiganda.*

*Læuia quibus
exasperanda.*

Quæcumque verò partes, quæ exasperatæ sint, naturalem amiserint habitum, iis læuitas naturalis restituenda est: ossa quidem læuigando: asperam verò arteriam, vel linguam leniendo, humidis quæ nihil mordeant, atque lentorem habeant. At quibuscumque læuitas inest non naturalis, cognata asperitas, reuocanda est medicaminibus quæ sufficienter abstergant, astringantque parum. Quaecumque verò vel obstructiones, vel angustiae meatuum, alios morbos sequuntur, eorum curatio prius est perficienda. Quod si nonnulla ex proximè dictis inuicem complicantur, varias habebunt indicationes. Si igitur in particulam

aliquam tanta sanguinis copia confluxerit, vt vniuersæ ipsius venæ intumescant, & distendantur, nō nihilq; in spatia vacua & intermedia transfundant, huius quidem affectus sanatio scopum habebit euacuationem: aut, vt apertiori vtamur vocabulo, detractionē: quandoquidem morbus est immodica partis repletio. Itaq; necessarium est, vt superfluitas vacuetur, aut retrocedens, aut per ipsam patiētem particulam. Retrocedet autem, vel impulsa, vel attracta, vel trāsmissa, vel vno aliquo horum modorum, vel omnibus. Per locum vero patientem vacuabitur, partim quidem manifestē, sensibiliterq;: partim verò resoluta in vapores. Si igitur vniuersum corpus plus æquo plenum fuerit, per patiētem locum minimē vacuare expedit. Nam si scarificationibus, aut sectionibus, sensibiliter aliquid euacuemus, plus ratione excitati doloris attrahemus in partem. Si verò calfacientibus conemur discutere, maior copia caloris vi ad partem trahetur, q̄ dispergatur. Quod si hac in re laboremus, vt retrocedat id quod in fluxit, corpus quum plenum sit, non admitteat. Vt igitur fieri hæc ambo possint, in primis euacuare vniuersum corpus oportet: dein autem id quod in partem in fluxit, ad contraria loca retrahere. Quod quidem vbi fecerimus, prius repellamus à parte, q̄ aggrediamur discutere. At quo mitiora præsidia fuerint, eo erit longè aptior vacuatio. A patiēte verò loco repellimus astringendo, atq; refrigerando. Quinetiam loca inanita attrahunt ad seipsa quæcunq; repercutiuntur. Vasa præterea, vi medicaminum astringentium corroborata, à se ad alia remittunt. Si igitur superfluum omne hac via retrocesserit, bene se res habet. Si verò aliquid fuerit retentum in parte, id lētum & crassum esse, ob idq; ægrè solubile, conicere oportet. Potest etiā, vel si influens humor non sit eiusmodi, effusus tamen esse ad intermedia spatia. Quo tpe euacuandus est per ipsum

Vuu ii

Vacuacionem
per partem læ-
sam non esse
moliendā, vni-
uerso corpore
pleno existēte.

Inflammatæ par-
tis curatio, vbi
vniuersum cor-
pus est plenu.

Repercussione
fieri per astringen-
tia & refri-
gerantia.

*Discutientium
que vehemen-
tissime calida
sint in quibus
sit usus cau-
endus.*

*Dolor omnis
fluxiones exci-
tat.*

*Discutientium
calorem inten-
dendum esse,
vbi humor va-
cuandus in pe-
nitioribus par-
tibus hæret.*

*Partiū quæ nō
vacuētur faci-
le & quæ acio-
ra medicamen-
ta desyderent.*

locum affectum: imponentibus nobis particulis super
iacentibus ea, quæ repellendi humorem vim habeant.
Maximè vero euacuabis quod in spatiis iis delitescit,
& scarificationum auxilio, & medicaminū quæ discu-
tiendi vim habeant. At quia discutientia omnia vires
calidas habent, effectus autem huius temperaturæ, est
mordere, vbi caliditatis modum excesserint: cauenda
ex eis sunt vehementissimè calida: ac tum præsertim,
quum patiens locus in superficie cōstiterit. Neq; enim
parvus excitabitur dolor, si præter proprium affectū,
in super mordeatur. Taceo etiam dolorem omnem ir-
ritare fluxiones. Quod igitur mediocre caliditatem
obtinet, in hisce dolorem sedat: ac multo magis si hu-
midum fuerit. Et quidem quicquid per summa hæret,
potens est id medicamen digerere, * etiam si validas
non sortiatur ad discutiendum vires. Quod si summæ
quidem partes oī noxa caruerint, id verò qđ euacua-
ri oportet, in penitioribus partibus hæreat, intendens
atq; augendus discutientis medicamenti est calor:
quum dubitandum sit, ne prius q̄ profundas partes at-
tigerit, interim vires amittat. Nec tamē ex eo superio-
res partes aliquem dolorem sentient, quum omnes va-
cent affectu. Quare duo hæc simul inuitant ad calidiorē
pariter atq; acrius medicaminum vsum, & summæ
partes quæ tolerant: & profundæ, quæ egent. Hæc igit
indicationem, à situ partis desumebamus. Porro affe-
ctarum partium, in quibus retinetur supfluitas fluctio-
nis, nonnullæ quidem raræ, laxæ, & molles natura exi-
stunt: nonnullæ autem densæ, pressæ, ac duræ. Priores
igitur, euacuantur facillè: reliquæ autem, medicamen-
tis acrius vacuantibus, ac præterea tenuiores par-
tes habentibus, egent: atque eo magis, quo profun-
diorem situm habuerint. Hæc igitur tibi rursus sit in-
dicatio, vna quidem à particulæ patientis substantia:
altera verò à formatiōe & situ. Fingamus enim in he-

pate tē proximē dictū affectū, in angustis valoz finib⁹, impactis humoribus, qui vel lenti & tenaces, vel crassī existant: vel superabundent. Nonne in promptu est, primum quidem crassitiem vnā cum lentore & tenacitate, cibis ac potibus extenuantibus, ad subtiliorum partium substantiam transferri oportere? Secūdo autem, non per angustos tantū, inuisibilesq; meatus, sed per latiores etiam, quicquid inibi infestum est, euacuandum esse? Sunt enim in hepate venæ, non minus amplitudine, q̃ numero, īsignes. Terminantur aut, hæ quidē, in gibbis, ad venā cauam: hæ verō in cauis, ad portam. Vnde haud difficile tibi futurum est, vbiq; pressi constipatiq; humores fuerint, eosdem expeditē euacuare: trahendo quidem ad ventrem, cum his quæ attrahendi vim habent medicaminibus, qui cunq; ex ipsis, in venis ad caua hepatis pertinentibus aceruati sunt: ad vrinæ verō meatus promouendo, per cauam venam, quicunq; in venis ad eam p̃inentibus herent. Est & alia indicatio ab hepate sumpta, veluti à venarū principio. Nam quum non tantū seipsum regere natura sit aptum, sed largiatur etiam virtutem venis, vrendum est, ne si eius vigor fomentis & cataplasmatibus relaxātibus exolutus fuerit, & ipsum primum ad proprium opus, & omnes subinde venæ, ratione illius, imbecilles reddantur. Quare in curationibus eius aliqua ex astringentibus medicamētis semper miscere oportet. Sed quoniam in profundo admodum loco situm est, dubitandum erit, ne astringentis medicaminis vis, debilitetur, nisi ab aliqua altera subtilium partium substantia, qualis aromatum est, traducatur. Melius verō fuerit, si & ipsum medicamē astringens, etiam aromaticum fuerit. Nam si duas habuerit natura īsitas qualitates ac potestates, valentius operabitur: ita vt euacuet quidem quod præter naturam in ipsum membrū confluxit: seruet autem humorum modum conueniē

Hepatis ob-
structi cura-
tio.

Hepatis causa,
& gibba, quæ
parte vacuanda
sunt.

Hepar venarū
principiū.

Hepaticis me-
dicamētis cur
aliqua ex astringē-
tibus admi-
scenda sint, &
quæ aromaticā
vim obtineāt.

V u u i i i

Intemperies est
se per contra-
ria curandas.

tem naturæ. Explorandum itaq; est, num quid ab hu-
moris confluentis qualitate, temperies eiusdem mem-
bri sit alterata: vt hanc ipsam curantes intemperiem,
sanitatem parti restituamus. Curabimus autem, con-
trariam ex aduerso afferentes qualitatem: quantum
vnumquodq; calidius aut frigidius redditum est, tan-
tum refrigerantes, aut calfacientes. Quare & hic rur-
sus agnoscenda est ipsius secundum naturā tēperies.

DE MORBO SECUNDVM

numerum.

Cap. 96. (XCI.)

Redundantes
partes refecari
triplici posse.

Quibus autem aliqua particula deficit, in iis qui-
dem, scopus est, efficere alteram, subministran-
do naturæ, eo quo diximus modo. Quibus
autem redundat, hanc refecare oportet, aut scalpello,
aut igne, aut caustico medicamine. Hæc igitur omnia
sanare * fermè possibile est: At generari, non omnia
possūt. Quædā verò sunt, quæ & si generari nequeāt,
pro ipsis tamen licet alterum substituere: quemadmo-
dum osse ex toto sublato, carnosum quendam callum
inducimus: qui processu temporis duriores naturam
contrahit, quum ab initio carnis imitaretur substan-
tiam. Vbi verò parte quacumq; sublata, neq; eandem
secundum speciem substantiam, neq; similem efficere
possumus, tertius nobis scopus est, inuenire decorem
quendam quemadmodum in mutilationibus.

Mutis mem-
bris arte conci-
liandum esse
decorem.

DE MORBO SECUNDVM

magnitudinem.

Cap. 97. (XCII.)

Communicat autem hoc genus totum, cum eo
quod ad magnitudinem pertinet. Nā quodcumq;
ex eo est secundum naturam, illi propinquū exi-
stit. Id verò tantum seiunctum est, quod inter minimè
naturalia connumeratur. In quo quidem prima inten-
tio est ablatio. Secunda verò, si illa sit impossibilis, trā-
spositio: quemadmodum in suffusionibus. Quæcumq;
autem non integris partibus, sed earum tantum parti

A R S M E D I C I N A

culis, aut deficiunt, aut excedunt naturæ modum, refectio quidem, vel generatio, in iis quæ deficiunt: ablatio verò & abolitio, in his quæ superabundant, scopus est, Quare neq; in ipsis altera intentio, neq; medicaminum forma est diuersa.

D E M O R B O S E C V N D V M situm.

Cap. (XCIII) 98.

Sed iam veniendum est ad reliquum salubrium causarum genus, quod ea corpora emendat, quæ in situ sunt vitata: veluti luxationes, & in scroto intestinum. Quæ sanè vitia contingunt, partim ex violenta tensione atq; impulsu: partim ex dilatato continente, vel rupto. Quare modus etiam curationis est duplex: alter quidem ad oppositam partem ei * ad quam facta est permutatio, intendendo, & pellendo: alter verò, id quod continet, firmitus solidiusq; reddendo.

Luxationum
causa & cura-
tio.

D E C A V S I S P R A E S E R V A tiuis:

Cap. 99. (XCIII)

Porrò eorum quæ præseruatiua dicuntur, triplex secundum genus differentia existit. Prima quidē, hominis qui integra fruitur sanitate. Secunda verò, eius qui non integrè valet. Tertia deniq; eius qui iam ægrotat. Primum igitur gen^o, ad salubrem artem spectat: in duasq; partes diuiditur. Secundum verò, ad præseruatricem pertinet. Tertium ad curatiuam. Hoc autem vniuersum genus præcipuè circa humores versatur: quos neq; lentos oportet eē, neq; crassos, neq; aquosos, neq; plurimos, neq; vehementer calidos, aut frigidos, neq; mordaces, neq; putredini obnoxios, neque veneni naturæ affines. Nam vbi aucti fuerint, generant morbos. Augentur verò nonnunq; eadem ex causa, quæ ab initio eos generauit. Illud autem plerunq; accidit, vt sua alteratione inficiant illos, qui sunt in corpore humores. Scopus verò & horum curationis duplex existit: alteratio scilicet, & euacuatio. Alterantur

Præseruatiua-
rum causarū
differentia tri-
plex.

Vnu ii ii

Alteratio hu-
morum a qui-
bus fiat.

Euacuationis
modus multi-
plex.

Reuulsio fit
ad quā maxi-
me distantia
loca.

Deriuatio fit
ad vicina.

Conualescen-
tium senumq;
dispositio qua-
lis.

igitur, vel concocti à corpore, vel ab aliquibus faculta-
tibus aliis, quæ vim medicamentosam sortiuntur. E-
quorum numero existunt ea, quæ aduersantur exitia-
lium ferarum venenis: quæq; etiam pharmaca viru-
lenta transmutant. Euacuantur autem satis calidis me-
dicamentis, purgationibus, clysmis, sudoribus, & vo-
mitibus. Hæ igitur sunt ipsorum communes euacua-
tiones. Proprie autem, ex locis in quibus coaceruantur,
sumuntur. At verò pròptius euacuatur p ventrē quæ
cūq; continent in primis venis superfluitates. Quæ autē
in iis quæ in hepate sunt, per vrinæ meatus. At quæ in
toto corpore, per sudores: sicuti quæ in capite, per pa-
larum, vel nares, vel per utrūq;. Cæterum quæ in spa-
tiis pectoris laxioribus continentur, per guttur simul-
cum tussit: quæ in renibus sunt, vel vesica, per vrinam.
Communis autem in his indicatio est, * reuulsio qui-
dem ab omnibus partibus, ad quā maximè distantia lo-
ca: deriuatio verò, ad vicina. Quæcūq; itaq; huiusce-
modi curant dispositiones, causas salubres vocamus:
sicuti insalubres eas, quæ adangunt: & neutras, quæ
neq; obsunt, neq; iuuant. Pars igitur artis præseruati-
ua talis est.

DE ILLA ARTIS PARTE,
quæ conualescentes reficit, & senibus congruit.

Cap. 100.

(XCV)

Quæ autem reficit atq; restaurat, in conualescē-
tibus atq; senibus locum habet. Cæterum quæ
nam horum sit dispositio, & à quibus præci-
puè causis ad naturalem habitum reducat, i metho-
do medendi expli cauimus. Dispositio igitur talis est.
Optimus quidem, sed exiguus est sanguis: atq; vnà cū
ipso spiritus animalis, vitalisq;. Ipsæ verò solidæ par-
tes sicciore: atq; ob id, earum vires imbecilliores: pro-
indeq; vniuersum corpus, frigidius. Causæ verò salu-
bres quæ hanc emendat dispositionem, vt vno eas cō-

METHODO MED. LIB. I.

313

prehendam capite, sunt quaecumque praesentaneum, tumque exhibent alimentum. Particulatim autem, in motibus moderatis, & cibis, potibusque, ac somnis consistunt. Sunt porro materiae motus, vehicula, ambulationes, frictiones, & balneae. Vbi igitur non parum se ex his profecisse senserint, paulatim se ad consueta opera transferant. Cibos autem assumant, in principio quidem, humidos, coctosque faciles: neque frigidos: in processu vero, eos qui plurimum alimenti suppeditant. At potus eis opportunus est, vinum: aetate quidem, moderate prouectum: substantia autem, purum, pellucidumque: quod scilicet vel sufflaum, vel album existat, atque suauiter olens: gustui vero: neque aqueum omnino, neque aliquam qualitatibus insignem, aut dulcedinem, aut acritudinem, aut amarorem, aut denique astringentem referens.

Conualescentes atque senes reficiendi ratio.

GALENI PERGA

MENI DE METHODO

MEDENDI. LIB. I.



INTER alias causas quae a condenda medendi methodo me haecenus dehortatae sunt, charissime Hiero, haec fuit una & praecipua, quod frustra me scripturum timerem: quum nemo prope dixerim hac nostra aetate veritatis inquisitioni sit deditus: sed pecuniam, & civilem potentiam, & inexpleriles voluptatum delicias, omnes eodem usque suspiciant, ut si quis sapientiae quoduis studium sectetur, pro insano hunc habeant. Quippe qui primam ipsam, & veram sapientiam, quae diuinarum, humanarumque rerum est scientia, ne

Temporū suorum felicitate Galenus deplorat.

Sapientia est diuinarum humanarumque rerum scientia.

esse quidem omnino existiment, ac proinde inter eos
cenfeatur optimus, non qui plurimis instrumentis mu-
 sicis, aut etiam sermone vti philosophico norit, sed
 qui multos, eosq; maximos calices exiccarit. Eo q; fit,
 vt quum ægrotare ii cœperint, medicos aduocet lo-
 cupletentq; non quidem optimos, sed eos qui adulen-
 tur ipsis: quiq; & frigidam dabunt, si hanc poposcerit,
 & lauabunt, quum iusserint, & niuem, vinumq; por-
 rigent: ac breuiter, quicquid iubebitur, mancipiorum
 ritu facient: contra q̄ veteres illi medici ab Aesculapio
 oriundi: qui veluti duces militibus, & reges subditis,
 imperare semper ægris voluerūt: nequaquā verò empti-
 tiorum Getarum more, parere & obsecundare: id qđ

Medici vete-
 res imperabāt
 ægris veluti du-
 ces militibus.

Theffalus pol-
 licebatur do-
 cturum se artē
 medicam curri-
 culo mensum
 sex.

2. Curaturo mor-
 bos necessaria
 est corporis na-
 turæ cognitio.

Corpus vniuer-
 sum est conspi-
 rabile & fluxi-
 le.

Mistorum qua-
 litates & facul-
 tates sunt totę
 per totas mi-
 stas.

3.

facere Romæ erat solitus impudētissimus Theffalus,
 eò etiam temeritatis progressus, vt sex tantum men-
 sum curriculo traditurum se totā artē medicā profite-
 retur: citra vllam aliaq; disciplinarum institutionē. Quā-
 obrē ipsius facilitate allekti, sutores, textores, fabriq;
 feruilib' opificiis relictis, cateruatim hodie sese sub eo
 præceptore, ad professionem sacratissimā conferunt,
 in perniciem humani generis. At verò, minimē licere
 alicui curare cōmodē morbos, nisi prius naturam cor-
 poris vniuersi pspexerit, apud omnes sapientiæ profes-
 sores est in confesso. Totius autem naturæ constitu-
 tionem, accuratissimē exposuit nobis Hippocrates.
 Quem quidem Peripatetici, atq; Stoici sequuti, vtriq;
 sanē hoc illius dogma recipiunt, nempe, vniuersum
 corpus conspirabile & cōfluxile existere, omnesq; ani-
 malis particulas à se inuicem affici: dissident tamen in
 eo, q̄ Aristoteles quidem, qualitates tantum in se mu-
 tuo transire, atq; omnino misceri: Stoici verò, nō has
 modò, sed etiam substantias ipsas existiment. Cæterū
 medicinæ fuerit abundē, si concedantur ea quæ ab
 vtrisque sunt demonstrata: necnon q̄ qualitates, virtu-
 tesq; in mistis, totæ sint totis permistæ. Hac autem hu-

mani corporis contemplatione posthabita, nullaq; usus demonstratione, ille sapientissimus Thessalus, duos tantum esse morbos, simplices tradit in vniuersum, nempe fluxum & clausum: ex quibus simul coeuntibus gignit tertium vnum compositum: non intelligēs se differentiam quandam morborum, nō numerum in medium adferre. Atqui minimē conuenit, quum de animalium numero quæritur, vnā differentiarum oppositionem producere. Alioqui duo sic vniuersa animalia erunt: vt gratia exempli, rationale, & irrationale. Proinde ad species quæ in substantia, nō quæ in differentia versantur, respicere oportet eum, qui numerum morborum sit traditurus. Porro non omnis differentia generi addita, ad speciei constitutionem conducit aliquid: sed quæ ex generis propria diuisione nascitur. Hæ siquidem differentię sunt, quæ species constituunt: reliquæ omnes, alienæ. Etenim propriæ animalis differentię existunt, mortale, & immortale: rationale, & irrationale: mansuetum, & ferum: aliaq; id genus. Molle verò ac durum, graue & leue, rarum & densum, magnum & paruum, animalis differentię nō sunt, sed substantię. Itaq; etiam si cū animali vel molle vel durum componas, ad speciem constituendam nihil sanē cōrulerint. Sin vel rationale & immortale, vel rationale, & mortale, animali adieceris, efficitur iam illic Deus: hīc homo. Ita verò, & si rationali aīali duas illas differentias peculiāres addideris, quæ sunt gressile & bipes, sic quoq; hominis speciem effeceris. Vnde fieri non potest, vt vllius rei specificas differentias inueniat quis, nisi prius substantiam illius, aut definiuerit, aut oratione circumscripserit accuratē. Si quis igitur tradere de morborum numero instituat, is non debet statim in primā differētia subsistere, sed diuisa illa procedere, donec ad aliquam īfimarum specierum, & quæ in aliam distrahi amplius non possit, perueniat: id qđ

Thessalus constituebat duos tantum simplices morbos in vniuersum.

Differentię specificæ.
Animalis differentię proprię

Deum animal rationale immortale definiuit Galenus.

Essentiam cuius rei esse principium a quo ordiendum est ad exactam omnem inquisitionem.

4. Instrumenta in uentionis duo: ratio & experientia.

Methodo inquirere, qd sit. Experientia a methodos, vnus fortunæ dūtaxat fauorē desyderat.

5.

Notio cōis.

facere illi tantum est promptum, qui in diuidendi arte magnopere fuerit exercitatus. Peccauit etiam vel grauissimè Thesalus, quod ne principium quidem in demonstrabile, ac per se notum attigerit, illius rei quam pertractandam suscepit: principium autem intelligo, quæsitæ vniuscuiusq; rei propriam essentiā: à qua necessario est ordiendum, quum ad inuentionem specierum & differētiarum, tum vel maximè (vt ait Plato) ad diuisionem, atq; ad omnem cuiusuis rei absolutam inquisitionem. Sed nec ratione, nec experientia ad fulcienda sua dogmata vsus vnq̃ est Thesalus: quæ quidē duo instrumenta, iis quæ optimè inuēta fuerint, apud homines solent semper patrocinari. Cæterum in his commentariis animus nobis est agere, non de experientia quæ ratione nō utitur, sed de iis præsiidiis, quæ methodo & ratione inueniuntur. Etenim methodo quippiam inquirere, inuenireq; ex aduerso opponitur ei, quod est fortuito & temere. Est siquidem illud, cū via quadam & ordine, quippiam inuestigare: experientia autem à methodos, non artem, aut ordinem certum, sed tantum fortunæ vnus fauorem, ad rei inuentionem desyderat. Qua quidem prorsus neglecta, nos demonstrationi insistamus, quæ à principiis in demonstrabilibus, & per se notis, intellectuiq; obiectis nunq̃ non proficiscitur. Nam quod intellectui se vno occursum non exhibet, id protinus controuersum existit, demonstrationemq; desyderat: nec artem vllam à tali principio incepsisse conuenit. Quandoquidem igitur morbi curationem inuenire est propositum, haud dubiū necesse est, prius morborū numerum sciri. At quoniam fieri nequit, vt aut differētiās generis vllius morbi, aut species inuenias, ipso quod diuiditur, non planè explorato, oportet profectò nūc, etiam quid morbus sit, enarremus, quo sic diuisionem eius ritè adeamus. Id verò fiet cōmodè, nobis à communi notione au-

spicatis, sine qua inuenire propositæ rei substantiâ non licet. Vt igitur vbi citra offensam, omnium partium actiones obeunt, homines valere se dicunt: sic dum naturalium corporis actionum fenserint quampiam vel malè geri, vel prorsus non geri, & ægrotare se illa corporis parte existimant, cuius actionē oblæsam vident, & medicum de remedio consulunt. Ac tales sunt vniuersis hominibus notiones & sanitatis, & morbi. Ergo accepto illo, quod omnes consentientur, principio, nempe id in medendi methodo propositum esse, vt ægra corpora in sanitatē restituiamus, hoc est, naturales partium actiones, si quæ oblæscant, emendemus: claritatis gratia, oculum proponamus, cuius nimirum particulæ opus esse vt videat, inter omnes homines conuenit. Nec verò refert partem ne, an particulam, quispiam oculum dicat. Siquidem quicquid totum cōplet, atq; integrat, id, corporis totius, quod complet, particula siue pars nominatur. Est namq; pars ex iis quæ dicuntur ad aliquid. Quippe pars totius integriq; pars dicitur: æquè profectò vt totum, integrumq; , per relationem ad partes, & particulas suas nominatur. Cæterum à rerum, non nominum differentia, in omni comentatione principium sumendum est. Est itaq; visio, oculorum actio: quemadmodum locutio, linguæ: icessus autem, crurum. Ipsa rursus actio, motus est actiuus. At motus est prioris habitus immutatio. Qui quidem actiuus dicitur, quum à se æditur: passiuus verò, quum ab alio posito extrinsecus, excitatur. At verò immutatio prioris habitus dupliciter fit: nempe aut in qualitate: aut in loco. Cæterum quæ circa locum versatur, latio dicitur: alteratio autem, quæ in qualitate cōsistit. Porro instrumentum appello eam animalis partem, quæ perfectè ædere actionem potest. Qua significatiōe oculus pars animalis, & particula: & instrumentum vocatur. Cornea verò tunica, particula quidem & pars:

Valere et ægrotare qm se dicant homines.

Pars quid dicitur.

Visio est oculorum actio.
Actio quid.
Motus quid.
Motus duplex
Immutatio duplex.

Latio.
Alteratio.
Instrumentum quid.

Oculi tunicae.

at instrumentum non item. Simili modo & quæ rha-

Similaris par-
ticula quæ di-
catur.

CrySTALLINUS
humor primū
instrū visionis

Nihil sine cā
contingit.

Sanitatem &
morbum sub
eodem genere
contineri.
Contraria que
dicantur.

goides, & quæ arachnoides, & quæ amphiblestroides, dicuntur: quarum nimirum singulæ, primum quidem, ac maximè, oculi particulæ sunt: & quia is etiam faciei pars est, itidem & illæ faciei sunt partes: sed secundaria ratione. At verò similarē partem appellant, quæ undique in particulas similes diuidi potest: veluti vitreus humor, & crySTALLINUS, & tunicarum propria cuiusque substantia. Est itaque instrumentum oculi: actio verò, visio: vna ex eius particulis similaribus, ac primum instrumentum visionis, crySTALLINUS humor. Id namque est, quod alterari debet ab aliquo extrinsecus occurrētium colorum, ut animal videat. Alterari verò non potuit, nisi purum omnino, perspicuumque esset. At purū ita, pellucidumque esse non posset, sine eo quod nunc obtrinet temperamento. Quippe ostensum est, vnamquæque rem talē esse, qualis est, per calidi, frigidi, humidi & sic ci temperaturam. Ideoque si quid horū magnopere immutatum sit, aut planè non videbit, aut malè videbit animal. Vbi igitur neutiū videre oculum cernimus, qui tamen probè antea cernebat, subito nos accingimus ad ipsius læsionis causam inuestigandam: quum si ne causa nihil in natura rerum contingat. Causa inuenta, necessariò fatendum est, aut morbum ipsum eam esse: aut, si morbus læsio actionis existat, affectū qui huic officit, morbi causam existere. Dubitauerit tamen aliquis, ipsum ne oculi affectum, à quo cernendi actio vitiatur, dicere morbum debeamus: an ipsum actionis vitium. Quodcunque tamen elegeris, necessum est ut de sanitate enuncies, & quidem multo antea, contraria: nempe eam esse vel incolumen oculi actionem: vel affectum, qui visionem absoluat. Sanitas quippe & morbus, maximè contraria quum sint, sub eodem genere continentur. Contraria siquidem sunt, quæ in eodē genere posita, plurimum inter se dissident: veluti album

METHODO MED. LIB. I.

319

& nigrum: quorum vnum est genus, color. Ergo si sanitas actio est, quæ secundum naturam se habet: omnino morbus, actio præter naturam erit. Sin autem affectio quæpiam, aut constitutio naturaliter se habens, extiterit sanitas: & morbus affectio, constitutio'ue præter naturam, necessario fuerit. Verum quum duo rerum genera sint, nusquam inter se similia, sed tota differentium natura: quorum alterum quidem, corpus, certo modo affectum, vocatur: alterum verò, functio: fatendum proculdubio est, affectum ipsum corporis, causam esse: functionem verò, id, quod ab affectu ipso proficiscitur. Comitatur quippe necessario affectum naturaliter se habentem, naturalis actio. Contra, si à natura recesserit, actio statim præter naturam se habebit. Atque hoc ipsum est veluti elementum primum totius medici methodi, quum nihil aliud sit quod curatur à medicis quam ipsius affectus corporis. Contingit tamen non ex nominum, sed rerum, recta opinione, recta morborum curatio. *Ut autem* omnia methodo compendiosa explicemus, quatuor in vniuersum res sunt, quæ in præsentī contemplatione proximè inter se coherent. Ac videtur sanè ex his esse vnum genus ipsorum corporum: alterum verò, actionum: ac corporum quidem genus, præcedere actiones, easque gignere: has verò sequi: idque, si corpora se naturaliter habeant, inculpabiles, naturalesque: sin præter naturam sint affecta, aut nullas prorsus, aut omnino certè impeditas. Tertium præter hæc genus est causarum, quæ hos affectus creant. Nam quam rationem habet affectus ad actionem, hanc alterum quippiam ad ipsum affectum omnino habere oportet: illo duntaxat euarians, quæ affectus vnà cum actione consistit: nec potest vsquam aut proba actio esse, si ne corporis naturali affectu: aut vitiosa, nisi quum corpus sit vitio affectum. Ipsius autem affectus, qui actionem impedit, causæ possunt & adesse, & abesse. Ab hoc

Affectus corporis existit functionis causa.

8.

Morbus est af-
fectus præter
naturam, fun-
ctionē vitians.

Symptoma
duplex.
Causæ morbi-
ficæ.
Causarum dif-
ferentiæ.

9.

Accidentia &
symptomata
quò differant.

Rerum quæ in
nostro corpore
habentur qua-
tuor genera.

quartum aliud genus est eorum, quæ quum corporib⁹
& naturaliter & præter naturam se habentibus insint,
actioni nec commodant, neq; incommodât: vt exem-
pli gratia, color niger, ob diuturnam in sole morâ con-
tractus. Affectū igitur corporis præter naturam se ha-
bentis, qui actionem aliquam vitiat, morbum (si pla-
cet) vocemus. Ipsum verò functionis vitium, insigne
quoddā morbi symptoma. Quæ alia rōne accidunt, ceu
colores, ea symptomata etiā, sed familiaria propriaq;
possit quispiam vocare. At quartum ab his genus sit in
salubrium siue morbificæ causæ. Quæ eas quideni,
quæ in ipso corpore animalis consistunt, internas siue
anteecedentes: quæ verò extrinsecus accidunt, externas
aut procatacticas appellabimus. Vt autem hæc exem-
plo clarescant, phlegmonem esse pedis morbum
constituamus: læsum autem ingressum, esse insigne ip-
sius morbi symptoma. At rubor, tensio, renixus, & tu-
mor præter naturam, diuersa quædā symptomata no-
minentur. Porrò sanguinis redundantia, phlegmones
causa interna dicatur. Sicuti externa, quæ præesit
abundantia ciborum. Cæterū nullus affectus dici mor-
bus meretur, nisi alicui⁹ partis actionem vitiet. Quod
autem postulat curationem, aliud planè non est, q̃ affe-
ctus qui vitiat actionem. Etenim quod primū, maxi-
meq; omnium desyderamus, id naturalis est actio. Vt
igitur totam particulam actionis tantū gratia requi-
rimus, eodem (arbitror) modo, & ipsius partis natu-
ralem constitutionem, etiam actionis gratia desydera-
mus. Porrò quæ constitutionem ipsam vnde actio na-
scitur, necessariò sequuntur, sanis quidem nobis acci-
dentia: agrotantibus, symptomata nūcupantur. Atq;
hæc quatuor genera sunt omnium, quæ in nostro cor-
pore habentur, siue secundum naturam nos, siue præ-
ter naturam habeamus: actiones, constitutiones, quæ
has præcedunt, quæq; etiam sequuntur.

GALENI

G A L E N I P E R G A

M E N I D E M E D E N D I

M E T H O D O . L I B . I I .

321



R G O Affectus qui actionem vitiat, morbus vocetur. Hunc si quis sequitur, symptoma. Quod illum excitat, causa. His ita distinctis, inspicienda diligenter est nominum diuersitas, quæ ægritudinibus imposuerunt, ipso
 rum primi authores. Partim namq; à læsa particula fuerunt indita, vt pleuritis, id est compunctio lateris. Peripneumonia: id est, pulmonum phlegmone. Ischias, id est coxendicum morbus. Podagra, id est pedum vitiū. Nephritis, id est renum affectus. Arthritis. i. articulorum vitium. Ophthalmia. i. oculorum phlegmone. Cephalalgia. i. capitis dolor. Dysenteria. i. intestinorum tormina. Subinde ab ipso symptomate, vt Ileos, hoc est voluulus. Tinesmus. i. desidendi assidua cupiditas. Spasmos. i. conuulsio. Palpos. i. palpitatio. Tromos. i. tremor. Paralysis. i. resolutio neruorum. Apepsia. i. cruditas. Dispnoea. i. difficilis respiratio, vel inordinata spiratio. Apnoea. i. spirandi defectus. Agrypnia. i. vigilia. Paraphrosyne. i. delirium. Coma. i. sopor. Sæpe ab ambobus simul. Vt Cephalalgia, hoc est capitis dolor. Otalgia, hoc est dolor aurium. Cardialgia. i. oris ventriculi (quod veteres appellabant cor) dolor. Odondalgia, id est dentium dolor. Hystæralgia. i. vteri dolor. Sæpe numero à causa putata, vt Melancholia. Nonnunquam à similitudine ad aliquid extra positum, vt Elephas, Cancer, Polypus, Staphyle. i. vicia. Leuce. i. vitiligo alba. Myrmecia. i. formica. Atheroma. i. tuber, cui pulticulæ quid simile inest. Steatoma, quod aliquid seuo simili

Morbus
Symptoma.
Causa.

2.

Morborum nomina indita a læsa particula

lib. II. c. IV

Morborum nomina sumpta ab ipso symptomate.

Morborum nomina tracta a parte affecta, & symptomate.

Morborum nomina sumpta a causa putata, vel ab aliquo simili.

Tomus. III.

X x x

le cōtinet. Staphyloma. i. oculi morbus, quum in summa tunica quiddam acino simile eminet. Meliceris, hoc est capitis vlcerā, sanien instar mellis fundentia. Anthrax. i. carbo. Alopecia. i. areæ in capite. Ophiasis. i. vitium serpentis formam repræsentans. Sycoſis. i. ficus. Satyriasmī, & Priapiſmī, pudēdi erectiones præter naturam. Ipsorum verò morborum, qui neq; locum affectum nomine repræsentant, nec causam quæ eos effecit, perpauca sunt nomina. Phlegmone. Gangræna. Scirrhus, Erysipelas. Apostema. Oedema. Empyema. Vlcus. Exarthrema. Catagnia. Spasina. Rhegnia. Colobomia, id est mutilatio. Dorthien, id est furunculus. Ionthos, id est varus. Phyma, laxarum partium phlegmone. Quamquā horum quoq; nonnulla, partim locū corporis, siue particulam afflictam subindicare videntur: partim à prægrauante symptomate nominari. Porro vlceris (quod vnitatis solutio est in carnosa parte) differentiæ particulares partim ab iis qui primum eas sanauerunt, dicuntur: partim ab ipsis qui iisdem affecti sunt: vt Telephium. Cancer autem, à similitudine ad animantem. Phagedæna, Herpesq; à symptomate. Verū phagedæna quidem, vlcus depascens est. Herpes autem non semper existit vlcus. At quotiescunq; cum exulceratione inuadit, ritu serpentis bestię, ad vicinas partes progredit, easq; depascit, & populatur. Cauum verò vlcus, & sordidum, & cruentum, & purum, & æquale, & carne excreſcēs, hæc magis proprias appellationes sortiuntur: non tamen similiter omnes. Nam æquabile, cauum, & supercreſcens, à propria differentiā: at cruentum, & purum, & sordidum, non à propriis differentiis, sed ab externis symptomatis, appellantur. Tres igitur esse in corpore affectus præter naturam, ostensum iā est: causas videlicet, morbos, atq; symptomata. Causas, veluti redūdantiā, & corruptelam. Morbos, vt phlegmonē, Vlcus. Sym-

Vlcus quid.

Vlcum varia nomina.

Phagedæna quid.

Herpes duplex

3.

Affectus præter naturā sunt tres: morbus causa & symptoma.

ptomata, ut prauum colorem, atque gracilitatem. Di-
 uersa ab his sunt quæ immodicè excernuntur à corpo-
 re, aut retinentur præter naturam, & functionum vi-
 tia: omnia scilicet cōmuni nomine appellata sympto-
 mata, cæterū non vni generi subdita. Quippe affectus
 quidam corporis est vitiosus color. Quod excernitur
 autem, aut retinetur, affectus non est, sed affectum seq-
 tur. Similiter actio vellæsa, vel integra, affectus sanè
 non est: particulæ autem vnde editur, necessariò comi-
 tatur affectum. Ac œdema quidem & phlegmone, ex
 iis sunt, quæ absolutè dicuntur esse. Eodem modo & re-
 dundantia, si ea sit sanguinis: & corporis pallor. Actio
 verò, ex eorum numero non est, quæ esse absolutè di-
 cuntur: aut certè non similiter sicut iam comprehen-
 sa. Siquidem nullo temporis spatio, eius partes manēt,
 sicuti nec sermonis, nec vllius motus. Sed horum quili-
 bet in generatione cōsistit. Quum verò duplex sit ipsi-
 us motionis genus, vnum in loco, aliud in qualitate: *Motus duplex*
 prius latior: secundum alteratio dicitur. Ac omnis qui- *Actio quid.*
 dem actio, motus est actiuus: omnis alteratio, eius quæ *Alteratio quid*
 alteratur, motus est passiuus. Patitur nanq; quod alte-
 ratur. Ergo affectus, dum aliterantur, mouētur: vbi ve-
 rò à motu cessauerint, iam alterati sunt: non autē am-
 plius alterantur. Quicquid enim quocūq; modo se ha-
 bet, aliquo omnino affectu est præditum. Quod autem
 in constanti, ægreq; solubili affectu est, id habitu iam
 quodam affectum est. Sanè alteratur is qui nigre-
 scit: alteratus est, qui obnigruit. Itaque alteratio genera-
 tio est qualitatis. Nā quæ absolutè dicitur generatio, *Habitu quid*
 ad substantiam via quædam est & progressus. Aliqua *affectū dicat.*
 igitur in generatione, alteratione, & ut semel dicam, *Alteratio qd.*
 motu, suam essentiam obtinent: aliqua * permanentē *Generatio est*
 habent substantiam. At sanitas quidem & morbus, & *ad substantiis*
 quæcūq; symptomatum, causarumq; affectus, vel ha- *progressus,*
 bitus sunt, ex permanentium numero existunt. Actio

Pathe.

Cause sympto-
mata.

Medici mu-
nus.

4.

autem omnes, alterationesq; circa rem quālibet, in ge-
neratione propriam essentiam sortiuntur. Porro cor-
pus ipsum, secundum quodcunq; mouetur, secundum
idem patitur: motusq; eius pathos, siue passio, est. Ete-
nim priscei, motus omnes, etiam si naturales existant,
nisi actiui sint, pathe, hoc est, passiones nomināt: sicut
actiuos motus actiones. Nos autem, contrarium sa-
nitati affectum, à quo lædi functionem diximus, tantū
morbum vocamus: siue diutin⁹ hic sit: siue brevis: siue
momento duret. Ex reliquis affectibus præter naturā,
eos qui hunc præcedunt, causæq; rationem obtinent,
causas tantum dicimus, non pathe. Qui illum sequun-
tur, si actionum offensæ sint, & symptomata, & pathe.
Eodem modo, & immodicas vel inanitiones vel reten-
tiones. Qui verò affectus sunt, veluti vitiosus color, su-
pra affectionis & symptomatis appellationem, etiam
affectus, vel affectiões vocamus: ita nimirum ut sunt.
Omnium igitur horum, commune id est, q̄ præter na-
turam sunt. Proprium autem morbi quidē est, q̄ actio-
ni incommode: symptomatis, q̄ morbum sequatur:
causa deniq; q̄ præcedat. At verò medicorum pro-
prium est munus, ut morbos adimant: quibus sanè su-
blatis, non modò actionis vitium euanescit statim, sed
reliqua etiam omnia symptomata. * Quisquis igitur
ex iis quæ particulis naturaliter insunt, tum eas quæ
aliter accidunt, tum proprias functionis causas distin-
guere nescit, quū obsecro fieri potest, ut is dispositio-
nem inueniat, à qua primum læditur functio? Etenim
quæ fortuitò corporibus accidunt, etiam si millies sint
alterata, nocere actioni non possunt, q̄diu à quibus fie-
bat, omnia naturam suam seruauerint. Horum verò,
si vel vnum quoduis alteratum fuerit, actionem q̄q;
ipsam statim in tantum lædi est necesse, in quantum ab
eo est, quum secundum naturā se haberet, adiuta. Fie-
ri autem non potest, ut omnium morborum numerū

METHODO MED. LIB. II

325

methodo is comprehendat, qui numerum omnium actionis causarum, corpore secundum naturam se habente, non norit. Qui autem omnem morborum numerum methodo non inuenerit, hic maximè labat oportet in ipsis medendi auspiciis: quum constet, tot eè medendi rationes, quot morborum ideæ existunt. Verū enim verò, primus omnium ille affectus inuestigandus est, qui dicitur functionis effectrix causa. Hunc sanè eu crasiam nos diximus esse calidi, frigidi, humidi, & sicci, ex intemperie quorum, primus morbus in particulis similaribus nascitur. Quum autē à similaribus ipsis, corporis functiones ædantur, meritò instrumentis singulis, vnica tantum est attributa similis particula, à qua perfici ipsa actio possit. Reliquæ verò quæ cum hac quoduis instrumentum absoluunt, in aliquē vsum illius quæ prima existit actionis causa, sunt constitutæ: quāuis & ipsæ retinent suas peculiare actiones. Etenim instrumentum visus, est crystallinus humor. Reliquæ verò partes, eius gratia sunt factæ. Singulæ tamen earum aliquam seorsum actionem obtinent: ac vena quædam & arteria, & nervus, toti animanti communem: membranulæ autem oculi omnes, quum sint nutrimenti participes, præditæ omnino sunt naturalibus facultatibus: ac proinde etiā functionibus quæ ab ipsis proficiuntur. Quoties igitur crystallinus humor intemperie laborat, omnino læditur oculorum functio. Nō est tamen affectus is, eorum, vt organa sunt, morbus. At hypochyma, hoc est suffusio, nullius similariū morbus existit, sed oculi totius, ceu instrumenti. Ad eundem modum si in finibus venarum, quæ sunt in cauo iecinoris, obstructio aliqua oriatur, digestio quidem in corpus per has morabitur: ægrotudo tamen totius hepatis, ceu instrumenti censebitur, nulla similarium eius partium adhuc egrotante. At si intemperies venas illi infestauerit, ipsa quæ illa morbus primū erit: ex ac-

(5) 6.

Medendi tot esse rationes, quot morborum ideæ existunt. Functionis cā.

Functiones edia corporibus similaribus.

Crystallinus humor est instrumentū visus.

Hypochyma, oculi totius, ceu instrumenti, est morbus.

Xxx iii

Similares particulae solent octo intemperaturis cruciari, absque humore affluxu totidem per etiam, dum illi affluunt. Morborum genus duplex. Morbus instrumentalis quadruplex. Solutio centum est communis morbus similibus & instrumentalibus particulis.

Experientiae soli, quae debeat incumbere.

Empiricorum ars quid sit.

cidēti verò, etiam iecinoris. Solēt autem similes particulae, octo intemperaturis secundum nudas qualitates cruciari: nempe quatuor quidem simplicibus: quatuor autem compositis. Quod si ad intemperiem accedat & humorum affluxus, totidem rursus itemperies oriētur. Duplex itaque erit morborum genus: alterum in partibus similibus: alterum in organicis. Quod igitur ad particulas similes pertinet, circa intemperantias versatur. Quod verò ad organa, vnum quidem in figura: aliud in particularum numero: tertium in magnitudine: quartum denique in positura spectatur. Vtrarumque verò partium, id est similiarium, & instrumentalium, communis affectus est, unitatis diuortium. Quare sex in vniuersum morborum genera existunt. Vnum, quod similiarium est proprium: nempe intemperies. Quatuor, instrumentorum cuiusque. Et cum his sextum, quod vtriusque partibus est commune, ipsius unitatis solutio. Porro omnis medendi methodus, seiuncta ab experientia procedit. At medicorum plerique non tantum experientiae applicantes animi (per quam tamē liceret eis euadere in probos medicos) sed perfectioris etiā rationis cupidi, quum ait iis, quae citra demonstrationem sunt enūciata credant, aut vitiosis fallantur demonstrationibus, non solum nihil excogitant boni, sed etiam quae per experientiam cognita sunt, corrumpunt. Proinde talibus experientiae ut incumbant consulo: quum non leue instet periculum iis, qui supra vires aliquid moluntur, ne & id non consequantur: & quae intelligere alias possent, omnino omittant. Itaque committendum non est, ut utraque simul misceantur, & quae per experientiam inuenta sunt, & quae sola ratione inuestigata. Sed quum vtrumque seorsum sit tractatum, post ambo coniungantur. Etenim tota Empiricorum ars, observatio quaedam est, & memoria, eorum quae visa sunt inter se habere consequutionem aliquam. At ex ipsa rei natu-

M E T H O D O M E D. L I B. I I I.

327

ra ordiri, atq; ab ea, quod sequens sit, inuenire ci-
tra experientiam, id est indicatione inuenire. Vo-
co autem indicationem, ipsam veluti consequutio-
nis imaginem. Omnis itaq; medendi methodus donec
ad optatum finem perueniat, per indicationes progre-
ditur. Quandoquidem quicquid ab experientia est se-
iunctum, id totum indicatio vocatur. At finis propo-
siti tractationis est, inuenire cuiusq; morbi remedia.
Huius autem inuentionis principium, est ipsius morbi
cognitio. Ergo primum, quæ nam generalis, commu-
nisq; morborum omnium indicatio sit, inuestigandum
est. Ab hac deinde ad alias speciatim est descendendum,
donec finem eum consequamur. Porro quemadmo-
dum hominibus vniuersis inest quippiam commune,
cuius nimirum ratione, omnes dicuntur esse homines,
ita & vsu venit in morbis. Vt enim Socrates atq; Pla-
to, specie quidem sunt vnus homo: numero autem va-
rii: sic, mea quidem sententia, morbus qui vtrunq; eo-
rum infestat (sit febris, exempli gratia) genere & spe-
cie erit vnus, & si duo numero existunt. Id quod Plato
significare videtur, dicens, Multa vnum esse, & vnum
multa. Rectè igitur ab antiquis philosophis dictum est,
aliud numero, aliud specie, aliud genere esse, quod tū
idem, tum vnū est. Quā igitur omnis affectus præter
naturam, functionem lædens, sit morbus, necessum
haud dubie est, omnes id genus dispositiōes, quatenus
tales sunt, vel genere, vel specie vnum morbum exi-
stere. Quamobrem, vnum genere, specie, ac numero
dici & esse qui non intelligunt, asino (quo nullum est
animal stupidi⁹) mihi stolidiores videntur. Nā hic aliud
esse vnum quidem specie: numero autē aliud, cogno-
scit. Quæcunq; verò de morbo dicimus, eadem & de
optima valitudine, & de aliis etiam dispositiōibus, in-
telligenda veniunt. Nam quemadmodum hominis no-
men est vnū in vniuersis hominibus, morbiq; in om-

Iudicatio qd.

Multa vnum
esse, & vnum
multa.

Idem & vnū
quot modis di-
catur.

Morbus quid.

Asino nullum
esse stupidius
animal.

Asinus vnum
specie, ab eo
qd numero est
vnū, discernit.

Xxx iiii

Morbi nomen
est vñ in vñ
uersis morbis.

nibus morbis: sic sanitatis denominatio, vna eademq;
est, in omnihus illorum constitutionibus, qui prospera
sanitate fruuntur.

GALENI PERGA

MENI DE MEDENDI

METHODO.

LIBER. III.



Igitur indicatio quæ ab ipsa rei na-
tura primùm oritur, quid agendum
sit inuenit, necesse est remediorum in-
ueniendorum initium, ex morborum
ipsorum natura sumi. Cæterum indi-

catio ipsa, quæ à morbis sumitur, pri-
cipium tantum est, vnde medendi ratio promouet: nō
autem ipsius artis medicatricis pars: aut certè, nec ma-

Medicus quis
nam solus exi-
stimandus.

Empiricus.
Logicus.

Doctrinā Em-
piricam, logi-
cāq; non esse
confundendas
sed seorsim vtrā
tradendam.

Quamobrem eum solum eē medicum existimamus,
non qui nouit, quid nam morbi prima indicatio dicet,
sed qui illa perficere potest, quæ à tali præscribuntur
indicatione. Is igitur, si per experientiam ea inuenit,
obseruator & Empiricus est vocandus: sin ratione qua-
dam & methodo, logicus, & methodicus, & dogmati-
cus. Empirici quippe, per experiētiam inueniri omnia
contendunt. Nos partim experientia, partim ratione:
quum neq; illa inuenire omnia queat, nec sola ratio.

Verum confusam, mistamq; tradendam esse doctrinā
non censemus: sed seorsum Empiricam: & seorsum lo-
gicam: quo facile appareat, quam vtrāq; earum vim
habeat. Igitur vnitatis solutio (quæ i osse quidem fra-
ctura: in carnosā autem parte vlc^r dicitur) vnitatem
postulat: quemadmodum, & vulnus, & ruptio, & con-

M E D. M E T H. L I B. I I I.

vulsio. Equibus, vulnus quidem solutio quædā ex vul-
nerādo in carnosā parte relicta, est: ruptio autem atq;
conuulsio, citra vulnerationem accidunt: ac prior qui-
dem, carnosæ partis diuisio existit: secunda autem ner-
uosæ. Hîc itaq; omnibus vnitio molienda indicatur:
quæ an p̄stari vbiq; possit, an in multis non possit, hoc
vtiq; internoscere, primū iam artificis est. Siquidē hoc
ipsum primum artis est opus, vt intelligas sperare ne
id quò tendis debeas, an secus. Eius rei duplex cogni-
tio est: nec potest addi tertia. Altera per experientiam
cui longo vsu est opus: altera per ipsius rei naturam.
~~Hæc~~ siquidem, tum cuiusq; substantiam particulæ, tum
actionem, tum vsu, situmq; æstimabit. A quibus pro-
cedens, non solum quod sanari nō potest, præuidebit,
sed etiam quod recipere sanitatem potest, de inuenien-
dis ei remediis deliberabit. Constat autem q̄ à simpli-
cissimis auspicabitur. Porro nihil est simplicius vlcere,
quod in summa carnosā parte consistit. Huius ergo, si
quidem vlcus tantum sit, vnus curationis scopus, vni-
tio est. Sin autem cum cauitate adsit, erit duplex affe-
ctus: nempe vlcus, quod est vnitatis solutio: & cauitas,
quæ ex amissa aliqua animalis propria substantia con-
tracta est. Ac proinde duplex etiā proponitur eius cu-
rationis scopus. Nēpe vt inducatur cicatrix, & implea-
tur cauitas. Horum tamen alterum sæpe fieri non po-
test: vt puta, quum non modò carnem, sed etiam illi
subiectum os, perire contigerit. Quippe impleri ad vn-
guem huiusmodi minimè potest: cicatrice induci, faci-
le potest. Inuentionis autem, vt aliarum rerum, sic re-
mediorum omnium duo nobis sunt instrumenta: vi-
delicet experientia & ratio. Cæterum qui sola experiē-
tia vtuntur, quum videant, cui Aristolochia vlcus car-
ne non impleuit, huic thus conferre: cui autem thus
non contulit, ei irin admotam esse vtilem, iudicant
non omnes ab omnibus medicamentis similiter affi-

329
Solutionis cō-
tinue species.

Ar

2.

Vlceris cavi
curationis du-
plex scopus.

Instrumenta in-
uentionis re-
mediorum eē
duo, experien-
tiā atq; rōnem

Empiricos ci-
tra delectū in
vnum medica-
menta contraria
confundere.

Oleum cauo
ulceri aduersis-
simum medica-
mentum est.

Ceræ usus ca-
uo ulceri exi-
sit piculosus.
Æruginis vis.

Temperamentum
vnum modicum
confici ex im-
modicis atq;
contrariis pos-
se.

Sarcoticū me-
dicamentū vl-
ceri aptissimū
cōfici ex oleo,
cera, & ærugi-
ne.

cirac proinde quamplurima eiusdem speciei medica-
menta sarcotica in vnum confundunt, quo nulli cor-
poris naturæ desit, quod sit ex usu. Atq; hi quidem q̄-
turpissimè hallucinantur. Primo quidem, nam solius
compositionis quæ ex similibus specie medicamentis
conflatur, non eius quæ ex contrariis initur, instituūt
methodum. Dein autem, quia in eius miscellæ multi-
tudine, vnum fortasse medicamentum laboranti pro-
desse poterit: fortasse neq; vnum quidem: contra verò
septem, aut octo obesse: ita vt pluribus numeris eius-
modi medicamen obfit, q̄ proficit. Ac proinde, quod q̄-
dem ad hanc rem pertinet, ii plura mihi ignorare, q̄ no-
uisse videntur. Etenim oleum cauo ulceri infusum, ad-
uersissimum omnium medicamentum est: ipsumq; &
sordidum, & foetidum reddit. Quòd si tempus quoq;
anni calidius sit, ac vitio mali succi homo laboret, aut
sit natura obnoxius fluxionibus, aut in victus ratione
delinquat, timendum est, ne pars illi ea computrescat
ex usu olei, quæ fuerit exulcerata. Periculosus est etiā,
& ceræ siue solius, siue in oleo solutæ, usus. Hæc itaq;
putrescere vlcus faciunt. At si æruginem, ad læuorem
tusam, inspergas, ea quidē nullo modo putrefaciet: do-
lorem: tamen & morsum non paruum inferet: præte-
rea exedet, ac phlegmonem excitabit. Quòd si largi-
utare, etiam contruersionem accerset. Quoniam igitur
neq; oleum, neq; ærugo, neq; cera, cauū vlcus per se
implere carne potest: constat q̄ ex iis qui experiētiā
proficētur, nemo vsq; miscebit illa: id quod faciet Ra-
tionalis intrepidè, videlicet haud ignarus, ex duobus
temperamentis immodicis, contrariisq; , confici vnū
modicum posse. Non est ergo difficile, ex oleo, cera, &
ærugine, medicamentum sarcoticū, & moderatè sic-
cum conficere: quale vlceri cauo est aptissimum, ceu
quod mediocriter exiccari postulet. Omnis igitur quæ
præter naturam est cauitas, repleti postulat: quare, &

quæ in carnosa accidit parte. Ipsa verò repletio, inueniendorum remediorum finis, quò tenditur, est. Cæterum ut illa quæ implent inuenias, & multa ratione est opus, & multiplici particulatim indicatione, & methodo rationali exacta. Quæ quidem destitutum, vulgus medicorum quum sit, etiam oculorum doloribus illa medicamenta adhibet, quæ ex opio, mādāgora, & hyoscyamo parantur: maximam planè oculorum perniciem: utpote quæ nulla re alia sublata ad præsens speciem doloris præstant, quæ ipsum sensum extinguant. Nos verò, dolores oculorū grauissimos, aut balneo, aut vini potione, aut fomentis, aut misliōe sanguinis, aut deniq; purgatione sanauimus. Ut igitur ad caui vlcere curationem reuertar, in eo sanè proponitur nobis, ut quæ periit caro restituatur. Scire autem oportet, generande carnis materiam, sanguinem bonum existere, opificem verò, atq; authorem, naturam, illi videlicet corporis, cui caro superinduci debet. Porro natura cuiusq; corporis, calidi, frigidi, humidi, & sicci temperatura cōstat. Quare perspicuum est, iustum horum temperamentum in subiectis particulis, quibus deficientem carnem sumus restituri, opificis habere rationem. Ac primū quidem in omni cauo vlcere hæc duo consideranda veniunt: iusta ne sit temperie id quod subiectum est: nempe an secundum naturam se habeat (similarium quippe corporum sanitas, iusta est quatuor qualitatum tēperies) & an sanguis qui infuit, bonus ac mediocris existat. Nam si horum alterutrum sit vitiosum, multi affectus præter naturam constiterint. Verū si & sana sit pars, & sanguinis confluxus citra omne vitium: nihil obest, quo minus prima carnis generatio contingat prosperè, idq; nullius externi medicamenti ope. Cæterum quia in ipsa primæ carnis generatione duplex excrementum oritur, alterum quidē tenuius (quo d n vlcere sanies dicitur) al-

Oculis perniciosissima esse quæ medicamēta ex opio, mādāgora, & hyoscyamo cōstant.

Oculorum dolores quæ nam medendi ratione Galenus sanarit.

Carnis generandi materia est pbus sanguis opifex ipsa natura.

Natura cuiusq; ex primarum qualitatum tēperie constat. Sanitas similarium partium est iusta quatuor qualitatum temperies.

3.

*Sarcoticū me-
dicamē primo
gradu debet
detergere, &
siccare.*

*Sarcotica me-
dicamēta quæ
sunt.*

*Thuris facul-
tates.*

*Naturaliter, se
habentia cor-
pora, sibi simi-
lia possulant:
præter naturā
aut, contraria.*

terum verò crassius: quod nuncupatur sordes: atq; ex
tenui quidem, vlcus humidum redditur: ex crasso au-
tem sordidum: duplicibus sanè medicamentis est op^o:
vtiq; vt humidum vlcus est, siccantibus: vt sordidum,
quæ ipsum expurgent. Ergo quum nullo vnq; tempo-
re natura cesset, certè nec tēpus vllum erit, in quo nō
ambo hæc in cauo vlcere colligantur. Quare nec tem-
pus vllū erit, in quo non vtrunq; medicamenti genus,
& siccans, & expurgans desyderetur. Sed nō sat est in-
uenisse genus medicamenti, nisi etiam speciem eius dis-
quiras. Cuius quidem inuentio petenda est ex comen-
tariis medicamentorum simplicium: vbi nimirum om-
nium medicaminum temperaturas, gradus, & differē-
tias tradidimus. Debet autem medicamen producen-
dæ carni conueniens, ex iis esse, quæ primo ordine tū
detergunt, tum siccant. Qualia sunt thus, hordeacea,
fabacea, & erui farina, iris, aristolochia, cadmia, pa-
nax, atq; pompholyx. E quibus, aristolochia quidem,
& panax, tum cæteris plus siccant, tum natura magis
calent. At hordeacea, fabaceaq; farina, multo his mi-
nus siccant, ac minimè calida existunt. Thus verò mo-
deratè calet: minus tamen illis siccant. Erui farinæ, &
iris, horum, atq; aristolochiæ & panacis, medium locū
fortiuntur. Cæterum thus in humida corporis natura
carnem producere potest: in sicca autem non potest:
vim tamen mouendi pus habet: nimirum cum mediis
ac temperatis naturis consentiens. Sunt nanq; duæ
differentiæ primarum indicationum: quod secundum
naturam se habet, custodiā sui indicante: & propterea
quæ sibi similia sunt, postulante: quod præter naturam
est, sublationem sui, eoq; requirente contraria. Peric-
enim quidq; in contrarium, & à cōtrario. Vlcus ergo,
quo humidius fuerit, eo sanè, medicamento quod ma-
gis siccet, indiget. Corporis verò natura, quāto est hu-
midior, tanto quod minus siccet, medicamentum po-

METHODO MED. LIB. III.

333

stulat. Quamobrem ex vlcerebus æquè humidis, quæ quidem in sicciore temperamento consistit, utique magis siccare postulat: quod in humidiori autem, minus: quatenus natura naturæ interest. Siquidem producta carnem, ei quæ antea erat, similem esse oportet. Iam verò, si medicamen vlcere admotum profuerit minime, continget utique id, aut quod exiccarit impensius (hoc enim cognoscitur ex insigni vlcere puritate) aut quod parcius id sit molitum: quod sanè ex ipsius vlcere sordibus facile coniiciemus. Quare haud magno negotio ex notis ipsis corrigemus siccitatis medicamentum & defectus, & exuperantias. Atque hæc de cavitatis quæ vlcere inest, curatione, sit dictum. Propria autem curatione vlcere (est enim hoc commune simularium atque instrumentarium particularum vitium) tum à laborantis particulæ temperamento, tum à medicamentorum proficiscitur facultate. Cæterum ambo hæc, à tractatione de elementis pendente: quum nimirum genitura corruptelæque quatuor qualitates sint causæ. Quo circa, nec simularium, nec instrumentarium partium licet curationem attingere, absque naturali scientia. Sed iam ad vlcere, quod solum consistit, curationem transire, tempestivum videtur. Fuerit autem solum, si neque affectus ullus simul adsit, nec symptoma. Igitur dum solutio cutis contingit, citra fluxionem, aut intemperiem, aut cacochymiam, aut cavitatem, aut aliquam ipsius cutis deperditionem, quemadmodum ubi à telo aliquo acuto ipsa cutis convulneratur, vlcus ipsum est & dicitur simplex, tantumque agglutinationem desyderat. Quippe si commissæ simul sint cutis oræ: nulla intercedet cutis diuersi generis: quemadmodum in eo repleto, planoque reddito. In quo scilicet oræ vlcere se non contingunt: sed totius vlcerate partis cuticula amissa est: quæ utique prius restituere, quæ ora iungantur oportet. Quoniam igitur in simplici vlcere sola di-

Vlcere propria
curatio unde
proficiscatur.

4.

Genitura corruptelæque, quatuor qualitates sunt causæ.

Vlcus simplex
solum agglutinationem desyderat.

Diductæ partes in unum quibus modis adduci possint.

Glutinatoriū medicamentū plus siccet oportet, quā quod carnē producit.

visio proponitur, diducta labra coniungi, coniuncta quæ manere oportet. At verò ex diductis corporibus, alia quidem per se: alia aliorum ope coniuncta manent. Per se quidem, quæcunque secum concreverunt, coalescuntque: ut caro, & quæ ex carne constant. Aliorum autem ope, tum quæ colligantur, tum quæ vinculo aliquo continentur: ut ossa & quæcunque sunt dura. Est autem, sicuti in cavis ulceribus, ut producaturo caro, ita in simplici ulcere, ut ora ipsæ mutuo coalescant, natura opifex causat: ita, ut si quæ disident, in idem adamussum componas, citra omnem reliquam extrinsecus molitionem coalescant. Quæ diducta sunt, in idem adduces, aut vinculo ex duobus initiis circumdato, aut futura, aut fibulis impositis: aut horum quibusdā: aut omnibus. Expediit autem, quod circumjicitur, nec molle nimium sit, quo videlicet tutò contineat: nec rursus ita durum, ut premendo offendat. Circunductio etiā ipsa, nec ita laxa sit, ut nihil efficiat: nec ita vehemens, ut dolorem premendo excitet. Hac itaque medendi ratione, quale diximus, ulcus simplex coibit. At si ob magnitudinem eius, vel ob intercidentem saniem, vel ob dolorem, aut insignem imbecillitatem particulæ, vel denique ob inclusum aerem, disiectæ partes exacte ad invicem usque coniungi nequeant, eiusmodi sanè ulcus ex sola partium cōmissione agglutinari omnino non potest. Quare medendum prius est illis impedimentis, aliquo medicamento siccante: quod quidem si qua sanies iam subsit, absumat eam: & si qua in vacua loca influxura est, hanc prohibeat. Etenim medicamentum glutinatorium, aut omnino carnis generatione non eget: aut planè exigua: ac proinde plus siccet oportet, quā quod carnem producit. Præterea, quum carnis productivum medicamentum, facultate extergendi opus habeat, quæ non modò redundantiam humoris siccet, sed etiam expurget sordes: glutinatorium certè nec deterget,

nec expurgat, sed contrā prorsus substantiam omnem in idem cogit: cuiusmodi facultatem habent medicamenta ea, quæ austera, & astringentia vocantur. Quo circa, vbi carni gignendæ studemus, maximè cauendum est à medicamento astringente: vtpote, quod fordes vlcerib⁹ arctius affligat, quā vt facillè possint elui. Vinum igitur, omnis vlceris, quatenus vlcus est, optimū medicamentum existit. Porro ipsa medendi method⁹ procedet nobis bellissimè, si de singulis simplicib⁹ seorsum aliquid præceperimus: post verò, de compositis omnibus alteram aliquam methodum explicarimus. Quā quidem si ingrediamur viā, omne vlcus tum siccari, tum debere astringi inueniemus: non tamen detergeri. Contra, cavitatem in carne, siccari quidē postulare, & abstergeri: minimè autē astringi. Cæterum quō corporis natura est humidior, tanto medicamentis minus siccantibus eget. Quanto autem siccior, tanto rursum quæ vehementius siccant, magis quæ astringāt, desiderat. Iam verò vlceri mediocriter cauo, statim quicquid volumus applicamus, siue siccum id, siue humidum medicamentum existat. At in vulneribus quorum maior profunditas est, id non licet. Etenim & cerussa & lithargyros siccant, astringunt quæ; modicè: ad vlceris tamen fundum vis eorum nō peruenit, nisi humori cuiuspiam misceantur. Porro quemadmodum cauum vlcus vt repleatur, carnis generationem (cuius materia sanguis est) postulat: sic plenum, vt perducat ad cicatricem, generationem cutis, quæ ex carne est, non vnionem tantū, desiderat. Verū caro eadem specie cum ea quæ periit, gigni in cauo vlcere potest. Cutis talis omnino, qualis erat quæ periit, prorsus restitui non potest: sed simile quiddam cuti, & quod eius officium suppleat, potest. Etenim quū cutis carne ipsa tum siccior, tum densior sit, certè si resiccarimus & astrinxerimus carnem, persimilem illam cuti redde-

Astringentia
medicamenta
cur fugienda,
vbi carnem p
ducere est ani
mus.

Vinum omni
vlceri optimū
medicamentū
esse.

Vlcus oē sim
plex tum sic
cari, tum astringi
debere.

Cauum vlcus
esse siccādum
& abstergen
dum;

Vlcus in humi
diori natura
minus siccandū
eē: in sic
ciori autem ve
hementius.

Vlcus tum ca
uum, tum ple
num, quid po
stulent.

Cutem similē
ei quæ periit
restitui nō pos
se.

5.

Cutis gignē
dæ ratio.

Cicatricē indu
cturum medi
camentum qua
le nam esse de
beat.

Cicatricē indu
centia medica
mēta quæ sint.

6.

Excreſcentia
carnis in vlce
re a vehemen
ter ſiccātibus
medicamentis
exeditur.
Naturæ ope
ra quæ.

Carnem minu
entia medica
menta.

Carnem exe
dentia medica
mēta reddi mi
nus acia ſi cō
burantur: mi
nuſq; adhuc ſi
abluta fuerit.

mus. Cæterū multo ſiccior quod cicatricem inducat
q̄ quod agglutinet, eſſe oportet medicamentum. Quā
do quidem glutinatur, ſolum id propoſitū eſt, vt eius
quod ſecundum naturam eſt, redundantia conſumat
qui autē cicatricem inducet, non hoc modo, verū etiā
vt ei quod ſecundū naturam ſe habet, aliquid deradat.
Galla igitur imatura hoc loco, & malicoriū, & Aegy
ptiæ ſpinæ fructus, modicē ſiccantia pharmaca ſunt.
Chalcitis, & æs uſum, & æris ſquama, & miſy, multo
his valentiora exiſtunt: miſy quidem & chalcitis, præ
cipuē: mitior autē æris ſquama: atq; etiā hoc initius æs
uſum: præſertim ſi ablutum fuerit. Sed hoc quidē ad
ſpeculationem de cōponendis medicamētis pertinet:
quæ medendi ſequitur methodum: quemadmodum
ipſam præcedit, ſympliciu pharmacoꝝ notitia. Deinceps
autem agamus de excreſcentia carnis in vlcere,
quæ morbus in magnitudine exiſtens, primo omniū
ſui ablationē indicat. At hæc, ſola vehementer ſiccant
tium medicamentoz ope perficitur: haud itē naturæ
opera: contrā q̄ in carne reſtituenda, aut glutinatione
res habuit. Hæc enī, ipſi naturæ ſunt opera, nec aliud
medicamenta moliantur, q̄ ſubmouere illa, quæ actio
ni eius obſtant. Porro medicamenta carnem minuē
tia, proximā tū his ſunt, quæ valenter detergunt: tum
iis quæ cicatricē inducunt. Cæterū miſy & chalcitis, ſi
humidæ naturæ applicentur, potius carnē exedent, q̄
cicatricē inducant: niſi fortē in pollinem admodum te
nuē reſectis, parciffimē illis quiſpiā vtatur. Nā ſic im
poſita, partibus cicatricē conciliant. Quod ſi minuire
quæ ſupercreuere ſtudent, liberalius ſunt imponēda.
Aerugo autē, magis adhuc q̄ hæc, minuire carnem po
teſt: ita vt genus eoz quæ cicatricē inducunt, prorſus
egreſſa videatur. Iā verò, ſi exuras hæc omnia, vt mi
nus acia, ſic etiam ad cicatricē inducendā ipſa reddes
aptiora. Si verò etiā laues, adhuc euadēt mitiora. Hoc
autem

autem semper curantis animo hæreat, non omnem naturam eadē remedia requirere: sed infirmiores, mollioresq; , mitiora: validiores siccioresq; valentiora. Quare natura ægri in primis venit considerāda. Quā autē cuiusq; naturæ proprietas ineffabilis sit, nec exactissima scientia cōprehensibilis, ac præterea cuiusq; hoīs propria curatio habeatur, is erit optimus cuiusq; particularis ægritudinis medicus, qui iam eam methodum cōparauit, ex qua & dignoscere naturas possit, & coniectura consequi, quæ sint cuiusq; propria remedia. Vex legitimi vlceratorū partiū tēperamenti, quoties eas vel carne implere, vel glutinare, vel cicatrice inducere studes, maior tibi sollicitudo erit. Nā si ipsa ex ulcerata caro calidior sit, aut frigidior æquo, utiq; melam exigit, quæ nō modē moderatē siccet, sed etiā in tantū calfaciat, refrigeret ue, in quantū subiecta caro à naturali suo recessit habitu: quā fieri nō possit, ut in vlcere vel carnis productio, vel sinus impletio, vel agglutinatio, vel cicatricis inductio, rectē vnq; cedat, nisi subiecta caro pro naturali modo se habeat. Vt igitur si phlegmone vnā cū vlcere vrgeret, priusq; hæc esset discussa, nemo id vel carne implere, vel glutinare, vel inducere cicatrice tentaret: ad eūdē (arbitror) modum, etiā si sine phlegmone sola intēperies subsit, nullum horū fore prius sperabimus, q̄ illa fuerit sanata. Cauenda tamen sunt interim imodicē quum calfacientia, tum etiā refrigerantia. Ergo hyoscyamum, mandragorā & cicutā, ceu supra modū refrigerantes herbas vitabis: tametsi siccant eæ quoq; , quantū sit vlceri ex usu. Resina verò, & pix, & asphaltus, q̄q; modicē siccant, imodicē tamē sunt calida: ideoq; eis solis vtetur nemo, nec aliter, nisi admistis cum leuiter refrigerantibus, vnum ex omnibus medicamen fecerit, quod sit tēperatum. Inspiciunda quoq; est, & aeris nos circundantis tēperies. Siquidem veluti medicamētum quid-

Tomus. III.

Y y y

7.
Naturam ægri in primis esse considerāda. Medicus cuiusq; morbi optimus, quis sit dicendus.

8.
Vlcus rectē curari nō posse, nisi subiecta caro pro naturali modo se habeat.

Vlcera curaturus cauere debet ab extreme calfacientibus atq; refrigerantibus.

Aeris tempera-
turam ad vlce-
rum curationē
esse expendē-
dam.

9
X. Naturaliter se
habentia cor-
pora, similia si-
bi, præter na-
turam autē, cō-
traria postulat

Siccæ partes
quæ sint.

Vlceri sordidi
& caui curandi,
methodus.

dam is etiam corporibus nostris forinsecus incidens, ubi immodicus calore, vel frigore est, sanationē moratur. Danda igitur opera est, ut medicamenta eius excessui occurrant. Ideoq; Hippocrates in calidiorib⁹ anni tēporibus, iis quibus frigidior facultas sit, medicamētis utitur: calidioribus p^{er} frigidiora. Iā verò quēadmodū hūidior natura, humidiora: siccior sicciora medicamēta exigebat: ita nūc, calidior calidiora: frigidior frigidiora regret: contrariā scilicet semper iis, quæ p^{er}ter naturā, & quæ secundū naturam sunt, indicationē præstantibus. Quippe quæ secundū naturā sunt, similiū sibi indicatiua sunt: quæ præter naturā, contrariorū: si modò illa seruari: hæc submoueri est necesse. Quod verò ad contrarias indicationes pertinet, si q^{uo}to ægri tēperamentū iusto est humidius, tanto particula iusto sit siccior, tale adhibendū est pharmacum, quale si vlcus in mediū temperamenti particula, corporis medio critere tēperati, consisteret, adhiberemus. Sin autē particula fuerit * siccior iusto, q^{uā} corporis tēperamentum sit æquo humidius: utiq; in tantū intendi siccitatē medicamenti conueniet, q^{uā} tum particulæ tēperamētum, totius tēperamentū excedit. Veluti si exulcerata pars, quatuor numeris sit siccior medio temperamēto: ægri autē natura gradibus tribus humidior: manifestum est, particulam quæ nūc exulcerata est, siccior vno gradu desideraturā medicamentum, q^{uā} quæ sit tēperata particula. Simili modo & de aliis excessib⁹ licet tibi ratiocinari. Porro sicciore particulæ sunt, quæ minus carnosæ existunt: cuius generis sunt, quæ circa digitos articulosq; habentur: p^{er}terea, quæ circa aures, nasum, oculos, & dentes cōsistunt: atq; ut semel dicā, ubi crebræ cartilagine, & mēbrantulæ, & ligamenta, & ossa, & nervi adsunt: adeps verò & caro, vel omnino nulla est, vel perexigua. Ordo autem curandi vlceris sordidi & caui, à sorde expurganda orietur: quum nec glutinari

quicq̃, nec carne impleri possit, priusq̃ purum fuerit. Secundum locum exiget cavitatis sanatio. Tertium cicatricis obductio. Quod si vnā cum illis vel phlegmone, vel erysipelas, vel gangræna, vel intēperies aliqua simplex, cōposita ue, partem infestet, nisi quis prius eā sanarit, vlcus implere carne non poterit. Carnis siquidem generatio ex subiecta, quæ sana est, ortū ducit. Ex ea verò, quam premit phlegmone, quæq̃; intemperata est, & egrota, gigni caro noua nō potest. Etenim iusta subiecta carnis tēperies, causæ rōnem habet: vt quæ concrefcere secum, quod vlceratū est, faciat, & cavitatem impleat. Puritas vlceris, rationē eius sine quo nō: atq̃ hanc sordes interpellans, curationem moratur. Habet autem & vlcus ad cavitatem, rationē eius sine q̃ non: quandoquidē si vlcus cicatrice fuerit obductū, nō amplius cavitatis impleri carne poterit. Ergo si phlegmone, & cavitatis, & vlcus, & sordes, in eadem particula simul adsint, primo phlegmonem, secundo loco sordem, tertio cavitatē, & quarto vlcus sanare oportet. Cæterum affectus vnde primum maximeq̃; imminet periculū homini, hic debet primus curari: atq̃ etiam solus interdū: veluti si puncto capite musculi, conuulsio, quæ congruentiū omniū medicamētōrū vim respuit, accidat, præciso per transuersum toto musculo, conuulsionem quidem sanaueris: aliquem tamen ex particulae motibus vitiaueris. Ad eundem modū, quum ex vena, arteriæue sanguis immodicē profluit, si totū vas per transuersum præcideris, vlcus quidem eius postea sanare non poteris: periculum tamen, quod ex profluvio sanguinis impendebat, sustuleris. Iā nernuum punctum sæpe cogimur transuersim præcidere, quoties vel conuulsiones, vel deliria, vel ambo magna, ægreq̃; sanabilia, superuenire vulneratiōi cernimus. Similiter vbi luxatio cum vlcere in aliquo maiorum articulorū incidit, vlcus sanamus: luxationē autem insanatam re-

Carnis generationē ex subiecta carne, si sana sit, fieri,

Puncto capite musculi, si conuulsio oriatur imedicabilis, scindendū esse totum trāsuer sim musculū. Sanguinē fluentem imodice, suppressi, si p̃ trāsuer sum totum vas præcē datur: vlcus tamen eius postea sanari nō posse.

Nervus quando trāsuer sim secandus.

Luxatio cum vlcere quādo debeat insanata relinqui.

Differētia nul-
 10. **lius pōt, qđ p**
se cōsistere po
teſt.

Vlceris ſimpli
cis dīrīe pro-
priæ vnde ſu-
mantur.

Effluxus moli
endi ratio ī iis
vlceribus quæ
apte expurga
ri nō poſſunt.

Deligandī vl-
ceris ratio.

linquimus. Nā si hanc quoq; sanare conemur, conuul-
 siones haud dubiè sequentur. Primus igitur medendi
 in hisce est scopus, ille qui veluti à causis sumitur, eius
 quod est futurum: alter, qui ceu rationem obtinet, ei⁹
 sine quo non. Tertius deniq; is de quo nuper diximus,
 qui ad id quod vrget dirigitur. Porro quod consistere
 seorsum, & per se potest, id nullius vnq; alterius differē-
 tia fuerit, sed quod alteri accidit, nec seorsum p se con-
 sistit. Quamobrem vlcus, phlegmone, gāgrāna, & pu-
 tredo, quum seorsum & per se consistere possint, affe-
 ctus quidam præter naturā potius dicenda sunt, q̄ vlce-
 ris differentia. At magnitudo, paruitas, æquabilitas,
 inæquabilitas, tempus, & figura, ex eorū numero sunt
 quæ aliis accidūt: ac proinde ab iis sumuntur propriæ
 simplicis vlceris differentia. Indicatio autem curatio-
 nis à differentiis fit, sed non omnibus. Nam nec recēs
 nec verus vlcus per se indicat aliquid. Siquidem quod
 vlcus tantum est, omniq; alio affectu liberum, siue re-
 cens, siue antiquum sit, eandem semper curationem
 desyderat: nihil planè proprium indicante discrimine
 eo, quod à tempore sumitur. At si cavitatem altè recō-
 ditam sub cute habeat, consyderare oportet, vtrū ea
 ī superiore parte sit sita, vt sanies ex ea prona effluat:
 an in inferiore, sic vt illic sistatur. Eius igitur cui efflu-
 xus patet, eadem quæ aliorum curatio est. Cui nō est,
 huic ipsi moliamur effluxum quendam oportet. Eius
 duplex ratio est: aliās tota cavitare desecta: aliās in fun-
 do tantum aperta. Quando verò harum alterutra sit
 ineunda, docebit tum locorum ipsa natura: tum verò
 vlceris magnitudo. Si nanq; & loca ipsa periculosam
 sectionem faciunt, & vlcus magnum fuerit, in fundo
 aperire, magis expedit. Sin contrā se habeant, perſcin-
 dere præstat. Deligatio verò eius incipiat quidem su-
 perne, sed finiatur infra: vbi scilicet patet effluxus. Iā
 verò trāsversa vlcera, q̄ eorum labra magis dissideāt,

METH. MED. LIB. IIIL.

à seseq; absint, diligentius coniungi postulant: ideo q; tum futuris, tum fibulis, in eis est utendum. Quæ verò per longitudinem musculorum sunt facta, hæc, si duplici initio deliges, nec futuris egebis, nec fibulis. Sin aliter deligare placebit, vel fibulis, vel futuris utere. Sufficient autem paucissime omnino futuræ. Et magna quædam vlcera, iis quæ valentius siccet medicamentis curabis. Parua verò, vel quæ moderatè siccant, abunde sanauerint. Cæterum profunda vlcera, eadem etiam sunt magna: voluntq; tum à duobus initiis deligari: tū verò nec labra sua præpropere glutinari. At quæ profunda multum, longaq; sunt, vt duplici ratione sunt magna, sic duplicem quoq; præstant indicationē. Itaq; & quæ valenter siccant postulant, & ne immaturè labra coniungas: & vt à duobus initiis deliges: & vt altis futuris conluas.

341
Transuersa vlcera diligentius q; recta iungenda esse.

GALENI PERGA

MENI DE MEDENDI

METHODO. LIB. IIIL.



ST Itaq; vnum morborum genus, diuortium continui vocatum. Quod quidē in carnosā parte, vlcus: in osse, fractura: in neruo, cōuulsio appellat. Eiusdē generis sunt auulsio, ruptio, & contusio: illa quidem, in ligamēto: hæc in vasis, musculisq; ex violento ictu, vel graui casu, vel alio quopiam valente motu excitat. Ecchymosis verò vt plurimum vnā cum contusione & ruptione incidit. Fit autem aliquando & ex oris vasorū apertione, quæ Anostomosis dicit, & ex ea quā Diapedesis vocant, & ipsam existentem solutæ continuitatis aliā speciem. Iam verò, & ex erosione etiam soluitur inter

Vnitatis solutio.
Vlcus.
Fractura.
Conuulsio.
Auulsio.
Ruptio.
Contusio.
Ecchymosis.

Anastomosis.
Diapedesis.

Yyy iii

Erosionis cau-
sa,

Vlceri curan-
do quæ requi-
rantur,

Vlcera cacoe-
the cur talia
evadant.

dum in animalis partibus continuitas. Vex is iā mistus affectus est. Porro erosio, si intrinsecus ab ipso animali proueniat, vitiosi succi est soboles: sin extrinsecus, aut a valentibus medicamentis fit, aut ab igni. In vniuersum autem, simplices affectus à compositis distinguere oportet: quū simplici morbo simplex curatio adhibenda sit: composito verò, non simplex. Igitur omne vlcus, aut solum atq; per se, nullo nec cū eo simul inuadente, nec ipsum præcedere, aut sequente alio affectu, partem infestat: aut cum alio quopiā vno, pluribus ue coniunctum: quorum alii, non modò statim ab initio excitant vlcus, sed nunc etiam maius efficiunt: alii, eius sine quo non, vt ad curandi opus, rationem obtinent. Cæterum qui vlcus maius efficiunt, sub mouendi è corpore sunt, aut peruincendū id, quod inducunt, incōmodum. Hoc autem, si affectus exiguus sit, fieri licebit facile: si verò magnus, duci ad cicatricem vlcus non poterit, prius q̄ illi affectui subuētum fuerit. Ergo omne vlcus subiectam sibi carnem præditam naturali dispositione, optat: & ne quid alienum inter oras conglutinandas intersit, quod curationem morari possit. Subiectæ verò carnis affectus, causæ rationē obtinet: ad id quod efficit. Quippe ex hac, & per hanc tum quæ disident, glutinatur: tum quæ caua sunt, carne implentur: quare pro natura sua se habeat oportet, quo hæc vtraq; cōmodè perficiantur. Rectè autem illa se habuerit, si proprium temperamentum tueatur. Itaq; necessum est ad vlcera tum glutinanda, tū carne implenda, temperatam esse subiectam carnē. Nec sat hoc ipsum videtur esse, nisi etiam qui affluit sanguis & probus sit, & quantitate mediocris. Quippe ægrè sanabilem, rebelliumq; vlcera, alia ob intemperiem carnis exulceratæ: alia ob affluentē humorem fiunt talia. Caro autem ipsa, interdum solis qualitatibus naturæ modum egreditur: interdum accedente tumore præter natu-

ram. Iam humor confluens, aut qualitate, aut quantitate, à naturæ modo discedit. Interdum verò miscent dictorū affectuum aut aliqui, aut etiam pariter omnes. Ac carnis quidem intemperiem, si squallens siccaq; videatur, aqua temperata fouens, humectāsq; donec rubescat, attollaturq; in tumorem, corriges. Si verò ultra perfuderis, id quod attraxisti euocabis: ac proinde nihil profeceris. Quinetiam medicamēta humidiora, q̄ sanæ carni, adhibeantur. Si verò humidior q̄ pro naturali habitu caro fuerit, contraria ratio ineunda est, ac medicamentorum facultas ad siccius transferenda: aqua verò nullatenus admouenda: sed si lauandum vultus videtur, vinum, aut posca, aut decoctum austeræ cuiuspiam herbæ, præparandum. Eodem modo & calidiorē, q̄ par est, carnis habitum refrigerabis: & frigidiorē calfacies. Agnosces verò horum utrūq; partim colore, partim tactu, partim laborātis sensu. Quippe aliās vstionem se sentire fatentur: aliās manifestum in particula frigus: gaudentq; vel frigidis medicamentis, vel calidis. Et aliis quidem rubor levis insidet: aliis color magis albicat. Partium porrò quæ cum aliquo præter naturam tumore exulceratæ sunt, earum prius sanandus est tumor. Vbi labra tantum vlcis decolorata duraue plusculum fuerint, excidenda ea sunt ad sanam vsq; carnem. Quum verò altius id malum serpit, deliberatione est opus, excidendum ne omne sit, quod præter naturam cernitur: an temporis spatium curādū: qua in re certè consulendus etiam est æger. Iam verò, si prauus humor in particulas confluens exulceratas, nec vberior sit iusto, nec multum excellat malignitate, auerti hunc, atq; repelli conueniet: astrictis scilicet, refrigeratisq; iis particulis, quæ ante exulceratam consistunt. Inchoanda etiam deligatio est à laborante particula, deducendaq; versus sanam. Quæ autem vlcibus ipsis admouent pharmaca, siccant valētius oportione.

Carnis sicca intemperies, quomodo corrigenda.

Carnis humida intemperies quomodo corrigenda.

Carnis intemperies quomodo dignoscenda.

Vlcis labra quando excidenda sunt.

Æger quomodo consulendus.

Humor in particulas confluentis exulceratas, quomodo auertendus & reprimendus sit: & qua ratione.

Vyy iiii

tet, quæ simplici applicantur vlceri. Quod si fisti, cō-
pesci q; medicamētis influxus nequeat, causa eius inue-
stiganda est, atq; hæc prius adimenda. Ac si quidem ob
partis, quæ fluxum recipit, imbecillitatem aliquam id
contingat, huic nimirum medendum est. Imbecillitas

**Imbecillitas p-
tis ab intempe-
rie nascitur.**

autem partis, omnino ab intemperie nascitur: non ta-
men ab omni: sed ab excellentiori: quæ sanè per cōtra-
riam est abigenda. Vbi igitur intemperiem ipsam sana-
ueris, te ad curandum vlcus conuerteris: non aliter pla-
nè nunc curata intemperie, q; si incidisset citra vlcus.

**Varices prius
sanandas esse,
q; vlcus ab eis
fluxū recipiēs.**

Si verò ab alia quauis particula, vel etiam à toto cor-
pore, vitiosus aliquis humor influxerit exulceratis par-
ticulis, medendum in primis est ipsius fluxionis radici.

3.

**Indicatio uti-
lis, nulla sumi-
tur a causa nō
permanente.
Procatactica
causarum
vna.**

Ita igitur & varices, quæ sæpe supra exulceratum lo-
cum sunt, prius sanabimus, vt deinde mox vlcus sanè
mus. Aduertendum autem est interim, nullam primiti-
uarum causarū, quas procatacticas vocant, nisi etiā-
num affectum producant, esse curationis indicatricem:
sed huius indicationem, ab ipso affectu initiū habere.

Siquidem à nullo eorum, quæ adhuc non permanēt,
indicatio sumi eius quod ex vsu futurum sit, potest. Est
tamen utilis causarum procatacticarum cognitio, ad
noscendos affectus eos, qui tum rationē, tum sensum
latent. Est itaq; rei quidem præsentis, curatio: futura
autem, prouidentia. Quod verò nec nunc lædit, nec
læsurum timetur, id ab vtroq; artis munere, tum eo
quod curat, tū eo quod prouidet, excessit. Quare nec
indicatio ab hoc ad curationem vlla: nec prouidentia
ratio sumitur. Si igitur à procatactica causa indicatio

**Indicatio cura-
tionis a causa
præsentem sumi-
tur.**

**Prospectrix ar-
tis p- duplex:**

4.

curationis nō sumitur, vtiq; manifestum euadit, quod
ab ea quæ præsens est, sumetur. Cæterum prospectrix
pars artis, est duplex: altera, quæ morbosum affectum
iam præsentem submouet: altera, quæ illum qui non-
dum vrget, prohibet. Porro contingit vlcera non sane-
scere, interdum quidem ob labra ipsa pessimè affecta:

METHODO MED. LIB. IIII.

345

interdum ob intemperiem particulæ, absq; vlllo tumore præter naturam: nonnunq; ob intemperantiã quidem, sed quæ cum tumore aliquo sit coniuncta: non tamẽ qui omnino sibi labra excidi postulet. Fieri etiã potest, vt superiacens varix, vel auctior lien, vel aliquod vitium iecinoris, vel imbecillitas exulceratæ particulæ (quæ ipsa quoq; intensa quædam est intemperies) vel totius corporis cacoehymia, vel plethora, vt vlcera minus sanescant, prohibeat. Quare causa ipsa, quæ cunq; illa sit, circuncidenda venit. Iã verò, vlcus omne cacoethe, hoc est malignantis naturæ, continuò & cauum sit est necesse, quũ ex erosione nascatur. Nunq; autẽ id genus vlcera, sicuti neq; alia vlla, calido acriq; medicamento exasperes, priusq; vniuersum corpus à recrementis liberares: quemadmodum faciebat imperitissimus Thessalus. Quippe eiusmodi medicamẽta omnia, cucurbitæ ritu ad se trahere à toto corpore sunt habilia. Itaq; nisi id prius vacuaris, materiam fluxiõis acri medicamento relinques. Etenim q; nec rectẽ sanare oculum ante totum caput, neq; hoc ante totũ corpus, vlla ratione liceat, tum philosophis, tum medicis vniuersis, qui methodo mederi sunt soliti, est in cõfesso. Voco autem methodum certam quandam vniuersalemq; viam, quæ sit omnium particularium cõmunis. Cæterũ notitiam quandam habeat oportet, tum similis, tum dissimilis, qui methodo quiduis molitur. At verò, etiamsi in singulis morbis priuata quædã esse methodus medendi videatur, cõmune tamen genus in omnibus vnum existit. Quippe in omnibus curationibus, vnum est methodi ipsius principium, quod ab affectus indicatione sumitur: viaq; etiã quæ ab eo principio ad finem vsq; perducit, est in omnibus particulis similis. Quæ igitur vlcera, omnibus ritẽ decenterq; factis, non sanantur, ea medici cacoethe, hoc ẽ, maligna, cõtumacia, rebelliaq; nuncupant. Protrahũ-

Vlcera sane, scere quæ prohibeant.

Vlcera exasperanda non esse prius q; vniuersum corpus sit purũ.

Methodus est certa quẽdam & vniuersalis via, omnium particularium communis.

Vlcera cacoethe, 5 the quæ dicantur.

Vlceris diuturnitas est succi vitiosi idiciū.

Vlcus omne, quæ ulcus est, vt sanetur mediocriter exicari postulat.

Putredinē ori-ri a calido & humido.

tur aſit, vbi quis illis, perinde ac ſi tantūm vlcera ſint, medetur. Cæterū ex diuturnitate ipſius vlceris, indi-
catio curationis non ſumitur: ſed ex ipſius particulari
affectu. Si ergo tantūm exulceratæ partes affectæ ſint,
ſi eas curaueris, continuo ſanaueris vlcus. Sin verò vni-
uerſum corpus prauo ſucco redundet, ſi hunc euacua-
ueris, idem haud dubiè molieris. Ac ſignum quidem vi-
tioſi ſucci, eſt ipſa diuturnitas vlceris: inuentio autem
eius quod expedit, non ex diuturnitate, ſed ex ſucci vi-
tio ſuggeritur. Quare tria hæc ſibi mutuò cohærent:
Signum, Affectio, & Curatio: Signū quidem, ipſa diu-
turnitas. Affectus, ſucci vitium. Curatio, eiꝰ vacuatio.
Veteres autē, vtpote breuitatis ſtudioſiſſimi, præter-
miſſo medio, interdum tertium ſtatim primo ſubiiciūt.
Veluti Hippocrates fecit, quum dixit. Tum ab inuete-
ratis vlceribus confert, vt aſſiduè ſanguinem eſſuere
facias, vtcunq; id opportunum videtur: non vtiq; cu-
rationem indicante diuturnitate, ſed ſanguinis vitio.
Porrò omne vlcus, quæ vlcus eſt, ut ſanetur, mediocri-
ter exicari poſtulat. Si verò etiam habeat ſecum affe-
ctum alium coniunctum, primò quidem illius curatio-
nem: ſecundò autem, ſuam propriam requirit. Sed de
curatione vlcerū, ſic verba fecit Hippocrates. Quod-
cūq; ulcus caſum, peruerſimꝰ ue acuto telo ē diuiſum,
medicamentum enæmon, & ſiccans, & quod ſuppura-
ri vetet, admittit. Sin caro aliqua telo tum contuſa, tū
cæſa ſit, huic ita medendum eſt, vt q̄celerrimè ſuppu-
ret. Nam & minus phlegmone urgebitur, & neceſſum
eſt, carnes, quæ contuſæ cæſæq; ſint, putrefactas & in-
pus verſas, liquare: poſtea nouam carnē produci. Quo
quidem ſermone nos docet, oportere omnia ſiccari, p̄-
ter ea quæ ſunt contuſa. Porrò omnia quæ putreſcunt,
ex calido & humido ſic afficiuntur. Ideoq; etiam ea ca-
taplaſmata quæ ex hordei farina conſtant, ceu quæ cal-
faciant, humeſcentq; , omnibus iis affectibus, quibus

moueri pus expedit, admouemus. Hordei namq; farina, ex aqua & oleo: itēq; panis, ex aqua & oleo: p̄terea fomentum multæ calidæ aquæ: & tetrapharmaci uis: omnia deniq; calfacientia simul & humectantia, pus q̄ celerrimè mouent. Sciendum tamen est, admoberi cataplasma calidum atq; humidum inflāmatiōi, haud q̄dem tanq̄ remedium ipsius (phlegmones namq; remedia facultatē sicciorē possident, vt verbascum coctū, & folia trifolii cruda, & epipatri folia cocta, & poliū) sed vt lenimen quoddā symptomatis. Ac proinde hordei farina, lenit quidem dolorem: minimè autē medetur inflāmatiōi. Igitur vel prauus succus nō amplius confluit ad partem exulceratā: aut etiānum fluit. Si non amplius fluat, ipsi tātūm quod laborat, est succurrendum: si quidem vel liuidum, vel nigrum, vel rubrū conspicitur, scarificando, ac sanguinē emittendo: mox spongiā sicciorē potius, q̄ humidiorē, superimponendo. Post hæc verò etiam siccantia remedia applicando. Ab his, si res postulat, rursus sanguinem auferendo, ac mox iterum eadem peragendo, donec parata sanitas sit. Quòd si labra vlcis dura, callosaq; appareant, etiam ea excindendo. At si alicunde humor ad partem fluat, fluxionis est occurrendum origini. Si verò valens aliquis morbus, vnā cum virium robore, affligat, vel si redundantis sanguinis concursus nō adsit, nemo est qui non sanguinem detrahat, qui utiq; in artibus operibus fuerit exercitatus. Quippe sanguinis redundantia haudquaq; sanguinem esse mittendum indicat: sed magnitudo morbi vnā cum virtute vegeta: exceptis tamē à sermone pueris. Etenim si quis etiamnum sanus, nec adhuc quicq; læsus, sanguinis redundantia grauetur, non statim huic mitti sanguinem est necesse: immo alii satisfacit inedia: alii cibi parcitas: alii soluta aluus, vel purgatio, vel frequentius balneum: alii sola exercitatio, vel multa frictio, abūdē fuit. Sed nec pur-

Pus mouentia quæ sint.

Inflammatiōi cur adhibeantur cataplasmata calida et humida.

Hordei farina dolorem mitigat

Sanguinē mittendum esse vbicunq; magnitudo morbi cū viriū robore conspirauerit, vel si sanguinis concursus non adsit. Sanguinis redundantia nō postulare sectionem venæ.

6.

*Purgationē in
sola cacochy-
mia nō admi-
nistrari cōmo-
de, nisi etiam
magnitudo ip-
sius morbi eā
postulet.*

*Vitia oīa trifa-
riā grauiā red-
duntur.*

*Vulnera arti-
culorum eua-
dere cacoethe.*

*Herpetes a bi-
lioso excremē-
to oriuntur.
Reuulsionē es-
se ad contra-
riā loca molie-
dam.
Deriuatio fa-
cienda est per
vicina.
Morbi magni-
tudinē eē sco-
pum sanguinis
mittendi, pur-
gationisq; ad-
hibendæ.*

gatio in sola vitiosi succi abundantia conuenienter ad-
ministratur, nisi etiam magnitudo ipsius morbi sit ipsi
cacochymia coniuncta. Sic enim vlceribus atq; vulne-
ribus omnibus quoties valida sunt, purgationem esse
utilem est professus Hippocrates, q̄ nimirum & insi-
gniter vacuet, & ad diuersum trahat. Vniuersa autem
vitia, trifariam grauiā validaq; redduntur: nempe, vel
propter afflictæ partis præstantiam: vel propter affe-
ctus magnitudinem: vel propterea q̄ sint cacoethe.
Vulnus igitur quod intra thoracē, peritonæum, ue pe-
netrat, non paruum periculum adfert: præcipuē si in-
teriorum quicq; sit simul conuulneratum. Quinetiam
cacoethe statim fieri, quæcūq; in articulis accepta vul-
nera sunt, id quoq; omnes ferē sciunt. Vbi enim ten-
dones, & nerui, & carne vacua, osculentaq; sunt loca,
hic doloris, vigiliarum, conuulsionis, & delirii pericu-
lum instat. Tum hæc igitur vulnera, tū quæ adeo sunt
magna, vt futuris aut ligaturis indigeant, purgationē
desyderant. Adhæc, quibus periculum corrumpendi
ossis impendet, ea utique non sunt absq; magnitudine
phlegmones. Quæcūq; verò exeduntur, ea tū cacoe-
the sunt, tum malorum succorum soboles. Herpetes
quoq; à bilioso excremento ortum habent: cæteraq;
diuturna omnia, ex huiusmodi quapiam causa proue-
niunt. Quare in omnibus his meritò purgare per aluū
iubet Hippocrates. Si igitur valenter etiamnum fluxio
irruat, reuellere ad contraria studebimus: utiq; si in su-
perioribus vlcus consistat, per inferna purgantes: sin-
autem in inferioribus sit, superiorem ventrem vacuā-
tes. At si iam fluxio restitit, atq; in membro inhæsit, de-
riuare per vicina magis expedit: quum & in propinquo
ra translatio, & purganti medicamento tum accessus,
tum attractus, è vicino, sit promptior. Magnitudo au-
tem morbi, ceu scopus quidam sanguinis detrahendi,
aut purgationis adhibendæ, à nobis constituenda est.

METHODO MED. LIB. III.

Quem sanè scopum inuenit primus omnium Hippocrates. Secundum cuius quidem sententiam, omni recens factò vulnere, nisi in ventre consistat, expedit ex ipso statim sanguinem plus minus' ue effluere. Quippe phlegmone sic minus tentabitur, tum vlcus ipsum, tū quæ circumposita ei loca sunt. Idem etiam confirmat, debere scilicet imitatoreni esse medicum, non tantum naturæ, sed eorum etiam, quæ quum sua sponte eueniant, conferunt: necnon conducere, si ab inueteratis vlceribus eorumq; circūiacentibus partibus, crebrò sanguis fluere cogatur. Porro quæ acuti sensus pars est, eā q̄ maximè seruare citra dolorem tentandum. Quæ verò parum acri sensu est prædita, hæc, si affectus ita suadet, valentiora præsidia admittit. Rursus principis quidem mēbri robur, seruari oportet. Quod tale non est, licet huic adhibere relaxantem medendi rationem. Quod verò ad positum pertinet, si ventriculus fuerit exulceratus, medicamenta bibenda sunt. Si gula (quæ transitus comestorum bibitorumq; est) nō semel, nec tota simul sumenda: sed paulatim, assidueq; lingenda, & sanè tū crassiora, tum magis lenta esse debet. Nā ex transitu, contactuq; vulneribus quæ illic habent, emolumentum accedit: non ex cōtinendo, & diutius adhærendo: sicut iis quæ in ventriculo sunt. Quæ verò vlcera in crassis sunt intestinis, iis quæ per sedem iniiciunt remediis, magis egent: quippe cui magis sunt propinqua. Quæ in tenuibus habentur (quoniam & longinquiora sunt, & medio situ posita)ambo requirunt: & quæ supernè sumuntur, & quæ infunduntur per sedē. Communis autem omnium internarum partium est indicatio, vt ea eligantur, quæ animalis naturæ maximè sint familiaria: siue cibi sint: siue medicamenta: fugiantur, respuanturq; his contraria. Quanq̄ in iis quæ foris sunt vlceribus, innoxius etiam taliū medicamentoz sit vsus, æruginis, æris vsti, æris squamæ, cadmiæ,

349

Vlceri recens
expedit vt ex
eo statim fluat
sanguis.

7

Gulæ exulce-
ratæ medica-
mēta esse pau-
latim, assidue-
q; lingenda.

Intestinis exul-
ceratis quō
succurrēdum.

Intro quæ pro
pinanda non
sint.

Mel crudum.

Austerū quid.

Acerbū quid.

Vlceribus in-
ternarum par-
tium q̄ prosint
medicamenta.

Vinum fugiē-
dum esse, vbi
flegmones su-
spicio adest.

Asperę arterię
vlceribus qua
ratione medē-
dum sit.

Potionis non-
nihil semp in
asperam dela-
bi arteriam.

Mel permiscē-
dum esse me-
dicamentis, quæ
thoracis
pulmonisq̄ vl-
ceribus insti-
tuuntur.

pompholygis, lithargyri, atq; cerussæ. Hæc igitur & similia, interioribus exhiberi non debent. Eligenda verò alimenta sunt, si quidem ad cicatricem perducere, aut ulcus glutinare studemus, tum austera, tum glutinosa, & quæ minimè rodant. Sin emundare, quæ modicè abstergeant: quod munus mel non coctum, præter cætera præstat. Ac voco sanè austera, id quod astringens dicitur: vt acerbum, quod impenitens est austerum. Ergo internis vlceribus opitulantur, hypocistis, balauitium, punicorum cytin, galla, mælicorium, terra Samia, Lemnium sigillum, rhois, rosarum succus, acacia, aliq; id genus, quæ citra incòmodum viscerum, præsidium internis vlceribus afferunt. Danda verò hæc sunt, ex aliquo astringentiū decocto: vel mali cotonei, vel lentisqi, vel clauiculorum rubi, vitis ue, vel myrtorum, vel deniq; ex vino aliquo austero. Cauendum tamē à vino est, vbi phlegmones suspicio adest. Sunt autem & præparanda id genus medicamenta, cū eisq; miscenda etiam, tum tragacantha, tum gummi: præsertim si ob gulæ vlcera exhibeantur. Sed & gargarizare quoq; iubendus est, qui ad fauces & parihsmia his vtetur. Ad vlcus autem, quod in aspera sit arteria, vt supinus q̄ diutissimè in ore teneat, ac omnes qui illic sunt musculos laxet, remittatq; præcipiendum. In fluit nanq; sic sensim & paulatim de medicamento aliquid sensibilibiter & manifestè in ipsam arteriam. Nam & quā naturaliter sese habet, scire licet potionis non-nihil illuc percolari. Semper autem cauendū est, ne largius quicq; & per mediam spiritus viam, in fluat: alioq; excitabit tussim. Iam verò medicamentis omnibus, quæ thoracis & pulmonis vlcerib; sunt destinata, mel admiscendum est. Quod quidem digestionis eorum in corpus, ac celeris trāsitus, veluti vehiculum erit, cum eo, q̄ neq; nocebit vlceri. Ad eundem modum, quoties in vesica & renibus consistit vitium, non solū mel

METHODO MED. LIB. V.

ipsum, sed etiam diureticorum aliquod, vlcera medicamentis miscere oportet. Cæterum partes exulceratæ, tum ex earum substantia, tum functione, tum utilitate, tum positu, tum figura, facile discernuntur. Itaque non modò illa quæ diximus, sed etiam complura alia, ex figura partium, posituraque indicantur. Etenim cathetere omnino probè uti nequeas, nisi & positum, & figuram totius vesicæ planè perspectam habeas. Ergo in hisce omnibus nò parum ad totam curationem locus affectus indicat. Porro valentiora medicamenta requirunt, affectus in alto delitescètes corpore, quàm qui in summa superficie consistunt. Ecchymosis omnis, vacuationem pro curationis remedio indicat. Quare calfacientibus huic, & modicè siccantibus medicamentis est opus. Quòd si ecchymosis altius descendat, non fuerit usus cucurbitulæ inutilis. Quod quidem instrumentum fuit à medicis, ad violentam attractionem, excogitatum. Ergo si euocatum celeriter ecchymoma sit, facile coalescet rupta ipsa caro. Sin longiore spatio, sordes multa subnascens, medium inter vlcera labra spatium occupat, ita ut iam coire ruptio non possit, sed tantum ipsa labra prope admoucantur.

§ § §

Diureticorum aliquod, melque ipsum miscendum esse medicamentis quæ ad vesicam & renes faciunt exulceratos.

Affectus in alto sitos, valentiora medicamenta requirere, quàm qui in summa superficie consistunt. Ecchymosis curationis ratio. Cucurbitulæ usus.

G A L E N I P E R G A

M E N I D E M E T H O D O

M E D E N D I. L I B. V.



ONSTRATVM igitur est, omne vlcus siccantia medicamenta requirere. Cæterum quod sinum habet, ut minus sanè quàm reliqua, sic ea quæ præter quàm modicè siccant, etiam abstergendi facultatem possideant, desyderat.

Vlcus cautum modo dice siccantia necnon detergentia postulat.

Glutinantia
medicamenta
qualia nā esse
debeant.
Cicatricē indu-
centia medica-
menta qualia
esse oporteat.
Excrefcens ca-
ro qualia re-
quirat medica-
menta.

Indicationes a
laborantis tem-
perie sumptas
diuerſam habe-
re rationem il-
lis, quæ ab ul-
cerum differē-
tiis ſumuntur.

2

rare. Quod verò coniungi ſibi labra poſtulat (cuius-
modi ſunt cruenta) huic tum quæ magis etiam ſiccet:
tum quæ citra abſterſionē leuiter aſtringant eſſe opus.
Iam, quæ vlcera perducere ad cicatricem poſtulāt, hæc,
non ſolum magis adhuc ſiccantibus, ſed etiam ſtrenuē
aſtringentibus remediis egere. Quod ſi caro eorum p-
ter naturā modum intumuit, acria & demolientia de-
ſyderare. Si quod verò aliud ſymptoma vlceri adiun-
ctum erat, ab eius natura curationis indicatio ſumeba-
tur: atq; ex hac rurfus petebatur remediorū facultas.
Si nanq; ſordes innasceretur, quæ hanc tollerēt opus
eſſe: eaq; omnia abſtergendi vim habere, multo ſanē
maiorē, q̃ ea quæ carne implerent. Ac ſi agglutina-
turum medicamentum eſſet, ſiccans, aſtringensq; id
eſſe debere. Si carne impleturū, ſiccans, & abſtergens:
atq; in ſingulis reliquorum, vti dictum eſt. Si verò intē-
perata ſubiecta caro eſſet, primum per contraria ſuc-
currendum eſſe illius intemperantiæ. Nihil ſiquidem
redire ad propriam naturā poteſt, ſine iis quæ ipſi fa-
cultatē habent contrariam. Conſyderandas præterea
eſſe & ipſius intemperantiæ cauſas: ac primum quidē
medendum eſſe cauſæ quæ adhuc intemperiem foue-
ret: poſt hanc verò, & ipſi, quæ iam facta eſſet, intēpe-
rantia. Oſtendimus autem, tum ab ulcerū differentiis
diuerſas indicationes pberi: tū eas quæ à laborantis cor-
poris tēperamento ſumuntur, diuerſam ab his habere
rationem. Siquidem illæ, quæ ex iis, quæ ſunt præter
naturam, ſumantur, oēs cōtraria eſſe adhibēda dictāt:
hæc, quum ab ipſa natura capiantur, ſimilia. Nec illud
omniſimus, ex præcellentia membri, aut contrario ſta-
tu, itemq; ex ſenſu acri, hebetē ue, diuerſum medican-
di conſilium peti. Quum autem non modò in ſimilari-
bus, ſed etiam in organicis partibus ſolutio continui
oriatur, remediorum indicationes, aliæ quidem à ſimi-
laribus, aliæ ab inſtrumentalibus deſumuntur. Cæteræ
quandoquidem

quādoquidem satis superq; de iis vlceribus quæ in car-
 nosis accidunt partibus differuimus, tempestiuum vi-
 dei nunc de illis agere, quæ in arteria, vena, & neruo
 contingunt. Ergo si cui arteria, vena, ue magna sit vul-
 nerata, copiosum sanguinis profluuium subito super-
 uenit, & glutinari id vulnus difficile quidem ī vena po-
 test: in arteria autem (sicuti nonnullis medicorum est
 visum) fortasse omnino non potest. Sanè profluit ex
 vena aut arteria sanguis, aut referato earum ore, aut
 tunica earum diuisa, aut transcolatus, siue sudoris istar
 transfusus. Porro diuiditur ipsa tunica aut vulnerata,
 aut contusa, aut rupta, aut erosa. Anastomosis (hoc est
 referatio) accidit, propter tum vasis imbecillitatem,
 tum sanguinis qui ad os eius impetu ruat, copiam: ad
 hæc, acrem quāpiam, quæ illic extrinsecus icidat, qua-
 litatem. Diapedesis verò, ex tunica rarefacta, & atte-
 nuato sanguine oritur. Accidere tamen potest, & ob
 gracilium vasorum os adaperitum. Quæ igitur vulne-
 rant, ea sunt acuta, atq; ad secādū habilia. Quæ contū-
 dendo soluunt, dura, grauiq; existunt. Quæ rumpūt,
 omnia tensionis interuentu id faciunt. Idem & inten-
 sior actiōis vehemētia facit: tum plenitudo illa quæ re-
 spectu vasorum dicitur: tum casus ab alto: necnō gra-
 ue quippiam durumq; incidēs. Ac si ex vulnere, vel cla-
more, vel casu, vel contusione, perruptū vas sit, utiq;
in iis, causa ipsa desit. Si verò ex abundantia, fieri po-
 test vt vas etiam amplius rumpatur, effectrice saltē
 etiamnum causa manente. Quare in tali affectu, q̄pri-
 mum est ipsa plenitudo vacuanda: dein, suppressus
 sanguis: ac demum vlcus curandū. Vbi verò effectrix
 causa iam desit, primò quidem sanguis sistendus est:
 ac mox vlcus sanandum: idq; obturato perrupto va-
 se, translatōq; aliorum quod per id ferebatur. Porro
 vlcus ipsum claudetur, vel labris eius, quæ disfidēt, in
 idem adductis, vel osculo ipsi^o obstructo. Adducēt in

Sanguis qua-
 tuor modis, ef-
 fluere a vasis
 potest.

Anastomosis
 vasorum vnde
 accidat.

Diapedesis
 causæ.

3.

Suendum arte
riæ aut venæ
vulnus nō esse
Vas apertum
obstrui quotu-
pliciter possit.

Sanguinem de-
ruiari ad vici-
na, & reuelli
ad contraria.

Menses reuelli
sursum, admo-
ta cucurbitula
mammis.

Sanguinem ex
dextra nare
fluentem sup-
primi, admo-
ta cucurbitula
hepati: ex sini-
stra autē lieni.
Sanguine per
nares fluente,
quando & qua-
lis secanda sit
vena.

Deriuandi mo-
di diuersi.

idem labra, tum nostrarum manuum opera, ubi sic ad manus ulcus se exhibet: tum per deligaturam: tum per refrigerantia, astringentiaq; remedia. Neq; enim sue- re fas est, arteriæ uenæ uel uulnus. Obstruere uasis osculum & sanguine ipso concreto, & iis, quæ foris illi ad- mouentur emplastris, linimentisq; necnon igne, & medicamentis inducentibus crustam. Potest etiam superimponi ulceri circūiacens caro, atq; ipsa in nonnul- lis uulneribus cutis. Auertitur autem sanguis, tum ad proxima deriuatus: tum ad cōtraria reuulsus. Deriuatio ad uicina loca fit, quum id quod per palatū uacua- tur, deriuatur per nares: reuulsio autem ad contraria, quum ad inferna reuellitur. Rursus, quod per sedem profluit, id deriuamus per uuluum, sursum uerò reuel- limus. Ita nanq; & natura ipsa facere solet. Mulieri enī (inquit Hippocrates) sanguinem uomenti, menses su- peruenientes remedio sunt. Hac de causa, si uel men- ses confertim eruperint, uel sanguis ab utero quoquo- modo profluxerit, sursum reuelles, cucurbitam maxi- mam suffigens mammis. Eandem ob causam, si ex de- xtra quidem nare profluat sanguis, eum retinet maxi- ma cucurbitula hepatis admodum: Si ex sinistra autem, lie- ni. Quemadmodum si per utranq; fluat, utriq; uisceri cucurbitulæ applicandæ sunt. Quod si resolutus adhuc æger non sit, etiam uena ex eodem cubito incidenda est, qui profusioni è directo respondet. Cæterum ubi paulum detraxeris, mox unam horam intermit- tens, rursus detrahes: post iterum, atq; iterum, pro la- borantis uiribus. Ad eūdem modum, quæ per aluum, fluunt, ea uel per urinas, uel per uterū deriuabis: quæ per urinas, ea uel per uterum, uel per sedem transfe- res. Pari modo, quæ per uterum erumpunt, uel per uri- nas, uel per aluum. Quæ uerò in oculis, aure, uel pala- to, fluxiones accidunt, earum ad uicina deriuatio per nares est. At reuulsio in iis quæ supra sunt omnibus,

deorsum semper agitur: sursum in iis quæ sunt infra. *Reuellendi rō.*
 Præterea à dextris ad sinistra: sicuti ab his rursus ad
 illa. Similiter ex iis quæ intus habentur, ad ea quæ fo-
 ris sunt: contraq; ab his, ad illa. Ergo & frictio contra- *Frictio.*
 positæ partis, potissimum per ea medicamenta quæ *Vincula.*
 calfaciant: præterea vincula arctiora, iis quæ ad cōtra-
 rium reuocant remediis annumeranda sunt. Non sec^o
 profectò, & naturalium meatuum qui positi ex aduer-
 so sunt, reclusio. Porrò vinculum ipsis profluentibus
 vasis iniectum, fluentem sanguinem sistit: nostriq; simi-
 liter digiti appositi: atq; adeò disidentium vulneris la-
 brorum ligatio, quam epidesmi vocant. Situs autem *Epidesis.*
 particulæ vulneratæ sit talis, vt & spectet sursum, & *Vulneratæ par-*
 ipsam indolentem conseruet. Si vas vnde sanguis pro- *ticulæ situs.*
 fluit, altius demissum sit, vnco attollendum est, modi- *Sanguis profluens*
 ceq; intorquendum. Quod si ne tunc quidem sistatur, *ex vasis demis-*
 ipsumq; vas vena fuerit, suppressendus est cataplasma *sis alius, quō*
 tis quæ ex frixa resina, & farinæ triticeæ tenuissimo *suppressendus.*
 polline, & gypso, aliisq; id genus confecta sunt. Sin sit
 arteria, aut vinculo amplexens, aut totum vas præci-
 dens, profluuium sistes. Sed vinculū etiam iniicere ma-
 gnis venis compellimur: interdumq; transuersim to-
 tas præcidere: vbi rectè ex profundissimo loco assur-
 gunt, ac præsertim per angustias quasdā, vel per prin-
 cipes partes. Tutius tamen est vtrunq; moliri: & vincu-
 lum vasis radici iniicere: & quod deinceps habetur, præci-
 dere. Vasis radicem voco priorem eius partem, quæ
 vel iecinori est propior: vel cordi. His peractis implē-
 dum carne vuln^o est, prius q̃ vinculum à vase decidat. *4.*
 Ita q; sistendo sanguini lōgè sunt commodiora empla-
 stica, q̃ inducentia crustas: quandoquidem in his est ve-
 rendum, ne vbi crusta deciderit, rursus sanguinis pro-
 fusio ab ipso vase excitetur, quū vas magis nudatum
 carne, q̃ pro ipsius naturali habitu derelinquat. Siquidē
 generatio crustæ, ex subiectis sit, circūpositisq; corpo-
Sanguini sup-
primendo cur
emplastica sine
aptiora crusti-
ficis.

Sanguini sup-
primendo op-
timum cata-
plasma.

Dolor, omniū
maxime tum
ipsum proflu-
uium excitat,
tum phlegmo-
nas auget.
Māna thuris.
Thus.
Mastiche.

Cauteris, cau-
sticisq; in qui-
bus cogamur
vii.

ribus semiustis. Optimum igitur omniū quæ noui me-
dicamentorum, quo etiam ad cerebri membranarum
necnon sphagitidum venarum hæmorrhagias tutissi-
mè utemur, est quod subiiciam. \mathcal{R} . Thuris partem. ss .
Aloes partē. ss . Misceantur ita cum oui candido, vt per-
ueniant ad crassitudinē mellis. Postea verò leporis mol-
lissimis pilis excepta, tum vasi, tum vniuerso vlceri,
liberaliter admoneatur. Alligandū autem id forinsec-
fascia est ex tenui linteo. Cuius fasciæ primi quatuor
quinq; ve amplexus, ipsi profluenti vasi iniiciuntur:
ducenturq; mox versus eius radicem: nisi in quibus
partibus id non licet: vt in cerebri inuolucris. His
factis, ubi tertio die solueris, si tutò adhuc medicamen-
tū vlceri adhæret, aliud rursus superimpones, deligabisq;
ut antea, similiter. Quòd si prius linamentum decide-
rit, impones alterum, ac sic, quoad carne muniatur, cu-
randum ipsum vas est: necnō, à principio ad finē vsq;
vulnerata particula, mediocriter supina seruanda. Vi-
tādum autem est ne dolor incidat, ac rursus profluuiū
excitet: quum nihil sit, quod profluuium magis q̄ do-
lor proritet, & phlegmonas augeat. Iam manna thu-
ris magis q̄ thus estringit: est autem minus emplastica.
Constat verò in duris corporibus plus aloes immiscē-
dum esse prædicto medicamento: in mollibus autem,
plus thuris. Cæterum ubi medicamentū id facere ma-
gis emplasticum optas, deligere thus resinosis oportet:
quod quidē & mollius est, & candidius: mansumq;
non cōminuitur, sed partes suas sibi co hærentes tues,
vt mastiche. Maximam autem necessitatem vel crusti-
ficis medicamentis, vel ignitis ferramētis utendi aīad-
uertit, ubi ex erosione putrescētis alicuius, profluuium
sanguinis excitat: vt ī pudēdis & sede: quæ ptes, & pp
naturale humiditatē, & q̄ excrementorū canales sint,
ex leui occasione putrescunt. Vbi igitur totum quod
iam computruit sublatum fuerit, tūc in hisce opus est,

radicē ipsam exurere, idq; aut ferro candenti, aut medicamentis excitantibus crustari: sed quæ etiam facultatem astringendi possideant, qualis in chalcitide, & mysi, & atramento sutorio visitur. Porro quæ ex calce non extincta conficiuntur, ea utiq; valentiora his sunt: cæterum calx vim astringendi non habet. Excident igitur citius quæ ab his fiunt crustæ: hærent autē diutius, quæ ab astringētibus: quod utiq; longè est utilius. Quare nec festinare quidem debemus ad amolendas crustas, ubi hæmorrhagias periculum adest, nisi in illis tantum affectibus depascētibus, in quibus propter putredinem, candens ferrum admoveere corpori fuimus coacti. Porro qui è vasis profluit sanguis, aut propterea q̃ amplius non cōfluet, sistetur: aut quia occlusa diuisio erit: aut etiam ob vtrinq; causam: id quod tutissimum fuerit. At confluere prohibetur, & propter deliquium animi, & quum ad contraria reuellitur, & quum deriuatur ad proxima: & per refrigerationem, tum corporis toti, tum præcipuè partis affectæ. Hæc etiam ratio, frigida tum pota, tum parti foris affusa, sæpe hæmorrhagias suppressit. Idem etiam moliuntur, & posca, & vinum acerbum, aliaq; oīa quæ vel astringendi, vel simpliciter refrigerandi vim habent. Clauditur ipsa diuisio, si vel contrahatur conniueatq; id qd̃ diuisum est: vel obstruatur. Sanè contrahitur tum astrictione, tum refrigeratione, tum deligatura, tum vinculo exceptum. Obstruitur vel intrinsecus, vel extrinsecus. Et intrinsecus quidem, à concreto sanguine. Extrinsecus verò, tum ab hoc ipso: tum à linamento, & spongiis, & crustis, & medicamentis iis, quæ lentitia, crassitieq; sua, meatus obserant: adhæc, corporibus iis quæ circuniacent, propius admotis. Atq; hætenus de profluuiis sanguinis, quæ à partibus expositis sensui oriuntur. Nam quæ de profundo sanguinis profluvia erumpunt, ea nec vinculo nec deligatura sanantur.

Zzz iii

Adurentia simul & astringentia, q̃ sunt.

Crustas a causticis astringentibus excitas, herere diutius vlceri.

Refrigeratio totius corporis & particule affectæ, fluentem sanguinem suppressit.

Sanguinis pro-
fluuiis ex pro-
fundo erumpē-
tibus qua ra-
tione occurren-
dum sit.

Plantaginis suc-
cus remedium
optimū est
sanguinis effu-
sionibus.

Astringentia
medicamēta.

ris, veluti neq; candenti ferro: sed per reuulsionem, ac ad vicina loca deriuationem: necnon per cibū, atq; potionem, quæ & emplasticā vim sortiantur refrigerent q;: necnon per medicamenta astringentia. Pro differentia autem & proprietate partium quæ profluuium patiuntur, variis utimur instrumentis. Siquidem per clysterem, in intestina: per metrenchytas in vterū: in vesicam deniq; per catheteras, idoneorum aliquod medicamentorum immittimus. Equidem quaternis diebus vidi sanguinem ē vulua profluere, nec potuisse vllō remedio sisti, quoad quarto die plantaginis succo vrentibus nobis, prorsus constiterit. Est quippe hoc medicamen & ad ea quæ ex erosione excitantur profluua sanguinis vtilissimum. Cui etiam valentius aliqd hoc casu medicamentū, aliās aliud miscere soleo: utiq; ad totum respiciens affectum, id quod perpetuō est faciēdum. Etenim in his ipsis quæ ex vulua, vesica, & intestinis profluua oriuntur, æstimari debet ipsius profusionis quantitas: vt videlicet hanc ipsam, vel vt primam, vel vt secundam indicationem curatiōis habeamus: nec tamen negligentes affectum. Nam si perruptum vas aliquod magnum est, aut vehementer reclusum hiat, utiq; astringentibus medicamentis est opus, veluti balaustio, hypocistide, rhoe, omphacio, acacia, gallis imminaturis, & malicorio. Sin vel exiguum vas ē, quod perruptum est, vel modicē reseratum, sic vt non multus sit ex eo sanguis profluens, etiam aloe, & manna, & pini cortex, & lemnium sigillum, & spinæ Aegyptiæ fructus, & crocum, & lapis hæmeatites, alia q; id genus, ex vino nigro austero, vtilia medicamēta sunt. Quod si nec genus id vini adsit, nec plantago, nec solanum (quippe hæc quoq; sunt idonea) rubi, & cynosbati, & myrti, & lentis, & hederæ, & cotoneorum, & mespilorum, breuiter q; astringentium omnium decoctum ex usu est. At si ex erosione profluuiū aliquod

METHODO MED. LIB. V.

incidit, erit utiq; id exiguum, atq; paulatim effluens. Quare Pasionis, uel Andronis, uel Polyide pastillis utendum est: aut etiam nostro qui ex charta constat. Sin profusior hæmorrhagia sit, iis quæ uehemētissimè astringant utendum medicamentis, quoad uehemens eius frangatur impetus. Mox deinde admiscēdi illis pastilli sunt: postea ad ipsos solos ueniendum, cum aliquo ex ante dictis succis, aut decoctis. At uerò, quæ extrinsecus profluenti particulæ admonentur, tum astringentia, tum citra astrictionem frigida, hæc ipse non ubiq; probo. Sed mihi contra omnino q̄ fieri res postulat, ipsum sanguinem intrò compellere, ac venas quæ in alto sunt implere, uidentur. Vidimus enim quosdam eorum, qui sanguinem à pulmone reicerent, ex thorace refrigerato manifestè læsos: æquè ut qui sanguinem vomuerunt nonnullos, q̄ uenter esset foris refrigeratus. Eodem modo & eorum quibus ex narib⁹ sanguis profluxit, aliqui ex capitis refrigeratione, deteri⁹ habuerunt. Quare nec omnino, nec sine discrimine, nec omni tempore loca quæ circa particulam, unde sanguis profluit sunt sita, refrigeranda suaserim: sed postea q̄ in alia diuerteris: ut exempli gratia, in naso, ubi sanguinis missione usus fueris, uel artuum frictione, deuinctione q; uel ad præcordia cucurbitis defixis. Quin ne sic quidem ad frontem caput q; refrigerantibus utendum est illico, sed reuellendum prius ad contraria: utiq; affixa in summa ceruice cucurbita. Quippe duplex est in sanguinis è naribus profusione auersio: & quæ est ad totius corporis inferna: & quæ ad capitis posteriora. Propterea uidelicet q̄ ipsæ nares & in superiore, & in anteriore parte sunt sitæ. Iam uerò sanguinis effusio diapedesis dicta, refrigerantibus & astringentibus est curanda: necnon victu crassiori, si ob tenuitatem sanguinis accidat. Porro qđ uenæ insedit vlcus, si ad manum est, eandem curationem cum iis desyde-

Zzz iiii

359

Pastilli diuersi contra profusum uia sanguis ex erosionē oborta

Astringētium simul & refrigerantiū, quæ ad supprimendum sanguinē applicantur extrinsecus, non ubiq; probat vsum Galen⁹.

Refrigerantibus quādo circa partē synde fluit sanguis utendum.

Cucurbitam summæ ceruicæ affixam, reuellerè a naribus sanguinem. Sanguinis fluitis per nares, reuulsio duplex.

Diapedesis quomodo sit curanda.

7.

Dura omnia
ægre consoli-
descere.

Verno tempo-
re sanguinem
mittere, græcis
etiam erat cō-
suetum.

Vesica pro cly-
stere Galenus
vult.

8. Lemnia terra.
Romā esse ma-
xime obnoxio-
sum fluxionib⁹
Pulmonis vice
ra cur effici-
tiora sanatu-
runt.

rat, quæ in carne consistunt. Enimuero quemadmodū dura omnia ægrè consolidescunt (chartilago enim cū chartilagine per coitionem haud coalescit, sicuti nec os cum osse, sed per callum tantū coniungitur) sic etiam solutæ arteriæ, cum difficultate ob substantiæ duritiem coalescunt : & si eas aliquando cōglutinari aiderimus: id q; in mulieribus atq; pueris, tum circa frontem, tum circa malleolum, carpumq; ac medium extremæ manus. Simile quiddam aliquando & agresti cōtigit iuueni, dum sanguinem sibi mittendum verno curaret tempore, quod nostratibus est maximè i vſu. Illi siquidem pro vena fuit secta arteria in cubito, quā postea nos ipsi cōglutinauimus. Est autem sanatu difficilior arteria incisa q̄ uena, tantoq; siccioribus medicamentis eget, quanto ipsa est suapte natura q̄ illa, siccioris temperamenti. Cætera uerò, eiusdem speciei ambæ medicamenta desyderant. Porro ad ea quæ in recto intestino sunt ulcera, per uesicam, cui sit fistula recta ad finem annexa, iniicere liquatum medicamen, atq; tepidum, licet. Cæterū sicca medicamenta magis sunt idonea, q̄ quæ liquabilia uocantur: quoniam facile uel plātaginis, uel alterius eius generis succo, miscentur. Eiusmodi medicamenta sunt, & crocum, & pompholyx, & aloë, & quæ dicuntur cephalica. In ipso autem primo producendæ carnis tempore, quod suppressionem sanguinis continenter excipit, etiam lemnia terra salutare est præsidium. At quæ pulmōni adhæserunt ulcera (cuiusmodi sæpe i urbe Roma visuntur, loco profectò maximè obnoxio fluxionibus) difficiliora curantur existunt, ob assiduam ipsius visceris agitationem. Quod quidem laxum & spōgiosum quum sit, minimè etiam mirari conuenit, si sanguis aut pus in thorace cōtentum, aliquando per membranam illius transmittatur ad arteriam asperam: quandoquidem per ^{eualem} ~~aliā~~ ^{eualem} ~~lō-~~ ^{eualem} ~~gē~~ ^{eualem} ~~du-~~ ^{eualem} ~~riorē~~ ^{eualem} in ossiū fracturis effunditur sanguis cras-

^{quasi} ^{est necessarius} tus ad calli generationem. Vbi igitur vel ex casu, uel præualida acutaq; voce uas aliqd in pulmone rūpitur, citra q; dolorem confertim sanguis feruens, floridus, multusq; cum tussi expuitur, scire licet, in viscere vulnus consistere. Itaq; laboranti iniungēdum est, ut nec respiret uehementer, ac semper silentium agat. Præterea uena cubiti interna, protinus incidenda: à qua bis terq; postea sanguis est detrahendus: utique auertendi gratia: tum artus omnes fricandi, uinciendiq;. His peractis, primum posca tum diluta, tum tepida, potui offerenda est, quo si quis in viscere cruor cōcretus latitet, solutus expuatur. Atq; hoc nihil uetat bis ter' ue ternis horis facere. Ab iis uerò etiam aliquod eorum quæ tū emplasticā uim hñt, tū astringunt, medicamētū ē exhibēdū: id q; aut ex posca diluta primum, aut ex maloꝝ, myrtorum' ue decocto. Rursusq; uesperī medicamen hoc similiter dandum: circunciso (si ualētior sit æger) omni nutrimento. Sin aliter, sorbitionis quod satis est exhibendum. Maximè uerò ad rem pertinebit, si etiā postero die (modò æger robustus sit) parum sanguinis rursus ab incisa iam uena detrahas. Victu autem, medicamentisq; eodem modo in quartum usq; diem utatur: pectore iterim, si æstas sit, undiq; melino & rosaceo, madefacto: sin hyems, nardino unguento. Iuuerit etiam uel maximè, nō modò ad uulnus pulmonis, sed ad alia omnia, illud medicamē emplasticum, quod ex bitumine, acetoq;, & aliis quæ illi misceri solent, cōstat. Quod si mulieri, puero' ue, aut corpori quod molli sit carnis, medearis, quod ex chalcitide sit, satis habile medicamētum fuerit. Cæterum si rupturæ uasis successerit inflāmatio, exigua spes est cōglutinādi ipsius: quandoquidem inflammationis solutæ pus, expurgari sine tussi nō potest, quæ maximè rupturæ aduersatur: in longius tamen tempus produci ipse affectus potest. At septi transuersi uulnera, quæ foras non perueniūt,

Pulmonis exulcerati indicia.

Hæmoptoici morbi curatio.

Posca dissoluit grumos.

Sanguinem ex puentibus repetendam esse missionem sanguinis.

Pulmonis uasi disrupto si inflammatio successerit, cur affectus nequeat consolidari.

in carnosus quidem partibus subinde uisa sunt coalescere, eius motu minimè obstante. Quæ in nervosis eius hærent, insanabilia sunt. Sanè difficilis grauisq; curatio est, etiam eorum quæ in carnosus sunt partibus, si has iam phlegmone obsederit, id q; nō in diaphragmate solum, uerum etiam in omnibus quæ intra peritonæum ambiuntur: quod in ea scilicet sanies defluat.

Danda tamen opera est, ut illa quacunque ratione sicce mus, tum per ea præsidia quæ extrinsecus imponuntur: tum per ea, quæ ex aqua, uinōue tenui bibuntur. Horum maximè idonea sunt, quæ diaspermation vocant: & quod ex asia componitur. Immutatur aut plurimum ipsa curatio ulcerum, per singulas animalis partes. Indicat siquidem, veluti uitium ipsum, ut curetur, sibi applicandū esse contrariū: sic particula queq; quod sibi sit q̄ simillimum. Quamobrem, aurium ulcera, quum ea partes longè siccissimæ sint, glaucio ex aceto curantur: necnon (si ualentiore sit opus) medicamine Andronio, scoriaq; ferri in pollinem tenuissimū læuigata, & cum acerrimo aceto, quousque ad lubrici mellis consistentiam deueniat, coacta. Porro quod tetrapharmacum dicitur, siccare ulcera id genus prorsus non potest: at maturare phlegmonem potest, augereq; affectæ partis putredinem. Itaq; audiendi locus, quoniā siccissimus est, ideo medicamentis eget, quæ uehementissimè siccent. At oculo exulcerato, collyriū fortasse quod ex thure conficitur, expedit: naribus uerò, quod multo sanè magis siccet, q̄ ut conueniat oculis: nin⁹ autem, q̄ ut auri quadret. Vlcera uerò quæ in ore accidunt, quæcunque admodum humida existūt, præsertim si proximè adhærent ossibus, ea medicamentis egent, quæ uehementer siccent: veluti diphryge, tū ipso per se, tum ex melle, & uino, & mulso: præterea & ea quæ iris dicitur, & quæ anthera: hisq; vel siccis, uel ex melle, uel mulso, uel uino. Vtile uerò ad talia est

10. Vicerū curatio nem immutari plurimū p̄ singulas animalis partes.

Aurium vlcera quibus medicamentis curantur.

Tetrapharmacū coquit phlegmonem, augetq; affectæ partis putredinem

Oculi vlcera qualia medicamenta postulet

Nasi vlcera qualia medicamenta postulet. Oris vlcera q̄ medicamenta requirant.

& Musæ medicamentū, præterea rhois succus, & omphacium, aliaq; strenuè siccantia. At quæ simpliciora oris ulcera sunt, hæc sanare commodè possunt etiam medicamenta quæ modicè siccant: ueluti quod ex moris conficitur: & quod ex rubi fructu: & quod ex succo corticis iugladium uiridis, atq; etiam his magis, quod ex musto & cupressi sphaerulis constat. In uniuersum autem, genus quidem medicamenti, ab ipsa curandarum partium substantia, & affectu est sumendum: utendi uerò modus, à figura, & situ. Siquidem quæ in uentriculo, pectore, & pulmone vlcera constiterè, per ea quæ eduntur, bibunturq; curanda sunt. Quæ uerò in intestinis, bifariam. Nam quæ vicina ventriculo sunt, his per comesta bibitaq; succurritur. Quæ uerò inferius sunt sita, per ea quæ iniiciuntur. Quippe neq; ad ea quæ vicina ventriculo sunt, subire potest quod per sedem infunditur: nec integris viribus ad inferiora pertingere, quod per os sit ingestum. Quamobrem thoracis atq; pulmonis vlcera, tum difficilius iis quæ in ventriculo sunt, sanantur, ut quorum situs longius absit, atq; iccirco medicamentorum vis remittatur: tū propter hoc ipsum multo valentiora ea quæ deuorentur præsidia requirunt, q̄ si ipsis statim vlceribus admouerentur. Quod igitur pulmonis atq; thoracis vlcera expurgentur per tussim: ventriculi autem per vomitum & deiectionem, id, ob ipsarum partium contingit formam. Cæterū qui è ventriculo eluere pus volunt, non sine periculo vomitum prouocant, sicuti si aliter infixam illi pituitam per oxymeli & radiculam detergerent. Tutius itaq; est deiectione uti: quum vomenti periculum sit, ne & quod exulceratum è dilaceret, & succum quempiam inutilem ex vicinis attrahat. Porro si in pulmone ruptum vas sit, scire licet, nisi protinus, ante q̄ excitetur phlegmone, glutinetur, id postea insanabile fore. At vlcere iterioris tunicae asperæ arteriæ, &

Diamorō oris
vlceribus com-
modum.

Medicamen^{ti} 11.

genus a substā-
tia partis affe-
ctæ, & ab affe-
ctu ē sumēdū.

Utendi modus
a figura, & a si-
tu sumitur.

Intestinorū vl-
ceribus, qua ra-
tione meden-
dum sit.

Clysmos non
posse perueni-
re ad intestina
ventriculo pro-
xima.

Thoracis atq;
pulmonis vlce-
ra, valentiora
præsidia requi-
rere q̄ si ipsis
statim vlcerib^{us}
admouerētur.

Ventriculi exul-
cerati pus, tu-
tius expurgari
deiectione, q̄
vomitū.

Pulmonis vas
ruptum, qñ sit
insanabile.

12.

Asperæ arte-
riæ ulcerū me-
dicatio.

Tabiarū lac.

Lac bubulum.

Lac asininū.

Lac caprillum

Lac muliebre

tabidis esse ma-

xime congruū.

Lac astatē ani-

mali, statimq;

mulctum, bibē-

dum esse.

17. Lacū quando
sal & mel inii-
ciendum.

Sanguinis reie-

ctiōis a catar-

rhopodeuntis

curatio.

Theriacēs qua-
drimestris fa-
cultas.

præcipuè laryngis, curationem sanè recipiunt, per me-
dicamenta humida quidem, sed facultate exiccantia :
quæ retinentur ore, paulatimq; per fauces defluunt,
idq; ægro iacente supino. Lac etiā, ad talia vlcera vni-
cè commendatur, sed præcipuè quod Tabiis habetur:
quum nimirum illic locus sit satis æditus, & aer circum-
datus siccus: & pascuum pecoribus salubre. Licebit au-
tem tibi similem locum etiam arte parare, inserereq;
in eo agrostim, lotum, polygonum, melystophyllum,
lentiscum, arbutum, rubum, hederam, cytisum, & alia
id genus. Iam verò, lac bubulum, crassum natura est :
asininum, tenue: caprillum deniq;, mediam consisten-
tiam sortitur. Verum muliebre lac tabidis auxiliatur
eximiè, quum naturæ humanæ sit admodum familia-
re. Hoc tamen de lactis vfu sit maximum, & commu-
ne præceptū, vt ii quibus eo est opus, omnino id astan-
te animali statim mulctum ebibant: etiam melle inie-
cto, si cui cogi in ventriculo solet: necnon sale, si ipsum
citius ad aluum descendere cupis. Quod verò ad san-
guinis reiectionem ex catarrho ortam pertinet, quum
olim accersitus fuisset ad splēdidam quandam matro-
nam Romanā, tali affectu prehensam, incidere illi ve-
nam non placuit: quādoquidem iam quatrduum sine
cibo egerat propter catarrhum: sed iussi vt acri vtere-
tur clystere: tum crura manusq; calfacienti pharma-
co plurimum perfricaret, vinciretq;: mox caput rade-
ret: cui deinde medicamen, quod ex palumbium ster-
core constat, imposui: interpositisq; horis tribus, i bal-
neum duxi, ac laui, nullo caput contingens pingui.
Dein caput idoneo pilo contexi, & pro eo qui tū erat
temporis statu, nutriui sola sorbitione: post quam, sta-
tim fructum aliquem autumnalium austerum dedi.
Quum autem dormitura esset, theriacem propinaui,
circiter quatuor menses ante confectam. Habet enim
id ætatis adhuc præualētem papaueris succum(qui in

antiquatis ignauus redditur) ideoq; & somniferū est, & fluxiones tum siccāt, tum leuiter crassat. Secundo autem die, iussi omnes eius partes fricari, vno capite excepto: ad vesp̄eram verò, porrexi rursus theriacēs ceu fabæ nostræ magnitudinem. Erat enim quod pridie acceperat, hoc longè amplius. Postea verò q̄ hac quoq; nocte probè dormiisset, tertio die mane mel coctum copiosè exhibui, & in quiete seruauī. Procedēte die totum corpus similiter fricui, ac ptisanæ cremorē cum pane exiguo, pro cibo sumere iussi. Mox quarto die mane dedi theriacem consistentem in ætatis vigore, idq; cum melle copioso. Capiti verò mulieris eodē pharmaco, quod vehemēter tum siccāt, tum calfacit, imposito, ac dein ipsa lota, nutritaq; modicè, valentiā iam pulmonem expurgare sum in quinto conatus. Ac dehinc rursus, rursusq; ex interuallo, ad caput quidem consueto cerato, quod thapsiā recipit, sum vsus. Totam verò corporis curam, in gestatione, frictione, ambulatione, lauandiq; abstinentia, ac victu tum moderato, tum boni succi, ad reficiendum direxi. Qua industria rectè se habet mulier, minimè lactis opem requrens. Alteri verò adolescenti, cui ex refrigeratis spiritus instrumentis orta tusis fuerat, quum sanguinem ipse reiecisset ad dimidiam heminam, statim venam incidi, ac bis eodem die ex ea detraxi sanguinem: deinde rursus postridie bis, sed artuum frictione & vinctura priore die vsus, ad vesp̄eram dedi pharmacum nostrū quod diaspermaton dicitur. Secundo die post alteram detractionem imposui toti pectori ceratum quod ex thapsia conficitur: mox vesp̄eri, ne supra modum calfaceret, id auferens. Tertio die rursus ad treis horas imposito, hominem laui. Cibaui autem similiter tribus his diebus: prioribus quidem duobus, sorbitiunculis: tertio verò, ptisanæ primum cremore: dein, pisce statim aliq, qui facilis concoctu esset, adiecto. Dedi quoq;

Sanguinē bis
eadem die &
ex eadem ve-
na detraxit Ga-
lenus reiciēti
sanguinem ob
refrigerata spi-
ritus inst̄ra.
Diaspermaton
medicamen.
Ceratum ex
thapsia.

Diaspermaton
medicaminis
vſus.

14. Pulmonis vlce-
ra cōtracta ex
vitioſi ſucci
eroſione, eſſe
prorſus infana-
bilia.
Pulmonis ex-
ulcerati cura-
tio.

Catapotia de-
ſcripta a Ga-
leno.

15. Pulmonis vlce-
ra in iis qui de-
plorati nō ſunt
curari per de-
tractionem ſan-
guinis, purga-
tionē, et ea quę
caput roborāt.

medicamentum diaspermaton & ſecūdo & tertio die ſimiliter circa velperam. Quippe & ſomnū conciliat, & ſenſum doloris leuat, & ſiccādi vim habet. Vbi autem & ſpiritus delegatę partes in naturali eſſent temperie, & totum corpus vacuatum, ac nulla phlegmones ſuſpicio iuxta ruptum vas ſuper eſſet, tunc expurgare incepimus. Mox propinata theriace vigentis ætatis, illum ad Tabias dimiſi. Ex iis verò qui vlcus in pulmone habent, ii demum inſanabiles mihi eſſe videntur, qui ex ſucci vitioſi eroſione id poſſident. Oportet autem in principio nullius rei æquę eſſe ſollicitum, q̃ ut neq; tuſſiant, neq; ex capite aliquid in pulmonem deſſuat. Canetur id triplici præſidio: purgatione primū: ſecundò, medicamine quod diaspermaton dicitur: tertio, ipſi capiti prouidendo. Quod purget, diuerſas facultates habeat oportet: cuius generis noſtrę ſunt pilulę, quę ex Aloe, Scammonio, Colocynthide, Agari-
co, Bdellio, & Gummi Arabico conſciuntur, ad plures videlicet purgandas ſpecies excrementorum. Capi-
ti prouidebitur cerati vſu quod ex thapſia cōſtat. Atq; hæc quidem ſunt peragenda in principio. Poſt verò reſciēdus eſt æger ſalubriter, cibis boni ſucci, frictione, in ambulatione, & balneo, ac præterea lacte fouēdus. Quicunq; parum habere ſanguinis videbuntur, iis ad quendam ſuccum probiorem reductis, detrachere ſanguinem poteris: tum rursus reſicere: eoſdem etiā rursus purgare, ac rursus reſicere: denuoq; ſi res ſuadeat, ſanguinem mittere: potiffimum quibus veluti limus quidam vitioſus & craſſus, tot⁹ eſt ſanguis. At qui ſanguine abundant, ſtatim iis a principio minuēdus eſt. Itaq; per hæc tria, qui planē deplorati non ſunt, omnes ſeruantur: nempe per detractionem ſanguinis, & purgationem, & ea quę caput roborant. Quare minimē a paruis incipiendum auxiliis eſt, in quibus morbis maximum impēdet periculum. At in leuioribus, licet q-

dem leuiora experiri remedia. Sciendum autem est in
 terim, fieri non posse vt glutinetur vlcus, si phlegmo-
 ne pulmone inuaserit: omninoq; si inuaserit, febrici-
 taturum hominem esse, ac purulenta deinde, quā sol-
 uetur phlegmone, exputurū tussi. Porro vlcera quæ
 citra phlegmonem in pene, sedē ne cōsistunt, nullum
 cataplasma desyderant, sed medicamen quod cicatri-
 cem inducat: non tamē eius naturæ, quæ vlcera, quæ
 in carne sunt, inducere cicatrice possit: imò quæ tanto
 magis valeat siccare, quanto hæ partes carne sicciores
 existunt. At talia sanē medicamenta sunt, qđ ex char-
 ta combusta constat: anethūq; vstum, atq; respersum:
 ac deniq; colocynthis combusta. Verū ipsorū, quæ
 in pene sunt, vlcere, magis siccari postulant quæ in
 toto cole hæserunt, & quæ solam glandulā occupant:
 minus verò quæ in præputio sunt: atq; etiam his mi-
 nus, quæcunq; in reliqua sunt cute, quæ totum colem
 vestit. Recentibus & sine madore tum sedis, tum pudē-
 dorum vlcerebus, sola aloë redacta ī tenuissimum pol-
 linem, inspersaq; salutare medicamen existit. Similli-
 mam huic vim habet cadmia vino elota, & sicca. Ab
 hac non lōgē abest lithargyros. Deinceps verò molib-
 dæna sequitur. Cæterum omnibus tum minus inferēs
 doloris, tum nullo minus efficax, pampholyx est. Sin
 humidiora sint vlcera, ipse per se pini cortex, itēq;
 lapis hæmatites, idone⁹ est. Quòd si profunditas
 quæpiam adsit, vbi exiccata fuerint, dicto-
 rum alicui tantum mannæ admiscen-
 dum est, quātum sit ad carnem
 gignendam satis.

Extremis mor-
 bis extrema re-
 media adhibē-
 da esse.

Pudendorū vl-
 cera qualia me-
 dicamenta po-
 stulent.

Aloem insper-
 sam, esse saluta-
 re medicamen-
 tum sedis &
 pudendorū vl-
 cerebus.

Medicamina
 vlcerebus sedis
 & pudendorū
 aptissima,

GALENI PERGA MENI DE MEDENDI METHODO. LIB. VI.

Solutæ unitatis
species.



2.

Puncturæ cu-
ratio.

Punctio neruo
vulnus est dila-
tandum.

Puncti nerui
curatio.

Aquam calidā
esse vulneratis
neruis inimi-
cissimam.

SOLVTIO continui, in carne quidem, vlcus: in osse, fractura: in neruo sis fibris, spasma: in musculis denique, vlcus atque ruptio vocatur. Singuli verò horum affectuum, quatenus quidem affectus sunt, sui per contraria sublationem indicant: quatenus autem solutiones continui, vnitionem. Igitur si cutis tantum acu (exempli gratia) alicui sit puncta, facileque in eo sanescant vlcera, etiam si citra medicamentum, nudoque membro, ipsum ad consueta dimittas opera, nihil sentiet mali: sin verò ægrè in illo sanetur, primum quidem dolebit: post etiam tum pulsu particula infestabitur: tum phlegmone. Quare minimè imponemus medicamen quod glutinet, sed molle, & blādum, & quod dolorem mitiget. Siquidem vbi magna diuisio est, ibi studium impendi debet, vt magis siccantibus remediis labra vlceris, & vniantur, & coalescant: vbi autem acu stylo'ue facta diuisio fuerit, id duntaxat curandum est, ne phlegmone tentetur particula. Porro vbi aliquis neruus est punctus, cutim ipsam apertam seruare oportet: aut (quod tutius est) latius incidere, vt per eam ex neruo vulnerato effluat sanies: Dein verò admouenda quæ simul dolorem mitigent, & exitum saniei patefaciant. Si vir tus vegeta sit, sanguinis missio est expediens, purgatioque: vniuersi corporis, si vitiosis succis redūdet. Aqua verò calida, quæ reliquas phlegmonas valde mitigat, vulneratis tamen neruis inimicissima est, quum præsertim eorum substantia ex refrigerata cōcretaque humidiore

midiore materia sit condita. Omnis quippe eiusmodi constitutio per ea quæ simul calfaciunt, humectantq; , resoluitur, atq; putrescit. Quare præstat oleo tenuium partium & veteri, & calido nervos punctos fovere. Hoc siquidem, si frigidum applicetur, tenues meatus obstruit: sin calidū, digerit. Etenim medicamenta quæ nervi puncturæ auxiliantur, debent esse facultate tenuia, modiceq; calfaciētia, & quæ siccare citra dolorem possint: quādoquidem sola hæc trahere ex profundo saniem, nec demorsa, nec contracta particula, valent. Ego itaq; sum vsus primū resina terebinthina, tum per se, in iis qui molli erāt carne: tum cum euphorbio, in iis qui dura. Non secus etiam & propoli, non per se modō, verū etiam cum euphorbio ipsam emolliēs: quod si durior esset, cum aliquo tenui oleo. Quin & sagapeno, opopanaceq; , sum in duris corporibus vsus, utiq; cum oleo & terebinthina id miscens. Sed emplastrum ex lachryma Cyrenaica nō inutile ad id fore mihi videtur. Nec secus sulphur viuum, ac minimē lapidosum, tenui oleo permistum, donec sordium crassitudinem contrahat. Calx etiam lota, oleoq; commista, similiter auxiliatur, præcipueq; si in æstu caniculæ bis ter'ue aqua marina abluatur. Ego verò ad nervos punctos hoc vti consuevi emplastro. Cerae partā. j. Resinae terebinthinæ, aut (loco eius) humidæ pineæ, aut colophonix, aut abietinæ, vnius partis dimidium. Picis, tantundem. Si itaq; humidam resinā miscebis, tum sum cribratumq; euphorbium reliquis immittes liquidis. Esto verò pondus eius, pars ceræ duodecima. Sin siccam, sicuti quæ colophonia dicitur, utiq; oleum pusillum desyderabit euphorbium. Itaq; vulnerati nervi curatio medicamenta postulat, quæ & tepidum calorem excitent, & valenter siccent: tum quæ ex substantiæ suæ natura & attrahendi vim habeant, & tenuium sint partium. At si nervus non punctus, sed per directū

Nervos punctos oleo calido foveos eē.
Puncti nervi qualia medicamenta postulet.

Terebinthinā auxiliari punctioni.

Punctis nervis emplastrū optimū.

Punctis nervis qualia desyderentur medicamenta.

3.

Nervi per di-
rectum cæsi cu-
ratio.

Metallica me-
dicamenta, de-
bent elota esse
si citramorsum
sint siccatura.

Nervis vulne-
ratis nihil de-
bere admoueri
frigidum.

Musculi sunt
infra volunta-
riæ motionis.

Oleum reddit
vlcera sordida

fit cæsus, nudusq; diuisa cute, ostendatur, vim euphor-
bii nō feret, ita vt quum interposita cutis est, ferre po-
test. Quare tūc optimè calce elota, & in plurimo oleo
soluta vtēre. Salutare etiam est medicamen, quod ex
pompholyge medicamētum sit, si in largo sit rosaceo
liquatum. Quod vtiq; melius fuerit, si tum rosaceum
ipsum, tum oleū, salis sit expers. Porro quæ ex metal-
lis pstant medicamenta, ea elota omnia esse debent, si
citramorsum sint siccatura. Salubre verò medicamē-
tum est, quod ex melle soluto in oleo insulso constat.
Cera præterea, terebinthinaq; si his misceantur, elui
prius debent. Quippe medicamentis omnibus, quæ la-
ueris, acris mordensq; sanies eluitur, abstergiturq;. Si
verò robustus sit, qui vulnus accepit, & cui corpus sit
à superuacuis humoribus mundum, in hoc fas est, va-
lentioribus remediis nonnullis vti. Cuiusmodi sunt li-
namenta imbuta pastillis polyidæ, sapa solutis, & sup
aqua calida tepefactis. Nā eorū quæ vulneratū neruū
cōtingūt, nihil esse frigidū debet: qñquidē ea pars ma-
ximè sensibilis est, & principū partium primati cōtinua,
& temperamento suo frigida. Quorum omnium oc-
cassione facilè à frigido offenditur, & suā offensam in-
pertit cerebro. Quod si ex iis fuerit, qui perueniunt ad
musculos (sunt enim hi instrumenta voluntariæ mo-
tionis) etiam conuulsionem facilè accersit. Idem fore
& in tēdonibus expectabis iisdem de causis. Sanè oleo
perfundere tale vlcus non conuenit: nam oleum viri-
bus illius pastilli est aduersum, vlcusq; sordidum red-
dit. Nec enim parum interest, nudo ne neruo, an per
interpositam cutem admoueas. Abluēda igitur à vulne-
re est sanies per lanam mollem specillo circūuolutā,
ac in principio quidem sapa madefactā, expressamq;:
postea verò etiam vino dulci, sed omni mordente qua-
litate carente. Nam quæcunq; dulcia pariter & fulua
sunt, vt Falernum, ad id inutilia existūt. Quippe acriæ

sunt omnia talia, & supra modum calida. Ulcere vero iam ad cicatricem veniente, quæ alba planè sunt, & tenuia, nec multam aquam tolerant, nec odora sunt, ea dulcibus præstât. Aquæ verò vsum ad nervum vulneratū perpetuò fugies, sicuti & cataplasma relaxans. Ad iam dicti pastilli vsum proximè illud medicamentum accedit, quod diachalciteos vocant. Liquari autè id debet, æstate rosaceo, hyeme Sabino oleo. Quòd si polyidæ pastillus nō suppetat, Andronis vel Pasionis, loco eius sumendus est: uel noster, qui etiam omnibus eis est valentior. Vbi uerò nervus alicui transuersim est vulneratus, detrahare largius sanguinem expedit: ac tenui magis, quàm in illis, uti uictus ratione: tum in quiete omnino ac lectulo molli hominem continere: tū oleo calenti ubertim in axillis, collo, tendonibus, ligamentis, & capite uti. Quòd si uulneratus nervus ex iis sit, qui in crure habentur: sicuti quum in manu est, alæ: ita in his, bubones largo oleo imbuendi: tum per totam spinam ad collum, & caput ascendendum. At cōtusi nervi, ubi cum eis est simul & ipsa cutis contusa, cataplasmate ex oxymelite & fabacea farina curatur. Qui vero absque cutis simili affectu, contusi sunt, iis oleum calens, atque tenuium partium, auxilio est. At si dolor unā cum contusione cutis & nervi infestet, etiam picem liquida immiscere illi cataplasmati, ac bene coquere, tum calens medicamentum imponere oportet. Vbi vero magis siccans efficere voles, erui farinam iniicies. Quòd si ut amplius quoque siccet desyderas, irim immittes Illyricam. At si totus præcisus nervus sit, metus præterea nullus instat: debilis tamen remanebit particula. Curatio verò eius cōmunis est, cum ea quæ aliorū est ulcerum. Ligamenta autem, quum similitimam habeant speciem tendonibus, valentissimorum remedia, & uim tolerant: quæ neque ad cerebrum pertingāt, & sensus sint expertia. Nā nervi omnes, alii ex ipso statim cerebro

Nervo vulnerato neque aqua nec relaxas cataplasma ad mouere oportet.

Nervi transuersim vulnerati, curatio.

Nervis vulneratis in brachio, axillas: in crure, bubones largo oleo fouendos esse. Contusi nervi curatio.

4. Ligamēta sine sensus expertia, neque cōsentiant cerebro.

Nervi oriuntur
a cerebro.

Tendones con-
stāt ex ligamē-
to & nervo.

Ligamēta oriū-
tur ab ossibus.

Ligamenta ob
noxia periculo
si vulnerentur
quæ sint.

Abdominis de-
scriptio.

Peritonæum.

habent ortum: alii spinali interueniente medulla. Ten-
dones quoq; quoniam ex nervo & ligamento cōstāt
quatenus nervi participes sunt, eaten⁹ ex cerebro ori-
untur: minus tamen q̄ ipsi nervi conuulsionem accer-
sunt. Ligamenta verò, quum ex osse ortum habeant,
quæcunq; rotunda sunt, ea nervis sunt consimilia: du-
ritie tamen plurimum dissident. Verum in eo q̄ alba
sunt, & exanguia, & cavitare carentia, & in fibras diui-
duntur, similitudo illis cum nervis & tendonibus con-
stat. Ligamentum igitur vulneratum, si id est quod ab
osse ad os permeat, & maximè sine periculo est, & si id
ficces quibuslibet medicamentis, nihil hominem offen-
deris. Sin id quod se in musculum inserit, quāto est ner-
uo & tendone minus opportunū periculo, tātō vtiq;,
nisi rectè curetur, reliquis ligamentis magis terrere de-
bet. Sed iam operæpretium est, vt de abdominis vul-
nere aliquid etiam dicamus. In abdomine extrinsecus
cutis omnibus antestat: quæ in membranam finitur.
Post cutem, medio circiter loco, neruea tenuitas mu-
sculorum gemina tenditur, membranarum ritu. Post
has deinceps habentur duo muscoli recti, & carnosi, q̄
à pectore ad ipsa pubis ossa perueniunt. Atq; hæc qui-
dem omnia sibi mutuò cohærent, abdomenq; consti-
tuunt. Quod verò deinceps hoc excipit, peritonæum
vocatur, estq; ex corporibus duobus exanguibus &
neruosis conflatum. Verum alterum eorum nervosa
tenuitas eorum musculorum est, qui per transversum
se agunt: alterum, mēbrana prætenuis, veluti aranea,
quæ vtiq; verè est peritonæum. Ac tale quidē in me-
dio sui est abdomen. Partes verò eius, quæ vtrinq; ad
latus ad quatuor quasi digitos recedunt, hæc statim à cu-
te obliquos musculos habēt: priores quidem, qui à pe-
ctore demittuntur: secundos, qui ab ilibus ascendunt:
dein post hos, trāsversum vtrinq; musculum, sub quo
est peritonæum. Ergo & minus periculi in hoc loco

cōvulnerato est, q̄ in medio: quum tenuem aponeuro-
sim nullam habeat, & sutura in medio difficulter admi-
nistretur: quum nimirum, & hac parte maximè proc-
idant intestina, & ægrè inibi contineri queant. Si igitur
maius sit abdominis vulnus, tum plura necesse est inte-
stina excidere: tum difficilius denuo immitti: quanq̄ &
parua vulnera tractatu etiam sunt difficilia. Nam nisi
quod procidit, illico in suum reponatur locum, infla-
tur, surgitq̄; in tumorem: quo fit, vt per angustum fo-
ramen immitti nequeat. Quare minus graue per huius-
modi vulnera mediocre foramen est. Principio itaq̄;
id agendum est, vt intestina quæ exciderunt, in suum
recondantur locum. Secūdo, vt vlcus suatur. Tertiò,
vt medicamen imponas. Quartò, vt ne qua præstan-
tior pars simul afficiatur, prospicias. Si ergo adeò par-
uum sit vulnus, vt inflatum intestinum ex frigore am-
bientis aeris, remitti nequeat, discutiemus flatum, spō-
gia molli, & ex calente aqua, madenti, moxq̄; expres-
sa, intestinum ipsum calfacientes. Præparetur verò
interea vinum austerum calidum. Quippe id magis
calfacit quàm aqua, roburq̄; intestino addit. Quòd si
huic quoq̄; præsidio, intestini inflatio non cesserit, in-
cidendum peritonæi tantulum Syringotomis est, q̄tū
ei quod excidit, reponendo sit satis. Scalpelli verò qui-
bus acies vtrinq̄; habetur, aut quibus cuspis acuta est,
sunt omnino fugiendi. Situs autem laboranti sit talis,
vt quæ vulnerata pars est, sublimiorē semper locum
obtineat. Cauendumq̄; magnopere est, ne id quod ex-
ciderit, degrauetur quicq̄ ab intestinis aliis. Quæ igitur
intestina per magnū vulnus prolapsa, reponere in pro-
prium vult sedem, is vbi totum vulnus manibus suis
extrinsecus apprehenderit, debet intro reprimere,
tum constringere, ac exiguum semper sueti prænuda-
re: quinetiam id ipsum quod assutum est, modicè com-
primere, quoad totum persuatur. Quoniā igitur coi-

Abdominis
partem ante-
riorem si vulne-
retur, Aegrius
curari iis, quæ
consistunt ad
latera.

Abdomine vul-
nerato, cur me-
diocre foramen
sit salutaris
angustia.
Intestinis exci-
dentibus per
abdominis vul-
nus, qd agēdū.

Abdomen vul-
neratum cōsue-
di ratio.

Abdomen vul-
neratum cōsue-
di secundus mo-
dus.

re coalescereq; oportet cum peritonæo abdomē, incipiendum quidem à cute est, atq; ab externo introrsus acus iniicienda. Vbi verò tum cutini, tum rectum musculum totum transierit, præterito quod ei subest peritonæo, per reliquum peritonæum eam ab interno extrorsus iniicies, atq; inde per reliquum abdomen ab interno extra transmittes. Vbi hoc penitus penetraverit, rursus ab externo introrsus idem abdomen est perforandum. Mox vbi peritonæum quod illi quoq; subhæret præterieris, atq; ad contrarium veneris, hoc quoq; ab interno extrorsus est perpungendum, vnaq; cū eorum totum ipsi coniunctum abdomen. Deinde ab hoc incipiendum rursus, atq; id cum contrario peritonæo cōsuendum: ac rursus vicina quoq; cute transmissa, iterum ab ea parte acus introrsus est traicienda, cōsuendūq; abdomen id, cum peritonæo contrario: etiam inibi vicina cute transmissa. Atq; hæc iterum, iterumq; faciēda, quoad totum vulnus similiter consuerimus. Quod verò ad intervallum punctorum earundēq; altitudinem pertinet, mediocritas eligēda est. Filum etiam inter durum & molle medium quoddam obtineat. At verò medicamenta, quibus in his utemur, eiusdem materiæ sunt, cum vulnere glutinantib⁹. Sunt q aliter vulneratum abdomen consuant, ad hunc modum. Oportet à vicino nobis abdomine incipere, atq; ab externo introrsus per id tantum acum transmittere. Post, præteritis utrisq; peritonæi labris ex aduersa parte ab externo introrsus per utrumq; eius labrum acum reuocare: dein rursus hæc reuocare, atq; ab interno extrorsum per aduersum abdomen traicere. Atq; ita totum peritonæum sibi mutuo coalescens, prorsus intra abdomen absconditur. Deligatio verò extrinsecus, vel precipuè in his necessaria est. Adhæc quod inter bubones & axillas est, id totum molli lana ex oleo mediocriter calido imbuta circumdare oportet. Satius item fuerit,

& si per clysterē intestinis aliud simile infundas. Quod si quid ipsorum intestinorum sit vulneratum, quæ extrinsecus fieri debēt, omnia similiter, vt diximus, sunt peragenda. Cæterū quod iniicitur, vinum nigrum, austerum, & tepens erit. Ac crassa quidem intestina, sanatu facilia sunt: è cōtrariō difficilia, quæ tenuia existunt. Ieiunum autem est omnino incurabile: tum propter magnitudinem multitudinemq; vasorum: tum quod tunica eius nervosa, prætenusq; sit. Adde quod tum bile synceram hoc intestinum recipit vniuersam: tum quod omnium maximè est vicinum iecinori. Ventriculi autem quæ carnosæ partes infernæ sunt, curare cum fiducia tentabis: quæ verò in ore eius sunt, ex sensus acumē, quo minus sanentur, obest: atq; hoc etiam quod medicamenta illic diu hære nō possint. At verò omētum si per vulnus exciderit (præstat enim hæc pars animali vsus non vsq; adeò magnum: constatq; ex membrana tenui, arteriis atq; venis contexta) si quid ex eo nigricans sit, excipiemus id vinculo: ac sic, quod post vulneculum est, amputabimus: atq; vt in imo sine iam prædictæ suturæ abdominis, pendeant ipsius vinculi extrema, curabimus: quo nimirum ea, quæ ex vulnere suppurante euomentur, facile recipiamus. Sed iam ad fracturæ curationem veniendum est: cuius quidē scopus vnitio existit. Cæterū coalescere nequeunt ossa iuuenum, adolescentum, consistentium ætate, necnon senum, ob eorum maximam siccitatem, duritiemq;: tametsi interueniente alia quapiam substantia crassiuscula (quæ ex proprio eodemq; crasso ipsorum ossiū alimento redundat) concretescentq; in labris fracturæ, possint ceu quodam glutino, separatæ ossis partes connecti inuicem, atq; conglutinari. At verò quæ abudè sunt mollia, qualia in puerulis conspiciuntur, ea sola vnitionem recipiunt. Ergo si os aliqd per transuersum frangatur, sic disident à se eius partes, ut è dire-

Intestino alioquo vulnerato quid agendum. Intestina crassa esse sanatu facilia: difficilia autem, quæ tenuia existunt. Ieiuni intestini vulnus, cur incurabile.

Omento excedente per vulnus, quid agendum.

Fracturæ scopus vnitio. 5.
Ossa vt coalescant inepta, quæ sint.
Callū glutinantis ossibus nasci ex alimento eorundem.
Ossa puellorū sola, posse in vnū coalescere

cto non iaceant: quare primò curādum est, vt in direc-
ctum & contrarium agantur, iuxta integrę exemplū:
à qua nimirum certissima trāspōsitionis fractorum os-
sium indicatio sumenda est. Quęcunq; igitur retror-
sum (exempli gratia) magis sunt acta, ea prorsum ma-
gis impelli conueniet: nec minus alteram quoq; fracti
ossis partem modicē ad contraria retrudi. Cōtrā, quę
prorsum sunt emota, hęc rursus ipsa quidem retror-
sum: reliquam verò partem sensim duci prorsum: nec
secus de cæteris differentiis. Cauendum tamen est in-
terim, ne in adducendis contrario motu partibus, ex-
tantię fractorum ossium frangantur. Quibus sanè cō-
fractis, non poterunt ad amussim inter se coaptari fra-
cti ossis fines. Ob idq; disidentia ossa, è directo admo-
ta esse oportet: quod commodè fieri nequit, nisi retra-
cta sint: idq; aut manibus, aut vinculis, aut instrumen-
tis. Postea verò quàm abundē reuulsa fuerint, nec vl-
lus supersit metus, ne se in adducendo tangant, tum in
directum opponere, vinculaq; remittere, ac musculis
ipsis diductorum in idem commisionem permittere
expedit: interim verò te ipsum quoq; manibus subser-
uire: & sicubi aliquid paululū subsulter, corrigere atq;
formare. Ab iis secundum, quò diriges, fuerit, vt im-
motum prorsus membrum consistat: ne quid eorum
quę effinxis, moueatnr. Ne verò per motiones ipsas
disiungantur ossa commissa, tuta delegatura comple-
cti fracturam oportet. Quam sanè deligaturam nec
adeò debemus arctare, vt eam comprimat: nec remit-
tere ita, vt sit laxa. Ac pectori quidem latissima fa-
scia congruit: artubus autem & iugulo angusta, sed
qua tantum ex versuum numero, securitatis adiiciat,
quantum ex angustia deficit. Adhęc deligaturę prin-
cipium debet super ipsam fracturam iniici ac circun-
duci bis ter ue: hinc verò ad membrum reliquum di-
spensari. Siquidem qui sic deligat, & ab integris ad la-

borantem partem sanguinis cōfluxum arcet: & quod iam collectum in ea est, exprimit prohibetq; circa fracturam excitari tum phlegmonem, tum sphacelum, quæ ossiū caries, & corruptela existit. Cæterū quū duæ partes sint, quæ & recipere aliquid à laborante particula, & transmittere ad eam possint: utiq; quæ superiacent, tum propter multitudinem, tum magnitudinem, ad ambo magis sunt habiles. Extreme verò, propter causas contrarias, exiguum quidem aliquid vel recipere, vel transmittere possunt: at multum, nec ægris subministrare, nec ab ipsis recipere. Sed nec sola deligatura fasciarum est satis ad commissorum ossiū tutelam, nisi etiam & splenia vnà cum fasciis exterioribus adhibeantur, quæ hæc quoq; ipsa stabiliant. Ne autem phlegmone oriatur, cerato est humido vtendum. Iam verò repositionis figura eligenda est, quæ à dolore maximè sit immunis: quo nec phlegmonē particula contrahat: & æger persistere in vna ea diutissimè immotus possit. Ac talis sanè est q̄ maximè naturalis mēbro: vt brachio quidē, angulosa: cruri verò, quæ paulo minus porrecta est. Verū ad dolorem vitādū, non modò naturalis habitus cuius instrumento est utilis, sed etiā consuetudo quoq; conducere nō nihil videtur. In vniuersum aut̄ tum extendere, tum effingere, tū deligare, tum reponere, vna ea figura, quæ doloris minimum habeat, est studendum. Soluere autem deligaturā tertio die debes, ne in membro præter solitū cooperto dolor aut pruritus creetur: nec eius quod iā fracturæ est infixum, perspiratio prohibeatur. Cuius occasione nō modò noxius pruritus quibusdā accidit, sed etiam cutim ob acrimoniam saniei erosam exulcerari. Infundendū igitur tantū tēperatæ aquæ est, q̄tū ad euocandū eiusmodi saniem sit satis. Quod si rursum quoq; simili modo facies, utiq; septimo id à primo die facere debebis. Apparuerint verò iā omnia phlegmo

Sphacelos est
ossiū caries,
& corruptela.

Splenia fractis
ossis confirmā
dis requirī.
Ceratum humē
dum.

Figurā eā ossi
fractio eligēdā
esse, quæ mini
me dolorifica
sit.

Fracta ossa, ter
tio die soluen
da esse.

*Ferulis quādo
utendum ad
fracta ossa fir-
manda.*

*Perfusioe aque
calidæ quādo
utendum circa
ossa fracta.*

*Callo gignen-
do qualis vi-
ctus ratio con-
ueniat.*

*Callos promo-
uent emplasti-
ca medicamen-
ta, quæ modi-
ce calfaciunt.*

ne libera, & quā pro naturali habitu magis aliquādo gra-
cilia. Tunc igitur licebit & ferulas circūponere, & sol-
uere ex maiore interuallo. Nam antea quā phlegmo-
nes periculum esset, non erat tutum ferulis premere.
Quod si ex longiori interuallo eas soluas, callus multo
feliciter concreset. At vbi adeo exiccata sunt ossa, ut
callus produci nequeat, tertio vel quarto die modicē
aquam calidam infundemus, donec carnes in rubrum
tumorem attollantur: desistemusque prius quā subsidere
incipiant. Vbi verō aliquid digerere volumus, non pri-
us est desistendum, quā quod ex perfusione intumuit, sub-
sidat. In quibus autē, quo minus callus in fractura pro-
ueniat, humiditas abundantior obstat, ibi hanc siccare
conuenienti deligatura, & perfusione aquæ, quæ vel
minima omnino sit, vel plurima, conabimur. Minima
quippe, humores qui in superficie sunt, per spiritum di-
gerit: & qui in alto hærent, modicē liquat. Plurima
verō, digerit plus quā attrahit. Constat autem, in ea qui-
dem deligatura, quæ exprimet, minus esse arctandos
fasciarum fines: in ea verō quæ ad renutriendū est com-
parata, nec minus hos esse arctandos, & vniuersos cir-
conductus laxiores faciēdos. Quo tempore callus gi-
gnitur, nutriendum corpus est cibus optimi succi, & qui
multum nutrant: ex quibus provenire succus consue-
uit, non solum bonus, sed etiam tenax: qualis desydera-
tur ad calli generationem. Magnitudo autem calli ea
sit, quæ & ossibus tuto vinculo existat, nec musculos
tamen comprimat. Quare dāda opera est, ut si minor
iusto proveniat, augeatur: vel inhibeatur, si immodi-
cē crescat. Sunt verō quibus hæc efficies, ipsius perfu-
sionis quantitas, qualitasque: præterea ciborum quanti-
tas, & medicaminū quæ illi imponuntur extrinsecus,
facultates. Etenim quæcunque emplasticam substantiam
habent, ac modicē calfaciunt, ea callos tum promo-
uent, tum verō augent. Quæ verō digerendi vim ob-

tinent, ea magnos iam callos diminuunt. Conseruant in
 proprio statu, medicamenta quæ cruentis adhibentur
 vulneribus. Atq; hætenus de transuersis fracturis.
 Longæ autem, similiter sunt curandæ, cæterum com-
 primendæ magis in ipso fracturæ loco: tū quod reces-
 sit, retrudendum introrsum est. Quæ verò multifariâ
 confracta sunt, iis splenia circūdētur fasciæ ritu incur-
 ua, vt monet Hippocrates. Medicamēta etiam omnia
 ex siccantium sint numero, atq; ex iis quæ enæma vo-
 cant. Capitis autem fracturæ simplices, quæ ad secun-
 dam vsq; laminam caluariæ perueniunt, scalpellis an-
 gustis indigent. Expediit autem hos, vt numero mul-
 tos, sic esse magnitudine impares. Atq; vbi os vitiatū
 nudatum fuerit, primò quidem, vtendum latiore est:
 secūdo loco, eo qui sit illo angustior. mox ita deinceps
 reliquis, vsq; ad angustissimum omnium: quo sanè est
 in ipsa secunda lamina, quam diploen appellant, vtē-
 dum. Post hæc tum protinus, tum ad finem vsq; siccis
 est medicamentis medendum, quæ ob id cephalica vo-
 citantur. Ea componuntur ex iri Illyrica, & erui fari-
 na, & manna, & aristolochia, & panacis radice corti-
 ce, & in summa, omnibus quæ extergere citra mor-
 sum possunt. Ipsa nanq; generatio carnis, naturæ op^o
 est. Itaq; ægro ad eam rem nihil est opus arte medica.
 Vt autem quæ prouenit caro coalescat, circūhæreatq;
 omni ossis parti, id inde maximè eueniet, si nec for-
 des super eo sit, nec oleosa quæpiam pinguitudo. Id
 igitur est, quod ægris medici ad carnis productionem
 præstant, vt totus locus siccus sit, tum quælibet ossis
 vitiati pars planè pura. Ex fracturis verò quæ ad cere-
 bri vsq; membranas peruenerunt, si simplex tantum
 fractura sit, angustis scalpellis vtendum. Sin cum cōtu-
 sione aliqua, quod contusum est, excidi debet: idq;
 vel terebellis prius in circuitu foratum, ac mox scal-
 pris admotis: vel protinus ab initio cycliscis. At quæ p

Callos minuē-
tia.

Callos in statu
proprio seruan-
tia.

Fracturas lon-
gas curandi rō.

Capitis fractu-
rarum curatio.

6.

Cephalica me-
dicamenta.

Carnis produ-
ctio, naturæ o-
pus est.

Fracti simul &
contuli capitis
ossis, curatio,

Terebellæ usū
in fracturis capi-
tis, ceu parū
tutū Galenus
dānat.

Cycliscorum
usum ī magnis
fracturis capi-
tis, quādo pro-
bat Galenus.

Lenticularia
scalpra,
Caluariæ forā-
dæ ratio,

Ostagræ usus.

Dimidium fa-
cti qui bñ coe-
pit habet.

terebellam quidem ratio fungitur, parū tuta est: pro-
pterea q̄ dum audacius eam tractāt, duram membra-
nam, quæ ossi substernitur, non raro violāt. Quod ve-
rò per cycliscos opus administratur, ne id quidem ont-
nino vitio caret: quum quatiat immodicē caput: quod
potius quietem postulat. Cæterum si magnæ sint fra-
cturæ, & ossa quæ fracta sunt vehementer mota, mihi
cycliscorum vsus perplacet. Quippe paucis excisioni-
bus facies lenticulatis excisoriis locum. Sin firma pluri-
mum ossa sint, foranda sunt terebella. Terebellis autē
ipsis, vt mergi non possint, parum supra cuspidem, nō
nulli supercilium extans efficiunt. Expedi itaq; id ge-
nus complures præparatas habere ad omnem calua-
riæ crassitiem. Commodissimè tamen cycliscis vteris:
& primo quidem aggressu, latioribus: postea, magis an-
gustis: donec ad crassam membranam perueneris. Ve-
rū quod excidi oportet, id totum cycliscis nudandū
non est, sed ex ea maximè parte, qua fractura est gra-
uissima. Nam præter alia, etiam membrana ipsa ab os-
sibus quæ sunt vehementer afflicta, recedit celerrimè.
Si verò vnam semel partem nudaueris, atq; scalprum
in cuspide habens præfixā, obtusamq; et læuem len-
ticulæ speciem, aciem verò per longitudinem erectā,
submiseris, vbi latam partem lenticulæ statueris su-
per membranam, feries malleolo, ac sic caluariam q̄
tutissime diuides. Neq; enim qui minus cum periculo,
nec qui celerius perficiatur, forandi modum alium in-
uenias. Iam verò instrumento, quod ostagram vocāt,
nonnulla ossium vehementer cōminutorum vel exal-
tantes, vel conuertētes, per eam potissimum partem
lenticulato scalpro præparabimus aditum. Quod qui-
dem vbi demissum fuerit, dicere possis illud prouer-
bium celebre. Dimidium facti qui bene cœpit habet.
Igitur qđ vehementer confractum est, id totū est auge-
rendū. Si verò ab eo fragmenta quædā longius excur-

rant, hæc persequi ad finem non expedit: illud persua-
sam habentibus, minimè futurum ut ex eo noxa se-
quatur vlla, modò reliqua ritè sint nobis peracta. Atq;
indicatio agèdorum hic quoq; ex natura ipsarum par-
tium affectarum subministratur. Necessum itaq; in ca-
pite nobis (quatenus distum est) primò fracturæ aliqd
denudare: quo videlicet detergere & abluere à mem-
brana saniam possimus. Post verò, quum phlegmones
tempus præterit, omniaq; ad vnguem sunt sicca, car-
nem producere, ac cicatrice locum includere. Porro
quum vnus atq; alter homo occurrisset mihi habens
sincipitis atq; temporis os confractum, equidem supe-
rius, hoc est sincipitis, os exemi: à temporali autem ab-
stinui: cui callum inducendum curavi. Nec infelicitè
cessit nobis negotium. Quòd verò ad medicamenta
post foratum os infundenda pertinet, quandoquidem
auditorius meatus (qui non solum vsq; ad cerebri du-
ram membranam penetrat, sed etiam neruum contin-
git, q in ipsum descēdit à cerebro) vehemētissima me-
dicamenta tolerat: nihil miri sit, si crassa membrana
cerebri, anteq̃ notabiliter occupetur phlegmone, va-
lentissimis post forationes etiam medicamentis gau-
deat, ceu naturaliter siccam substantiam possidens.

Fracturas cra-
nii admodum
exporrectas &
longas, non es-
se persequen-
das ad finem
vsq;.

Cranio forato,
valētissimis
& siccissimis
medicamentis
gaudet dura
membrana ce-
rebro.

GALENI PERGA

MENI DE MEDENDI

METHODO. LIB. VII.



EDENDI Methodum Eugeniane
charissime, quā olim In Hieronis gra-
tiam scribendam susceperam, postea
q̃ illum functum vita intellexi, ipsi
quoq; persequi destitimus. Tu nanq;
mihi conscius est, neq; hoc me opus,

neq; aliud vllum, popularis auræ studio fuisse aggressum: sed quo vel amicis gratificarer, vel me ipsum simul vtilissima ratione ad rem propositam exercitarem, simul ad obliuionem senii (vt Plato inquit) cōmentarios mihi reponerem. Quippe multitudinis laus cōmodum ad vsus nonnullos instrumentum viuentibus aliquando est: mortuis certè nihil prodest, sicuti neq; viuentium quibusdā. Nam qui viuere in tranquillo optarunt, & fructum ex philosophia cœperūt, sunt q; iis quæ corpori curando sufficiunt contenti, eis vtiq; impedimento non paruo est apud vulgū fama: vt quæ ipsos à rebus pulcherrimis plus iusto transuersos auferat. Ego verò (haud scio qua ratiōe) ab ipsa vsq; adulescentia mirificè siue inspiratus, siue furore percitus, & vulgi famam contempsi, & veritatis scientiæq; studio flagraui: nullam eē hominibus neq; honestiorem, nec diuiniorem possessionem ratus: ob idq; nulli meorum librorum meum nomen præscripsi. Quandoquidem igitur in præcedentibus commentariis, quemadmodum similarium instrumentaliumq; partium communem morbum, nempe solutionem cōtinui, curari cōueniat, scripsi: deinceps quod reliquum est, in tui, & aliorum amicorum id flagitantium, gratiam, adiiciā, reuertarq; ad eum morbum, qui omnium est primus: nempe qui in similaribus nascitur: quibus scilicet primum animantis functiones referuntur acceptæ. Est enim hoc morbi genus cognitu maximè necessarium: nec ratione curari potest, primis elementis corporis ignoratis. Ergo quoniam vna quæq; animalis particula propriam actionem ædit, quæ tantum ab aliæ actionibus differt, quantum ipsa particula ab aliis, quæ illas ædunt, diuersa est, temperamenti ratione: sanè qui tue ri partium actionem vult, hic temperiem earum custodiat oportet. Custodiet autem, si id quod ad calidius cōuersum est, refrigerabit: quod ad frigidius inclinat.

Laudem popularem mortuis nihil prodesse, sicuti nec viuentium quibusdā

Galenus iactantia.

2. Galenus nulli librorum suorum proprium nomen præscripsit.

3. Similaribus partibus primum animantis functiones referuntur acceptæ.

METHODO MED. LIB. VII.

383

tum, exalfaciet: ac de cæteris in tēperantiis, tā sim-
plicibus, q̄ compositis, eadem ratione. Quū enim octo
earum sint differentia, octo nimirum erunt & meden-
di rationes: quibus particula, per cōtraria eorum quæ
exuperant, ad naturalem symmetriam reducitur. Erit
itaq; curationis vna meta communis (quò diriguntur
consilia medentis) ipsius similis corporis alteratio:
quandoquidem etiam morbus, ex naturalis tempera-
menti alteratione est ortus. Medicatio autem particu-
laris, ex materiæ copia, & huius congruente vsu confi-
citur. Sed horum iam proponamus exemplum, auspi-
cati à ventriculo. Ac facillimæ quidem curatu eius al-
terationes sunt, quæ ex calido & frigido oriūtur: pro-
pterea q̄ maximè actiuis qualitatibus corriguntur.
Aegrius verò curantur, quæ in humido, siccoq; habentur,
q̄ qualitatibus imbecillis, curatio earum perficia-
tur. Ac tempus quidem caloris, frigorisq; reparandi,
par quodāmodo est: securitas tamen impar. Nisi enim
cunctæ quæ ei quod curatur circundatæ sunt particu-
læ, validæ planè sint, verendum est, ne ab iis quæ refri-
gerent, noxam contrahant non leuem. In reliquis dua-
bus qualitatibus est securitas similis. Tempus tamē cu-
rationis in sicca intemperie multo amplius est. Quip-
pe quod senium in sanis, id in ægris sicca intemperies
existit. Itaq; etiam insanabilis est, si prorsus sit consum-
mata: nempe vbi solida partium similarium substantia
reddita fuerit siccior. Nam est & altera siccitas, utiq;
quum ea, quorum substantia ex humore concreto cō-
stat, sicuti caro & adeps, sunt liquata. Etiam tertia, quū
propria humiditas, vnde partes nutriuntur, & quæ in
illis habetur veluti, ros quidā sparsus, omnino est ab-
sumpta. Diuersa ab iis siccitas est, quæ in propriis cuius-
que particulæ exilibus arteriis atq; venis consistit. Pro-
uenit autē & hæc ex penuria sanguinis. Omnibus igitur
his siccitatibus maximè contrarius est austerorum

Intemperantia
rum esse diffe-
rentias octo: co-
tidemq; medē-
di rationes.

Medicatio par-
ticularis ex
materiæ copia
& huius con-
ueniente vsu cō-
ficitur.

Ventriculi al-
terationes quæ
ex calido & fri-
gido oriuntur,
esse curatu fa-
cillimas.

Sicca intempe-
ries i ægris est
quod senium
in sanis.

Siccitas con-
summata est in
sanabilis.

Siccitatis spe-
cies uariæ.

Austerorū usus
siccitatibus ad-
uersatur maxi-
me.

(4)
5.

6.

Siccitatum cu
ratio.

Lac asininum
siccis affecti-
bus maxime
congruēs esse.
Lac si in aere
aliquandiu im-
moretur muta-
ri prompte.
Semen genita-
le extra ppria
vasa corrūpi.
Lac muliebre
esse optimum
tabidis.
Lactis asinini
prærogatiuæ.

Mel optimum
quale esse de-
beat.

Lac optimum
quale.

usus. Quippe quæ si quid in iis superest naturalis humo-
ris, id absumunt, partim ebibentia, partim in sinu ven-
tris per exiguos meatus exprimentia, partim ad conti-
nentes partes trudentia. Curabis ergo ipsas, si meatus
qui contracti sint, dilataueris: ac quod in vicinas par-
ticulas est impulsum, reuellas: præterea singulas simila-
rium partium propria humiditate, humectantis nutri-
menti ope, repleas. Cui negotio lac asininum ex ipso
animali suctum, vel maxime ex usu est. Quod si asinā
fugere æger ipse grauetur, expedit, ut q̄ minimo tem-
pore lac in ambiente aere moretur, propterea q̄ celer-
rimè mutari ē aptum, genitalis seminis ritu, quod nec
ipsum aliquandiu extra propria vasa morari patitur.
Optimum autem, utpote cognatum, existit muliebre
lac: quod quidem sugendum iis suadet Prodicus, qui ta-
be absumuntur. Sed quoniam id exhiberi sibi ceu pue-
ris pleriq̄ recusant, utiq̄ ceu asinis, asininum ipsis da-
ri conueniet. Id si quidem reliquis omnibus ad propo-
situm affectum utilius est: quum & tenuissimū sit, coa-
guleturq̄ minimè, & quoquo versus ocysimè digera-
tur in corpus. Est itaq̄ lac ipsum iis tum per se dādum:
tum pauxillum ei tepidi mellis miscendum. Cæterum
quod mel flauo ē colore, odore suauis, tum purū adeò,
ut totum pelluceat, ac gustanti parum acre iucundissi-
mumq̄: præterea tam sibi hærens, ut si attollatur digi-
to, cōtinuum sibi, nec intercisum, ad humum defluat,
id omnium optimum iudicatur. Si verò abrumpitur,
nec demissum ad terram vsq̄ continuitatem tuetur,
id aut crassius iusto ē, aut tenuius, aut dissimilium par-
tium. Debet autem nullam penitus alterius cuiuspiam
rei eminentem in se cōtinere qualitatem optimū mel.
Quare quod thymum planè redolet, minimè probo.
Ad eundem modum & lac nullam externam qualita-
tem odore gustu ue præ se ferat: sed esto q̄ dulcissimū,
& sibi ipsi continuum, & prout lacti cōuenit, splendēs,
super

super omnia, quoad eius fieri poterit, similes partes habeto. Quo verò tale lac fiat, & idoneis nutrimentis alendum animal est, & exercitationibus mediocribus exercendum: & pullus, si quem lactat, auferendus. Quò autem ætatis quoque florentis esse vel maximè debeat, id neminem later. Curandum quoque ut quò optimè concoquat: contemptis videlicet iis, qui si asinis quoque præscribemus victus ratione, ridebunt. Fingamus igitur ægrum aliquem tum lotum esse, tum lac hausisse: hunc ad secundam usque lauationem quiescere permittemus, tum modicè fricabimus, & pinguius: utique si lac quod sumpsit, iam ad vnguem confecit: id quod tum ex rustu, tum ventriculi mole, nobis licebit coniicere. Modicum verò temporis inter primam & secundam lauationem interuallum erit, si quatuor aut quinque æquinoctialium horarum interuallum intersit: scilicet si tertio adhuc lauare paras: sin aliter, plurius. Sanè tertio lauabis, si multis lauationibus fuit assuetus. Quin etiam post quamque lauationem hominem vngemus oleo, prius quàm se vestiatur: ne videlicet plus digeratur æquo, sed obstruantur exigua cutis spiramenta. Quippe conducit ad renutricationem id quoque, sicuti & frictio. Iam verò siue cuilibet parti corporis temperatam infundas calidam aquam, siue frices, siue laues, siue aliter quomodocumque calfacias, primū quidem attollitur: mox efficitur gracilis: ideoque ubi carne implere quodlibet corpus studemus, id eatenus calfaciendum nobis est, dum intumescat: ubi verò primū intumuerit, tunc supersedendum est. At si digerere & euacuare contendimus, eatenus continuandum est, dum quod prius intumuit subsidat. Si æger igitur delectetur lacte, post secundam quoque lauationem id exhibebis. Sin aliter, ptisanam diligenter coctam, aut alicam ptisanæ ritu præparatam. Hinc ubi rursus quiesuerit, ad tertiam reducendus est lauationem: aut illico ad cœnam. Sit autem præparatus illi panis purus, probè co-

Animal cuius
lacte uti volu-
mus, optima es-
se victus ratio
ne educandum

Vnctionem ex
oleo obstrare
quo minus di-
gerantur ac re-
soluatur succi.
Carni augen-
dæ, minuendæque,
qualis frictio,
perfu sioue de-
syderetur.

Testes gallina
cei.

Testes gallina
cei.

Suilla caro est
maximi nutri
menti, ægre tñ
concoquitur.
Vino vtantur
oēs quibus re
fici corpus ex
pedit dūmodo
non febricitēt.
Vinū aquosū.
Vinū uinosum.
Vinum nouel
lum.

Vinum anti
quius.
Aquæ uitia p
ueniunt ex ei
frigiditate.

Aqua distribuē
do alimento p
corpus non ui
detur usq̃ adeo
conducere.

ctus in furno, quiq; tum fermenti, tum salis, quod sa
tis est, habuerit. Opsonium quoq; sit ex saxatilibus pi
scibus, aut ex albo iure asellus: necnon alæ testesq; gal
linacei, qui lacte sit altus. Quorum si copia nō est, aliis
vtendum. Ad eundem modum & perdicibus, & mon
tanis auiculis, quæ mollem carnem sortiuntur, vescen
dum. Vitanda autē & quæ palustria sunt, & quæ carne
sunt dura. In summa verò, alimentum sit coctū facile,
& nutriens: minimeq; glutinosum, aut excrementitiū.

Porrò omniū ciboꝝ, quos nouimus, maximè nutriens
suilla caro est: verū non æquè ac prædicta, concoctū
facilis: præterea glutinosum succum, crassumq; gene
rat. Quare hac vtī ad propositū affectum nō conuenit.

At vino vt vtantur oēs, quibus refici corpus est opus,
consulo: modò non febricitent. Esto tamen id & aquo
sum, & astringens leuiter. Aquosum natura appello vi
num, quod tenue est, & purum, minimaq; aque mistio
nem ferens. Cauendū autem à vinoso est, q̃ feriat vi
res imbecilliores. Rursus, nouellum vinū tū aquosius,
tum imbecillius quodāmodo est, q̃ vt vino conueniat.

Adde etiā q̃ ægrius concoquitur, ac magis excremen
tosum est. Antiquius verò, vt vinosius est, ita vehemē
tius existit, q̃ vt propositis sit ex usu. Porrò aquæ vitia
pendent ex eius frigiditate omnia: cuius culpa, & mo
ratur in præcordiis diutissimè, & fluctuationes exci
tat, & in flatum vertitur, & corrumpitur, adeoq; ven
triculi robur resoluit, vt deterius proinde concoquat.

Sed nec digerendo per corpus alimento magnopere
videtur aqua conducere. Quibus sanè aquæ vitiis, qua
le nuper diximus vinum contrarias virtutes obtinet.
Potionis itaq; is erit modus, vt neq; in ventriculo in
natet, nec fluctuationis vllius sensum inuehat: ciborū
verò, vt vel non grauent: vel grauare q̃ citissimè desi
nant. Ab hoc tensio inflatioq; præcordiorum vitandæ
iis sunt. Ergo si ob affectum ventriculi totum corpus

macrescat, exquisitior victus ratio desyderatur, propter concoctionis imbecillitatē. Vbi verò æger sanior est redditus, ad refectoriā est transferendus. Id fiet, si pluribus & frictionibus, & gestationibus, quā antea utemur: ac ciborum tum qualitatem, tum quantitatem mutabimus: ita ut plures & valentiores quā prius exhibeantur. Quū verò ad sanitatis statum propemodum ventum iam sit, cibandus volatilibus est: illique iam offerre carnes suillas licet: primum quidem, porcelli pedes in ptisana elixos: dein pernam: ab hac etiā reliquas partes. Quē porcellum, si hyems sit, pridie fuisse iugulatum oportet. Nam hesternus, quā recens necatus, facilius concoquitur. At æstate, sat fuerit, si porcellus mane immolatus fuerit, ac iuxta occasum solis edatur. Quippe semper alimentum valentius ad vesperam exhibendum est. Quū igitur qui macilentissimi sunt, plurimo nutrimento indigeant, nequeant autem vel quod mediocre est concoquere: paulatim eos, sed sæpius cibare erit melius. Atque hac sanē de causa ipse eos ter cibare sum solitus. Verū quando iam manifestē meliores sunt facti, etiā bis nutruisse sit satis. Quare tantam exhiberi primam cibationem est rationabile, quanta prius quā secunda sumatur, tota prorsus erit concocta: id quod valentiori contingere alimento non potest. Idcirco primo loco leue sumendum eis est: secundum autem crassius, quandoquidem & quies & somnus, & longius tempus huius naturalem administrationem excipit. Iam verò bibendum illico post cœnam nō est, ante quā cibus fuerit concoctus. Siquidem innatant cibi si bibant, ita ut eos ventriculi corpus, propter humorem interpositum, non contingat. Cæterum si magna siti torqueantur, tantillum est propinandum, quod & molestiam soletur, & sitim leuet. Vbi verò nutrimentum concoxerint, abunde bibere sunt sinendi. Mane autem, post somnū, quū deiecerint, & paulum inambulauerint, modicē sunt

Refectoria uictus ratio, quomodo administratur.

Hesternum, quod recens necatum porcellum, facilius concoquitur.

Vesperis exhibendum est alimentum ualentius.

Macilentissimi sunt cibandi parce, sed crebro.

Cibi cur crassiores in cœna dandi.

Bibendum illico a cœna quibus non sit.

Conualescētū
tūctus ratio, me-
dia est inter eā
quæ sanis, &
eam quæ ægris
debetur.
Cōsuetis cibis
utendum.
Vigiliæ quib⁹
sint aduersis-
simæ.

Senium ex
morbo.

Siccitatis spe-
cies quatuor.

fricandi: videlicet donec corpus incaleat: mox gesta-
tionibus utendum. Deinde tum lauandi sunt, tum frican-
di, idq; intra vel circa meridiem. Quum igitur conua-
lescentium victus ratio media quædam sit inter eā quæ
sanorum propria est, & quæ ægrorū: difficile minimè
fuerit, ex iis quæ de utraq; sunt prodita, ut p seipsum
quis mediam inueniat. Domus in qua conualescens
nutritur, sit temperata: laborādumq; ut ad eos cibos
reducatur quisq; quibus insuevit: naturarum interim
proprietas obseruata, necnon regionis & temporis.
Sciendum aut est vniuersum corporis habitum exicca-
ri à vigiliis: ac proinde eas infestissimas esse iis, qui ex
siccitate laborant. Qd verò ad nutriendi modum spe-
ctat, si corpus modicè siccum sit, vberius nutrire id li-
cet: propterea q vires eius, quæ utiq; alimentum con-
ficiunt, penitus non conciderunt. Si verò immodicè,
parcius, contraria ratione. Porro intemperies sicca,
vbi solida corpora contigerunt, si quidem in vna qua-
piam parte consistant, veluti nunc in ventriculo pro-
positum est, nunq integrè sanabuntur: neq; in eum sta-
tum qui ante morbum fuit, reuertentur: sed in reliquā
vitam particula affecta laborabit imbecillitate. Quod
si intemperies sicca etiam solidas cordis partes occu-
pet, celeriter sic affecti inarescunt. Quem marasimum,
Philippus vocat ex morbo senium. Is itaq; breui mor-
tem conciliat. Proximè huic, qui à iecinore inceptus ē.
Mox qui à ventriculo. Qui ab aliis partibus ortum ha-
bet, tanto tardius, quanto quælibet harum, ignobilior
q illæ existit. Cæterum victus ratio eadem genere est,
tum in hac siccitate, tum in illa, quæ solam eam humi-
ditatem absument, quæ nutrit solidas partes. Præterea
etiam in tertia, quam supra memorauimus, siccitate.
Facillima verò omnium sanatu quarta est, in qua ve-
næ succo suo sunt inanitæ. Immo hic affectus ut frigi-
ditas poti⁹ corporis, q ut siccitas, est curandus: ac pro-

inde eius sanatio est celerrima. Scire autē licet, solidorum corporum siccitatibus, si perdurēt, succedere necessario frigiditatem. Celerrimē nanq̃ ex nutrimenti defectu refrigerant partes, propterea q̃ ex calido sanguinis succo nutriuntur. Si igitur siccitati partium iuncta frigiditas sit, duplex erit medēdi ratio, humectans scilicet, & modice calfaciens. Nam quæ calfaciunt impensē, iis vehementer siccandi vis inest. Quare calfacientis materiæ humectantibus medicamentis tantum miscendum est, quantum particula ad frigus ratione siccitatis inclinat. Proponamus ergo (exempli gratia) ventriculum tum siccum, tum modicē refrigeratum alicui esse. Huic certē simul cum lacte vberius mel exhibebimus. Vinum verò, quod minus aquosum q̃ prius sit, & plurium annorum, dabimus. Quinetiam esculenta omnia calidiora offeremus: idq̃ tum naturali temperie, tum ignis opera, sic comparata. Nardino p̃terea vnguento vngendus assiduē est venter, sic vt nunq̃ siccus remaneat. Eius si copia nō adsit, vtere mastichino, aut opobalsamo: & per se, & misto dictis vnguentis. Quod si cupis vt magis ea corpori adhæreant, cere nō nihil est admiscendum. Si aer ambiens sit frigidus, lannam opobalsamo, aut vngueto nardino imbutam, in quibus liquata prius chia mastiche fuerit, admouebis ventriculo. Præstiterit autem imbueri optimam purpuram, qualis est Tyria: quando & astringi ipsum modicē, & cutis eius meatus obstrui expedit. Siquidē quæ rarum habitum faciunt, & relaxant, ea tum digerunt succos, tum particulas frigidis extrinsecus aduenientibus obnoxias reddunt. Quæ verò valenter astringūt, ea siccant. Quo fit, vt medicamētum qd̃ eiusmodi corpora calfacit, id neq̃ euocantē vim habere expediat, neq̃ astrictoriam multā sibi immistam. Memineris ēt, qualitatem acerbam, sua quidem ipsius virtute, & refrigerare & siccare: quare etiam prohibenda est in hu-

7.
Siccitati cor-
porū solidorū
si perduret, suc-
cedere necessa-
rio frigiditatem

Ventriculo sic-
co, modicēq̃
refrigerato, q̃
medendi ratio
debeat.

Ventriculo sic-
co & frigidior-
ri reddito, quæ
unctiones con-
ueniant.

Purpura Tyria

Acerbam quæ
litatem refri-
gerare & sic-
care.

iuscemodi affectibus. At si cum sicca intemperie multa frigiditas adsit, in nardino vnguento similiter Chiā mastichem q̄ pinguisimā solues, ac purpura excipiēs, vteris. Cōmodissimè etiam adieceris opobalsamum.

Mel cum lacte cōferre uentriculo sicco, impenseq̄ refrigerato.

Dandum præterea vberius cum lacte mel est, sed super prunas ex quercu, vitē ue, Idespumatū curiosè, quo & minus sit excrementosum, & magis nutriat. Quin etiam mel ipsum despumatū per se optimum nutrimentum frigido ventriculo est, vt aduersissimum calido.

Vinū antiquū ventriculo refrigerato congruere.

Vinum autem eligendum semper antiquū est, eoq̄ antiquius, quo maior fuerit frigiditas. Sed nec adeò eē debet vetus, vt iā amaricet. Siquidem vina amara, im-

Vina amara immodice siccāt. Picatione in quibus vtendum.

modicè siccant. Sanè optimum medicamentū talibus omnibus sit, quo picatores quotidie vtuntur. Ergo il- linire eo totum ventrem, sicuti & alias omnes particulas, quæ alimentorum vsu non promouentur, conueniet, ac post auelli, priusq̄ refrigeretur. Quod quidē

Puellus admotus ventri, fouet calorem illius.

si bis vno die feceris, abundè fuerit. Naturalem ventriculi calorem tuetur & fouet admotus Puellus, qui boni habitus sit, & minimè cute humecta. Sunt qui catellos pingues in hunc habeant vsu: qui etiam ex vsu sunt iis, qui propter siccitatem solam habent imbecillum ventriculum. Nocent autem intemperantiis eiusmodi, fomenta calida: quæ quidem sicca sunt, eo q̄ ro-

Fomenta calida quibus nocentia sunt.

rem simularium depascunt corporum: quæ verò humida, q̄ hunc digerunt: potissimum vbi largius his vtimur: præterea q̄ nimis rarum, frigoriq̄ opportunum

8. *Ventriculo admodum sicco, & modice incalēscenti præter naturā, qua līs uictus ratio est ex vsu.*

corpus efficiant. At si multæ siccitati sit calor non admodum multus adiunctus, abstinendum à melle est, vinumq̄; minimè antiquum bibendum. Iam cibos offeremus tepentes: sed si æstas sit, qualitate referentes aquam fontanam. Ventriculum autem vngemus oleo tum crudo, tum melino. Ac multo sanè magis, si plusscula caliditas sit, ipsum vinum tum aquosius exhibebimus, tum sub eo frigore, quod fontis aqua per me-

dium ver exhibet: illud nobis persuadētes, eiusmodi affectum febris proportionē correspondere. Nam quod illa vel in toto animali, vel in corde est, id propositus nunc affectus est in ventriculo. Cæterum ubi validē in ambabus qualitatibus immutata quævis particula est, omnis eius actio perit, atq; labefactatur: nec facillē qd sic est affectum, ad suam naturam reuerti potest. Vbi verò altera tantum qualitas plusculum immutata est (veluti nunc siccitatem finximus) reliquarum autem aliqua se habet mediocriter: utiq; qui ita est affectus, sanari potest. Si ventriculus in temperie affligatur calida, cui mediocris humiditas iuncta sit, facillē affectus is frigida potione curatur: quum minimē ex ea lædantur partes vicinæ: utpote se habētes mediocriter. Nam in siccis ventriculi affectibus, necesse est, non ea modò, quæ proxima sunt, sed etiam totum corpus gracilius reddi: ac proinde tunc potus frigida maiori cum periculo administratur. Sic ubi verò adeò vehemens caloris intemperies ventriculum occupet, ut vsq; ad cor ipsum perueniat, febricitare hominem est necesse. At intemperies humida ut cunq; accidat, facillimē oīum curatur. Cuius quidem, si sola consistat, remedia sunt cibi citra valētem calefactionem, refrigerationem ue siccantes: præterea cōsuetæ potionis parcitas. Eius autem quæ cum caliditate coniuncta est, astringentiū tū ciborum, tum potionum minimē calfacientium vsus, necnon potus frigida: quemadmodum illius quæ frigori est iuncta, optima præsidia sunt acris omnia, quibus admisceri debent quæ acris sint, minimē tamen euidenter refrigerantia: præterea potio exigua, eaq; vini insigniter calidi, veterisq;. In vniuersum autē calida intemperies ventriculi, refrigeranda est: frigida calfacienda: humida siccanda: sicca madefacienda. Ad eundem modum quæ ex duabus qualitatibus intemperantia constant, reliquis contrariis sunt retundenda.

BBb iiii

Ventriculus in
temperie labo
rans calida, cū
humiditate me
diocri, facile fri
gidæ potione
curatur.

Frigida potus
quibus pericu
losus existat.

Humida intē
peries facillē
me omniū cu
ratur.

9.

Ventriculi in
temperantias
esse corrigen
das contrariis.

10.

Ventriculi in-
temperies fri-
gida & sicca,
est omniū pes-
sima.

11.

Ventriculi in-
temperantias
quibus copula-
tus est humor,
qua ratioe cu-
rari cōueniat.

Abſinthii po-
tio quibus ſit
congruens pre-
ſidium.

Aloem purga-
re humores in
tunicis ventri-
culi imbibitos
Aloes elotæ fa-
cultas.
Hiera picra du-
plex.

Pesſima aut̃ omnium eſt intemperies, inter ſimplices quidem, ſicca: inter compositas verò, ſicca ſimul & fri- gida. Atq; haſtenus de ventriculi intemperantiis, citra humoris affluxū. Vbi verò aliquis humor aut in ipſo ſi- nu ventriculi deliteſcens, aut imbibitus in illius tuni- cis, author intemperantiæ extiterit, expurgandus ille eſt. Quòd ſi ab aliis partibus tranſmittatur (id quod ex toto corporis habitu, ac tum ſingularum partium ex- ploratione, tū ex vacuationibus ſolit̃is, retentiſq; nec non cōſueta victus ratione, cognosces) primò illis eſt ſuccurrendum. Dein verò, roborandus ventriculus, q̃ eorū quæ ad ſeſe confluunt, minus promptè quicq; ad mittat. Verū ſi quidem ex minus momentaneis fa- cta tranſlatio ſit, quod ſuperfluū eſt, rurfus ad ea reuel- les. Sin ex iis quæ maioris momenti ſunt, ambobus ſi- mul conſules, eū ſemper affectū ſubmouens, qui fluxio- nē excitet. Fiet id, ſi omnes corporis partes ad bonam reduxeris habitudinem: omnesq; expulſiões naturæ, fluxiles ſemper reddideris. Quòd ſi ob æqualium in to- to corpore redundantia humorū, ventriculus fluxiōe tēteretur, totū corpus eſt euacuādū. Si propter mali ſuc- ci abundantia, ea purganda eſt: atq; hinc ad ventricu- lum conuertenda curatio. Quæ igitur in ſinu eius con- tinentur, cōmodè expurgantur per vomitū. Verū ſi q̃ plures dies prauus humor decubuerit in ipſum, ven- ter aliquid ſibi vitii contraxerit, haud intēpeſtiuè, qui ſic laborat, abſynthii potione vtetur. Per contraria au- tem corrigi inducta intēperies debet. Si vitioſus ſucc⁹ in ventriculi tunicis ſit receptus, curari is affectus de- bet, pharmacis quæ modicè purgent. Cæterū quæ ex Aloe cōponuntur, omnium ſunt longè aptiſſimæ: nec ſecus ipſa ſola aloe. Quæ quidem ſi illota ſit, valen- tius vacuat: elota aut̃, purgat quidem minus, ſed robo- rat ventriculū magis. Expedit ergo paratā habere hie- ram, tū ex aloe illota, tū ex elota confectam. Admiſcē

METHO. MED. LIB. VIII.

tur aut huius drachmis centenis, cinnamomi, xylobal-
sami, asari, spicæ nardi, croci, & Chiæ mastiches, sin-
gulorū sex drachmæ. Præstantissimū hoc medicamen-
est contra vitiosos succos, qui in tunicis ventriculi ha-
bentur: vtiliusq; fuerit eo sicco ex aqua vti duū paruo-
rum cochleariū mensura: vbi mediocriter illo vti stu-
demus. Siquidem maximus eius modus, est magno-
rum duūm cochlearium potio, in aquæ tēperatæ cya-
tis tribus: vt minimus, vnius parui. Utendū verò hoc
tempore & ptisanæ cremore est, qui primus à balneo
sumetur. Nā medicamen ipsum solito purgātium me-
dicamentorū tempore dabitur. Post id verò, vbi modi-
cè inambulauerit, de reliqua victus ratione nihil est im-
mutandum. Sunt qui reponunt medicamentū, excipie-
tes id despumato melle. Et fit quidem sic durabilius: cæ-
terū nō perinde ad propositos hoc loco affectus vti-
le: quum & minus uentriculū roborat, & magis aluū
subducit. Verū quibus lenta pituita est infixā ventri-
culo, iis prius sunt exhibenda, quæcunq; eam dissecēt.
Post deinde purgandū. Quod si ad vomendū sint apti,
non inutile fuerit per radiculā ex oxymelite vomere.
Sin verò nec lentus humor sit, nec crassus, vtiq; abun-
dē fuerit, à ptisanæ solius cremore vomuisse: itē à mul-
sa. Quo casu sumendū vtrius vis plus est, q̄ vel nutrimē-
ti, vel etiam deiectionis causa sumeretur. Idoneū verò
est, & si mulsa, in qua coctum absynthium sit, bibatur.
At verò si plures affectus in vnum coeant, ad eum qui
magis vrget, dirigi primū curantis consilium debet.
Vbi aliud efficiens est, aliud quod ab eo efficitur, ipsa
causa spectanda. Sin aut curari hoc ante illud nō licet,
ad id quod ordo dictat, est respiciendum. Atq; in eo q-
dem curationis consilio, quod ab urgente initur, affe-
ctus magnitudo perpendenda est: quæ sanè triplex exi-
stit. Alia nanq; ex læsæ actionis præstantia spectatur.
Alia ex propria affectus essentia. Tertia præter has, ex

393

Hierę picræ cō-
positio.

Hierę siccæ
vsum ex aqua
unice Galenus
cōmendat, con-
tra vitiosos suc-
cos uentriculi.

Hiera cū melle
cōfecta minus
uentriculū im ro-
borat, sed ma-
gis aluum sub-
ducit.

Attenuādos ef-
se prius crassos
succos, q̄ eua-
cuandos.

Vomitibus qui-
bus & per quē
prouocandus.

Affectui oīum
maxime urgē-
ti, dirigi semper
curantis consi-
lium debet.

Affectus mag-
nitude est tri-
plex.

12.

Ventriculi gra-
uissime labo-
ratis ob deflu-
um humoris
a capite descē-
dētis, curatio.

Affectum nul-
lum perfecte sa-
nari posse, ma-
nente adhuc
ipsa unde or-
tus est causa.

Indicatio reme-
diorum a natu-
ra partis labo-
rantis de sum-
pta, est multi-
plex.

facultate, quæ læsum corpus gubernat. In eo verò cō-
silio, quod ex causæ ratione initur, animaduertendum
est quidnā eorū quæ inter se sunt cōiuncta, augere aut
gignere reliqua possit: quæ rursus, vel gignantur, vel
incrementū ab alio accipiant: at in eo quod ordo præ-
scribit, quid ante quod, vel quid cū quo, vel quid post
quod sanari possit. Fingamus igitur in ventriculū de-
fluere ex cerebro superfluū quēdā humorem frigidū:
atq; eius occasione intemperie quādam in ventriculo
contractā iam esse: vel potius malū iam succū per totū
eius corpus media omnia simularium particularū spa-
tia occupasse: ab eo q; si placet, etiā mordicationis sen-
sum, ac proinde tum deliquiū animi, tum sudores, cū
syncopes quadā dissolutione excitari. Manifestū utiq;
est, in primis esse occurrēdū ei, qđ vires resoluit. Vbi
aut vires firmatæ erunt, nec plurimū vitiosi succi in vē-
triculo aderit, tunc nimirū ad fluxionis causam nos cō-
uertemus: illud pro cōperto habentes, non posse ad p-
fectionem vllū affectum sanari, manēte adhuc ipsa, vn-
de natus est, causa. Ergo si sic persanarimus cerebrum,
vt sensibile amplius redundantia non creet, veluti fon-
tē fluxionis in ventriculū, euertemus. Cæterū si neq;
copia notabilis excrementorum in ventriculo sit, nec
eorū quæ in capacitate ipsius continentur, nec eorū quæ
in tunicis, sed nec mordicatio quæ officiat viribus, tū
omnium primum sanandū ipsum cerebrū est. Ab hoc,
sinus ipse ventriculi vacuandus, extergendusq; est:
postea expurgandæ tunicæ: postremo intemperiei me-
dendū. Ac reliquarum etiam partium intemperantiæ,
similiter iis, quas in ventriculo proposuimus, sanabun-
tur, adhibentibus semper nobis remedium affectui cō-
trarium: illiq; remediorū indicationem, quæ à laboran-
tis membri natura sumitur, adiicientibus. Ea aut indi-
catio est multiplex. Vna quidē ac prima indicatio à la-
borantis loci temperie sumitur, quæ mensurā introdu-

cendæ qualitatis præscribit. Secunda ex eo sumitur, quæ actio eius oïbus animalis partibus sit cômunis: aut quæ cômunem virtutem subministret. Tertia, ab ipsa partibus figura. Quarta, ab ipsius positura: cuius portio est ad vicinas partes societas. Tum præter hæc omnia, ipsa sentiendi vel acrimonia, vel hebetudo. Porro quæcûq; calidiores natura partes ex frigore laborant, hæc & liberalius, & diutius calferi postulant. Si verò calido morbo ægrent, exiguam brevis uet temporis refrigerationem desyderant. Siquidem parvus hic est in id quod propter naturam, lapsus: quare & in id quod secundum naturam, reditus. Eatenus namque redeat ad naturam suam unumquodque est necesse, quatenus à natura recessit: ac veluti quadam via retroferatur, quæ in diuersum agat ei, quæ facta in ipso est, transmutationi. Minus itaque periclitantur, qui cunctis cognato naturæ suo morbo laborant. Quemadmodum autem reducendam esse ad mediocritatem diximus calidam & frigidam intemperiem, sic reducetur & cætera, siue ea simplices sint, siue coniugata. Porro in iis intemperaturis, quæ sunt ex humoribus ortæ, si particula sibi soli inseruiat, audacter euacues licet, prout affectus suadebit: sed tamen etiam virtuti attentus. Sin necessarium opus eius sit omnibus animalis partibus, veluti ventriculi & iecinoris, non levis habenda sollicitudo de robore virtutis est, ne hanc, magna semel vacuatione usus, dissoluas. Est autem cômune opus & venarum, & articularum, & cordis, & thoracis, & renum, & utriusque vesicæ. Cerebri verò opus, quum sani sumus, ad uoluntarias actiones est necessarium, iis scilicet instrumentis, quibus eiusmodi actiones obimus. Quum ægri sumus, necessarium non est, nisi iis tantum, quæ ad respiratum sunt deputata. Reliquorum verò organorum actio certe non est: ministerium tamen est ad vitam necessarium, veluti pulmonis, & asperæ arteriæ, & gutturis. Ergo ex eiusmodi particulis quæ primum vacuare redundan-

Recessibus a naturali temperie exiguis, exigua mutatio esse opus ut corrigatur: maximus uero maxima.

Cognato naturæ suæ morbo laborantes, minus periclitari.

Vacuare partes affectas, quam audacter & quam debeamus trepidare.

Partium officia, quæ nam sint necessaria uitæ, & quæ deest taxat utilia.

tiam licet, prout volueris. Ex ventriculo verò, & iecinore, ut cunq; vacuare non licet: sed cum cautione: ut ne quid virtuti officias. Habenda præterea est & dignitatis actionum ratio. Maxima autem est cordis officii dignitas, ægrotantibusq; omnium maximè necessaria. Cerebri verò ad vitam par est momentum: non tamè par robur eius in ægrotis requirimus: quò necesse omnibus non sit neruorum ac musculorum opera uti. At iecinoris opus omnibus particulis per necessarium è: non tamen adeò saltem perpetuam necessitatem habet, sicuti ipsius cordis. Ad portionem autem iecinoris, etiam ventriculi opus se habet. Itaq; ex partium functionibus facile intelliges, quatenus cuiusq; robur custodiri expediat. Ad eundem modum, & quæcunq; partes aliis sunt facultatum authores, harum quoq; robur seruare decet, pro facultatis earum vsus portione.

Cerebrum.
Cor.
Hepar.

Vacuationis
modus quomodo
a figura partium
affectione sum-
matur.

Situs partis af-
fectione quas in-
dicationes ex-
hibeat.

Etenim cerebrum nervis ac musculis: cor arteriis: iecur uenis facultatem suppeditat. A' figura verò, indicatio ipsius modi vacuandi excrementi, ad hunc modum suggeritur. Ventriculus vomitu, deiectione q; inanitur. Intestina deiectione tantum: sicuti & iecinoris cava. Renes verò, & vesica, & iecinoris gibba, si multo vitioso succo redundant, per deiectiones & pharmaca deiectoria expurgantur: sin mediocri, per urinarios meatus. Cerebrum, per palatum, & aures, & nares. Pectus & pulmones, per asperam arteriam, & fauces. A' situ indicatio dabitur, tum ad solidarum intemperies, tum ad succorum vitium, non leuis. Nā qui per summa corporis intemperie laborant, iis medicamenta quæ intemperies requirit, applicabimus. Quibus autem in summo corpore intemperies est, in iis rationem interuallum inibimus. Si enim medicamenti iis utere, quæ intemperies postulat, utiq; multo ibecilliora, q̃ pro vsu tuo, ad affectum locum peruenient. Iā ad vacuationes quæ situs nonnihil indicat: dum societatem laborantis par-

MED. METH. LIB. VIII.

ticulæ cum aliis docet. Non spernenda verò indicatio est, & ea quam sensus partiū acuitas, hebetudoq; sup-
peditant. Quandoquidem omne medicamen contem-
nunt, quæ tardi sunt sensus: etiam si non leuiter mor-
deant. At quæ acuti sunt sensus, earū vires dolore sol-
uuntur. Expedi igitur his nec confertim, nec semel,
valentibus auxiliis mederi tentēs: sed tutò potius in tē-
pore. At vbi tardus est sensus, in his etiam celeriter obi-
re qđ iustū est, licet: semel vsis remedio qđ sit idoneū.

397

Sensus partis
affectæ quas
præbeat indi-
cationis.

G A L E N I P E R G A

M E N I D E M E T H O D O

M E D E N D I. L I B. V I I I.



QVod igitur ex calido, frigido, humi-
do, & sicco, similarium particularū
natura cōstet: quòdq; ipsæ simplices
atq; primæ particulæ secundum ta-
les temperaturas inter se dissideant,
alibi à nobis est traditum: quemad-
modum etiam duo eē morborum genera quæ simpli-
cibus ipsis particulis accidunt: alterum, quod compo-
sit est etiam cōmune, & dicitur vnitatis solutio: alterū
peculiare ipsarum, quod in calidi, frigidi, humidi, &
sicci intemperie consistit. Quarum sanè intemperan-
tiarum, quatuor diximus esse simplices: quatuor verò
compositas. Simples quidem, quæ secundum vnā
qualitatem à naturæ ordine aberrant: compositas ve-
rò, in quibus secundum oppositionem vtrāq; ipsa na-
tura uariatur. Febris autem, unus morborum est, quos
intemperies gignit: vtiq; quum adeò immodicè est au-
ctus calor, ut & offendat hominē, & eius functiones læ-
dat. Porro primarum differentiarum febrium, vna il-

Similariū par-
tiū natura ex
quibus cōstet.

Similariū par-
tium duo esse
morborum ge-
nera.

Intemperan-
tiarum genus
est duplex.

Febris quando
gignatur.

Febrīū primæ
differentiæ.

Hectice febres.
Scheeticæ feb.
Febris indica-
tiones.

Excessus om-
nes per contra-
rios excessus
sanandos esse.

2. Constipatio
meatuum quoniam fe-
brim gignere
possit.
Febris a consti-
patione produ-
cta, curatio.

Biliofas natu-
ras, ex longio-
ri inedia febrim
acutissimis
conspici.

la est, in qua causa adhuc adest febrim creans: aut fe-
bri excitata, iam desit. Altera uero, qua ægrè solubi-
les, à solutu facilibus febribus distinguuntur: illas hec-
ticas, has Græci scheticas uocant. At uero prima indica-
tio omnis febris, ueluti à morbo est, ablationem eius
præscribens. Secunda autem, ueluti à tali est morbo,
quæ certam quandam sublationem indicat: nempe in-
temperiem febrilem, quum sit caloris excessus, per oc-
cursum refrigerantium tollendam esse. Omnis quip-
pe excessus per contrarium excessum sanatur. Ergo si
febris ipsa sit genita, causa autem, quæ eam excitauit,
iam desit, huc tantum sanandæ eius dirigetur consili-
um, ut refrigeretur. Si uero in generatione adhuc febris est,
causa quæ accendit illam, est submouenda. Sin pars
eius iam genita est, pars etiamnum gignitur, consulen-
dum utriusque fuerit: primum quidem submouendo quæ
eam accendit causam: dein extinguendo, quæ ab hac
accensa est, febrem. Excitare autem uel maximè febrē
solet constipatio meatuum, in iis corporibus, quibus
quod transpirat, halituosum non est, sed mordax, acre,
& fuligini simile. His igitur corporibus saluberrima est
ex aqua dulci temperataque; lauatio: tum frictio quæ ra-
refaciat: & exercitationes mediocres, & uictus qui dul-
ces efficiat siccos. Aduersissima uero sunt lauatio frigi-
da, & aluminosa, & lauationis abstinentia, & exercita-
tio acuta, & frictio, uel planè nulla, uel dura, & uictus
mali succi, & uigiliæ, & ira, & tristitia, & cura, uisioque; in
sole, & fatigatio. Grauisimè autem peccare mihi uidetur,
à carnificibusque; nihil differre, qui medici homini-
bus natura biliosis, tenuissimam per morbos rationem
uictus iniungunt: eosque; tridui inedia conficiunt. Quum
nimirum tales naturæ, ex longiori abstinentia cibi, acer-
rimis acutissimisque; febribus corripiantur: à quibus pro-
ptus est in hecticas transitus: atque ab his rursus in maras-
mum torridum: aut (si os uentriculi est iniuriis obno-

METHO. MED. LIB. VIII.

299

xiūm) in eum qui syncopen infert. Etenim in quorum temperie siccum præualet humido, & calidū frigido: his corporis habitus gracilis, hirsutus, & nigrior est: ac reliquis tribus intemperantiis, quæ hac minus calidæ sunt, tactu calidior aduertitur. Plurima quoq; his flaua ē bilis, urinaq; ac deiectio bili saturata, & pulsus magni, & somni leues & pauci, & animi impetus vehemens. Quare his tum refrigerationem, tum aquæ potiōem, atq; adeò requiem & cibū largiorem congruere proficitur Hippocrates. Quum autem refrigeratio ipsa cōciliet corporibus tum ex aliis quibusdam, tum non minime ex ciborū exhibitione: conueniet utiq; ubi corpus calidius siccusq; solito est redditum, frigidum humidumq; nutrimentum ei exhibere: sed quod nec medicamentosam vllam sensu perceptibilem facultatem obtineat: nec ipsum quod nutrit, plurimum: quemadmodum neq; minus q̄ sit ex usu. Cōmodissimus itaq; tali corpori est ptisanæ cremor ad vnguem coctus, in quo nullum sit condimentum superfluum: utpote qui & refrigerare, & humectare, ac sine siti seruare hominem potest, cum eo q̄ nec halituosum, nec humidum, nec siccum detinet excrementum: quum nec astringēdi, nec obstruendi, aliquam vim sortiatur. Ac quod nō astringat quidem, vel gustus ipse docet: cuius vnus id iudicare est proprium. Quod verò nec obstruat meatus, hinc licet etiam conicere, q̄ non secus q̄ aphronitrum, sordes cutis extergeat: vomituq; à ventriculo mediocrem pituitam eliciat, nihilo infœlicius q̄ mulsa: quæ sanè nec sitim restinguit, ut ptisana: & in naturis biliosis bilefcit facile. At verò si multa & vehementer glutinosa, & crassa pituita vētriculo adhæreat, hāc radícula ex oxymelite, non mulsa, aut ptisana detergere est habilis. Optimū itaq; biliosis temperamentis nutrimentum est ptisana. Proximum huic, alica, cui paululum aceti ad faciliorem distributionem adiectum fue-

Calidæ & sic-
cæ temperatus
ræ indicia.

Calidis & sic-
cis naturis qua-
lis uicinus ratio
conueniat.

Ptisanae cre-
moris facultas.

Gustui quid
propriū.
Ptisanae in es-
se uim deterfo-
riam.

Mulsa in natu-
ris biliosis bi-
lefcit facile.
Alica biliosis
naturis conue-
nit.

Pisces biliosus
naturis con-
gruentes.

Pisces damna-
di qui sint.

Volucris bilio-
sis cōgruentia.

Exercitatione
carentia, esse
maxime excre-
mentitia.

Hoedi biliosus
apti.

Animalia uetu-
la, recensq; edi-
ra, esui esse in-
eptissima.

Stiparia cutim
quæ sint.

3. Febrientes a
cōstipata cute
qualiter sint
fricandi et ab-
luendi.
Febri ab ani-
mi affectibus.

rit. Tertium, quæ sine aceto liquida existit. Iniecisse ve-
rò huic, dum coquitur, aliquid porri, satius est. Nam
quod tum anethi, tum salis aliquid necessariò habebit,
neminem latet. Quin etiam panis in furno coctus, est
utilis cibus: sicuti etià omnes pisces saxatiles: nec ipsis
minus aselli. Proximè asello sunt solea, torpedo, lu-
pus, mulusq; post, mugil è pelago. Omnis autem piscis
deterior est, qui propè lacu qui mari iungitur, aut ma-
gni fluminis ostium, pascit. Ex volatilibus optimi sunt
perdices, ac montanæ omnes auiculæ. Ab his, gallina-
cei, & phasiani, & columbæ iunenes. Sed nec hæ tamē
intus claudendæ: quum excrementosa sint omnia, quæ
exercitatione carent. Excrementosa verò non minus
sunt, tum lacustria, tum palustria omnia. Quo fit, ut ex
ipsis etiam suillis carnibus, optima sit montana. Ab his
deinceps sunt hoedi. In omnibus autem fugienda tum
vetula, tum recens ædita sunt. Illa namq; duriora, con-
coctusq; difficiliora sunt: hæc immodicè humida, & ex-
crementosa. Igitur, quibus acre aliquid quotidie tran-
spirat (revertamur enim rursus ad institutum) ii, si cu-
tis eis constipetur, facillè corripuntur febri. Stipant ve-
rò ipsam, tum quæ astringunt omnia: tum quæ lentit-
ia, crassitudine ue sua, in exiguis hærent meatibus.
Aliquē etià ipsius cutis immoderatio siccatas, exiguos
meat⁹ densat. Qui ergo ex stipata cute febri laborāt,
ii, inclinante prima accessione, ducendi omnes ad bal-
neum sunt: tum pinguius, molliterq; fricandi: si qui-
dem ex aliquo, quod astrinxit cutim, laborent. Nam
si ex siccitate, fricandi quidem & ipsi, sed parcius: lauā-
di autem vberius. Respicendum verò ad virtutis mo-
dum semper est, in huiusmodi auxiliis. Atq; iræ qui-
dem, tristitiæ, vigiliæ & curæ, nec fricatione, nec laua-
tione multa indigent. Sed omnibus qui ex eiusmodi
occasione febricitarint, oleum infundendum est tepi-
dum largeq; cui minimè astringens vis insit: tum pati-
lulum

lulum fricandi, ex consuetudineq; lauandi. Vstio vero, protinus ab initio, refrigerationem desyderat: tū crebriorem lauationem: minimē tamē aut oleum largum, aut frictionem crebram. Sint autē quæ refrigerent, & rosaceum, & omphacinū, salis omnino expertia. Efficies hæc magis frigida, si ita vas, in quo continentur, in puteo suspendas, vt aquā tangat. Præterea, si defluxus frigidaæ aquæ vasi se illidat, magis humorē refrigerat: magisq; adhuc, nix circumposita. Infundere autem oleum ipsum syncipiti, sublata in altum manu, per mediocrem lanæ modum oportet. Hæc vsq; ad inclinationem faciens, in balneum duces. Si vero qui memorato est temperamento, ex frigore febricitat, etiam ducendus ad balneum in remissione is est. Si autem cum grauedine & destillatione febricitet, prius q̄ hæc sint concocta, lauandus non est. At qui ex vstione febricitant, ii, vel quā hæc adsint, lauari debebunt. Post lauacrum verò, iisdem quibus ante madefaciēda amborum capita sunt: eorum quidem qui ex vstione febricitarunt, refrigerantibus: qui ex frigore, calfaciētib. Cuiusmodi sunt irinum & nardinum vnguentū. Porro qui ex vstione febricitant, iis intendēda quæ ex refrigerantibus constat curatio est: iis verò qui ex frigore, quæ consistit in calfacientibus remittēda fuerit. Omnium aut conditionum comprehensarum in proposito temperamento, vbi febris diaria laborat, vltus cōmunis est iis, qui & sit boni succi, & concoctu facilis, & qui nusq; exiguis cutis meatibus hæreat. Sed iis qui exusti sunt, cum eo quod refrigeret, & humectet. Pari modo iis, quos ira male habuit. Iis verò qui refrigerati fuerunt, cum eo quod calfaciat modicē. Iis qui peruigilio, & tristitia, & nimia cura confecti sunt, vltus esse debet humectans, atq; somnum concilians. Ad eundem modum iis qui defatigati sunt, magis nutriens; minus autem, iis qui refrigerati. Reliquis, qui

Febris ab exustione inducitur, curatio.

Rosaceū refrigerandi modus.

Capitis refrigerandi ratio.

Febris a frigore ortæ curatio.

Diariarum febrium in bilioso temperamento cōmunis omnium tum cuiusq; propria vltus ratio.

Diaria febre
detētis uinum
esse propinan-
dū aquosum.
Vinum acutis
febris Hip-
pocrates por-
rigit.

Calidæ natu-
ræ, frigidæ po-
tione iuuatur.

4. Aquam in fe-
bribus nō esse
propinandam
iis, qui uti illa
nō cōsueuerūt

Continētis fe-
bris speciem ali-
quam excitari
posse absq̃ hu-
morum putre-
dine.
Sanguinē nec
puero, nec seni
detrahendū ē.

Sanguinem de-
trahendum in-
terdum esse,
absq̃ plenitu-
dinis notis.
Obstructiones
soluunt, quæ de-
tersoria facul-
tate sunt præ-
dita.

medius sit amborum. Vinum verò ipse, his omnibus exhibere soleo, sed quod tum aspectu, tum viribus sit aquosum. Id enim ad omnia vtilius q̃ aqua est: utpote quod & concoctionem iuuat, & vrinas ac sudores pro- uocet. Etenim constat Hippocratem, nō in diariis mo- dō febribus, verum etiam in acutis, vinum porrigere. Cæterum naturæ calidæ, magnopere frigidæ potione iuuantur: neq̃ in diaria febre, iis quibus i usu fuit, ipse eam circuncido. Si quis verò non assueuit, huic per fe- brim dare non inceperim: nisi pristina sanitate prius reddita. Porro si propter obstructionē morata sit tran- spiratio, si parua quidem ea sit, qui rectē deterferit, se- cundam fore accessionem vetabit: sin momentanea, non possis ita promittere. Quod si & multi, & crassi, & glutinosi impacti sint succi, quæ hos excipit febris, fieri non potest, ut intra fines diariarum consistat: quā- do ex necessitate, huic in mali succi naturis ea quæ ex putredine humorum accenditur, succedet. Nā in aliis saltem temperamentis, quæ in sequētibus exponam, excitari ex tali causa potest, citra humorum putredi- nem, aliqua continentis febris species. Itaq̃ nisi vitio- sus succus transpiret penitus, necesse est ut putrescat: ut transpiret autem, valido auxilio est opus. Ac si qui- dem vel puer, vel senex sit, sanguinem detrahare non licet. Inter has ætates, ubi robur ægro non deest, secā- da vena est, vel si plenitudinis signa nō adsint. Præstat enim vitiosi succi maiore parte emissā, ad detergēdas obstructiones accedere: quum alioqui verendum sit, ne si obstructionibus liberādis, prius q̃ vacuaueris, stu- deas, ipsas multo magis impingas. At soluunt quidem ob- structiones, quæ deterforiam obtinent facultatem, seu foris admotā cuti, seu intrō in corpus accepta. Pe- riculum verò etiam est, ne quæ foras trahunt, vnā cū iis quæ obstruunt, etiam aliud quippiam attrahant: & quæ ab interno fursum feruntur, aliquid secum ex iis

quæ in vasis continentur, rapiât. Quod ipsum si tenax & crassum sit, obstructionem planè, geminabit: sin aliter, multitudine certè sua, non parum omnino nocebit. Ne igitur hæc contingant, vtilissimum est inanisse corpus. Discernetur autem magnitudo obstructionis ex ipsa magnitudine febris: vt quæ ex maiore obstructione, maior: ex minori minor inciderit. Vbi verò modicè iam vacuaueris, haud multo post, aut nutrimentum aliquod, aut pharmacum ex iis quæ detergeant, exhibebis. Atq; in alimentorum quidem ratione sunt ptisana & mulla: in pharmacorum, oxymeli & quæcunq; incoquere in mulla licet, ceu calamintham, hyssopum, origanum, serpillum, irim, & apium. Verum hæc omnia iusto sunt calidiora, ideoq; febres accendunt, æquè vt vinum. Oxymeli verò solum, nec febres accendit, & strenue deterget, sic vt ea quæ glutinosa crassaq; sunt, dissoluat, & meatus obstructos liberet. Inter mullam & oxymeli medium locū habet quod apomeli dicitur. Nec immeritò arbitror & saccharum inter hæc numerandum. Ex hoc victu obseruabis quantum de febrili calore minuitur. Etenim si tertio die mane videris minimū esse quod de febre relinquitur, ac nec putredinis humorū in pulsu nota sub sit, neq; in vrina cruditatis, suspecta verò hora, qua primo die febris occupauit, extra meridiem sit, audacter hominem q̄ ocysimè lauabis, longè ante sextam horam. Abundè tamen sit, si intra tertiam horam luationem compleueris. Ad eūdem modum & si decimā horam suspectam habueris, vsq; ad septimam laues licet: quum tres æquinoctiales horas quatuor ue inter balneum accessionisq; tempus interponi abundè sit satis. Debet autem in balneo corpus prius vnctū ac moderatissimè frictū, mox detergeri extrinsecus, abluīq; Moderatissimè detergent tum erui, tum hordei, tum fabarum farina. Præterea mulla quæ sit aquosa. Magis

Vacuandū cur
prius sit corp⁹
q̄ obstructiōi.
bus liberādū,

Oxymeli esse
aperiendis ob
structionibus
q̄ aptissimū.
Apomeli
Saccharum.

Balneum initu
ra corpora fe
bricitatia pri⁹
iungi debet,
moderatissi
meq; fricari,
ac dein deter
geri.

Detergentia
quæ sunt.

Non quæ hæc, iris, & panacis radix, & aristolochia, & mulsa quæ mediocri est mistura: veluti etiam hac magis, quæ meracissima est. Possunt aut vel hac magis detergere, tum spuma nitri, tum nitrum ipsum, tum aphronitrum. Sapo etiam ex iis est, quæ maximè detergere valent. Egressis balneum, præter aquam quæ parum

Diarias ex cru-
5. ditate fieri sæ-
pe in biliosis
temperaturis.
Cruditatum
differentiæ.

apii incoctum in se habuerit, nihil est offerendum. Iam verò diariæ febres (de quibus tantum in præsentis commentario agere est animus) in propositis corporum temperamentis, sæpenumero etiam cruditatibus solent superuenire. Est autem pessima in eiusmodi temperamentis cruditas illa, citissimeque febrem accendit, in qua cibus in nidorulentam & fumosam qualitatem corrumpitur.

Febris ex de-
surgendi fre-
quentia.

Febris a diar-
rhoea ortu cu-
ratio.

Fomento ex
oleo & absin-
thio quæ utendū.

Purpura ma-
rina.

Quando ea quæ in acidam vertit, ut raro talibus naturis contingit, ita minus nocet. Nidorosa tamen cruditas, si aluus lubrica sit, minus est noxia. Sin astringitur, grauis existit. Febricitant etiam nonnulli & ex iis, quos diarrhoea ex cruditate malè habet. Quibus utique non minimè proritur febris ex desurgendi frequentia. Est autem eorum quibus clausa aluus est, & quibus fluens, non eadem sanatio. Si igitur ea tantum quæ corrupta fuere, per diarrhoeam vacuata esse videantur, tum lauandum, tum nutriendum in remissione febris est: sed iis quæ circa ventriculum sunt, prius consulto. Sin ita multa inanitio aut prius facta sit, aut nunc etiam in homine duret, ut virtus iam sit defessa, satius est omissa lauatione cibare, sed consulto prius iis quæ circa ventrem sunt. Consultetur ita laborantibus, si modo vacuatio amplius non perseveret, fomento ex oleo & absinthio. Quod si quis morsus, aut doloris sensus in ventriculo adhuc supersit, amiciri peniculo post fomentum debet, qui vel calidus sit, & siccus: vel ex oleo in quo absinthium incoctum fuit, vel ex unguento nardino madens: ac plurimum expressus. Iam multo etiam satius sit, si purpura marina is fuerit: atque etiam longè

optimum, si optima sit Tyria. Quod si os ventericuli imbecillius sit, tanta portione Chiaë mastiches in nardino tunsa, unde sordium crassitudo existat, madefacta ex eo purpuram imponemus. Esto autem abunde calens talium quodque quum primum admouetur. Nam quæ tepida sunt, dissoluunt ventericuli firmitudinem. Vnguenta autem ipsa calfacere in duplici vase soleo: quandoquidem aliter calfactis, vitriatur eorum facultas. Cæterum fluente adhuc aluo, vtilius est, optimo recenteque melino, simili modo quo nardino, vti. Vtile autem ad omnia talia est, & mastichinū: nec in postremis conferunt spicata & foliata vngueta, quæ Romanorum luxus inuenit. Mirè etiam ventericulum roborat, hoc cæratum quod subdam. Ceraë Tyrrhenicæ, Vnguenti nardini, singulorum, vnciam. j. Aloes, Mastiches, singulorum drachmam. ij. Fiat ceratum. Si vero intus vratur ventericulus, ita vt affectus quidam phlegmonæ similis consistere in ipso videatur, vtilius est ceratum quod ex melino conficitur. Porro cibandi sunt, fluente quidem etiamnum aluo, polenta & pane, qui pauxillum aceti receperit. Quod si plus æquo aluus excernat, inspergere oportet polentam succo cotoneorum malorum, vel (si ægro magis arrideat) pirorum, aut malorum, aut myrtilorum decocto. Sin venter non amplius excernit, suffecerit tū alica, similiter ptisanæ præparata: hoc est aceti habes pauxillum: tum ex ea si ne aceto sorbitio: tum gallinaceorum testiculi: & saxatiles ex albo iure pisces: præterea fructuum aliquis ex iis qui astringant, vel solius, vel cum pane. Quod si appetentia deiecta sit, ex medicamento quod ex succo, vel ex carne cotoneorum conficitur, vnum aut duo cochlearia exhibebis. Atque ita sanè in prima remissione iis qui ex cruditate febricitant, ventre excernente, mederi conuenit. At si omnino venter astringitur, si quidem in superioribus intestinis, vel etiā in ipso ven-

Purpura tyria

Ventriculū imbecillum quæ roborent.

Tepida, si admoueat, dissoluere ventericuli firmitudinem.

Vnguenta esse calfacienda in duplici vase.

Aluo fluenti quæ conferat.

Romanorum luxuriam quæ unguenta inuenit.

Ceratum roborando ventericulo commodum.

Aluo fluenti uictus ratio conueniens.

Appetentiam restitui usu medicamenti ex succo cydoniorum confecti.

*Diatrion pe-
pereo esse me
dicamē crudi-
tatibus uētri-
culi aptissimū*

*Intestinorum
morsus leniē-
tia.*

*Flatus discutiē-
tia quæ sunt.*

*Flatus discutiē-
tia quæ sunt.*

triculo cibus crudus consistat, aliquid diatrion pepe-
reon propina, eius videlicet, quod in opere de tuenda
sanitate laudauimus, ceu & simplicissimum, & aptissi-
mum, iis qui cruditate laborant. Post deinde præcor-
dia, omnemq; ventrē perfundens. Hoc verò, etiam
si inferius descenderint quæ vitiosa sunt, facies, pluris
minorisq; ratione id varians. Siquidem plus & tem-
poris & perfusionis exigunt ad præparationem corū
quæ deinceps sunt agenda, quibus in superioribus ven-
tris corruptum nutrimentum adhuc manet. Sin mo-
tum id notabiliter ad inferiora sit, adiuuādum aut glā
de subdita, aut leui per inferna infusione est. Vtiq; si
morsus simul adsit, hunc mitigantibus nobis. Sin fla-
tus, hunc comprimētibus. Sin neutrum fuerit, ex mel-
le, aqua, & paululo olei ipsum clysmum facientibus.
Vbi verò morsus vehementior urget, Sabinum ole-
um, in quo aliquid seui anserini, vel gallinacei, vel ca-
prilli liquatum sit, est vtilius. Quorum copia si desit,
iniiciendum oleo parum ceræ est elotæ. Flatus verò
sanandi sunt oleo in quo ruta, & semina quæ flatus
discutiunt, incocta fuere: cuiusmodi sunt apii, cumi-
ni, marathri, sinonis, aliaq; id genus. Vacuata aluo,
nutriendum protinus in cœteris quidem iis quos me-
morauimus similiter est: astringentibus tamen anio-
tis. His igitur prima & secunda die obitis, si secunda
die febris desit, hominem lauari permittes. Ac vbi
sequenti nocte citra offensam dormierit, sanum iam
hominem prorsus existimabis. Si verò qui cruditati
succesit dies cum sequente nocte febrim attulerit,
veluti in secundo die, ita tunc & accurandus, & nu-
triendus homo est. Quod si nox tertiæ diei febrile quid-
dam paululum afferat, ne sic quidem est formidandū,
sed hos quoq; postridie lauabis, nutriesq; ac reliqua
omnia in illis, vt ante definitum est, ad portionem
exequeris. Acida autem cruditas non contingit in

biliosus temperamentis, nisi admodum raro, idq; ex
cibus qui promptè acescunt: nec accendere febrem
diariam solet, æquè ut nec concoctionis tarditas:
quandoquidem sicubi ob talem cruditatem febrici-
tant, quibus amara bilis abundat in temperamen-
to, obstructionis & humorum putredinis est suspi-
tio. Adhæc, fumidus vapor ex tarditate concoctio-
nis, aut cruditate, in qua ructus sentiuntur accidi,
nunquam excitatur. Quippe frigidi halitus ab sta-
libus succis ascendunt, hiq; omnino paucissimi: mi-
nimè autem vapores multi, humidique, ac fuligino-
si: quum neq; in iis quæ sunt extra, aliter aut fumum
edi, aut fuliginem videas, quam fumum ex materiis
semitis: fuliginem ex immodicè asis, vltisq;. Est
nanq; fuligo vapor terrestris. Fumus mistio quædam
ex terrestri, aqueaq; substantia. Absoluta iam in iis
naturis, quibus amara bilis redundat, diarium fe-
brium disputatione, ad aliud corporum temperamen-
tum transeamus, in quo ut calidum frigidum, sic sicco
humidum præualet. Est enim hæc intemperies om-
nium maximè obnoxia putredinis morbis, propterea
quod per ipsam sanitatem ad putredinem proximè ac-
cedit: id quod tum ex sudoribus conicere est, qui gra-
uiter his olent: tum verò ex urinis, deiectione, atq;
adeò ipsa etiam expiratione. Etenim qualis est hircor,
talis est harum naturarum temperies. Ideoq; prom-
pta est ex qualibet occasione tum aliis morbis, tum ve-
rò febribus corripì. Siquidem quum eorum cutis est
stipata, effugere febrem nō possunt. Sed nec quum va-
lentem cruditatem contraxerunt, aut perusti fuerūt,
aut tale quippiā aliud perpesi. Iā verò à cruditatibus
nidorosis obstructiōibusq;, naturæ calidæ & humidæ,
q; siccæ, prōptius læduntur. Itaq; oēs diarlæ febres ac-
cenduntur prōptissimè in istiusmodi temperamentis,
idq; ex qualibet earum causarū, quas in biliosis natu-

Acidam cru-
ditatē nō con-
tingere in tem-
peraturis bi-
liosus, nisi ad-
modum raro:
neq; accēdere
febrim diariā.
Fumidum ha-
litum nō exci-
tari ab acida
cruditate.

Fumus ex ma-
teriis semiu-
lis nascitur.
Fuligo ex im-
modicè vltis
materiis gigni-
tur.

Intemperie ca-
lidam atq; hu-
midā esse ma-
xime obnoxia
morbis putre-
dinis.

Naturę calide
& humide, ma-
gis q̄ calidę
& siccę, famē
& sitim perfe-
runt.

8. Intēperies ca-
lida & sicca ē
ad excipien-
das febres op-
portunissima.

Intemperātia
rum omniū, q̄
nam sint ma-
gis obnoxie
febris.

Intēperies fri-
gida & humi-
da, q̄ ab ine-
dia iouetur.

9. Naturālē ser-
uatiā ordinem
semper similia
postulat: ut cō-
traria, quę a
naturę ordine
aberrant.

Febris requi-
rit victus rōnē
frigidam atq̄
humidam.

ris retuli: curationemq̄; persimilem illis habent, ac in paucis omnino disidentem. Nam quū hæ naturę humidiores sint, magis q̄ illę famem & sitim perferunt. Est igitur illis ex usu balneum, quod cutim laxet, non autem quod corpus humectet. Quęcūq̄; verò de eiusmodi natura sunt dicta, eadem & de acquisito habitu dicta esse censendum. Quum autem octo intemperies existant in vniuersum, opportunissima ad febres est calida & sicca: ac nisi quis illam (vt dictum est) cibet, ocysimē in ea diaria febris in acutam mutatur. Pro- pinqua huic est, quaten⁹ ad febrem spectat, quīs sit ad alia deterior, intemperies calida & humida. Tertia ab his intemperies est, ea simplex intemperantia, in qua tantūm exuperat calidum. Huic proxima est simplex altera, in qua siccum humido præualet. Ab hac deinceps media omnium est, scilicet quę mediocritatem in vtraq̄ oppositione tuetur. Quatuor quę reliquę sunt intemperies, neq̄ facillē febribus, occasione iam dictarum causarum, patent: neq̄ diaria tentatę, si inedia tolerent, in plurium dierum febres trāseunt: im- mo aliquę saltē eaz, vbi citra corruptelā contraxerūt redundantiam humorę, vtilitatē ex inedia sentiunt, ac potissimum quę frigida est, & humida. Ab hac quę humida est: Tertio loco quę frigida: Quarto, quę simul frigida & sicca. In eiusmodi ergo omnibus tem- peraturis, temperamenti quidem ratione, victus ra- tio varianda est. Nam ex eo quòd eadem febris fe- bricitant, non diuersam, sed omnino eandem, sortien- tur indicationem. Siquidem quod secundum naturam est, semper similia postulat. Quod autē præter naturā, contraria. Quum nimirum quod se naturaliter habet, custodire: quod præter naturam est, tollere expediat. Porro febris omnis præter naturam est: ideoq̄ victus rationem frigidam & humidam exigit. Temperamen- ta verò ipsa, aliās similia, aliās contraria postulant.

Quæ enim vitio carent, similia perpetuo: quippe quæ seruare expedit. Quæ vitium habet, aliàs similia, alias contraria. Similia quidem, tum in aliis de quibus mox dicemus: tum in vlceribus omnibus. Contraria autem in eo victu qui per sanitatem adhibetur, dum corrigere eorum intemperantiam est animus: necnō vbi eiusmodi vitiosæ naturæ à longo tempore, contraria victus rationi assueuerunt: gaudent enim naturæ consuetis semper. Duplex itaq; nobis in iis qui sani sunt finis proponitur. Nempe vel corpus sanum in pristina eius temperie tueri: vel hanc meliorem efficere. In ea tamē natura quæ haud dubiè in medio temperamento consistit, ab ipsa febris contrariorum indicatione accepta, eatenus humidum frigidumq; adhibebimus victum, quatenus siccus calidiusq; q̄ antea iam redditum corpus apparet. Humidus igitur victus (vt testatur etiam Hippocrates) febrientibus omnibus conuenit: maxime verò pueris, & aliis qui sic cibari assueuerunt. Etenim febrientibus, quatenus febriunt, ex ipsa contrariorum indicatione humidus victus conducit: pueris ex similibus. Nam quum ætas ex iis sit quæ natura nobis insunt, similem sibi victum postulat. Quæ verò à consuetudine indicatio sumitur, sic sumpta est, sicuti & quæ ab ætate. Quippe seruare quoq; hæc iubet Hippocrates, perinde ac proprium ætatis temperamētū. Sed à regione etiam & anni tempore interdum indicationes sumuntur. Cæteræ à consuetudine quidē, semper est indicatio similitū, quoad scilicet ægrotāt homines. At ab ætate, natura, regione, anni tēpore, & statu cœli, vbi temperata hæc sunt, similibus semper præsidiorum est indicatio: siue valeant homines, siue etiam ægrotent. Contra ab intemperatis anni tempore, statu cœli, & regione, contrariorum est indicatio. Verūm ab ætate & natura, non absolutè, sed cum consuetudine. Porro nihil in contrariis indicationibus tam con-

Temperamentum inculpatum si similia postulat. Temperamenta vitiosa, quæ requirant similia & quando contraria.

Naturæ gaudent semper consuetis.

Humidus victus febrientibus omnibus, conuenit: maxime vero pueris.

Consuetudinem esse seruandam non secus ac proprium temperamentum.

Indicatio ab ætate, natura, regione, anni tpe, & statu cœli, quando similibus, & quādi similitū habetur.

Indicat iōibus uenit expendi, q̄ magnitudinem eorum quæ ad indica-
 oppositis oc- tionē conferunt: quæ quidē duplex existit: altera, quæ
 curretibz, ex ex * eoz dignitatibus spectatur: altera quæ ex ipso
 pendendam ef propriis substantiis. Quas sanē ex collatione cum me-
 se magnitudi- diocri, & quod secundum naturam est, esse accipiēdas
 nem eorū quæ ad indicationē liquet. Omnibus igitur conspirantibus in vnum indi-
 conferunt.

Indicationē a
 febris sumptā
 reliquis supe-
 riorē existere.

Indicationes
 tum diariarū
 febrium, iū ea
 rum quæ pluri-
 bus diebus af-
 fligunt, ex qui-
 bus capiuntur
 generibus.

Hecticas fe-
 bres nulla ac-
 cendit causa.

Hecticæ cum
 diariis in quo
 conueniant, &
 in quo discre-
 pent.

cesisse à temperato & medio victu par est, quātum ea
 quæ pollent, sua contraria superant. Ac diariarum qui-
 dem febrium indicationes ex his capiūtur generibus,
 raroq; à laborātis virium modo. At febrium, quæ plu-
 ribus diebus affligunt, indicationes, tum virium respe-
 ctum necessariò adhibent: tum causarum quæ ipsas ex-
 citant: exceptis tamen hecticis, vtpote quas nulla accē-
 dit causa: quemadmodum neq; corpus id, quod iam
 habitu calorem ignis in se recepit: siue id lapis sit, siue
 lignum. Illud nanq; commune cum diariis habent, q̄
 videlicet non amplius fiant: differunt autem in
 eo, q̄ diariæ in leui affectu calorem habent:
 hecticæ in habitu qui ægrè soluatur.

GALENI PERGA

MENI DE MEDENDI

METHODO. LIB. IX.



DIARIARVM igitur curationem præcedenti libro exposuimus. Quæ sanè febrîũ vnica accessio est, vnico plurimum die, ex ipsarum saltem natura, circũscripta. Cæteræ nisi q̃s eas cõmodè tractet in reliqua duo genera febrîum, nempe in putridas & hec̃ticas, transeũt. Putridas enim appello, quæ ex humorũ putredine: hec̃ticas verò, ex imodica solidarũ partium nascuntur calfactiõẽ. At verò in illo trãsitu à diariis in reliqua illa duo febrîum genera, alteræ quoddã febrîũ genus mediũ licet imaginari, qđ neutri extremitatũ sit idẽ. Cæterũ mediũ id, quũ inciderit, nec nosse ii possunt, nec reprimere, qui extremitatũ, quæ existit medium, speciem ignorãt. Ergo ex adustione, cruditate, lassitudine, vigilia, p̃turbatione animi, vel bubone, ab euidẽti causa aliqua oborto, nunq̃ ad tertîũ vsq̃ diẽ progrediet̃ febris accessio, nisi qđ delictũ circa laborantẽ fuerit. At q̃bus stipatio febris occasio est, iis et̃ ultra hos porrigi accessio p̃ot. Etenim stipatio fit, vel obstructis exilib⁹ meatib⁹ p̃p glutinosos, vel crassos, uel copiosos succos: aut p̃ni uetib⁹, ob ea quæ corp⁹ siccarũt, vel deniq̃ iprobẽ cõdẽsatis, ob occursum causarũ refrigeratiũ. Quas igit̃ febres uel conuiuentia meatuũ, uel recens corporũ densatio excitant, hæ & post primam accessionẽ desistũt, si quis rectẽ ipsas tractet: & uerẽ diariæ tum sunt, tũ dicũtur. At quæ ex obstructione creant̃, si hæc qđ pusilla sit, solui quoq̃ ipsæ sũt ut aliæ diariæ p̃nt: si quis eas legitimẽ sanet. Sin autem adeò vehemẽter sint humo

Diariarum accessio est vnica vnico circũscripta die.

Diarias transire in putridas hec̃ticasq̃, nisi rectẽ tractent̃. Putridę febres quæ.

Hec̃ticę febris quæ.

Stipatio quod dupliciter fit.

Diarię febres q̃ nam & sint, & dicantur.

res impacti, ut valentius aliquid quod eos eximat, postulent, id genus febres porrigi ultra unum diem necesse est, ac proinde diariarum genus videri egressas. Verum si neque humor putrescens subsit, neque ipsum corpus febrilem calorem susceperit tanquam habitum, utique genus id febris, ab aliis duobus diuersum erit. Quare huiusmodi febris natura quidem eadem est cum diariis: nomen vero non idem. Siquidem quæ febris ab initio ad finem usque unicam accessionem sortiuntur,

2. *Synochæ febres quæ vocentur.*

Synocharum febrium genus duplex.

in multos dies porrectam, eæ synochi, hoc est continentes, vocantur. Quarum natura est duplex. Quædam namque earum manifestam habent putredinis notam. Quædam prorsus non habent: quas nimirum ex diariarum esse genere constat. Quoniam enim accessionis remissio ex feruentium humorum transpiratu contingere solet: non transpirent autem prorsus in stipatione vehemēti: necesse haud dubie est, multorum dierum fieri accessionem. Igitur ubi in tali febris nulla subest occasio, quæ alterius accessionis principium excitet, non modo multorum dierum euadit febris, sed absque inuasionē vllius accessionis, ab initio ad finem una febris persistit, nec quotidianam, nec tertianam, nec quartanam referēs.

3.

Synocharum febrium tres differentiæ.

Quoniam igitur ex duobus his foueri febris potest: & quod totus vapor non transpiret: & quæ idem vapor ea quæ contingit excalfaciat: necessum est tres esse synochorum differentias in vniuersum: nempe vel pari permanente magnitudine ea, quam in primæ accessionis vigore habuit: vel adiiciēte semper exiguum aliquid, minuentē uel: atque hæc vel æqualiter faciente, vel inæqualiter. Ac si quidem quod accenditur, ei quod transpirat par fuerit, nec augeri, nec minui febrilis calor cernetur. Verum si eorum alterum vicerit, utique si quod vacuatur, necessarium est febrim minui: si quod adicitur, omnino incrementum. Hæc itaque est continentium febrium species una, quæ eandem naturam cum dia-

riis sortita, absq̃ humorum putredine in plureis, dies extenditur. Altera verò contingit, vbi in omnibus vasis, ac potissimum maximis, æquabiliter succi putrescunt. Quarum sanè febrium in gracili & frigido corpore neutra solet cōsistere: sed plurimum in iis qui sanguine abundant, & corpulentis: qñ nec obstructio citra putredinem excitare febrem valet, nisi id quod trāspirat, & copiosum, & calidum sit: nec humorum putredo in omneis, quæ inter inguina & alas iterantur venas, æquabiliter ac cito porrigi in frigido habitu potest. Debent enim quæ putrescunt, tum calida & humida esse, tum difficilem habere trāspirationem. Eo q̃ fit vt neq̃ in frigida ætate, neq̃ in frigido corporis temperamento, continens exciterur febris: quemadmodum neq̃ in gracilibus, uel qui raro sint corporis habitu, sed prorsus in temperamentis, corporibus, atq̃ naturis contrariis. Proinde fit, vt qui ita febricitant, iis & pulsus maximus sit, & æqualis, & vehemens: arteriæq̃ consistētia inter molle & durum mediocris. At celeritas atq̃ frequentia pulsus, pro ipsius magnitudine febris. Hæc itaq̃ sunt ambarum febrium communia. Alteri tamē priuatim insunt notæ putredinis: non modò in lotio, sed in pulsu etiam, calorisq̃ qualitate iniucunda. Quarum sanè febrium dignotionem & curationem ipsi tum ratione, tum experientia didicimus, qui statim ab adolescentia philosophiæ studio capti, primū nos ad eam contulimus: mox patris euidenti insomnio moniti, ad medicinæ studium excolendum accessimus. Est porrò continentium febrium p̃sidium maximum, si modò vires valentes sint, sanguinis diminutio, vel vsq̃ ad deliquium animi. Primum namq̃ in contrarium statum agitur corpus, celerrimè ex animi defectu refrigeratum. Hoc verò nihil inueniri possit neq̃ ipsis ægris, nec naturæ quæ animantes gubernat, iucūdius, vtilius'ue. Postmodum in corpo-

Putredini quæ
requirantur.
Continens fe-
bris in quibus
non possit gi-
gni corpori-
bus.

4.

Galenus p̃s
isomnio admo-
nitus Medici-
næ nauauit o-
peram.
Continentium
febrium p̃s
dū maximum
est misio san-
guinis vel ad
animi vsq̃ de-
liquium.

Sanguine de-
tracto, in ardē-
tissimis febri-
bus, interposi-
tisq; horis dua-
bus, esse modi-
ce alendum æ-
grum, permit-
tendumq; vt
quiescat.

Sanguinis mis-
sio qñ sit cele-
branda vsque
ad animi defe-
ctionem.

5.

Synochi qñ
orian-
t-
ur.
Accessiones fe-
briles vnde o-
riginē ducant.
Sanguis qui-
bus detrahen-
dus sit.

Plenitudo fm
vires
Plenitudo fe-
cundum vasa.

ribus ipsis necessario superuenit alui deiectio: non-
nunq̃ & vomitus bilis. Quas res statim à toto corpore
madores sudores ue excipiunt. Etenim vel sola sangui-
nis detractio sic obita restitui olim ipse quendam
adolecentem ardentissima laborantem syncho. Cui
sanè post duas à sanguinis missione horas paulum nu-
trimenti exhibui, permisiq; vt quiesceret. Iam uerò
eorum qui ex sola obstructione febricitantes mihi ui-
dere cōtigit, nemo in putredinis febrem incidit, q̃ san-
guinē prius detraxisset. Quē quidem ubi ualida uirtus
subest, & ætas permittit, usq; ad animi defectum (ut di-
ximus) mittere expedit. Vbi horum alterum haud sa-
tis respondet, tutius est, quantum satis uisum fuerit stā-
tum principio detrudere: quod defuit, iteratione sup-
plere. Quo quidem præsidio omisso, in summum ægri
discrimē ueniunt: nisi eos uel uiriū robur, uel largum
profluium sanguinis, uel sudor copiosus, ex manife-
sta perniciē eripiat. Agimus itaq; ipræsentia de iis fe-
bribus, quæ ex stipatis p obstructionē meatibus oriun-
tur. Quas, si sine putredine quidē consistāt, ex diariarū
esse genere dixi. Sin iis putredo aliqua supueniat, vbi ī
omnibus venis ac p̃cipuē magnis, ea p̃stitit, synochas,
siue continentes excitari febres: vbi in vnica animalis
parte, exacerbationes quæ certo ambitu repetāt. Qui-
bus igitur corpus ex succoꝝ abundātia inhabile ad trā-
spirationem iā redditū, tantum caloris congescit, vt in-
de iam febriat, iis t̃m sanguinis detrahēdū est, q̃tum ui-
res tolerant. Alioqui certē verendū est, ne aut suffocen-
tur, aut corripiātur syncope, nisi eos vel uiriū robur,
vel plurimus sudor, vel largū sanguinis profluium à
morte liberet. Nec verò existimes de plenitudine illa,
quæ cōparatur ad vires, hunc à nobis sermonem fieri
(quippe quæ nec sic obstruit venarū ora, vt refrigera-
tionē prohibeat, nec tunicas earū distēdit, nec ruborē,
nec tumorem inuehit) vix de ea quæ cōtineri à vasis

ultra nō valet: quæq; ob id ipsum solet p̄dicta symptō
mata inducere. Siquidē copia hæc, dū bonitatem suam
seruat, vt pariter augeri cū virium robore est nata, ita
si qñ has grauat, nec de cætero augebitur, & bonitatē
naturæ amittet: quare tunc fieri nequit vt non putre-
scat. Ergo festinare ad sanguinē detrahendū oportet:
quo valox natura, ex transpirando, ventilandoq; na-
turalē temperiem seruās, humoribus, eo quo inter ini-
tia modo, dominetur: qñ si ad intemperie versā labora-
bit, metuendū est ne hi putrescant. Excitatur autē intē-
peries in ea, ex febris calore. Optimū itaq; est in huius-
cemodi febribus statim non numero dieꝝ, sed vni vi-
rium robori attentū esse. Quo circa non solū sexto se-
ptimo ue, sed et sequentibus diebus sanguis mittendus
est. Quod si aut alii medici, aut æger, aut propinqui ip-
sius, nō permittant vt seces venā, ad frigidā exhiben-
dā accedes, sed diligenter ante discernens, q̄tum nocu-
mentū ex ea cōtingere possit. Quippe intēpestiue imo
diceq; exhibita, lentos & crassos humores attenuari,
digeriq; prohibet. Imbecillas particulas corporis pecu-
tit. Nonnullis illico spirandi difficultatem, cōuulsionē,
atq; tremorem conciliat. Tum verò, quibuscunq; in
particula principe tumor aliq; è phlegmones, œdema-
tos, aut scirrhi genere constitit, iis frigidam offerre nō
licet. Sed neq; iis quib⁹ obstructio, putridus ue humor
non concoctus incommodat. At si per continentes fe-
bres eōcoctionis humorum notas videris, absq; impe-
dimentis expositis, audacter ægris frigidā quātū appe-
tant, dabis: præcipue si tali potioni assueuerint. Porro
erysipelas vex, cōsistens in aliquo viscere, non aliter, q̄
frigidæ potu, sanabis. Sin verò mistum cū phlegmone
sit, in hoc p̄coctionis expectādæ sunt notæ. Cæteræ mi-
nus tuta iis q̄ pauxillū sanguinis, carnisq; obtinēt, fri-
gidæ potio est. Celeriter nāq; ad solidas animalis per-
uenit partes, nulli quod eius vim frangat, occurrens.

Sanguinem ef-
se quouis die
mittendū, etiā
septimo, si id
morbusatq; vi-
res suadeant.

Frigidæ potu
utendum, si æ-
ger non patia-
tur sibi secari
uenam.

Frigidæ intem-
pestius atq; im-
modicus ulus,
quæ accersat
mala.

Frigida qbus.
non offerenda
et quibus au-
dacter danda.
Erysipelas ve-
rum cōsistens
in aliquo visce-
re, non aliter
q̄ frigidæ po-
tu sanatur.

Frigidæ potus
cur macilētos
exanguēque
atq; ob id he-
cticos, lædat.

Continentiū
feb. detrac-
tio nem sangui-
nis atq; petio-
nem frigidam,
effe summa re-
media: atq; illa
q; dem, quous tē-
pore, si vires
tolerent: hac
aut, apparenti-
bus cōfūōis si-
gnis vtendum
esse.

Sanguinem de-
tractione quæ
sint confyde-
rando.

Sanguinis de-
tractionē quæ
prohibeant.

6. Sanguinis de-
tractionē quæ
postulent.
Methodus cō-
sistit in vniuer-
salibus.
Exercitatio in
particularibus
consistat.

Qua ratiōe etiam hecticæ febres nec prorsus frigidæ,
nec multam aquam desyderant. At continentium fe-
brium maxima remedia hæc duo sunt, detractione san-
guinis, & potio frigida. Verū illa nullo non tempo-
re: modō vires sustineant: hæc, quum & in pulsu & vri-
nis, concoctionis euidentēs cernuntur notæ: febris au-
tem est maxima. Est etiam habenda ratio in missione
sanguinis, tam eorum quæ præcesserunt, q̄ quæ conse-
quentur ipsam. Nam si præcedat ciborum cruditas, tā-
to tempore differre venæ sectionem iubebis, quātum
satisfacere tum ad eorum concoctionem, tum vt ex-
crementa descendant, videbitur. Sin sequetur necessa-
riō vacuatio quæpiam (vt exempli gratia, muliebre
profluuium) tantum illi relinquendum est, ex eo quod
superfluum existit, quantum est per eam uacuandum.
Sed nec negligenda interim natura eius qui venit va-
cuandus: sicuti neq; ætas, nec cœli status, sub quo & re-
gio, & anni tempus comprehenditur. Sunt enim non-
nulli ad extrahendos digerendosq; succos, natura pro-
pensi: nempe qui humidi & calidi existunt: quiq; raro
sunt corporis textu. Adhæc, quibus os vētris aut ama-
ra bile redūdat, aut imbecillum est, aut supra modum
sensile. Pueri certē propter ætatem pēperuō. Cœli
verō status vbi calidus nimium & siccus est, corpus in
ambientem resoluit. Atq; hi quidem scopi sunt, qui à
sanguinis detractione dehortantur. Eam autem postu-
lant, vnā cum affectu, cuius causa primū requireba-
tur, habitus durus, densusq; quiq; digeritur ægrē: tū
ambiens humidus, frigidusq;. Quū autem in vniuersa
libus methodus, in particularibus exercitatio cōsistat,
fieri non potest, vt sine multiplici in ægris singulatim
exercitatione, quod ex vfu sit, facias: nec sine vniuer-
salium cognitione, probē exercitatio procedat. Non
licet siquidem vllius artis scientiam nācisci, nisi & me-
thodum quādam habueris per vniuersalia theorema-
ta: & in

METHO. MED. LIB. IX.

ta: & in particularibus te exemplis exerceas. Vt igitur reuertar ad methodum, equidem virtutis considerationem ad curationem morborum saepe maximè necessariam arbitror: sic, vt quæ circa egrum administrantur, omnia ferme eius vnius causa fiant: aliquando mediocriter necessarium: sic vt aliquid ex hac quoque, ad ea quæ facienda sunt, consilii petatur: non tamen præcipua faciendorum ratio huc omnis dirigatur. Possum rursus ostendere, virtutem adeò exiguam ad inueniendæ remedia cōferre, vt pp exilitatem et lateat: aliàs verò p̄termitti, ac silētio p̄teriri: quasi prorsus ex vtiliter cōsiderandis non sit: vt in diariis febribus, in quibus vires nullam prouidentiam requirunt: vtpote validæ. Verum quod in virtute accidit, id in reliquis omnibus quæ aliquid faciendum indicant, vsu venit. Horum autem omnium aditum Hipocrates nobis ostendit, incul tum tamē: quem methodo postea nos explanauimus: perinde vt Traianus, fecit, qui omnes Italiæ vias asperitate difficiles, refecit, instaurauitq;: Vt verò accuratius de ipsis viribus differam, operæpretium est scire, tribus diuersi generis facultatibus siue animis vniuersum animal gubernari. Quarum sanè prima quæ stirpibus est communis, quāq; vocāt naturalem, atq; etiam appetitricē, iecur pro fonte habet: per venasq; illinc sparsas in vniuersum corpus, id alit. Secunda autem est, quæ non modò vt stirpibus, aut vita præditis, sed etiam vt animalibus anima, est insita. Hæc in corde, fonte caloris insiti, residēs, ab ipso per arterias ab eodem ortas, in totū corpus diffeminat: diciturq; tū vitalis facultas, tū irascibilis aīa. Tertia deniq; ē aīa ratiōatrix, quæ in cerebro domicilium habens, voluntariis actionibus præsidet: per nervosq; ceu per canales, toti corpori sensum & motum largitur. Has igitur facultates seruare, nihil planè est aliud, q̄ vitam seruare. Siquidē qualibet earū amissa, necessum est, reliquas simul peri-

Tomus. III.

DDd

417

Artis cuiusvis scientiā acquiratur opus est vt methodum quādam habeat p̄ vniuersalia theorematā: & se, in particularib; exemplis exerceat.

Vires in diariis febrib; negligi, q̄ existētes ualide nullam prouidentiam requirant.

Hippocratis documenta inculta explanauit Galenus.

Traianus oēs Italiæ vias difficiles, instaurauit.

Animæ naturalis siue appetitricē sedes, est hepar.

Anima irascibilis collocatur in corde.

Anima rationalis consistit in cerebro.

Curatiua pars
artis & ea que
sanitatem tue-
tur, qua in re
conueniant, &
differant.

Vacuantia re-
media omnia
virtutem exco-
luunt.

11. **Epicrasis** ἡδ.

re. Ac proinde in opere de sanitate tuenda huc omne consilium direximus. In hoc verò, primum propositū est, morbi sublatio. Nam cuiusmodi in illo est sanitatis tuitio, eiusmodi in hoc est morbi sublatio. Quorum utriusque communis est ipsa vitæ custodia. Hoc tamē interest, quæ quæ secundæ valetudinis tuendæ gratia geruntur, eadem statim vitam tuentur: quæ verò affectiōes præter naturam in morbis discutiunt, ea non omnino vitam custodiant. Quippe aliqua eiusmodi prædita sunt facultate, ut si immoderatè aut intempestiuè utare, vitam adimant: quod solent vacuationes immodicæ. Ergo quum virtus tantopere necessaria sit, eam autem lædāt oīa vacuantia remedia, si quis ipsis parū moderatè utatur: utique aduersæ inter se faciendorum indicationes in talibus corporibus sunt, in quibus affectus, quo expugnetur, notabilem vacuationem desiderat: virtus autem hanc ferre non valet. Cæterum quemadmodum nihil quod sanitatem tuetur in ualentibus vires corrumpit: sic in ægrotis aliquando virtus succedit iis, quæ veluti in perniciem eius administrantur: ut si euacuemus in plenitudine quæ est supra vires: aliquando ab ipsis dissoluitur. Etenim in synochis febribus: ex meatuum stipatione ortis, quoniam valida plerumque virtus est, citra periculum vacuatio adhibetur. In aliis verò quæ ex corruptela humorum gignuntur, existit maximè periculosa. Siquidem quod corruptum est, alienum à natura quum sit, id se auferendum dicat, uel vena incisa, vel purgatione. Horum autem præsidiorum neutrum feret imbecilla facultas, si quando cum corruptela coiuerit. Oportet igitur, ubi indicationes ita sibi aduersantur, paulatim quod vitiosum est, vacuare: paulatimque, quod salubre est, in eius locum reponere: quam curationem vitiosi succi Medici epicrasin nominant. Quum igitur sectio venæ, sanguinis sit vacuatio: sanguis autem ipse utilis

possessio naturæ existat: sic utiq; oportet venæ sectio-
nem fieri, vt quod inutile ex sanguine ipsi naturæ est,
emittatur. Fit porrò sanguis bifariam naturæ inutilis:
vel quum propriam qualitatem ad vnguem non ser-
uat: nec amplius nutrire, sicut pri^o, potest: vel dum ita
multitudine creuit, vt premat vires, aut distendat va-
sa, vel rumpat ea, vel obstruat. Atq; in his quidem mis-
sio sanguinis utilis est, ceu vacuantium præsidiorum
vnum: in aliis autem, ceu quod humorum vehemen-
torem impetum ad partem diuersam reuocet, vel ad
lateta deriuat. Postulat autem semper valentes vires,
quæ modo vacuationis eius respondeant. Quoties
igitur virtuti notabilis ex vacuâtibus auxiliis noxa in-
cidet, toties ipsa vtile aliquid indicabit: æquè utiq; vt
quum manifestè iuuabitur. Vbi verò ex iis quæ af-
fectum submouent, nec commodum illi accedit vl-
lum, neq; incommodum, ibi veluti inutilis prætermi-
titur. Porrò quicquid aliquam præstat indicationem,
si natura id simplex sit, etiam quod indicatur, utiq;
simplex erit. At si illud compositum sit, & hoc erit
quoq; compositum. At sanè quædam custodiam sui:
quædam amotionem indicant. Virtus itaq; semper
vnam rem indicabit: utiq; sui custodiam. Custodietur
autem, primò quidem, si quod ex substantia ipsius uel
inanitum, vel alteratum est, correxerimus. Secun-
dò verò, si quæ ipsius substantiam vacuare, altera-
req; possunt, prohibuerimus. Aestimari autem de-
bebit interim, quod magnitudine, dignitatē ue ante-
cellit. Maxima igitur dignitas, virium ipsarum est:
quando viuere ipsum nobis ex harum custodia con-
stat: utpote quum vitam, aut ipsas esse vires, aut ea-
rum actiones, necesse sit. Virtus ergo omnium pri-
ma custodienda hominibus est. A^o virium indicatio-
ne proxima existit, quæ ab affectibus, quos cura-
re conamur, subministratur: postea deinceps reli-

DDd ii

Sanguis pro-
bus est posses-
sio naturæ.
Sanguis dupli-
citer inutilis
redditur.

Sanguinis mis-
sio interdum
est utilis vt
præsidium ua-
cuans: interdū
vt reuclēs, aut
deriuans.

Vires quando
præbeant indi-
cationes uti-
les: & quando
minime.

12.

13.

Virtus semper
custodiam sui
indicat.

Virtus quot
modis seruan-
da sit.

Indicantiū di-
gnitates esse
æstimandas.

Vitā esse aut
vires ipsas aut
ipsarū actiōes.

Indicatio om-
niū prima ē q̄
a virtute sumi-
tur, non sic tñ
vt curationem
nos doceat.

14. Indicationes
medicatrices
vnde sumatur.

Morbi diffe-
rentiæ.

Febris quid.

Febris reme-
dia humecta-
tio, refrigeratio
q̄ exiit.

quæ. Quicquid igitur indicationi, quam vires præbent, aduersatur, id secundi est loci. Quæ verò cum iis quæ conducunt viribus, in idem competunt, hæc vtrunq; calculū referunt: & eorū quæ primæ sunt notæ, & eorū quæ secundæ. Quare citra controuersiā faciēda. Quæ verò aduersantur, aliquando administranda prorsus non sunt: aliquando paulatim. Prima igitur indicatio omnium est, quæ à virtute sumitur: non tamē sic prima, vt curationem nos doceat: quum ex numero curatricium indicationum nō sit, sed vitalium. Nā neq; vt valeamus, neq; ut à morbis liberemur ab ea quicq; primum desumimus, sed ut uiuamus: quis ex accidenti interdum virtutis roboratio ad affectū curationem conducatur. At uerò medicatrices indicationes à morbo ipso sumuntur, & à temperie corporis, & ab ambiente nos aere: qui causæ sine qua non, rationem obtinet: quum sine ipso nec tolli morbus, nec teneri sanitas possit. In omni itaq; curatione agendrum indicationes in his tribus ad summū consistunt. Reliquæ autem omnes ab his in partes diductis, oriuntur. Ceterum affectus ipse haudquaquam in causas diduci est aptus, quemadmodum temperies atq; ambiens aer: sed tantummodo in differentias. Nam aut in similaribus consistit partibus: aut in instrumentariis. Ac in similaribus quidem, vel simplex est intemperies, vel composita. In instrumentariis, circa simplicium partium uel positionem, uel formam, uel numerum, uel magnitudinē, tum quæ horum sigillatim traditæ sunt differentiæ, consistit. Porro affectuum qui simplices partes occupant, vnus est intemperies calida. Quæ si in totum corpus diffusa sit, appellatur febris. Ideoq; omnis febris, quæ febris ē, humectatio refrigeratioq; remedia sunt. Ac si sola quidem sit febris, ad refrigerandum humectandumq; ueluti ad finem, dirigetur omne medentis consilium. Quare, materia inuēta, opportunum tem-

pns ex quatuor febris temporibus sumes : quātitatem
uerò, ex conferendo cum naturali habitu morbum.

Quippe, quantum is recessit à naturali habitu, tantum
opus est ægrum refrigeres & humectes. Ambiens au-
tem aer (cuius fugere cōmercium non licet) si contra-
riam morbo temperiem habeat, è præsidiōrum nume-
ro est unum: sin similem, vna est morbificarum cau-
sarum. Iccirco tunc inhibenda eius noxa est, scilicet re-
liquorum auxiliorum humiditate ac frigore intensis,
adauctisq; . Ipse autem arte reddendus est talis, qualis ad
profligandam febrem, aut aliam q̄piam dispositionem,
desyderat. Si igit̃ morbus siccus & calid⁹ sit, humidio-
res frigidioresq; domos & eligenus, & p̄parabimus.
Sicuti ē diuerso, si frigidus, humidusq; , eas quæ calfa-
ciant & siccent. Sunt itaq; deligēdæ quæ ex seipsis eius
modi sint. Alioqui industria nostra p̄parabimus ipsas,
per æstatem quidem eas subterraneas molientes, & ad
Septentrionem conuersas: ac pauimenta ipsarum aspi-
duē humore aspergētes: tum vt ex euripo aliq̄ aura ex-
piret, machinantes: flores præterea & germina, quæ
frigidæ humidæq; sint facultatis, per aream disseminā-
tes: per hyemem verò, cōtraria horum facientes: præ-
sertim vbi morbus suadet: vbi non suadet: excessus tā-
tūm vtriusq; temporis remittentes. Poterunt rursus
tres illæ indicationes prædictæ ad duas tantūm redu-
ci: nempe ad morbum & sanitatem. Neq; enim aliud
ipsa sanatio est, q̄ morbi in sanitatem translatio. Qui af-
fectus contrarii quum sint, necesse est per cōtraria fiat
eorum alterius in alterum trāsmutatio. Atq; ita rursus
vna erit sola curationum indicatio generalissima, vi-
delicet contrarietas. Cæterū ad accuratam contra-
riorum administrationem, necessum est curandorum
corporum prius & naturas & temperamēta cogno-
scere: quæ quidem tum ex iis quæ in libris temperamē-
torum tradita sunt, poscuntur: tum ex ætate, & tota

Aeris cōmer-
cium nos fuge-
re haudquāq;
posse.

Febrientibus
quales ædes
eligere, præpa-
rareq; debeamus.

15.

Sanatio quid.

Indicatio cura-
tionis genera-
lissima, est uni-
ca: videlicet cō-
trarietas.
Contrariorum
exhibitioni,
quarum rerum
desyderetur co-
gnitio,

DDd iii

16.

Consuetudinē
ad inuentionē
remediorū, &
ad sanitatem
tuendam pluri-
mum posse.

Consuetudo
quō curationis
rōnē indicet.

17.

Corpora dissipa-
tu facilia &
difficilia quæ
sunt.

Puerorū substā-
tia cur omniū
facillimē dige-
ratur.

Puerilis substā-
tia cur minus
ceteris egeat
præsidio va-
cuante.

Sanguinis de-
tractionem p-
hibentia.

anteacta vita, quæ nimirum in victus & exercitii ratio-
ne consistit, præterea, in hac regione, & hoc anni tem-
pore, & hoc coeli statu, conuersatione. Ex ipso autem
temperamento inuento, administrandorum indicatio
suppeditabitur. Sed neq; parū quid, negligēdum' ue,
ad remediorum inuentionē consuetudo adfert: veluti
nec ad sanitatem tuendam: quum singulorum corpo-
rum etiam naturam ostēdat. Nos siquidem uia ratio-
neq; ab ea procedentes, inuenimus ipsarum partium
affectum: dein ex illo rursus peruenimus ad faciendo-
rum indicationem. Consuetudo itaq; curationis ratio-
nem indicat, per corporis naturam intercedentem,
quemadmodum ætas: quæ & ipsa temperamēti inter-
uentu, præstat indicationem. Aduertere autem oportet,
corpora frigida & sicca, quæq; ex terrestri natura
constant (cuiusmodi sunt mineralia) q̄ ægerrimē sol-
ui. At quæ calida & humida sunt, eorum substātiā ce-
lerrimē dissipari in ambientem. Quæ verò in medio
horum, ex diametro pugnantium, consistunt, ea cor-
pora quo magis ad hæc, vel ad illa accesserint, eo
vel aptiora ut dissipentur erunt, uel contumacia ma-
gis. In summa, citra calorem non potest in halitum
digeri corpus ullum, quādiu substantia eius coacta
densataq; manserit. Puerorum autem substantia, facil-
limē omnium digeritur, dissipaturq; propterea quod
est ut humidissima omnium, sic nulla frigidior. Quo-
minus vacuantis præsidii eget: quum ex se ipsa natu-
raliter abundē vacuetur. Fit autem profectō & pro-
pter calidam siccamq; regionem, & tempus æstiuum,
& statum coeli impensē siccum & calidum, notabilis p-
cutim vacuatio. Itaq; hac de causa, qui sanguinis detra-
ctionē desyderāt, iis aut prorsus nō secabimus uenam,
aut partē detrahemus. Eruntq; in hac detractiōe quoq;
spectāda, natura ab initio, cōsuetudo, ætas, locus habi-
tationis, anni tempus, coeli status, necnon is, quæ cura

mus, affectus: aliaq; ratione, ante hunc, laborantis facultas. Quum verò affectus sint numerosi, cuiq; ipsorum sua est curationis per cōtraria indicatio. Quo circa, octo intemperamenta quum sint, octo erunt etiam morborum, quibus simplicia corpora sunt obnoxia, particulares indicationes. Ultraq; has, una eius affectus, qui instrumentalium communis est, diciturq; continui diuortium: cuius sanè est indicatio curationis, vnitio. Est igitur vnum morbi genus, quod similes & simplices animalis vexat particulas: quam intemperiem vocant. Huius aliquæ differentie oriuntur vbi corpora, nudis qualitatibus alterantur: aliquæ vbi accedente etiam humorum affluxu. Quæ sanè dispositione utraq; vel afficitur vna pars corporis, vel plureis, vel vniuersum corpus.

Sanguinem de tracturo quæ sint consideranda.

Intemperies simplicium partium esse octo, totidemque illarum particulares indicationes.

Solutionis continui indicatio est vnitio.

Intemperie differentie.

GALENI PERGA

MENI DE METHODO

MEDENDI. LIB. X.



RGO in diariis febribus simplex quædam est in corpore præter naturam affectus: utpote causis quæ primum eas excitarunt, iam ademptis. In quibus verò causa quæ eas accendit adhuc manet, in iis neq; affectus simplex, neq; sanatio est. Siquidem quod febris iam receptum in corpore est, id ex propria ipsius curandi indicatione discutere oportet: quæ adhuc est futurum, id propulsare, ac ne fiat, vitare. Verabit aut, si quæ id excitat causa prorsus summotæ sit. Itaq; in diariis faciendæ indicatione maxime ex ipsa febre capiemus. In reliquis verò, quæ accensionis suæ causam intus habent, prima

Diariarum affectus simplex.

DDd iiii

Indicatio ipsa
quando a fe-
bre, & qñ a fe-
bri causa su-
men da sit.

Putredinē esse
causam febrū
quæ plures in-
festant dies: ac
proinde prius
tollendam eē.

Indicationes
agendorum in
putridis febrī-
bus sumi a fe-
bre ipsa, & ab
effetrice illius
causa, & a fa-
cultate.

2.

indicatio ab ipsa sumetur causa. Quare si febrium, quæ multos dies continuant, recte ostendimus putredinem esse causam: hæc nimirum sananda est prima. Sed nec interim extinguendæ febris, quæ per eam iam accensa est, ratio non habenda. Ac si quidem in idem consentiant, & quæ febrem extinguunt, & quæ oppugnant causam, in quod utraq; conspirant, quum vnum sit, si ne cunctatione est agendum. Sin febris, quæ iam accensa sit, sanatio, causam quæ hanc excitauit, est aucturæ: aut quæ causam submonent, febrem exasperabunt, diligens habenda consideratio est de remediis specie. Etenim si intolerabilis ægro sit magnitudo febris, committendum non est, ut per ea quibus causam adimimus, febrē augeamus. Sin ita mediocris sit febris, ut quo tempore contra causam tantū pugnas, obruendæ interim vires ægrotantis non sit, utiq; contemnendus is curationis modus non est. Non contemnendus autem nec ille est, qui contra id, cuius maius momentum est, instare iubet: nec tamen alterius omnino negligentem esse. Quum autem in examinandis iis, ad hominis salutem non parum momenti facultas habere videatur, tria nimirum erunt, quæ in propositis iam ob putredinem febribus, agendorum indicationem nobis prima largiant. Febris videlicet. Eius effectrix causa. Præterea naturalis facultas. Cæterum priora duo submouenda sunt: tertium est custodiendum. Erit itaq; rursus & hic necesse, ut tum febrem, tum ei⁹ causam, cum facultate ipsa conferas. Mox si eadem ambo remedia requirant, ea promptè exequaris. Sin indicationes pugnabunt, vnā præferas, vel quæ à viribus sumitur, vel quæ à causa, vel quæ à febre: sic ut quæ cæteris sit valentior, hanc magis sequaris: nec tamen cæteras negligas. Nunc vero ad particularium præsidiorum differentias nos conuertamus: repetita tamen mentione diariarum: quum & ipsæ, inscitia medicorum,

in plurimum dierum febres aliquando degenerent: idque vel earum effectrice causa abeunte: vel etiamum persistente. Porro abiit effectrix causa, quoties ab ira, dolore, vigilia, cura, æstiuo sole, fatigatione, & bubone qui iam desinit, citra stipationem febris est excitata. Manet, quoties vel ab externa causa, vel ab ipsa febre, stipatio aliqua est orta. Nam & frigiditas, & astringentiū osus, per mediam stipationem, semper febrē excitant. Vt itio præterea nonnunquam constipat corporis habitum. Iam ipsum febris principium, ubi cum horrore inuasit, stipationem subinde fecit. Quinetiam glutinosi, & crassi, aut etiam copiosi succi, ubi mediocriter obstruxerunt, diariam aliquando febrem accendunt. Dicuntur autem id genus febres omnes diariæ, quia solui vno die sunt aptæ: computata cum hoc vna & nocte. Cæterum non est idem diariarum omnium affectus. Sed ab aliquibus inseparabilis stipatio est: ab aliquibus minimè inseparabilis: sed vel ut plerumque simul adest: vel ambigua sorte: vel raro. Inseparabilis stipatio est iis, qui ex aluminosa aqua, vel chalcæthode, vel tali quapiam alia, aut ex frigore, aut leui obstructione febricitant. Plurimum verò iis adest, qui ex vitione febricitant. Ambigua sorte, iis, qui ex fatigatione. Quicunque verò, ex ira vel tristitia, vel vigiliis, vel pertineti studio, vel cruditate, vel bubone febricitant, iis raro adiuncta stipatio est. Atque harum omnium febrium nulla (quod utique ex ipsa sit) ad secundam usque accessionem perdurat, sed intra quatuor & viginti horas omnino desinit: idque cum sudore, vel madore, vel transpiratione quodam halituofo. Aut si quando earum aliqua (quod tamen rarius contingit) longius trahunt, duæ iis accedunt causæ, quæ ipsas solui vetant. Earum vna frigus est, quod vel ex ambiēte aere, vel ex vntione quapiam extrinsecus admota proueniat. Altera egregia illa diatritos est, si qui videlicet hanc transire, medicorum in

Diarias febres dum imperite tractantur, diuturniores fieri. Diariarum causas quæ recedant, & quæ persistant in corpore. Stipationem quæ faciant.

Diariæ febres cur sic dicant. Diariarum affectus multiplex.

Ephemerae febres cum quibus excretionibus definant.

Diarias produci unde accedat.

Diatritos.

Diariarū mul-
tiplex differē-
tia.

Stipatio du-
plex.

Densitudo me-
atū unde ac-
cidat.

Obstructionū
differentiæ.

Indicatio a vi-
ribus sumpta,
in diariis qui-
dem exigui in
plurium autē
dierum feбри-
bus, maximi
solet esse mo-
menti.

Vires prima
aut secūda die
ab initio mor-
bi, unde resol-
ui accidat.

3.

Nutriendi, etiā
in prima inua-
sione accessio-
nis qui sunt.

4. Punicum ma-
lum, ventricu-
lum roborat.

scitia coguntur. Multæ igitur apparent diariarum esse febriū differentiæ particulares. Vna, quando iam pror-
sus recessit ipsarū effectrix causa: ueluti vstio. Altera,
quādo hæc etiam adest: sicuti stipatio. Cuius duæ sunt
differentiæ: nempe exiguum meatuum & densitas,
& obstructio. Sanè densitudo ipsa, aliās ex siccitate pro-
uenit: aliās ex frigore, eoq; uel simplici, uel cum astri-
ctoria ui. Iam uerò obstructionum ipsarū, alia est, quæ
ex abundātia: alia quæ ex qualitate succorum, scilicet
qui aut lēti, aut crassi sint, incidit. Præferetur aut inter
remedia, in ea quam copia facit, sanguinis missio: in ea,
quæ ex humorū qualitate consistit, attenuantium usus.
Consilium uerò sumptum à uiribus, ut in diariis sanè
est exiguum, ita in iis qui pluribus diebus urgent, satis
magni est momenti, eoq; maioris, quo hæc sunt longio-
res. Enim uerò, ubi naturaliter vires se habēt, ne mini-
mum quidem in diuturnis febribus vacationū vsum
morantur: ubi aut sunt infirmiores, pro magnitudine
imbecillitatis, impeditur usus auxilioꝝ vacuantium. Ra-
rius aut accidit, ut protinus in primo, secundo uel die,
vires imbecillæ cernantur: id quod tamē interdum ac-
cidit, vel pp ægotantis malum corporis habitum, vel
pp senium. Nonnullis etiam fatigatio, ubi tristitia, vigi-
liæq; præcesserunt, & inedia per totum secuta est diē,
dein febris prius q̄ homo cibare, circa vespērā occu-
pauit, & nox insomnis est acta, vires ipse resoluit. Por-
rò quibus temperies corporis ad siccum calidūq; per-
sa, febrem accendit, ii interdum vel in prima inuasiōe
accessionis, nutriendi sunt: ne dum ante illam. Eis autē
soleo ipse sorbitionem ex alica exhibere, iniectis in eā
mali punici granis: qui cibis bilioso stomacho est opti-
mus. Nā & roborat hunc, malū punicum: & alica, quū
diutissimè in eo citra corruptionē maneat, sensum con-
coquit, idq; nec accescens, nec ēt innatans. Igit̄ mordēs
halitus, succusq; ubi per sensibilia corpora fert, hor-

rores & inæquales totius corporis concussiones facit, in iis, quibus cute stipata, quæ prius transpirabat, iam sunt detenta. Quæ quidem, si fuliginosa sint, febres accendunt. Eiusmodi autem halitus, succosq; tum multa & vehemens dimotio, tum vigilæ, & ira, & dolor, & cura, augent: tum proximè ab istis, vnum illud per se interdum augere eos sufficit, utiq; si cibum quis non sumpserit. Efficitur namq; corporis halitus in iis naturis, quæ faciliè amaram bilè gignant, ex longa inedia biliosus. Cōcussio itaq; siue rigor succedet, propter eorum quæ feruntur excrementorū, tum multitudinem, tum acrimoniam, tum impetus celeritatem, tum laborantis virium imbecillitatem. Horror verò fiet, ubi & qualitas eorum, & impetus velocitas est remissa: tum copia minor: ac potissimū quū vires tristati obstant. Quod si largius remittantur iam dicta, ne horror quidem continget: sed vel quidam ceu vlcerosus sensus: vel tantū inæqualitas. Porro quibuscūq; virtute existente imbecilla, squallidoq; ipsius corporis habitu, incipientis adhuc accessionis vidi adesse symptomata, iis omnibus panē ex vino diluto, & calente, maturè exhibens, horrorem statim inhibui. Quāto verò hos citius cibaueris, tāto scilicet magis febrem prohibueris. Si duæ horæ ab initio inæqualitatis interpositæ sint, nutries tunc quoq; modò adhuc duret horror: prædicēs tamen, q̄ hi febricitabunt, cæterū innoxia febre, & cui cutis mador succedet: quo facto, tū lauare, tū nutrire debebis. Quod si horror p̄terierit, ac iā planè febricitet, id t̄pis nō sunt cibādi: sed decrescēte iā accessiōe, atq; interdū in summo uigore, nutriēdi sunt, solutiōis itegritate nō expectata. In nullo nāq; squallido affectu cōmodè finit accessio, prius q̄ illi vel ex lauacro, vel humido victu, humectatio accesserit. Calidis itaq; & siccis naturis, siue à p̄mo ortu sint tales, siue sint et acquisitig, maximè inedia aduersat, febriū paratissima causa. In

Sucos acres q̄ gignant.

Rigor unde accidar.

Horror unde proueniat.

Vlcerosus sensus qū fiat.

Horrorem inuadentem in principio accessionis inhibet panis ex vino diluto & calente exhibitus.

Nutriti iterū dum horrent, q̄ possint.

Inedia aduersatur calidis et siccis naturis.

ter alia aut, calidus in summo, siccusque coeli status, iam de
clara temperaturam efficit. Hic aut status alio anni tempore, quam aesta-
te, plane incidere nequit: sicuti nec humidissimus pari-
ter frigidissimusque, in alio quam hyeme. Corpora igitur ca-
lida & sicca, ex inedia facile in febres ardentes incidunt:
à quibus, nisi prius mors occupet, in hecticas transeunt:
atque ab his, in marasimum: vel protinus ab initio, ardē-

Hecticis febribus a principio corripit calidas & siccas dispositiones.

tibus praeteritis abeunt in hecticas. Maximè autem sic-
cas, calidasque dispositiones corporum, à principio fe-
bris hectica corripit: id quod olim cuidam iuveni con-
tigit, qui ex ira febricitavit. Cui quidem, quoties nutri-
tus est, fontanae planè gelidae dedimus interim binos
cyathos, interim ternos: quando frigidam simul mul-
tam sibi dari, qui ita sunt affecti, citra noxam non fe-
runt. Quo circa vtilissimum fuerit, ubi febris ideam
perspexeris, in prima statim occasione, minori cum pe-
riculo, copiosiori frigida uti: corporibus ad validam
siccitatem nondum perductis. Iam verò quemadmo-
dum in quibus febris accenditur propter mordentem
acrimoniam excalfacti, attenuatque à Sole, inedia, &
& laboribus, succi, maximum eius remedium è humi-
dum nutrimentum: sic è diuerso, ubi ob copiam, vel
obstructionem, vel phlegmonem, vel humoris alicuius
putredinem, febris est orta, maximo malo est cibus.

Nutriendi qui non sint, ne in ipsa quidem accessione declinatione.

Nutriendi cum filium sumentem esse a summo vigor morbi, & viribus aegrotantis.

Quare hos quidem, nec in febris inclinatione, citra no-
xam nutrias, nedum ipsa accessione inuadente: illos
verò, omni certè tempore, sed potissimum per incli-
nationem. In summa verò, illa duo à primo statim die,
sunt tibi in omni agro spectanda, morbi summus vi-
gor, & aegrotantis vires: à quibus cibandi consilia pe-
tas. Postea si transiri summum incrementum sine om-
ni cibo potest, in cibi abstinentia hominē ipsum serua-
bis. Sin exiguum adminiculum requirat, abundè erit
sola mulsæ. Quòd si maius desiderat, quam sit ex mulsæ, pti-
sanæ cremor latis erit. At si fas non est summum mor-

bi incrementum aut tenui victu, aut inedia transmitti, id agendum, vt homo statim in prima accessiōis inclinatione nutriatur. Aliquos verò ipsorum, & quum inuasura adhuc est, & quum incipit, cibabis. Sint porro hi sicco temperamento & calido, oportet: tum viribus necessariò imbecillis: quum fieri nequeat, vt abundè siccum, calidumq; corpus, si febricitet, virib⁹ sit valentibus. Si autem cum eiusmodi febris & corpore, momentanei membri phlegmone sit coniuncta, omnino æger morietur: magisq; id certum est, si vel peripneumonia, vel pleuritis vel angina, vel ventriculi, vel iecinoris phlegmone infestet. In quibus sanè affectibus vna salus est, virium robur. Nam quod ad phlegmonē quæ in iis est partibus attinet, minimè planè est cibandum. Quod ad virium infirmitatem, vtiq; sæpe. Ac proinde necessum est, aut resoluantur vires, aut phlegmone augeatur. Quoties igitur vel ex lassitudine, vel ira, vel pluribus curis, vel vigiliis, vel tristitia, vel longa inedia, vel uniuersis vnà coeuntibus, siccatum corpus ē, ac febris inuasit, quæ & aridam reddit cutem, & igneum calorem refert, vtiq; hunc talem timor est hectica febris correptum iri, potissimum in æstate, ac cœli statu sicco, calidoq;. Oportet autem, q̄primum ptisanæ cremore, & sorbitione ex alica nutritum, panēq; post oblato, aquæ frigida potione hominem cures. Quippe protinus extinguitur, ac cessat omnino febris: modo nec phlegmone aliqua ei sit adiuncta, nec putridus humor. Quanq̄ ego etiam vel si hæc aderāt, ægrotorum non paucis aquam frigidam dedi, tutius esse ratus, phlegmonas in præsens augere, q̄ sinere hominem in hecticam febrem prolabi. Cæterum si magnum fore incommodum, vel humori putri, vel phlegmonæ sit suspitio, à frigida quidem danda abstinebis: refrigerantibus autem remediis, quæ foris applicantur, vtēris: modo ea super os ventriculi, aut tota præcordia: mo-

6.

Hectica febris
quando sit ex
pectanda.

Balnea quib⁹
conueniant.

Phlegmonas
cur febres se-
quantur.

Putredo humo-
rum quotupli-
citer accidere
possit.

7. Remediorū re-
frigerantiū hu-
mediūq; ,
materia du-
plex.

8. Refrigeratio i
febribus cur
breuis sit tem-
poris, atq; pe-
riculosa.

Aedes febrien-
tibus quales,
esse cōueniat.

do super pectus imponens: ubi scilicet plurimum sub-
esse caloris, maximè indicabis. Balnea etiam, iis qui
ficcato plurimum corpore sunt, & citra humorum pu-
tredinem febriunt, non incōmoda existunt. At phleg-
monas subsequuntur febres, propter putredinem hu-
morum, qui in ipsis impacti habentur. Possunt tamen,
vel citra phlegmonem, in ipsis vasis aliqui humores
putrescere: idq; aut in vna animalis particula, in fini-
bus ipsorum impacti: aut etiam in totis eorum capa-
citatibus, quæ inter bubones & alas sunt, comprehen-
si. Vbi igitur citra putredinem squallenti corpori fe-
bricitare contigerit, caput totius curationis, in iis re-
mediis quæ refrigerent, humectentq; , statuere oportet.
Porro duplex genere est harum rerum prima ma-
teria. Vna, eorum quæ foris incidūt: altera, quæ intus
in corpus sumuntur. Extrinsecus corpori incidunt, tū
aer ipse qui nos ambiat: tum pharmaca, quæcunq; hu-
meccandi refrigerandiq; vim obtinēt: & tertium præ-
ter hæc, dulcis aquæ balneum. Intrō in corpus sumun-
tur, quæ eduntur, ac bibuntur, & inspiratus aer. Ab
his generibus tentandum est propositis hoc loco fe-
bribus tum humiditatem, tum refrigerationem com-
parare. Verū refrigeratio, quoniam per efficacissi-
mam qualitatem inducitur, & parui temporis est, &
periculosa. Contra siccitatis, per ea quæ humectent, cu-
ratio, ut longi temporis est opus, ita minus est, q̄ refri-
geratio, periculo exposita. Si igitur temperat⁹ sit aer,
qualem se exhibet, tali eo est vtendum, nihil amplius
de eo nobis sollicitis. Sin verō admodum calidus, vel
fit admodum frigidus, pro calido inducendus arte cō-
trarius est, subterraneis inuentis domibus, quæ & frigi-
disimæ sint, maximeq; perflatæ, & ad septentriona
conuersæ: tum auris quibusdam suauibus opera nostra
paratis: aliàs ex euripis, in quos multi se aquarum fon-
tes precipitent: aliàs aqua frigida ex vasis in vasa transf-

fusa: id quod etiam conciliat somnum: præterea domo assidue aqua, quæ prorsus frigida sit, aspersa: ac rosis plurimis humi fuis, aut vitium capreolis, aut ruborū clauiculis, aut lentisci ramis, aut deniq; reliquarū, quæ refrigerent, stirpium aliquibus, turba quoq; hominū ingredi prohibita: ut quæ domum similiter calfaciat, Ac sic quidem calidissimum aerem, qui scilicet in æstate calida & sicca accidit, refrigerare est tentandū. Qui sanè si modicè frigidus sit, hoc esse cōtētos oportet, nihil de eius temperie alterantes. Qui verò frigidissimus est, utiq; quatenus respirando attrahitur, admittendus est, ut qui admodū calorē cordis refrigeret: nō tamen quatenus extrinsecus ægrum cōtingit. Quippe densat, cogitq; cutim, putrilaginosorumq; humorū fluxum, atq; trāspirationem cohibet. Siquidem p pul monem, quod rarum est viscus, difficile nō est, ut tum qualitas ipsius, tum ē substantia, facile ad cor perueniat: per cutim verò, utpote densatam, fieri id non potest. Cæterū ex frigida inspiratione maius sequitur cōmodum, q̄ incōmodū ex cute densanda: præsertim cum operimentis hanc nobis calfacere liceat. Porro vtendum maximè eiusmodi aere est in iis hecticis, in q̄ bus primum qd̄ afficitur, ipsum est cor: æquè ut si uentriculus primum affligeretur, ipsi per comesta & bibita succurrendū esset. At iecinori ex inspirato aere nulla certè accedit utilitas: à comestis uerò & bibitis, minor planè q̄ uentriculo: aliqua tamen haud obscure aduenit. Cōmunis autem omnium sanatio est, per ea quæ extrinsecus applicata refrigerant, & humectant. Atq; ob hæc quidem viscera, magna ex parte heclicas, marasmodesq; febres accidere contemplati sumus. Superueniunt tamen aliquando & pulmonum intemperantiæ calidæ & siccæ. Incidunt præterea & pectori, & mesenterio, & ieiuno, & colo: interim uerò, & utero, & renibus. In septo autem transuerso ma-

Sonum conciliari ab aquarum strepitu.

Turba hominum incalescere ambientē.

Aer calidissimus quō refrigerandus.

Aeris frigidi effectus.

Iecinoti ex inspirato aere nulla accedit utilitas.

Marasmodes febres ob q̄ viscera maiori ex parte solent accidere.

Hectica ex fe-
pro transuerso
orta, dyspnoea
& delirium ex
cipit.

Hectici ex fe-
pro transuerso
quo dignoscā-
tur.

Aer frigidus
qñ maxime
conferat.

9.

Refrigerantia
extrinsecus, in
febris quā-
lia eē debeāt.

Aceti facultas

Aceto quomo-
do utendum.

Refrigerantis
humefiantisq;
cerati desci-
ptio.

rasium non vidi: febrem hecticam vidi. Eiusmo-
di autem affectum & spirandi difficultas, & delirium ex-
cipere solet. Ex quibus magna ex parte prius moriun-
tur, q̄ hectica sit prorsus perfecta. Est autem eorū agni-
tio facillima, tum ex pulsus duritia, tum ex eo q̄ præ-
cordia plurimum trahuntur sursum, tum ex difficulta-
tate respirationis, quæ illis est inæqualis, & varia: inter-
dum admodum rara, magnaq; utiq; quum delirii ma-
lum præcipue dominatur. Frigidus itaq; aer tunc vel
maxime confert, quum quod primum afficitur, ipsum
est cor: quis confert & in reliquis febribus nō parum:
quandoquidem in his quoq; necesse est cor similem in-
temperiem recipiat. Pulmones etiā ubi ii sunt qui pri-
mum patiuntur, plus cæteris omnibus aerem refrige-
rantem postulant. Porro ex medicamentis, quæ admo-
ta extrinsecus in eiusmodi affectibus, refrigerandi hu-
meftandiq; vim possident, deligēda ea sunt, quæ non
modo citra astrictionem refrigerent, sed etiam corpo-
ris substantia sint tenui. Ac quæ quidem absolutissime
tenuium partium sit, substantiam exacte frigidam in-
uenisse, fortasse non est. Dixi exacte, propter acetum.
Quod quum omnium (quæ nouimus) potestate refri-
gerantium, planè tenuissimarum sit partium, admistā
sibi aliquam habet caliditatem. Præterea corpora quæ
cōtingit, siccant: quis ad imaginationem sit humidum.
Quo fit, ut ad eos affectus, quos humectari & refrige-
rari expedit, solo eo non utamur, sed tanto aquæ fri-
gidæ admisto, ut possit bibi. Hoc autem medicamē qđ
subdam, humefantium & refrigerantium omniū sim-
plicissimum est, optimumq; ad erysipelata, & puden-
dorum phlegmonas inter initia, prius q̄ depascens ali-
qua subindiceretur putredo. Olei rosacei ex omphaci-
no oleo citra salem confecti. Vncias. iij. vel. iiii. Cerae
albæ, & eloræ, vnciam vnam. Liqueantur simul in vase
duplici, ac fiat ceratum humidum, cui abūdo refrige-
rato,

rato, misceatur paulatim in mortario tantum frigidis-
simæ aquæ, quantum in se, dum cum ea molitur, acci-
pere possit. Quod si aceti quoque admodum tenuis &
clari paululum adicere uelis, utiq; magis adhuc tum
refrigerans, tum humectans medicamentum efficies.
Non debet autem medicamentum hoc eo usq; super
ægrum corpus manere, dum manifestè incaleat: sed as-
siduè subinde mutari. Aliud. Oxalidos, aut oxylapathi
succus, cum exigua polenta mistus, excipiat duplici-
tato & detrito peniculo, aut linteo: affatimq; frigidū
totum id admoveatur. Quin etiam portulacæ, & sem-
peruiui, & vux immaturæ succus, similiter polentæ mi-
scentur. Adhæc, lens palustris, & viridis tribuli, & poly-
goni, & lactucæ, & intybi succus, aliaq; refrigerantia,
cum tenui polenta miscentur. Licet etiam absq; polen-
ta, uti integris herbis tritis. Iam verò quod epithema
ex pinguibus conficitur palmulis, salutare medicamen-
tū est. Porro coquere oportet harum carnem, omni
membranoso exempto, aliàs ex solo claro aceto: aliàs
aqua ipsi permista: atq; hac, vbi tenera satis reddita ē,
tunsa uti. Est verò salutare medicamen ad talia, etiam
succus rosarum frigidus, vnà cum polenta. Salutares
similiter sunt & ipsæ rosæ contusæ. Præterea stirpium
quæ moderatè astringunt, germina trita. Ad quæ mo-
dum uti aliquando licet herbis mediocriter astringen-
tibus: ut solano. Huiusmodi tamen refrigerantia om-
nia, illi tantum admoveenda sunt parti, quæ primariò
est affecta: non aliis quæ refrigerari non postulant.
Ego namq; hominem scio, qui imposito præcordiis re-
frigerante medicamento, laborarit statim dyspnœa:
sicuti alterum, qui tussierit protinus. Verum ex reme-
diis ipsis, nonnulla quidem per se, neq; intercedente
alio, refrigerare sunt nata: ut gratia exempli, frigida
potio, necnon succus vux immaturæ. Alia autem ex
accidenti: ut sanguinis missio, quæ calidam aliquando

Frigido Gale-
ni cerato, quæ
utendum sit.

Refrigeratoria
presidia varia.

Refrigeratoria
ex palmulis.

Rosarum suc-
cus.
Rosæ.

Refrigerantia 10.
remediorum.
alia quidem p
se, alia ex acci-
denti refrige-
rare.

Balnei dulcis
aque, tempera
teq; facultas.

Balnei partes
diuersæ.

Balnei intem
pestium, hor
rores, cutisq;
densitudinē gi
gnit.
Horroris cau
sa.

Lauandū nec
in accessionis
initio, nec in
ipsius incremē
to, febrientem
esse.

intemperiem sanat. Ad eūdem modum & clystere, & purgatio & fomentum, & cataplasma: q̄ videlicet digerant, concoquant ue. Vtranq; verò facultatem in se comprehensam habet dulcis aquæ balneum temperatum: vtpote ex partibus varia facultate præditis cōstans. Siquidem quum primū in id ægri ingrediunt, in aere versantur calido: postea in calidam aquam descendunt. Mox ab hac egressi, in frigidam. Postremò sudorem detergent. Potest autem prima eius pars materias per totum corpus, tum calfacere, tum liquare: præterea, quæ inæqualia sunt, æquare: & cutim laxare: & multa, quæ sub hac ante detinebantur, vacuare. Secunda eius pars, vbi quis in sicco corporis affectu ea vitur, potest madorem vtilem solidis partibus immittere. Tertia balnei pars potest, vbi quis frigida vitur, & totum corpus refrigerare, & cutim densare, & vires firmare. Quarta verò, corpus per sudores, citra refrigerationis noxam, vacuare. At vbi quis intempestiue lauatur, in horrores, cutisq; densitudinem incidit. Est autem continens ipsius horroris causa, mordentiū excrementorum, aut etiam crudorum humorum, cōfertim actorum, citatior motus. Proinde, quibus horum est abundantia, caro verò ac cutis densæ, siue balneum sint ingressi, siue steterint in sole, siue quoquo modo vel gestati, vel perfricti, vel exercitati, vehementius dimoti fuerint, utiq; iis horror incidit. Contra, quibus hæc pauca sunt, & corporis habitus, vt remittat, laxeturq; à balnei calore, promptus, ii non modò non horrent, sed et meliores redduntur: vtpote excrementis p̄ id vacuatis. Quo rōnabili⁹, neq; in primo inuasionis initio, nec in incremento quisquā ægrotantē lauit. Quippe densata est hoc tpe, coarctataq; & cutis ipsa, & quæ sub hac habetur carnea substantia. At in febris inclinatione vel incipiente, vel procedēte, vel amplius progressa, sæpenumero nos ægrotos lauantes, non pa-

rū eis contulimus. Si quis igitur balneū ingressus, minimē inhorruit, sed laxata illi, necnon rarefacta est cutis, huic succedent planē excrementorū vacuatio, equalis per vniuersum corpus calor, exiguorum meatuum rarefactio, tensorum laxatio, defatorum fusio. Ac vacuatio quidem excrementorum, omni feбри est utilisima. Pari modo & rarefactio, & relaxatio. Fusio tñ, & calor, non item: sed calor omni feбри inimicus est. At fundi æqualiter, id solidis quidem animalis partibus non est alienum. Succis certē non perpetuō est utile. Sed q̄ties in animali vel phlegmone, vel affectus phlegmonæ similis cōstitit, vel vtrius plenitudo, omnium inimicissimum. Nā phlegmone quidē, quū calfacti & liquati succi ad ipsas confluunt, augentur. Tunicae verō vasorum, impares plenitudini, quæ iam ex liquatione est repleta spiritu, distenduntur, ac vires hoc nomine malē habent. Ergo calidis illis, siccisq; affectibus, effusio mordentium est salubris: liquatioq; eorū contingit citra periculū. Calfactio tñ noxa non caret. Atq; hæc quidem ex prima balnei parte optimē administrata sumuntur. In secunda autem (quæ lauacrum erat) vt febrilia corpora ex humectatiōe iuuant, sic ex calore nihil illis cōmodē accedit. At in tertia, refrigerantur innoxie, quæ fuerant excalfacta, & vires firmantur. Si qua verō & laxata, & iusto plus sunt remissa, ea in naturalem redeūt mediocritatem, id quod quarta balnei pars, quæ deterfio est, indicat. Quippe quibus rite sunt omnia adhibita, ii post frigidaē vsū adhuc sudant, & omnia ipsis excrementa vacuantur. A balneis igitur (vt vnam omnium veluti summam colligam) vacuatur quicquid in corpore vel humidū, vel fuliginosum præfuit. Reducitur ad naturalem symmetriam, tum caro ipsa, tñ cutis: corrigitur solidaē partiū ariditas: & calor non modō is qui ex lauacro accessit, sed qui et præfuit, ex frigidaē vsū extinguitur. Maximo huius

Balñ eū contulisse per sepe accessionū declinationibus. Balnei temperati usus.

Calor omni feбри inimicus ē.

Phlegmone cū augeantur.

Balnei singule partes, quos usus præstent.

rei documento est, præsidium quod sentiunt homines, ex huiusmodi balneo, ubi à feruente sole exiccati, lauantur. Quippe quum accedant ad id, ritu stipulæ, aridi, egressi è frigida, illico in naturalem habitum redeunt. Si itaq; certam febricitantium naturæ haberemus notitiam, nõ dubitaremus eorum aliquos assidue in aquis frigidis citra balneum lauare. Quia verò exacta nobis dispositionum nõ est notitia, ac maxima ex errore impender noxa, utiq; eiusmodi recusamus præsidia, potissimum in febribus hecticis: quando per has & pauci sanguinis, & nudum carne, & expers adipis corpus est redditum. Etenim iuuenis corpulentus, æstatis tempore, ac in febris summo, vigore modò nulla viscerum phlegmone sublit, sudabit, si in frigidam se coniecerit. Quod si sit frigida lauatiõni assuetas, securre remedio vtetur. Qui autem ex calida & sicca intemperie febricitant hectica: ac potissimum qui iam marasmodies fiunt: iis vbi tale præsidium petunt, tutum non est in totam conici: & què vt nec gracilibus & imbecillis, qui æstate calida & sicca, longa via peracta, refrigeratione indigent. Nam neq; his tutus est frigidi solii usus, nisi prius fuerint in balneo æqualiter ex-calfacti. Siquidem simile quiddam nobis videtur accidere, quum in frigidum solium post balneum ingredimur, ei quod ferro accidit, quum tingitur. Etenim tum refrigeramur, tum roboramur: quemadmodum & illud, vbi candens iam redditum frigida mergitur. Atq; huius rei causa ad imbecilla corpora inuertæ sunt balneæ, quæ ea præcalfaciant, atq; ad frigidum solium præparent. Non dissimile quiddam faciunt, & qui sine balneo frigida vtuntur, quum scilicet se ab exercitatione in eam saltu demittunt. Siquidem quod nobis balneum, id præstat illis exercitatio: vt quæ nõ cal faciat tantum, sed etiam insiti caloris motum à profundo corpore extrorsum concitet, sic, vt & frigida

Balneum frigidum quibus in trepide & quibus caute debeat administrari.

Balneæ calidæ ad solii frigidi usum corpora præparant.

Exercitatio præparat corpus ad balneum frigidum.

impetui occurrat, & quo minus viscerum aliquod fe-
 riat, aduersetur, atq; prohibeat. Neq; enim ipsam fri-
 gidæ substantiam, neq; eius qualitatem omnino inte-
 gram, vsq; ad viscera pertingere est salubre. Immo sa-
 tius & tutius fuerit, solam qualitatem, eamq; retusam
 calidorum occurſu, descendere. Iam verò qui hectica
 febricitantes ad balneum accedunt, nisi in frigidam
 sint dimissi, nihil iuuantur, contra q̃ aliis correpti fe-
 bribus. Nam quū iis solidæ partium affectus cādenti
 ferro sit similis, calfecisse duntaxat eos, humectasseq;
 haudquaquā videtur satis (sic enim alimentum, incremē-
 tumq; præbuerimus febrī) sed opus est, vt merſis in
 frigidam, extingamus calorem. Quod si ex violento
 ipſo, subitoq; frigidæ vsu, malè fuerint affecti, utpote
 in contrariam qualitatem mutati, hos licet in toto qd̃
 sequitur tempore, calfaciendo sanare: quum neq; par-
 periculum sit in frigido affectu: nec in remediis quæ il-
 li adhibentur. Quum autem insanabilis solidarum par-
 tium summa siccitas sit, ad quam per hecticas febres
 via expeditissima patet, melius est hominem in frigi-
 dam intemperiem transferre, ac cui curationem adhi-
 beamus habere, q̃ tendentem rectā ad interitum sine-
 re, desperatamq; illi salutem facere. Ergo eos qui he-
 ctica febriunt, illico omni ratione refrigeremus, ante
 quā progressi, in marasimum perueniāt. Nam quem
 iam occuparit marasmus, hunc neutiq; sanare tentaue-
 ris. Ipsum tamen in alterum transferre marasimum,
 quem appellāt ex morbo senium licebit: ac sic super-
 stitem, non tantum plures dies, sed etiam menses, ser-
 uare. In cæteris autem febribus, quas vel phlegmo-
 ne, vel putrescentes succi accenderunt, nihil offendes,
 etiam si in frigidam ægrum ipsum non merſeris. At in
 hecticis, id quod remedium affert, calidæ solium non
 est, sed frigidæ. Quicunq; igitur hectica febre laborāt,
 atq; ex iis præcipuè, qui iam marasimode tenentur,

Exercitiorum
 usus.

Hecticos, dum
 ad balneū ac-
 cedunt, nihil
 iuuari, nisi i frī-
 gidam sint di-
 missi.

Siccitatē sum-
 mā solidarum
 particularū ef-
 se insanabilē.

Hecticos sta-
 tim esse oī ra-
 tione refrige-
 randos.
 Marasimum ef-
 se incurabilē.

Seniū ex mor-
 bo.

Balnei partiū
descriptio.

Hæcici quō
sint p̄ quatuor
partes balnei
tractandi.

11. Hæcicis requi-
ri humidum et
frigidum utri-
usque.

Hæcicorum vi-
tus ratio.

modò his nulla alia febris, vel ex solo putrescente hu-
more, vel cum phlegmone, sit adiuncta, eos omnes au-
dacter lauabis: sed prorsus citra omnem laborē: ne re-
soluantur vires: Sint ergo tres domus balnei: in quarū
primam, quæ satis esse calida debet, in lectulo cubans
ducatur: in ibique nudetur. Illinc autem valida sin-
done in secundam portari debet: quæ non tantum si-
tu sit media, sed etiam temperie: tanto scilicet prima
calidior, quanto est tertia frigidior. In ea itaq; oleo te-
pido super sindone perfundatur. Hoc facto, ad tertiā
ducatur domum: ubi nimirum est solium. In cuius qui-
dem moretur aqua mediocriter: idq; sustentus sindo-
ne: nullaq; infusione aquæ, cuiusmodi in aliis vti sole-
mus, adhibita: immo nec capiti eius quicq; infundi ve-
lim: quum sit satis id quoq; bis, ter uel vnā cum toto
corpore, in aqua mergi: demissa mediocriter deorsum
sindone: ac rursum per quatuor iuuenes, qui cum por-
tant, leuata. Mox hinc eductus, in frigidam semel totū
tingatur: ne vel breuissimo quidem spatio illic mora-
tus. Protinus verò alter paratam habens calentem sin-
donē, ipsi iniiciat. Dein æger suo in lectulo collocatus,
primum spongiis detergeatur: dein mollibus linteis,
quoad fieri potest, blādisimè. Postea verò unctus, ami-
ctusq; vestibus, rursus super lectulo reducat in aliquā
aliam domum vicinam, vbi cibari cōsuevit: in ibiq; nu-
triat. Porro humidum esse, ac frigidum, quod hæci-
cis febribus sit conducturum, nemo nescit. Eiusmodi
verò sunt tum cremor ptisanæ, quum frigidus sumit:
tum alica, similiter ptisanæ cremori condita: id vero ē
ex aqua, & exiguo porri, & anetho: tum sale, oleo, &
aceto. Cōmodus præterea iis, q; sic laborant, est & exi-
guus in aqua frigida panis. Cæterum nullius horū, pu-
ra frigiditas esse debet, sicuti potionis. Quippe hæc
maturè tum incalescit, tum per corpus digeritur. Illa,
quū plusculum tps in vētriculo morentur, ipsum for-

tas sis refrigerant, si fuerint immodicè frigida. Vbi autem febris iam traxerit, dandum quoque asininū lac est, sed diligenter obseruato, ne in ventre concreseat. Cauebitur autem id, si mel illi admisceas: aut salis, quo uescimur, exiguum. Abstinentum tamen in hecticis, quoad fieri poterit, à melle est: atque iccirco etiā à mulsis. Quippe protinus in bilem conuertitur, & sicciores, acriorisque calor febres reddit. Dandus itaque principio asini lactis est non plus cyathus: sed inducta in ipsum cucullum asina: quo nullum tempus interponatur: æger autem id protinus bibat. At verò si corruptū in uentre lac fuerit, pulsus paruos atque inæquales inuenies, quales accidunt in compressione ventriculi. Sin autem non sit corruptum, & maiores & ualētiores eos, quā pro consuetudine inuenies. Qua ratione obseruata, licebit tum lactis, tum aliorum ciborum omnium modū sensim augere. Qui igitur iam marasmo vexantur, eos, sicuti dictum est, lauabis. Quos verò hectica premit, nōdum tamen marasmo tentantur, eos licet et laues, sine subiecta sindone: utpote viribus adhuc ualentes. At qui ex his minus sunt ualentes, eos non tutum est permittere in frigidam natationem descendere, sed foris ipsos potius perfundere: primum tepida: secūdō frigida: qualis fontana est. Ac si quidem omnia curiosè administrantur, utique sanandi iam eius quem marasmus consumit, spes est. Sin error uel in uno committatur, is, reliqua subuertit omnia. Quippe quum exitialis horum effectus sit, ne leuissimum quidem errorem tolerat. Ac si quis taliū est seruatus, huic carnosam tamen portionem marasmus iam occupauerat. Ipsis verò solidis resiccatis, fieri nequit, ut homo prorsus sanetur. Etenim primum eiusmodi febris propriā partiū humiditatē, ex qua nutriunt, depascit. Hinc transit ad genus carnosum. Deinde solidas populas particulas. Vocatur autem caro tamen ea quæ in musculo est. Nam quæ in uisceribus conspiciunt, non carnes, sed parenchymata.

Lac asininum cum melle sumptum non cogitur.

Mel esse inimicum hecticis.

Lactis in uentre corrupti nota.

Hecticas feb. ne leuissimum quidem tolerare errorem. Hectice feb. species.

Caro quæ dicitur. Parenchymata.

EEc iiii

*Marasmodes
a colliquanti-
bus febribus
quō differant.
Colliquatium
februm cura-
tio.*

nominantur. Porro singularum particularum substantię moles, ex tali maximè completa est natura, quæ & perire, & regigni possit. At verò nec fibrosa, nec nervosa, membranosa ue natura, eandem generationem habere cernitur: nec fas est eiusmodi singularum partium fibras, à febribus malignis liquari, perinde vt carnes: quando aial ipsum, prius q̃ hæ prorsus sint exiccate, iteremerint. Sanè sunt & quas marasmodes febres vocant, vniuersæ ex earum genere quæ colliquat: sed in eo differūt, q̃ in his, quæ portio carnis colliquatur, ea semper vaporis vice digeritur: in illis defluit in ventrem. Nam quemadmodum quo magis animal vel adipe, uel carne abundat, eo, quod ab ipsius carnibus, dū in craticulis torrentur, defluit, copiosius cernitur: ad eundem modum in calidissimis febribus, si carnes humidae ac molles, cum adipis copia fuerint, ea sensus liquari deprehēdas. Sin absq̃ adipe & siccae sint, insensibiliter absuntuntur, & in febres marasmodes transeunt. Hæc præmonitus, colliquantium febrium iisdē methodis curam ages: tum ad frigidam exhibendam, q̃ primum properans: tum iis quæ refrigeret & humectent, nutriendis. Mulsam uerò inimicissimam illis esse censebis.

GALENI PERGA MENI DE MEDENDI METHODO. LIB. XI.



ODVM Igitur curandarum ephemerarum, in octauo huius operis commentario: cōtinentium, in nono: hecticarum deniq̃ in decimo, satis accuratè exposuimus. Nunc verò, quæ admodum quæ ex putrescētibus hu-

moribus excitantur, methodo sint sananda, aggredi est animus. Duo autem sunt scopi curationis in vniuersum: affectus nempe ipse: atque agrotantis temperies. Affectus quippe, ex iis quæ sibi contraria sint, adhibenda esse remedia indicat. Laborantis verò temperies, si mul cum ipso morbo, mensuram contrarietatis definit. Potest etiam ambiens nos aer (qui ex cœli statu, anni tempore, ac regionis natura suas mutationes sortitur) unam efficere indicationem: ac uel ægritudinis causis, uel sanitatis, annumerari. Porro auxilium, quo ad morbos tollendos utimur, prima & vltima dicitur sanitatis causa: diuersis tamen rationibus. Dicitur quippe vltima tempore: quando quidem & natura, & ars, & fortuna, priores, secundum tempus, eo sanitatis existunt causæ. Prima uerò est, quatenus id primò laborantis corpus tangit, alteratque eius affectum. Ars siquidem artifexque; & fortuna, non per se primum, sed per auxilia morbos profligant: materięque interuentu operant: quemadmodum per seipsam natura. Quæ nimirum ex tum spiritus, tum solidarum particularum (quæ ex semine genitali oriuntur) tum carnosarum substantia, constat. Quarum trium substantiarum singule propriam pro natura sua tum qualitatem, tum quantitatem habent. Ac qualitas quidem earum, ex cõgrua temperie humidi, sicci, calidi, & frigidi efficitur. Quantitas verò solidarum partiũ, par semper manet: sed iis qui adhuc in augmentur, numero duntaxat: qui verò absoluti iam sunt, etiam magnitudine. Carnosæ uerò substantiæ magnitudo uariatur, etiam si iam non augeatur animas. Pari modo & suba spiritus * propemodum quolibet memento tum maior, tum minor aspiciť. Ergo ad duos illos scopos prius traditos, etiam vnica uirtus addetur, iuxta earum trium substantiarum enumerationem: aut temperies per se distinguetur: quæ & ipsa rursus bifariam scinditur: nempe & in originalem naturam, & in

Curationis scopi sunt duo: affectus, & ægri temperies.

Affectus quid indices.

Temperies quid indicet.

Aer unde suas mutationes sortitur.

Auxilium cur prima & vltima sanitatis causa dicatur.

Fortuna per auxilia morbos profligat.

Natura ex quibus constat.

Solidæ partes ex semine generantur.

Virtutem esse unum ex curationis scopis. Temperies est duplex.

Indicationes re mediorum unde sumantur:

*Intemperie
contraria aliā
sanādam esse.*

*Custodiā fieri
per similia.
Sublatio mor-
bi fit per con-
traria.*

*Partium singu-
larum per quæ cu-
stodiendæ sunt.*

*Tēperies opti-
ma, semper ser-
uanda.*

*Intemperies
vitiosa quā ser-
uanda, & quā
fit alteranda.*

acquisititiam dispositionem: sic nimirum ut ex istis, & aliis quæ prius dicta sunt, propria quædam cuiusque remedium sit indicatio. Ex ætate etiā, uitæ studiis, consuetudineque; remedium indicationes sumuntur. Proponatur igitur nobis intemperies quædam curāda. Ea utique per contrarium intemperiem sanabitur. At quoniam vniuersi febrium generis intemperies, est calor: utique per frigiditatem curabitur. Quemadmodum autem ab affectu ad materias præsidioque peruenimus, eodem etiam modo à singulis reliquorum generum primorum, ad eas est descendendum: veluti à uirtute, quæ morbo, ceu aduersatrix opponitur, & cui omni ratione opitulari & subuenire est consilium. Quare virtus quidem ipsa erit vnus ac primus scopus: alter autem, atque secundus, quod ab ea significatur: nempe custodia ipsius. Pari etiam ratione, morbus quidē dicitur esse primus scopus: secundus autem, sublatio ipsius. At verò custodia, similia indicabit exhibitionem: sublatio, contrariorum. Quoniam uerò virium substantia tum ex spiritu, tum ex carnosa specie, tum solidis ipsis completur: ex iis quæ similia sunt, moliri cuique suam custodiā oportet. Spiritui, ex respiratione, transpiratione, & uapore qui ex sanguine attollitur. Solidorum uerò generi, ex solido nutrimento. Carnoso generi, per eam naturā, quæ in medio humidoque ac solidoque corpore est. Porro cuiusque horum modum ex seruandæ substantiæ modo inuenies: qualitatem uerò, ex ipsius temperie. Quā autem horum cuiusque temperies, vel optima sit, uel aliquatenus vitiosa: quæ quidē optima ē, semper seruari debet. Quæ uerò oīno vitio non caret, hæc in sanis quidē, vel seruāda ē, vel alterāda: in ægris uerò, seruāda. Quā autem diuersitas non parua sit, in partium animalis temperamento, propriā cuique mensurā, eorum quæ ipsi similia sint, oportet accommodare. Nempe ei quæ terrea est magis, eorum quæ magis sint terrea: & ei quæ humidior est, eorum quæ sint humidiora.

ra: ac sic de cæteris cōstitutionibus. Hinc verò iā materiæ particulares oēs in cibis, potiōe, aere, & oībus peragi solitis, inueniendæ sunt. Quòd si mutuo inter se pugnēt aliquæ indicationes, ppendenda * indicantiū scopoz tū magnitudo, tū dignitas est, efficiēdumq; id, qd tū maiores, tū digniores scopi admonent. Quoꝝ dignitas quidē iudicāda est, vel vitæ, vel sanitatis respectu. Magnitudo autē est duplex: vel propriæ substantiæ ratione, vel declinationis à naturali habitu. His igit pmissis methodis, iā i febrīū genere exercitemur, qd ex putredine nascit. Ac primū ab illa febre exordiamur, quæ ex putredine humorū in maximis vasis, vel i oībus simul, cōputrescentiū, oritur: quāq; necessum est synochon, hoc est p̄tinentē, existere. Fieri autē neq; ut talis febris sanet, nisi inhibita prius ipsa putredo sit: quæ sanē inhiberi, causa manente, nō potest. Quare submouēda ipsius causa est, si mō putredo ipsa prior: mox post ipsam, febris sanari debeat. Ostensum autē est, illa tñ putrescere corpora, quæ quū calida humidaq; natura sint, neq; p̄flata, neq; ventilata, in calido humidoq; loco includuntur. Quòd si in motu sint, ventilenturq; ac p̄flentur, posse ea nō putria, integraq; seruari: potissimū quæcunq; corpora sua ipsoꝝ natura regūtur: ut aīaliū, stirpiūq;. Ea nāq; ab initio cōgenitos secū motus habēt, qbus superflua excernāt. Nec minus ēt est demonstratū, q̄ta sit tum respiratio, tū pulsuū utilitas, ad p̄flatū, vētilatiōnēq; corporis, atq; eius natiū calorem tuēdū. Itaq; si qd in eo manifestē putrescere debeat, dictas trāspiratiōes esse ipeditas oportet. Fieri autē nō potest, ut illæ per totū sistantur aīal, nisi vel finibus vasoꝝ stipatis, vel totacutē. Porrò accidere in finibus vasoꝝ stipatio potest, vel ex vehementi extrinsec⁹ refrigeratione: vel ex succoꝝ, q extrorsum in ipsos p̄fertī ruerint, crassitudine, multitudine, vel lentitia. Accidit hoc illis & ex iis excitatiōib⁹, quæ i palæstra, vel aliās obeunt, & itinere la

Indicantiū scoporum dignitates esse expendendas.

Synochos febris quæ dicatur. Synochorum curatio.

Putrescunt calida & humida, quæ in simili loco conducti, persari nō possunt.

Transpiratiōnes vnde prohiberi contingat. Stipatio in finibus vasorum, vnde contingat.

Stipulationis cu-
ratio.

5.

Nutrimenti q̄
tatem, a vir-
tute qualitātē,
a temperie su-
mendā esse.

Tenuissimo ci-
bo quando sit
utendum.

borioso: uel ambientis statu, quā ex rigore in æstū mu-
tatus est subito. Nonnullis uerō feruentes ex ira suc-
ci, ac foras sinuul impetu ruentes, effecerunt dictas sti-
pationes. Quisquis igitur propositam sanaturus est fe-
brem, hic simul causam eius oportet adimat: simul ca-
lorem qui in animali excitatus ab ea ē, refrigeret. Ac
quemadmodum quidem ille refrigerādus sit, prius est
dictum. Causam uerō adimi oportebit, propria cuius-
q; naturæ inuenta cōtrarietate. Vtiq; si ex frigida cau-
sa stipatum, densumq; redditum corpus est, relaxato
eo, omniq; ratione rarefacto. Sin ex obstructione ita ē
affectum, hac reclusa. Quod uerō recludet, hic quoq;
ad contrarietatis indicationem attentus inuenies. Vbi
namq; abūdantia humorum est, hos vacuabis. Vbi cras-
si, glutinosiq; sunt, eos tenues & fluxiles reddes. Si plu-
res causæ aliquando coibunt, omnibus per contraria
occurres. In eiusmodi aut dictarū causarum cōplexu,
coepisse à sanguinis missione conueniet: ac abundantia
vacuata, tum ad extenuādos humores venire. Ab hoc
ad remittenda quæ sunt constricta, & rarefaciēda quæ
sunt densata. Atq; hæc quidem à morbi affectu indica-
ri uē sumenda sunt. Quum autem ciborum atq; potio-
num, necnon spirituum decens quātitas, qualitasq; vir-
tutem ipsam custodiant: ac modus quidem quantitatis
ipsorum, à virtutis substantia inueniatur: qualitatis ue-
rō, à temperie: nimirum estimari debet, quemadmo-
dum vires quæ corpus regunt, se habeant. Quæ quidē
si sint valentes, audacter vacuantibus præfidiis uteris.
Sin infirmiores sint redditæ, vacuantia remedia cauti-
administrabis. Sed & nutrimenti modus hinc tibi desu-
mendus est. Quippe quum vires legitimum robur suū
habent, & morbi summus vigor breui expectatur fu-
turus, tenuissimo cibo uti licet. Vbi uerō infirmiores
fuerint, non licet sine graui noxa. Sed adiciere ad nu-
trimenta tantum oportet, quantum est de robore vi-

M E T H. M E D. LIB. XI.

rium detractum. At nutrimenti qualitas, ex morbi af-
fectu, unà cum solidorum corporum temperamento
præsenti, sumenda est. Tempus autem nutriendi, quod
quidem ad reliquas febres pertinet, quæ ex putredine
oriuntur, in progressu sermonis dicetur. Quæ uerò uni-
cam tantum à principio ad finem usque accessionem ha-
bent, synochi; dicuntur (de quibus impræsenti arum
est sermo) in iis tunc offerendus est cibus, dum ægri me-
lius se habent: eoq; potissimum dici tempore, quo in
sanitate prius cibari erant sueti. Est autem frigida quo-
que iis propinanda, quum succi & iam concoquuntur,
& crassitudo eorum est extenuata. Cæterum iam ope-
rationis præteritum est explicare, quot sint febrium, quas pu-
tredo accendit, in uniuersum differentiarum. Dein, quæ
nam sit ipsius generis earum communis utilium auxi-
liorum indicatio. Mox, quæ sit singulatim cuiusque pro-
pria. Quod igitur ad differentias pertinet, prima sanè
ex eo est quod causæ ipsius putredinis vel adsunt, vel
non adsunt. Secunda ex eo quod per totum animal, aut
eius partem aliquam diffusa putredo sit. Tertia, quate-
nus cum phlegmone, aut citra hanc. Ergo ordiamur
ab humorum putredine, quæ primum indicans in diu-
sione fuit. Cuius quidem natura, ad curationem erit in-
ventionis principium. Porro natura putredinis est mu-
tatio totius putrescentis corporis ad corruptelam, à
calido externo. Non enim profectò à proprio calore
corrumpitur quicquid: immo profectò cōtra, quicquid in
rebus subsistit, id augetur, roboratur, sanum est, ac vi-
uit, dum proprio calore regitur, veluti nimirum ipsa
animalium corpora, quādiu seruatur proprius eorum
calor: in cordis quidem corpore, per respirationem: in
reliquis omnibus partibus, tum per communitatem
quam habent cum corde: tum per aliam quandam re-
spirationis speciem, quæ per totam agitur cutē, & trā-
spiratio, perspiratio uel dicitur. His uerò læsis, unà etiā

448

Nutrimēti qua-
litas ab affe-
ctu & tēperie
est sumenda.

Nutriendi tē-
pus quale sit
synochis aptū.

Frigida qñ sit
propināda iis
qui laborāt sy-
nocho. (6)

Putridarum fe-
brium dñæ.

Putredo ē ma-
tatio corporis
ad corruptelā
a calido exte-
no facta.

Calor natura-
lis auget atq;
conseruat om-
nia, illisq; vitā
largitur.

Calor natura-
lis quō conser-
uetur in corpo-
re.

Putredo quō
sit sananda.

Putris humor
quō sit vacuā
tus.

Vacuantiū me
dicaminū ma
ior pars febres
ipsas adauget.

Vacuantiā mo
dice quæ sint.

Rarefaciēdum
nō eē corpus,
prius q̄ sit va
cuatum.

Vinum aque
sum p̄mouet
omnes euacua
tiones.

calor natiuus læditur. Alter verò quidam alienus, ac p̄
ter naturam in corporibus excitat^r, primū quidem
iplos succos propter humiditatem putrefacit, corrup
pit q̄. Spatio verò, tum adipem inuadit, tum etiam car
nem. Putredinem in corporibus ortam sanabimus, id
quod iam corruptum est, omni ratione vacuantes: qđ
reliquum est, moderatis motibus, & refrigerante per
spiratu ad exactam symmetriā reducentes. Ac vacua
tionem quidem illius per vrinam, deiectiones, sudores,
vomitus q̄; moliemur, si putridus humor, ad os ven
triculi aliquando sua sponte impetum fatiat. Post hāc
dimotiones mediocres, vnā cum ambientis bona tem
perie adhibebimus. Causam verò putredinis, si adhuc
perseueret in corpore, per contraria tollemus. Itaq̄
quoniam transpirationis prohibitio fuit occasio putre
dinis, hanc submouere oportet. Quia verò ea (quē ad
modum exposuimus) à variis causis est orta, ipsarum
singulis contraria medendi ratione occurremus. Sciē
dum tamen est, non easdē omnes partes vacuationes,
medicamentā ue requirere: quum & temperamentis,
& posituris, & forma, & omni deniq̄ cōstitutione, na
turaq̄; inter se dissideant. Quū aut maior pars medica
mentorū vacuantium, febrem ipsam adaugeant, vtpo
te facultate calida & sicca: deligēda medico sunt, quæ
citra calfactionē, siccationēq̄; valentē, ipsas vacuatio
nes moliātur. Cuiusmodi sunt cremor ptisanæ, aqua
mulsa, oxymeli, apomeli, & apii radix, i aqua, quæ po
tui datur, incocta. Hæc aut ipsa ventri sunt quoq̄ ido
nea. Qui si nihil reddat, iniicienda per clysterem mulsa
cum oleo est. Sanè totum corpus, prius q̄ id vacuaris,
rarefaciendū non est. Vbi vacuatum sit, utiq̄ licebit
id medicamento aliquo, cui calor tepidus insit, rarefa
cias: cuiusmodi est qđ ex chamæmelo conficitur. Hoc
tpe si vinū quoq̄ aquosum bibatur, id omnes vacua
tiōes promouerit. Idem faciat & temperatum dulcis

METHODO MED. LIB. XI.

447

aquæ lauiacrum. Cæterum, vbi magnitudo febris obstat, sicuti in continentibus, nec vino est vtendum, nec lauacro, nec iis, quæ habitum rarefaciant, vnctionibus. Iam verò id genus ardentissimis febribus, potus frigida confert: nisi subsint putrescentes humores, per aluum, vrinas, vel sudores vacuandi. In vniuersum autem, dum plura simul coeunt symptomata, id quod maximum omnium est, aggredi oportet: atque ei vel soli, vel magis quam cæteris, subuenire. Porro ad corrigendos putrescentes humores, non tantum requirimus vires ipsi pulsus firmas: sicuti nec eius facultatis quæ voluntarium motum largitur: sed multo magis ipsius concoctricis. Ergo si & vires cunctæ valentes sint, & ardentissima febris, & concoctionis notæ planè euidenter, frigida intrepidè propinabis. Quod si etiam æger bona corporis habitudine sit, tum status cœli calidus, ac siccus, etiã si in frigidam natationem huc dimittas, haudquaquam lædetur. At si mediocris est febris, & vires non validæ, sed cum notis concoctionis, iis qui ita se habent, balneum prodest, & vini potio: tum verò ex vnctionibus eæ quæ rarefaciunt: idque multo magis, quum ambiens est frigidus. Neque enim aut frigidam in balneo lotionem, aut frigidam potionem in eiusmodi cœli statu ferre expetunt, vtpote inspirationibus assiduè refrigerati: quum si quoniam in frigido ambiente vehementer vri ægro tum contingat, exigua salutis eius habenda spes est. Si vero nec concoctionis habeat signa, nec vires validas, seruari is planè non potest. Quo minus aut idem lauandus in balneo est, aut medicamentis iis quæ rarefaciant, vngendus, aut vinum illi dandum, frigida uero offerenda. In quo enim desperata omnino est salus, imprudentis consilii fuerit apud vulgum infamare præsidia, quæ multis fuere salutis. Febris igitur, prout febris est, aqua frigida est perpetuo remedium. Quod verò ad alia pertinet, non perpetuo. Veluti quum ex obstructione glutinosi & crassi humo

Continenti febre detentis, nec balneo, nec uino, nec vnctionibus rarefacientibus esse utendum.

Frigida quoniam sit propinanda intrepidè febri synocho afflictis.

Frigida natatione quoniam uti possumus in continetibus feb. Vinum quoniam exhiberi possit per continentes febres.

Lætalia signa in synochis.

Infamanda salubria medicamenta non esse ubi salus est deplorata.

Febris, ut febris, aqua frigida est perpetuo remedium.

Obstructio
quid.

Putredo est an
secedēs ipsius
febris causa.

Obstructa nō
esse aperiēda,
prius q̄ pleni-
tudo uacuetur.
Obstructionū
curatio.

ris putredo nascitur. Ponatur autem cum hoc, & redū-
dantiam in toto esse corpore: tum uirtutem non im-
becillam. In eiusmodi etenim complexionibus, quum
multa præter naturam in corpore sint, quædam corū
præcedentes causæ erunt: veluti redundantia cum glu-
tinosis & crassis humoribus. Horum nāq; vitio obstru-
ctio est orta: quæ morbus instrumentalis est, corū quæ
obstructa sunt corporum. Hanc symptoma sequutum
est, ipsa transpirationis cohibitio: quam rursus putre-
do humorum excepit, antecedens quædam ipsius fe-
bris causa. Ergo qui febrem curare vult, necesse est in-
hibeat putredinē. Ac sic duæ indicationes se exhibent:
altera à febre: altera à putredine. Atq; à febre rursus
duæ: scilicet ut portio febris, quæ iam accensa est, per-
curetur: quæ verò etiamnum gignitur, inhibeatur.
Aliæ autem duæ rursus à putredine erunt indicatio-
nes: ut & quod putredinis iam factum est, sanes: & qd̄
in generatione adhuc est, sistas. Porro quod in genera-
tione est, id perspiratio impedita facit. Ita ab hac rur-
sus aliæ duæ indicationes nascentur: tum ut quod re-
tentum est, vacuetur: tum quod retinendum est, pro-
hibeatur. Prohibebitur sanē, si obstructioni medea-
mur. Cuius quoq; ipsius, quod iam occupauit, sanan-
dum est: per ea quæ obstructa liberant, quod futurum
est, propulsandum: per ea nimirum, quæ affluxum ob-
struentium succorum compescunt. Ergo quod ultimū
in ipsa methodo resolutiua est inuentum, id primum
omnium in curatione tibi est peragendum. Etenim si
iis auxiliis, quæ obstructiones eximant, uti, non uacua-
ta prius abundantia, uelimus, non modò nihil proficie-
mus, sed maiorem etiam reddemus affectum. At si va-
cuata prius multitudine ad curandam obstructionem
accedamus, medicamentis iis utemur, quæ citra calo-
rem obstructiones expedire sint apta. Vbi autem quæ
obstruunt deterfa, dissectaq; sunt, per aluum, vrinas,
atq; sudorem

atq; sudorem, ea uacuare tentandū, idq; medicamen-
tis quoad licet, minimè calfacientibus. Hoc verò tpe,
ētvires roborare, quo & putredinē superēt, & succos
concoquant, studebimus. Quod aut febris ipsius iam
accensum est, refrigerabimus. Itaq; in auxiliorum in-
veniendox ordine, vltima est quæ ab hac sumitur indi-
catio, quæ alia ratione sit prima: quum à febre videli-
cet cœperit inveniendorum præsidiorum methodus.
Ac si nullum quidem interim vehemens symptoma
incidat, prohibeatq; quominus auxilia ab initio mor-
bi ad finem ita procedāt, celerrimè febris finietur. Sin
tale quippiam inciderit, quod totam ad se curationem
reuocet, producet & curationis finis. Expendere au-
tem oportet medicamentorum tum usum, tum no-
xam. Quippe aqua mulsa, quatenus crassos succos ex-
tenuat, glutinosos deterget, atq; excretionē promo-
uet, optimum in iis synochis medicamen fuerit, quos
habitus coarctatior, & putredo excitarunt. Quatenus
verò calorē febris adauget, est noxia. Quare si hic ini-
modicus sit, parcendum mulsæ est: vtendūq; cremore
ptisang. Quod si difficiles & cōtumaces iudicaneris esse
obstructiones, ēt oxymelite. At hoc ipsum rursus, si i-
modicè vtare, & intestina radit, & tussim excitat, &
neruosa lædit. Perpetuò aut dogma illud existit vix,
contrariox contraria esse remedia. Quidē fieri non
potest, vt eox quæ pter naturam sint, quicq; per aliam
vllā remediox speciem curetur. Non tñ ex vsu est sem-
per oībus quæ pter naturā sint, mederi: sed quum sola
per se subsistunt. Nā si cū aliis vnā incidant, aliis sæpe
est ante illa medendū: sicuti in cauis vlceribus, vbi ea
simul cū phlegmone sunt coniuncta. Siquidem vix in
his quoq; manet, q; per ea quæ carne implent, curan-
tur. Cæterum his vti non licet prius q̄ curaueris phleg-
monem. Quæ itaq; præter naturam sunt, omnia ab
iis quæ ipsis sunt contraria, curantur. Quum attē eo-

Mulsæ faculta-
tes.

Oxymelitos
noxæ.

Contrariorum
esse remedia
contraria.

Rerum præter
naturam diffe-
rentia duplex.

Contraria quo-
rum dicantur
esse.

Cōtraria quæ.

Oppositio q.

Medicina est
appositio &
detractio.

Cārū genera p̄
ter naturam.

rum quæ præter naturam sunt, duplex prima sit diffe-
rentia, aliis per se subsistētibus: vtruta affectibus: aliis
in generatione suam essentiam habentibus, ac umbræ
ritu affectus concomitantibus: nempe symptomatis:
vtrūq; sanatio quidem, affectuum sublatio est. Hanc ve-
rò symptomatum amotio sequitur. Quare affectuum
ipsorum, qui verè & primario curantur, potissimum
dicuntur esse contraria remedia: symptomatum autē,
ex accidenti. At verò contraria dicuntur, quæ sub vno
eodēq; genere, plurimum inter se disident. Si aut in il-
lo genere qđ mediocre est, hoc est medium inter duo
extrema, intellexeris, infinitam quandam contraria-
rum rerum multitudinem, quæ maioris minorisq; ra-
tione, inter se disideant, ex eo inuenies. Non enim in
corporum modò qualitate, verū etiam in quantitate,
eiusmodi contrarietatem inuenias. Quam vtrūq; Aristo-
teles non cōtrarietatem, sed oppositionem nominat.
Verū Hippocrati, omnia id genus contrariorum ha-
bent appellationem: sicuti etiam Platoni, qui ex cōtra-
riis esse dicit generationes. Contemnere tamen nomi-
na oportet: minimè autem scientiam rerum. Cuius nō
ignarus Hippocrates ait, Medicina appositio est, & de-
tractio: deficientium quidem appositio: redundantium
autem detractio. Porro deficiunt, redundantq; nōnul-
la quidem in quantitate: quædam autem in qualitate.
In quantitate, quum sanguis immodicè est auctus: aut
rursus minor redditus. In qualitate, quum vel calidus,
vel frigid⁹, vel crassus, vel tenuis, plus iusto, minus ue,
est effectus. Verū ad medendi indicationes propositi
nobis febrium generis reuertamur. Genera causarum
quæ in nobis præter naturam oriuntur, sunt multitu-
do, crassitudo, & lētor humoris. Causa simul atq; sym-
ptoma est transpirabilis excrementi retentio. Simili-
mō causa pariter & affectus est ipsa putredo. Morb⁹ ve-
rò tū obstructio, tū febris ipsa. Symptoma est, trāspi-

METHO. MED. LIB. XI.

rabilis excrementi retentio. Ergo indicabit præceden-
tium causarum quælibet proprium aliquid, poscēs nimi-
rum ablationem sui per opposita. Nempe multitudo
ipsa, quæ ex eorum est numero, quæ sunt ad aliquid, in præ-
dicamento quantitatis, vacuationem. Lætitia verò &
crassitudo, quæ sunt in qualitatis affectu, incisionem &
absterfionem. Obstructio aut, qui morbus instrumen-
talis est, reclusionem. At transpirabiliū retentio, excre-
tionē eorundē. Sicuti & humorum putredo, excretionē,
refrigerationē, ventilationem, & cōcoctionē semipu-
tridorum: quæ omnia illi ex aduerso respondent. Ipsius uerò
febris, refrigeratio oppositio est. Singulæ itaque res sem-
per unā indicationem exhibēt. Ac si propter naturā ipsum
indicans sit, semper indicabit cōtrariū: sicuti non con-
trariū, sed simile, si secundū naturā se habeat. Igitur si
vires eius qui ex putredine humorum febricitat, valētes
sint, mittendus statim morbo incipiente est sanguis: si
cruditas vētris nō adsit. Sin vires infirmæ sint, aut ætas
dehortetur, incidenda vena nō est. Eiusmodi tñ febris
in virtutē imbecillā non incidit. Quippe synochos be-
ne habiti corporis, & calentis ætatis est propria. At si i-
pueræ incidat, qui quartūdecimū annū hætenus non at-
tigerit, mitti illi sanguis non debet: propterea quod tñ il-
lis, quū præsertim calidi & humidi sint plurimum corpo-
ris substantiæ quotidie defluat, ac digeratur. Ita quod ex
incidenda vena moliendū nobis fuerat, id ultro nobis
ex curadi corporis natura præstatur. Quod si corpus quar-
tūdecimū excesserit annum, æstimandū est, qualis eius
natura sit: num gracilis, & spissa, & dura, & copiosi san-
guinis, an contra. Atque ita in priori missionem sangui-
nis adhibebis: in secūda, nequaquā. Quin etiā modus va-
cuandi sanguinis ex iisdem sumetur indicationibus. Si
enim cui sanguis mittitur, triginta annos sit natus: sed
laxus, & mollis, & pinguis, & albus, & gracilibus ve-
nis: huic aut planē sanguinem non mittes: aut parum

491
Causarum præ-
cedentium fe-
brem putridā,
quid singule in-
dicent,

XIV.
Sanguis in prin-
cipio statim mit-
tendus est, si pu-
trida febre la-
borans ualidis
uiribus sit, nec
cruditas sub-
sit.

Synochos, non
incidere in im-
becillas vires.

Pueris ante
quartūdecimū
annum cur nō
sit sanguis mit-
tendus, uel si
laborent syno-
cho.

Pueris post
quartūdecimū
annum quā mit-
tendus sit san-
guis, & quā mi-
nime.

detraches. Et omnino quidem non mittes æstiuo tempore, regione æstiuosa, & cœli statu calido & sicco. Parum detraches in reliquis tum anni temporibus, tum regione, tum cœli statu. Iam verò, si neq; obstructio, nec putredo subesset, sed sola redundantia succorum, protinus à missione sanguinis, pro naturæ sue ratione homo se haberet. Verum quoniā nec obstructio, nec putredo per solam curari missionem sanguinis potest, reponi sanguinis aliquid ad spatium curationis debet: quo minus itepestiuè nutrire necessitate vlla cogamur. Quantum nāq; ad huiusmodi pertinet febrē, prorsus nutriendum non est. Siquidem ostensum prius est, solum virtutis respectum esse, qui nutrimento præbeat indicationem. At uero euacuationis ratione, nutrire oportet. Ita necessum est duorum alterum: aut fe-

Synochā feb. regere tenuissimā uicū rationem.

Vires indicant formam nutriendi.

Sanguis cur non sit in synochis detrahendus immo dice.

XXV.

Victum instituens pars artis, ex quibus constet.

Præcordiorū perfusiones quæ sint perniciose.

Diuites quæ pauperes cur interdum soleant detenus curari.

brem, si nutris, augere: aut vires, si non nutris, deicere. Satiùs itaq; fuerit, aliquid sanguinis, quod propriis partibus animalis nutrimentum sit, relinquant: ac ipse paucissimas sorbitiones, potionesq; exhibere contentus sis: quibus utiq; ceu medicamentis, potius quàm nutrimentis egemus. Porro quum ars ipsa tota sit magna, non leuissima eius pars est, scientia ordinandi victus. Quæ utiq; ex his maximè remediis constituitur, cibo, potione, perfusione, cataplasmatibus, & clysteribus. Cæterum calfacere præcordia cataplasmatibus aut perfusionibus, non est perpetuò tutum: sed in iis tantum ægris, quibus in toto corpore nullum errat superfluum. Cæteris omnibus extrema est perniciēs. Nam siue redundantia vtrius sit, vel ad vasa, vel iuxta vires: siue etiam in vna parte pluribusue vitiosa excrementa habeantur: omnia ad partem excelsam trahuntur: inibiq; sæpe phlegmonas excitant. Quare in eiusmodi morbis diuites potius quàm pauperes perperam solent curari. Nempe, & quòd raro illis mittatur sanguis, vel si maximè tali egeant auxilio: & quæ medici, ut agere ali-

quid semper videantur, de pfundendis præcordiis maxime sint solliciti. Itaq; accidit, vt illo ipso tpe phlegmonæ iucipiant diuitibus, quo iā pauperibus, morbus propemodum perductus ad finem est. Saluberrimum igitur est in febribus venam incidere, non synochis modò, verum etiam aliis omnibus, quas putrescēs humor concitat: vbi præsertim neq; ætas, nec vires prohibēt. Leuata enim quæ corpus nostrum regit natura, exonerataq; eo quo, veluti sarcina premit, haud ægrè quod reliquum est vincet: concoquens quod cōcoquū est habile: & excernens qd̄ potest excerni. Porro vbi humor ad locum affectum confluit, remittere repellereq; hunc expedit: nō ad ipsum trahere. At repellentia remedia, quæ certè astringendi vim obtinent, in principiis idonea sunt duplici ratione. Et q̄ robur affectis particulis inferant (unde minus prōptè affluxum excrementorū in se recipiunt) & q̄ eorum quæ in iis iam recepta sunt, tenuissimū extrorsum exprimant. Quòd si tum fluxio humorū per ea remedia cōpescitur: tum densitas quæ in affecta particula relicta est, crassiora detinet: iam tempestiua relaxatio est, quo ea quæ retēta sunt, vacues. Præcipuè aut astringentibus est vtendū, ubi in iecur aut uētriculum, superuacuum aliquid profuit: qñ & è primoribus admodum hæ partes sunt: & ut mun⁹ suū obeant, vel in ipsis morbis, est necessariū: quū alimentum corpori uniuerso conficiant. Quare ciborū cōcoctio, siue ea in iecinore, siue in uentriculo sit improspera, febres intendit: ac succi vitio exacerbat. Quo magis in oī febris, ciborū concoctionis prospicere magnopere oportet. Atq; eius rei gratia, roboris q̄q; infirmorum qbus perficit, non leuis habenda est cura. Si ergo vel minima sit suspitio iecur aut ventriculū laborare, absynthiū protinus oleo incoquemus, ac eas particulas pfundemus. Quū aut duplex in oī absynthio facultas sit, vtq; in pōtico astringendi facultas nō parua

Sanguinē mittere i omnibus putridis febribus, qñ sit saluberrimum.

Repellentia remedia eē idonea phlegmonis incipientibus.

Relaxantibus qñ sit nobis vtendum.

Astringētibus qñ vtendum.

Cōcoctioni ciborum magno pere pspiciendum eē in singulis febribus Absynthiū hepatis opitulat. Absynthii duplex facultas.

*Absynthiū pō-
ticum esse eli-
gendum ad ie-
coris & uētris
phlegmonas.*

*Amara quali-
tas viā astringē-
ti facit.
Olei species
diuersæ.*

*Myrtinū oleū
esse crassiorū
partium, q̄ ut
alte descendere
possit.*

*Phlegmonis
heatis cōmo-
disimum cata-
plasma.*

est. In reliquis omnibus amara quidē qualitas est vehē-
mentissima: astrictio verò, aut planē obscura, aut pror-
sus nulla sentitur. Proinde ponticū ad iecinoris & ven-
tris phlegmonas eligi p̄stat. Est aut id tum folio, tū flo-
re lōgē q̄ cætera absynthia minore. Odor quoq̄ huic
nō modō non insuauis, verū etiam quid aromaticū re-
ferens. Reliqs oībus planē est fœdus. Quare hæc fuge-
re oportet: vti aut semper pontico. Etiā reliquorū me-
dicamentorū, in quibus mista cū amaritudine astringē-
di vis est, aliqd in oleū coniicere, atq̄ ad eūdem modū
vti, licet. Amara siquidē qualitas præit, viāq̄; astringē-
ti facit. Ac si quidē intendere astrictionē studes, oleum
ipsum ēt astringendi vim habeat: cuiusmodi est, qđ Hi-
spanū vocant, & quæcūq̄ cum oleæ frondibus p̄parā-
tur. Sin leuiore vti astrictione placet, aliud olei genus
p̄parabis, p̄cipuē qđ tenuiū sit partiū: quod genus Sabi-
nū est. Optimum tñ vbi astringere vehementius expe-
dit, est histricū oleū. In penuria nō absynthiū iter initia
vel melinū, vel mastichinū, vel lentiscinū satisfecerit.
Quod si exigua febris sit, ēt vnguentū nardinū: qđ uti
q̄ valentius iis oībus calfacit. Quare si aliorū copia nō
est, iualefcere febre, rosaceū illi admiscebis. Sanē myr-
tini astrictio idonea nō est: quū crassior sit partiū, q̄ ut
alte descendere possit. Ad eundem verò modū & cata-
plasma cōpositā vim obtineat, ex ea quæ tenuiū sit par-
tiū, ac relaxet: tū ēt, ex amara, astringenteq̄. Superet
aut in iis, vbi scilicet tū reprimere, tū robur addere stu-
demus, qđ astringat. Vbi tenuare ac digerere, amarū.
vbi euocare, quæ ex relaxantibus tenuiū maximē sint
partiū. Siquidem quæ crassæ substantiæ sunt, ea pus mo-
uentibus sunt accōmoda. Cataplasmate aut qđ sequit̄
fuimus nos fœliciter vsi, contra iecinoris phlegmonē.
℞. Olei in quo absynthiū decoctū fuerit, & cydoniorū
decocti, sing. vnc. 2. myrobalanorū & rad. ireos, sing.
drach. 2. Cerae quod sit satis. Fiat emplastrum pulue-

rizator, iuxta artis præcepta. Coquitur & in uino austero cydonium: ex ipsiusq; carne aliquid eiusmodi cataplasmatibus inditur: ubi uidelicet & quod confluit copiosum est, & particula ipsa infirmior. Tunc siquidem astringentem vim inuagemus. At verò nec colo laborante, nec reliquorum intestinorum quouis, nec musculis qui in præcordiis habentur, aut ipso peritonæo, miscenda astringentia sunt. Sed nec quum vesica male habet, vterus ue: modò nihil ultra ad locum fluat, nec sanguinis redundantia, nec excrementorum copia, in toto sit corpore. Porro renes & pectus in media prædictorum conditione consistunt: quantum scilicet à ventriculi iecinorisq; sollicitudine absunt, tantum reliquis antecellentia. Siquidem in ventriculo iecinoreq; resoluui robur perniciosissimum est: minimè in illis periculosum. In his verò est quidem periculosum, nò tamen perinde ac in illis: nisi pus educere ex pectore, aut pulmone, aliquando sit opus. At in liene curando, si vel æger ex iis sit, qui atræ bilis excrementum naturaliter congerant: vel etiam eo tempore succus is in eo redùdet, necesse est reliquis astringentia permisceas: quo visceris robur custodias. Ita enim & excrementa ad se trahet: & quum corpus expurgarit, ipse rursus per ventriculum excernet. Sin atræ bilis sit omnino excrementum nullum, aut prorsus astringendum nò est, aut parcissimè. Adhæc, si in quauis phlegmone obsessa particula, calor tumorem superet, agendum, vt sensim per ea quæ tepentem calorem obtinent, digeratur: qd genus est tum lini semen: tñ chamæmelum. Quibus adiaci vel hordei, vel fabarum farina debet: quippe quorū neutrum ex calfacit. Sæpe verò & artomelite ad eiusmodi phlegmonas utimur: cui aquæ aliqd admiscemus. Ad lienem verò et aceti aliqn aliquid. Si uerò laborantis phlegmone partis calor nò multum à natura recesserit: tumor autem ipse fuerit notabilis, digerere haud timidè sine

Astringētibus
in quarum par
tium affectibus
nō sit utendū.

Phlegmonas
quarum calor
tumorem supe
rat, quibus cu
rare medica
mentis debeat
mus.

Artomeli.

Phlegmonæ
quarū tumor
calorem supe
rat, qua ratio
ne curandæ sint.

FFF iiii

Acetū qñ mi-
scdum phleg-
monarum me-
dicamentis.

Lieni affecto
quæ medica-
menta conue-
niant.

Putrida febre
detentos, nec
lauandos, nec
relaxandos ef-
se, anteq̃ cor-
pus uacuatum

XVII.

fuerit.
Hepatis cata-
plasmatis esse
miscēda astrin-
gentia.

Pectore affe-
cto parcius mi-
scenda esse ca-
taplasmatis a-
stringentia.

Pulmone inflā-
mato, abstinē-
dum ab astrin-
gentibus.

Pulmoni inflā-
mato, applicā-
dā cucurbitulā
eē, si prius fue-
rit corpus ua-
cuatum

XVIII.

Cerebri & mē-
branarū eius
inflammationi-
bus, qñ cucur-
bitæ conueni-
ant.

aqua debebis: etiam fœnigræci aliquid supradictis imi-
scens. Si veluti scirrhusa duritie phlegmone sit, pp hu-
moris quem continet vel crassitudinem, vel lentorē,
tum acetū aliquid, tum amara medicamenta, simul imi-
scenda curabis: potissimū in liene. Etenim viscus hoc,
propterea quod ab iecinore crassum humorē trahit,
eiusmodi humoris occasiōe plerūq̃ laborat. Quo ma-
gis cataplasmata quæ ex oxymelite, & absynthio, &
cappari fiunt, illi sunt idonea. Cæteræ nec eorum qui ex
putrescente humore febricitant, quenq̃ ipse lauabo:
nec relaxantibus cataplasmatibus, prius q̃ supuacua pur-
garim, utar. His uacuatis, non solum audacter lauē, sed
etiam cataplasmatibus utar: in aliis quidem membris, iis
quæ relaxent: in iecinore uerò ac uentriculo, additis
etiam quæ astringāt mediocriter. Parcius autem ad pe-
ctus, q̃ ad ea, utendum astringentibus est. Qñ talia hu-
mores qui phlegmonem excitant, in pulmones & cor
nonnunq̃ reprimunt. Ac cibus potius horū firmitudini
est consulendum. Neq̃ enim sicuti in iecinore & uētri-
culo phlegmone laborantibus, ita hic tenuissimo victu
est utendum. Ac longē quidē magis in pulmonis phleg-
mone abstinendū ab astringentibus est. Qñ in eo ipsis
quoq̃ relaxantibus admiscendum aliquid acrium quo-
dāmodo, & euidenter calfacientium est. Quippe foras
trahere, potius q̃ reprimere, i eo debemus. Itaq̃ ēt cu-
curbitula, in iis qui sic laborant, si prius sint vacuati, ap-
plicabitur. Si uerò abundantia succorum adsit, nō ma-
gis ex pulmone in pectus aliquid excrementi transfe-
ret, q̃ ex toto corpore attrahet in utrunq̃. Eadem ra-
tione, neq̃ in cerebri & eius membranarum phlegmo-
nis, cucurbitulis in morbi initio utemur: verū ubi nec
influit adhuc quicq̃, & totum corpus prius ē vacuatū.
At reprimētibus in his q̃q̃ inter initia utendū. Sed quū
per cranii ossa mediā occupātia regionē, in altū descen-
dere reprimētū vim cupimus, eorū quæ præire, ac de

ducere ea possunt, aliqd reprimētibus admiscebimus. Ea sunt, quoz substantia ex tenuibus partibus constat. Sanē acetū non mō tenuiū partium est, sed et non mediocrē reprimēdi vim obtinet. Quo profectō rationalius in principiis affectuū ipso utimur, rosaceo admiscentes. Procedente verō tpe, et spondylii & serpilli, aliquid miscent: quo scilicet tpe transire ad ea quæ cōcoquant, ac digerant, conuenit. Sanē ad eum modum & castoreo utimur: quum tñ ipso in aliis phlegmonis minimē utamur, quīs et in summa inclinatione consistāt. Est nāq; calidius id, q̄ ut phlegmonis sit idoneum. Soleo aut ipse singulaz particulaz meat⁹, qui iis ad excrementoz emissionem sunt destinati, fluxiles reddere. Intestino, ventriculo, mesenterio, & iecinoris concauis, intestinum rectū. Renibus, uesicæ, iecinoris gibbis, uenæ cauæ, arteriæ magnæ, & oībus quæ ī lumbis habentur, eum qui uesicæ inseruit. Pulmonibus & pectori, arteriam asperā, atq; fauces. Cerebro & eius inuolucris, eum qui per palatū & nares descendit. Parat fluxibilitas iis quidē quæ per sedē excerni debent, mulsa, & cibis iis qui uentrē liquāt, & pharmacis, quæ modicē proritare possunt. Ad uētriculū uerō, iecur, & lienem, si qñ phlegmone sint uexata, nec mulsa ipsa ē utilis: qm̄ illico in bilem transit, ac uiscez phlegmonas auget. Excrementa aut, ut cum urina excernantur, diureticis promouebis: quēadmodum quæ in pectore, & pulmone hærent, iis quæ tussim excitant, euacuabis. Porro balneū in remissione febris administratum, corpore iam mediocriter transpirante, nō exiguū cōmodum affert, oīa ex eo tum fuliginosa excrementa, tū humida educens. Curādum tñ est primò, ut citra horrorem administretur. Secundò, ut nullum primæ notæ uiscus sit imbecillum. Tertiò deniq; ne multitudo crudi humoris in primis uenis contineatur. Horror siq; dem & auget, & gignit febrem. Partes uerō ibecillæ,

Tenuia qñ miscenda sint astringentibus. Aceti facultas

Castoreum esse calidius, q̄ ut conueniat phlegmonis. Partium singulaz meatus esse reddēdos fluxiles.

Fluxibilitas meatuum quibus medicamentis patetur. Mulsa quibus non sit conueniens.

Balneū quādo conducat.

Balneum quō administrādū.

Balnei usus
duplex.

21. Balneo aptissi-
mū tempus in
febris inter-
mittentibus,
quodnam sit.
Nutriendi tē-
pus unde sit cō-
iectandum.

Continente fe-
bre detentus,
quādiu absq[ue] ci-
bo seruari de-
beat.

per balneū liquatos humores multo facilius alliciunt:
& q[ui] succi liquati sint, & q[ui] uia dilatata. At crudoꝝ hu-
moꝝ copia in totum corpus digeritur. Horum si nihil
obstet, ex balneis duo hæc ægro cōpendia accedent: et
q[ui] redundantia humoꝝ vacuabitur aliquid, & q[ui] mul-
tum transpirabit calor febrilis. At uerò quum parti-
cula, quā obstructio, aut putredo, aut phlegmone obse-
dit, febris ipsius ueluti focus sit, si ei pp[er] calorem sua
sponte trahenti, alia quāpiam occasio extrinsecus, ex
iis quæ potestate excalfaciant, accesserit, necesse est af-
fectum intendi. Si quis aut prius toto vacuato corpo-
re, relaxantibus curet, ubi scilicet maxima febris non
adeft, utiq[ue] prodesse aliquā potest. Quo tpe etiam laua-
re citra noxam licet. Cauendum tñ a frigido folio iis
est: qñ & crudi & putrescentes succi, minus apti sic ad
exhalandum redduntur. Itaq[ue] in progressu morbi, ubi
& absumpta iam supervacua sunt, & tum cruda, tum
putrescentia concocta, & cataplasmatibus relaxantibus,
& balneis sine periculo utare. Porro aptissimum in fe-
bribus quæ intermittunt & repetunt, tempus est, quū
exhalare febrilis calor iam cōperit. Statim siquidem
corpus ad nutrimentum præparant: huius quoq[ue] op-
portuno tpe ex duplici coniectato respectu: nēpe sum-
mo præcedentis accessionis vigore, & futuræ princi-
pio. Ad hæc nanq[ue] spectantes, operā dabimus, ut q[ui] lon-
gissime ab utroq[ue] nutriamus. Vex si febris ipsa sit cō-
tinens, constat eam breui finiendam. Si igitur ultra se-
ptimum neutiq[ue] progressura videtur, prorsus continē-
dus à cibo æger est, si uirtutem non defuturam conii-
cimus. Sin ad nonum, aut undecimum, aut quartūde-
cimum usq[ue] progressura uideatur, aut etiam finienda
septimo, ceterū æger vires infirmiores habere, q[ua]m ut
in tantum tempus sufficiat: necessum erit nutrire, ac
deligere id, quod minus sit noxium. Etenim ubi vel ie-
cur, uel ventriculum phlegmoneprehendit, perni-

M E T H O. M E D. L I B. X I I.

ciofissimum est ante accessionem cibare. Vbi hæc ab-
est, quibus infirma est uirtus, utilissimum. Porrò sum-
mum vigorem febrilis accessionis expendes, an cir-
ca magnitudinem febrilis caloris sit siccus, squallesq;
an citra siccitatem vrens. Priorem nanq; humectante
victu quàmprimum madefacere oportet. In secundo,
dum plurimum sese calor remittat, manere. In prin-
cipii verò accessionis more æstimabis, an corporis ex-
trema refrigeret, & magnam sanguinis reuocatiõem
ad interna corporis faciat: an omnino corpus non pre-
mat. Quippe secundum hoc, ceu facile mansuetum,
contemnes. In priore distinguas oportet. Nam si absq;
visceris phlegmone, aut succorum redundãtia motus
ad interiora in accessionibus pollet, nihil offendes pau-
lo ante cibans. Sin vel phlegmone, vel redundãtia sub-
sit, cauenda est ante accessionem cibatio, ceu res ma-
ximè noxia.

452

Phlegmone af-
fligente ven-
triculũ, hepar-
ue, perniciosis-
simum esse an-
te accessiõem
cibare.

G A L E N I P E R G A

M E N I D E M E T H O D O

M E D E N D I. L I B. X I I.



Q VAE cum symptomatis consistunt
febres, non sunt ad febrium genus vl-
lũ, aut species, aut dñia distincta. Por-
rò grauiorũ symptomatũ, & quæ ra-
renter febrientibus incidunt, primæ
dñiæ sunt tres. Aut enĩ in læsiõe actio-
num cõsistunt: aut in retentoꝝ uacuatoꝝ ue imodico
excessu: aut in corpoꝝ ipsoꝝ affectu. Ex quibus duæ q-
dẽ dñiæ priores, si p̃stisent, ad se totã curationẽ puer-
tunt, affectũq; deserere cogunt. Tertia verò, alterius
tuidem, quem curare oportet, affectus, est signũ: nullã

Symptomatũ
grauiorũ tres
differentiæ.

Symptomata
ex se nec cura-
tionis ratio-
nem indicant,
nec primū im-
mutant.
Vires a quibus
lædantur.

Symptomata
submouere, quā
neglecto mor-
bo, cogamur.

Dysenteriam
grauissimā cu-
rari maxime
mordentibus
medicamentis.
Doloris expu-
gnandi ratio
duplex.

Medendum tu-
to esse.
Vires esse ser-
uandas.

tñ seorsum curationem exigit: utpote cum affectu, vn-
de nascitur, vnā cessans. Nullum autē symptoma, qua
symptoma est, nec curationis rationē indicat, nec pri-
mū immutat: licet ex accidēti interdum id faciat: vbi
scilicet causæ locum sortitur. Porro eorū omnium, vbi
veluti causæ curationē immutāt, vnū caput est, ipsa læ-
sio, siue virtutis sit, siue dispositionis. Lædunt autē vires
vigiliæ, dolor, atq; vacuatio immodica. Affectui uerò ea-
dem, non utiq; semper, ceteræ magna ex parte, nocēt:
ac potissimum quā fuerint immodica. Qua de causa,
quāq; cogimur prius submouere symptoma, q̄ morbū,
mutato videlicet instituto. Ergo si labant vires, non tñ
vehementer sint resolutæ, sed adhuc resistunt, ad sym-
ptoma tñ sumus attenti, atq; id q̄ primum tollere ma-
turamus. Sin iam resolutæ vehementer sint vires, non
modò symptoma sedare, sed illas etiam firmare contē-
dimus. Vbi verò virium roboris fiducia est, adeò nunq̄
contra symptoma pugnamus, ut (quod prorsus con-
trarium est) per ea nonnunq̄ præsidia, quæ dolorem af-
ferunt, morbos ipsos curemus: veluti profectò dysen-
teriæ ipsi mordentibus maximè medicamentis, tū po-
tissimum medemur, quum utiq; est grauissima. Est autē
duplex medicis contra dolorem instādi ratio. Altera,
qua delitiis cubantium subscribunt: altera, ex artis ra-
tione. Quippe si licet ægrum doloribus obnitētem va-
lentibus remediis vno die per sanari, qui tota curatiōe
neglecta dolori tantum intentus est, non ex artis ratio-
ne, sed in gratiam ægrotantis id facit. At si ex dolore
vires soluantur, atq; ex eo impendat periculum, miti-
gari dolor, & roborari vires debebunt: quo & morbo
resistere, & curationis spatium sufficere valeant. Esto igitur,
terminus in ægrotantibus, quem non transibit is,
qui ex arte generosè contra morbum pugnat, ut tutò
medicetur. Ei verò qui dolorē mitigat, ut vires custo-
diat. Porro dolorē mitigant, quæ ex papaueris succo,

vel alteri semine, vel radice mādragoræ, vel deniq; sty
 race cōstant. Cæteræ si fas sit, iis remediis quæ morbū
 sanent, vtendo, qđ optamus efficere, cauendū ab id ge
 nus soporiferis medicamentis est. Sin verò ex vigiliis
 & uiribus resoluēdis, æger ad mortis discrimē tendat,
 tū profectò ipsis rēpestiuē vtare: nō ignarus scilicet cor
 poris habitū nōnihil ex eis lædendū: eligendā tñ potius
 læsionē ipsam, q̃ mortem. Hac nimirū persuasione ipse
 quoq; tametsi oīum maximē ab usu grauitē sopiētū
 abhorrens (q̃ rebellē valentēq; in corpore frigiditatē
 relinquant) aliquñ tñ ea & colicis exhibeo: & iis qui vel
 oculoꝝ, vel auriū, vel aliaꝝ partium vehementissimo
 dolore cruciantur. Interim uerò, & quū eger ex tenui
 destillatione, vigiliis, & uehementi tussi uerget, pauxil
 lū eiusmodi medicamenti offero: facillē noxā eius, si qs
 semel sit vsus, spatio emendatū iri ratus. Oīa tñ id ge
 nus magis salubria sunt, si post annū à cōpositione su
 mantur: veluti qđ ad Philonē refertur. Quod ad dolo
 res * stupefaciendo sedādos, nullo minus est celebre.
 Id uerò ē si duorū, triū ue, aut quatuor annoꝝ sit, mul
 to sanē fuerit pstantius: sed neq; inutile tñ sequentibus
 annis, ad decimū usq;. Ergo sicuti cauendus est, quoad
 fieri pōt, eiusmodi medicamentorū vsus: ita si necessitas
 urgeat, nec admodū recentia sunt offerēda: q̃ frigida
 quæ in his sunt, p̃uales uires adhuc habeant: nec ita
 antiqua, vt spem nostrā frustent: sed tādū dimittenda
 sunt, quoad violētia refrigeratiū, ab eoꝝ quæ calfaciūt
 vi mitigetur. Et taliū quidē medicamentorū vsus, eoꝝ
 qui aduersus symptoma pugnāt, ē proprius: potissimū
 ubi ex frigida causa dolor est excitatus. Obsunt enim
 talia plurimū toti affectui, curatiōiq; cōtumacē eū red
 dunt. Ar sanguinis missio, quæ scilicet vires nō deiicit,
 symptoma spectātis medici opus nō est, sed eius q totū
 affectum adimere studet. Ad eūdē modū & balneū, &
 purgatio, & fomēta calida, & vini potio. Quæ omnia,

Dolorē rem quæ
 mitigent.

Soporifera, si
 fieri possit, vi
 tanda.

Soporiferis qñ
 utendum.

Stupefacienti
 bus medicamē
 tis Galenus v
 tebatur inter
 dum in dolori
 bus acerbissi
 mis, & i tenui
 bus destillatio
 nibus.

Stupefaciētia
 medicamenta
 tutiora esse, si
 post annum a
 compositione
 sumantur.

Philonium stu
 pefaciens.

Stupefaciētia
 medicamenta,
 cur nec recen
 tia nimis, nec
 vetera impen
 se exhibenda
 sint.

2.

3.

Vacuatio per
frictionem so-
lam, quibus de-
beat admini-
strari, & quo
modo.

Oleū Sabinū.
Oleum hispa-
num.
Oleum sicyo-
nium.
Oleum chamæ-
melinum.

Fricatio uberior
allicit semnū.
Sōnus diutur-
nus, ciudos suc-
ces digeri pro-
hibet, & vi-
scera reddit
grauiora.
Semnus cōco-
quit.
Vigiliæ dige-
runt.

dum affectus sanant, vnā cum ipsis, etiam dolores se-
dāt. Eodem modo & nutrimentum exhibitum, vbi sic-
co & squalente morbo os ventriculi afficitur, dum af-
fectum ipsum sanat, hominem prehendi syncope pro-
hibet. Porro qui ex copia crudorū humorum, vnā cū
oris ventriculi offensione, febricitant, ii neq; missionē
sanguinis, neq; purgationem tolerant: quum tñ vacua-
tionem desyderent. Quare eis vacuatio per frictionem
solam administratur. Ergo linteis mediocriter asperis
statim in ipsis auspiciis morbi fricandi sunt, à cruribus
supernè deorsum. Debet enim radi ab his cutis, quum
simul & calferi per eā, & digeri corpus postulet. Dein
tota brachia, simili modo ab humeris supne deorsum.
Vbi uerò artus omnes abundè calere iā videbuntur, &
metus fuerit ne quis ex multitudine frictionis, contu-
sa iam carne, superueniat lassitudinis sensus, oleo rela-
xante vteris: quod genus est Sabinum. Ab astringente
verò abstinebis, cuiusmodi Hispanum existit. Hyems
verò si fuerit, nihilo deterius sit, si ad digerentium ali-
quod transieris, quale sicyonium est, aut etiam chamæ-
melinum. Vbi igitur oleo membra ipsa abundè fricue-
ris, oleum est detergendum, atq; ad spinam dorsi tran-
seundum: quā totā pariter fricare, primū qdē sicca fri-
ctione: post oleo, expedit. Ab hac rursus ad crura te cō-
feres: & ab his ad brachia: denuoq; dein ad spinā: sic to-
tū diem agens, i domo & lucida, & tēperata. Sanè mul-
sa, in qua coctū hyssopum fuerit, his est aptissima. Qua
sola primis tribus diebus vtenī. Ipse verò eo tñ tpe dictā
i termittes frictionem, quo somnus hominē occupaue-
rit. Ad quem ēt alliciendū, & frictio vberior facit. Cæ-
terū somnus vberior his minimè est salutaris: quū nec
crudos succos digeri sinat: & viscera reddat grauiora.
Sed si quis ali⁹ affectus est, q somnū & vigiliās modicas
postulet, hic profecto i his est. Quippe somnus pcoqt.
Vigiliæ digerūt. Quorū utroq; est opus iis qui ex multi

tudine crudoꝝ succoꝝ egrotāt. Ac si pulsus his parvus admodū, infirmusq; sit, aut ēt supra hęc vehementer inæqualis, extremum periculū indicat: nec quicq; pter iam dicta, moliendum est. Sin verò mediocriter sit robustus, nihilq; intercifus videatur, si sua quidem spōte alius cōmodē non deiiciat, soluenda est, mulsa iniecta. Quod si maior iusto superfluoꝝ impetus ad aluum citetur, principio quidem percoquere mulsam amplius oportet. Ea nanq; sicut minus aluum subducit, ita magis nutrit. Post hęc, si supuacua largius descendant, ne sic qdem sistenda: sed exhibendus pro aqua mulsa ptisanæ cremor est. Si verò fluere p̄gant, alicæ sorbitione ægrum nutries. Si pulsus interim ad imbecillitatē, vel inæqualitatē, vel paruitatē mutent, panē ibutū diluto vino porrigere puenit: utiq; si nec vētricul⁹, nec iecur laborēt phlegmone. Qñ si hac infestent, corpore crudis succis referto, salus deplorata est, pulsib⁹ sic imutatis. Minimē aut vtendum cataplasmatibus aut perfusionibus est, prius q̄ superuacua magna ex parte partim vacuata sint, partim concocta. Interimq; sola mulsa, in qua coctum hysopum sit, vsq; ad septimum diem vtatur. Siquidem longissimam sic affecti cibi abstinentiam ferunt: corpore scilicet ex crudis ipsis, quos continet, succis concoquendis alto. Verū si alius ipense fluat, vel æger mulsam fastidiat, ad ptisanæ cremorem est trāseundū. Sin hunc quoq; auersetur, alica ad eundē q̄ ptisana modū ei pparabitur. Neq; enim eis qui sic sint affecti acetum incōmodū est. Immo sicubi crudos affatim succos eē aiaduenteris, oxymeli assiduē pro mulsa dabis: si qdē æstas sit, & æger frigide assuetus, frigidū: sin hyems aut, oib⁹ calidū. Maximē vò pulsus parvus, tard⁹, & rar⁹, frigidos subeē succos oñdit. Sanē ppositis aduersissima sunt tū balneū, tū aer ambiēs: q̄ties vel nimiū calid⁹ ē, vel frigidus. Itaq; ut lauandi hi nō sunt, sic, & reclinādi in domo sunt: æstate qdē, quæ frigeat:

Mulsæ exhibitio.

Cataplasmatibus utendum non esse prius quā supuacua partim vacuata sint, partim cōcocta.

Inediam longissimā ferūt quibus corpus crudis succis redundat.

Oxymeli congruere illis qui crudis succis redundant.

Frigidos subesse succos quis pulsus indicet.

Syncope a
cruditate, cura
tio.

4.

Syncope labo
rantibus om
nibus quale vi
num sit exhi
bendum.

Vinorum ge
nera varia.

hyeme, quæ caleat. Læduntur namque non parum ab utroque
excessu. Atque hæc quidem agenda sunt tibi, ubi à pri
mo die curationem susceperis. Si autem ad eos quos iam præmit
syncope accit⁹ fueris, si ea quæ retuli loca phlegmone
vacent, panem exhibebis non multum, eumque ex vino aliquo,
quod celerem in corpus digestionem adiuuet: statimque ad fr
ctiones venies, quas ut diximus administrabis. Ac si qu
dem cœli status sit vehementer calid⁹, cum frigida vinum
dabis: cum calida autem mediocriter, si temperatus. Quæ tamen
secundo & tertio dabitur potio, omnino calidam exhiben
dam curabis: ut quæ succorum crudorum concoctionem
adiuuet. At quibus ex flava bili, quæ os ventriculi infe
stet, syncope incidit, iis frigida exhibenda potio est. Vi
num tamen quod & calidum natura sit, & deductionem in
corpus promoueat, omnibus quos syncope male habet,
offerre conuenit. Constat autem ex vinis ea deligenda es
se, quæ & flauo colore sint, & substantia tenui, & ætate
vetera. Talia nimis & boni odoris continuo fuerint.
Quinetiam si paululum ubi mista sunt, gustes, senties ca
lorem per totum corpus transmitti. Ceteræ amara præ ue
rustate vina ne sunt, præsertim quæ iis exhibebis, qu
bus stomachus flava bile urgetur. Commodissima igitur
his vina sunt, quæ quum naturaliter sint austera, sensile
iam astringendi vim, propter uerustatem non amplius exhibent:
calorem tamen admodum euidentem habent. Huius igitur ge
neris vinorum optima sunt, Surrentinum, Signinum, Sabi
num, Tiburtinum, & Marsum: omnia quidem Italica, astringen
tiaque. Quibus tamen ex crudis humoribus syncope pericu
lum imminet, sanè Falernum tanto iam memoratis præstat, qu
to tamen melioris est succi, tum et calidi⁹: utpote quod & ve
locius illis digeretur per corpus: & crudis succis conco
quendis auxilio erit. In summa verò, quibus ex abun
dantia crudorum humorum syncope incidit, iis crassa vina,
ceu noxia: aquosa, ceu paræ efficacia, fugienda sunt. Deli
genda autem eorum sunt media, quæque flaua existant, & calida.

Nec enim

Necq̃ enim inuenias ex albo vinorum genere calidum vllum: quando etiam austera, & mediocriter alba, quā inueterauerit, quodammodo fuluiora reddunt. Quot quot autem in ipsis calidissima sunt, omnia profectō sunt flaua. Reliquorum vini generum, austera quę mediocriter alba, crassaq̃; sunt, certē nullum ad digestionem in corpus est idoneum. Si tamen abundē inueterarint, nec aliorum copia sit, vti illis licebit: quōd stomachum roborent. Cæterum vina quę calfaciunt immodicē, iis offerenda non sunt, quibus caput est imbecillum, facileq̃; ab id genus vinis repletur. Porro vina quę odora, fuluaq̃; sunt, quantū ex ipsorum est natura, omnia caput grauāt. Eoq̃; tum Falernum, tū Tmolites, tum Lesbium, infirmo capiti noxia sunt. At vina austera ventriculum roborant, caputq̃; inter omnia vina minimē tentant: digestionē tamen in corpus non promouent: quo magis fugienda tibi in syncope præhensis sunt, non secus quā aqua. In penuria verō vini quod accommodum vtriq̃; syncope sit, ei inquā quę ex multitudine crudi succi oritur, & ei quę ex bile incidit, coactus vti vino, vtēris aquosis, magisq̃; si antiqua fuerint. Talia nanq̃, tametsi non valenter excalfaciant, faciliē tamen deducuntur in corpus. Quo nomine vrinas præter cetera omnia promouent. A quibus secundum locum obtinent, quæcūq̃; fuluorū maximē sunt tenuia: quę etiā ad syncopas præcipuē sunt deligenda. Est autem syncope præceps virium lapsus. Quum autem essentia virium, quibus regitur corpus, tum in spiritu, tum in solidorum corporum temperamento consistat, hæc nobis, & ubi integra sunt, seruari: & vbi corrupta sunt, ad itegrum reuocari omnino debent. At verō substantia spiritus, ipsaq̃; solida corpora, sic nobis sunt custodienda in morbis, vt tum qualitate, tum quantitate, quoad fieri licet, se naturaliter habeant. Curandum itaq̃; est, vt quę substantiæ por-

Tomus. III.

GGg

Vinum album quod calidum sit, reperiri nullum.

Vina impense calida, iis offerenda nō esse, quibus caput est imbecillum.

Vina austera ventriculū roborāt, caputq̃; minime tētāt: syncope tamē præhensis non conferunt.

Syncope est præceps viriū lapsus. Essentia viriū in quibus consistat,

5.

tio ab eis defluit, hanc per appositionem farciamus: quod in ipsis verò alterascit, in debitam temperiem per contrariam alterationem restituamus. Si igitur tū vacuatio, tum alteratio sensim, paulatimq; fiat, etiam correctio vtriusq; sensim administrabitur: quod munus ad artem sanitatis tuendæ pertinet. Sin confertim & semel, ac magna aliquando vacuatio, vel etiam adiectio incidat, sic sanè & efficietur morbus, & medendi methodum ad eorum sanationē desyderabimus. Porro animalis spiritus, à cerebro, veluti à fonte, nascitur. Qui partim ex inspirando, partim ex eo quod reticularis plexus suppeditat, irrigatur, aliturq;. At vitalis spiritus cōtinetur in corde, & arteriis: nutriturq; tum ex aere inspirato, tum ex sanguine halituoso. Quòd si naturalis quoq; aliquis spiritus sit, vtiq; continebitur is in iecinore & venis. Virium igitur lapsus, qui quidē solidorum corporum substantiæ resolutæ succedit, in longissimis morbis subinde incidit: animante ex frequenti atrophía extenuato: præterea in colliquatibus febribus. Qui verò ex substantiæ temperie mutata provenit, is, vel ubi immodicè ipsa fuerint calfacta, frigefacta, madefacta, vel exiccata, vel horum aliquib; copulatis affecta, provenit. At alteratio spiritus, tum ex vitiosis oritur succis, tum ex ambientis aeris malitia: præterea venenatis facultatibus, aut animalium quæ virus eieciunt, venenis. Ipsius verò essentiæ spiritus corruptio (quæ tum ob animi affectus, cuiusmodi sunt timor subitus, vehemensq;, nec non mœror, ira, curæ, atq; summa voluptas, tum ob ingentem dolorem: præterea ob plures motiones, vigiliasq;, obq; immodicam ipsius tenuitatem, & continentium eum vasorum raritudinem, atq; adeò ante hæc omnia, ob respiratum prohibitum, & nutrimenti defectum incidit) diligentius corrigi postulat. Sciendum autē est, in omnibus perturbationibus, ipsam p se ipsam moveri ani-

Spirit⁹ animalis a cerebro nascitur.

Spiritus vitalis in corde & arteriis consistit.

Spiritus naturalis si quis sit in iecinore continetur.

Lapsus virium quibus succedere solet.

Spiritus a quibus alterari solet.

Spiritus quæ corrumpant.

Animam per se ipsam moveri in perturbationibus.

nam: quæ nimirum in aliis actiuis functionibus mouet etiã & ipsa corpus. Ob idq; resoluitur eius robur, utroq; motuum suorum generum, si modũ excedat. Ergo nec rarefaciendũ immodicẽ ægrotantis est corpus, si spiritum retineri in ipso studeas: sed nec quæ in eo sunt, per comesta & bibita valẽter extenuãda. Est etiã ad virium robur tuendum, ciborum atq; potionũ habenda ratio, vt sint cum quantitate modici, cum qualitate exquisiti. Aer præterea quem inspiramus, debet esse vt optimẽ temperatus, sic ab omni corruptela & inquinamento alienissimus. Curandum similiter est, ut ipsa corpora solida, in quibus vel maximẽ consistere virium substantia videtur, sint sano temperamento. Quippe ad conseruandum virtutis robur, & syncopalem accessionem prohibendam, singulare præsidium est temperamenti custodia: ante omnia quidem, trium principiorum: mox verò reliquarum partium, quæcunq; in consortium affectus principia secum ex facili trahunt. Cuiusmodi est os ventriculi, quod propter exquisitũ sensum, accersit syncopas. At verò si humores crudi vires sua copia premat, ac propter multitudinem simul & crassitudinẽ exiguos aialis meatus obstruant, is affectus multis noĩbus exitialis est, ac syncope opportunos reddit. Quippe succi crudi nutrire prius q̃ sint, cocti, nequeũt. Quod si nec obstruãt, nec onerẽt, syncopẽ ii certẽ non inferũt, sed deliqua animi. Siquidẽ resoluunt ægrotantes huiusmodi, nisi frequentius nutriant. Sunt autẽ nutriendi hi extenuatibus, calfaciẽtibusq;: idq; nõ copiose, nec semel. Medicamẽta similiter sint extenuatã, calfaciẽtiaq;: sed moderatẽ. His & aquosum vinũ idoneũ ab initio est, nisi tñ vehementer febricitẽt. Etenim q; laborant ex huiuscemodi succis, hos quotidie accessiones exercẽt, præcipueq; ad vespẽram, noctuq;. Qui verò ex tenuissimis succis vrgentur syncope, diuersa à iã dictis rone curãdi sunt. Illos nãq;

Virium robo-
ri custodiendo
quæ requiran-
tur.

Synopes ab
ore uentriculũ
ortæ, curatio.

GGg ii

6.

paulatim & assiduè vacuam⁹. At qui sic se hñt, hos paulatim & assiduè nutriemus. Quòd si virib⁹ ibecillis, aliqd̃ his viscus phlegmone obsessum sit, eorū salus est deplo-
rata. Quādo nec ipsos licet assiduè nutrire, sed tātū in remissionibus: & seruari non pñt, si non nutriant. Non
solum autem extenuatis ad eum modū spiritu & san-
guine solent sæpe viris resolui, sed etiam facultate ex-
pulerice per vniuersam corporis molem immodera-
tius concitata: id quod accidere maximè solet, ob re-
tentricis imbecillitatem. Ergo nutrire, quicquid horū
inciderit, est necesse, sicuti etiam corporis summa den-
sare: non secus q̃ priorum rarefacere. Frigidum itaq̃
iis aerem astringentemq̃; cōparabimus. Vngendi præ-
terea sunt astrictoriis vnguentis. Tum cibi iis dandi,
qui non admodum promptè diffuāt. Cuiusmodi sunt
panis, sorbitio ex alica, fructus austeri, & qui non faci-
lè corrumpantur, ouorum vitelli (quandoquidem al-
bum ægrè concoquitur) gallinaceorum, qui lacte alti-
sim, testiculi, ac deniq̃ suillum cerebrum, diligenter as-
sum, vel in albo iure legitimè elixum, porro & anetho
iniectis. In summa, omni ratione agendum, vt & suc-
corum materiam crassiorē reddas, & cutim denfes,
& exhalationē inhibeas. Vinum verò ipsis aquosum,
necessarium inter initia est, sumptū post cibos. Quòd
si ex sententia nobis omnia responderint, etiam car-
nei iis aliquid nutrimenti post alia dabimus: potissimū
post quartum diem: succis qui febrem excitauerunt,
iam ad concoctionem venientibus. In omnibus autē
eiusmodi curationibus, si iam adsit syncope, omnis so-
licitudo medentis ad symptoma vertetur. Sin expec-
tur, vtriusq̃ curam habebit, & vt symptoma non inci-
dat, & vt paulatim discutiatur morbus: quem celerius
discuteremus, si nullus symptomatis subesset metus.
Quippe qui multitudine crudi succi grauatur, hunc si
modo iustam semel vacationē ferre posset, nec me-

*Vires resolui
etiā ob excre-
tricē uim imo-
dice concitata.*

*Vires imbecil-
liores redditæ
ob excreticis
motus immo-
deratos, quō re-
ficiendæ.*

*Albumẽ orone
ægre cōcoqui.*

tus aliquis syncopes impenderet, semel, arbitror, vacuatum explicaremus à morbo. Eum verò, cuius spiritus & succi faciliè exhalant, si ante accessionem cibare non cogeremur, longiorem illi morbum certè non redderemus. Sunt & aliæ quinque occasiones quibus succedunt syncopæ: nempe dolor vehemens, vigiliæ, immodica ventris inanitio, motus in delirantibus, ac denique principiorum intemperantia, vel nuda, vel cum humorum affluxu. Si igitur causam ipsam unde excitatur dolor, adimere possis, ita utique contra symptoma non pugnaveris, sed curaveris ægritudinem. At si qua occasione prohibitus, affectui submouendo intentum esse non licet, vehementiâ mitigabis doloris. Dolent porrò tantum particulæ sensibiles, idque vel ob cōtinuitatis diuortium, vel ob aliquam alterationē, non sensim, sed confertim & violenter factam. Quippe videntur corpora, non solum quum in non naturalē habitum confertim aguntur, tristem mutationem sentire, sed etiam in ipso ad naturalem statū suum reditu, nisi is sensim fiat, torqueri. Ac ex alterantibus quidem dolore afficiunt, oīa vehementer calfacientia, atque refrigerantia. Ipsam autem solutionem continui, necesse est, vel ruptionem, vel contusionem, vel erosionem existere. At ruptio ex distentione quadam, contusio ex grauantē aliquo, erosio ex mordēte prouenit qualitate. Ergo quum nihil extrinsecus sit, quod vel distendat, vel grauet, vel erodat, sed ex seipso horū aliquod corpus sentiat, neminem latere potest, distentionem ab aliqua intrinsecus substantia, quæ multitudine sua corpus se cōtinens distendat, aut immodica siccitate, prouenire: contusionem, ex eo quòd aliquod corpus occurfarit extrinsecus, quod vel durum, vel magnum, vel graue, vel simul ambo exitit: erosionem verò, ex succo aliquo, cui mordens natura insit. Qui quidem si sit in tunicis intestinorum imbibitus, commodissimè

Syncopæ quibus succedat causas. 7.

Doloris cause.

Solutio continui quoduplex sit.
Ruptio.
Contusio.
Erosio.

Distentio spontanea unde accidat.

Contusionis causa.
Erosio unde fiat.

8. Hiera picra ex purgat humores acres tunicis intestinorum imbibites.

Dysenteriae qualis uiculus conueniat.

Distentionis a sanguinis copia, curatio.

Reuulsionem esse in cotrarium molientiam.

Deriuatio fit per propinqua. Doloris a flatu leto spiritu orti, curatio.

Doloris a moriente humore orti, curatio.

Intestinorum tunicas esse duplices.

Stupefacientia medicamenta obtundunt quidem dolorem: affectum tamen maiorem reddunt. Dolores intestinorum a crassis succis producti, qua sunt ratione curandi

hiera picra expurgatur. Quod si aliquam exulcerationem pepererit, nutriendus certe ager est calente alica, sed iniectis mali punici granis. Potus aut illi offerendus est mali punici cremor. Porro si sanguinis abundantia sit quod distendit, protinus sanguis mittendus est, modo vires agri non sint infirmæ. Sed si is vel sanguinis missionem timeat, vel viribus sit imbecillis, tunc reuellendus in diuersum est sanguis: tunc per propinqua deriuandus. Quod si his peractis dolor etiam perstat, patet profectò in ægrotante particula impactum esse quod contristat. Patet verò non minus, & quod curatio ipsa per digerentia medicamenta molienda sit. Similiter etiam curantur dolores à flatulento spiritu orti: magis tamen ii extenuantia remedia desyderant. Si moles aliqua grauando, contundendo uel dolorem excitet, moli ipsi est medendum. Sin mordens humor, aduersissima huic sunt, quæ extenuant, & calfaciunt. Postulat namque huius generis affectus ut ea quæ contristant vacuent, aut alterentur, aut medicamentis torporè inferentibus retundantur. Ea quippe minus hos affectus lædunt, quam alios, qui à crassis glutinosisque humoribus proficiuntur. Huiusmodi tamen succos, dolor vehemens non comitatur, nisi aliquis eis halituosus spiritus copuletur: qui ex iis corporibus quibus continetur, erumpere prorsus non possit. Nam sic, grauissimi solent excitari dolores. Etenim quum tunicæ intestinorum sint duplices, si in medio ipsarum spatio frigidus ac viscidus humor collectus sit, à calore liquidus, in flatulentum mutatur spiritum: qui crassus frigidusque quum sit, acerbissimos dolores inducit. Ac ad tempus quidem, post bibitum medicamen stupefaciens, prorsus indolentes redduntur agri: cæterum affectus iis variis modis fit maior. Nam & intestinorum tunicæ medicamentorum frigiditate densiores, minusque flatui transmittendo habiles, redduntur: & humor ipse tum crassior, tum ad motum ineptior euadit. Quare id ge-

nus dolores omnes, per ea quæ incidunt, & concoquant: præterea flatus discutiant, deficcantq; citra valentem calfactionem, curandi sunt. A nullo autem in eiusmodi succis tam est metuendū, quàm à calore qui & eos liquet, & in flatum vertat, sed non valeat discutere. Porro agrestis quidam, allio comesto, vinoq; ad vesperam meraciori bibito, à dolore colico fuit liberatus: neq; id iniuria. Allium siquidem flatum discutit, ac minimè sitim infert. Quam ob rem ipse allium theriacem agrestium appello: estq; commodissimum iis omnibus, qui regionem frigidam incolunt. Quos igitur ex supra dicta causa vehemens intestinorum dolor citra febrem exercet, iis & allium esse licet, & theriacem bibere. At si cum febre vnà talis dolor aliquando incadat, principio quidem, si id ferunt, fomentum siccum ex milio adhibendum est. Si ab hoc non quiescant, semē aliquod, quod flatum dissipet, in oleo quod tenuium sit partium, coquere, mox per linteū, quo purum sit, oleum colare, dein anseris, aut gallinaceum seuum, nec falsum, nec admodum vetus, in ipso oleo liquare, & per sedē infundere, oportet. At si neq; ex hoc remittantur dolores, secundò rursus iniiciendum est idem, adiecta etiamnum castorei & papaueris succi, vtriusq; fabæ non amplius magnitudine. Olei verò hemina modus esto. Excipitur & lanula ex hoc medicamento aliquid: quæ appensa forti filo, quāpenitissimè in rectum intestinum inferi debet: quo utiq; & quum libet, id faciliè recipiatur, & euidentem vtilitatē conferat. Similiter & oculorum, & aurium dolores, qui ab iisdem causis in febre excitantur, sedare conueniet fomēto ex milio. Sed infundimus etiā aurib' medicamentū id quod ex castoreo & papaueris succo cōficitur, sapa liquatū. Quod sanè auri instillatū, oculorū etiā, ac dentiū dolores lenit. Iā verò, si cataplasma imponi aliquando res ipsa suadeat, papauerum capitibus

Alliū auxiliat
dolori colico.

Alliū flatus discutit.

Allium dicitur
theriace rusti-
corum.

Theriace quib'
bus utilis.

Colici doloris
cui sit iuncta fe-
bris, curatio.

Pessari cōfici,
undi modus,
ad leniendos
dolores colicos.

Dolores oculorum,
& aurium
qua ratione leniendi.

Auribus instillatum
medicamentum ex
castoreo: succo
papaueris, & sapa
cōstās, oculorum
atq; dentiū dolores
lenit.

GGg iiii

**Dolori mitigā
do cataplasma
optimum.
Opium recipien
tia collyria, ue
hemētissimos
oculorū dolo
res laxant: tam
etli imbecillio
res ex frigidi
tate ipsas relin
quant particu
las.**

**Cucurbitula
admota, dolo
rem a flatu ex
citātū soluit.**

**Rutaceū oleū
auxiliari iis,
quos dolor co
licus a frigido
succo ortus, dis
cruciat.
Doloris a te
nui humore ex
citati curatio.**

in aqua coctis, ac scœnigræci, vel hordei, vel lini semi
nis farina aquæ immista, cataplasma conficies. Porro
collyria ex opio confecta, vehemētissimos oculorum
dolores laxant: utendumq; his est, quum maxima ne
cessitas vrget. Nam tametsi imbecilliores ex frigidita
te in reliquam vitam ipsas reddant particulas, occur
runt tamen præsentī discrimini: ac postea frigiditatē
ab opio relictam, licet nobis corrigere, tum oleis cali
dis, tum etiam collyriis. Nempe aurib² oleum id quod
solum castoreum recipit, instillamus: oculis verò, ex
cinnamomo collyrium. Qui à solo spiritu flatuoso cru
ciantur, illico cucurbitula admota, tum à dolore libe
ri, tum omnino sani redduntur: in quacunq; corporis
parte dolor sit excitatus. Quib² verò non spiritus mo
dò flatuosas, sed etiam humor quispiam, vnde is orit̃,
uētris dolorē excitat, iis illico ad tempus dolor sedat̃:
reddit tñ vel in sequenti nocte, vel postridie, vel etiā
tertio die similis dolor. Quare in his primū doloris
accessio est curanda: admota scilicet cucurbitula. Po
stea vacuandus humor, infuso per sedem aliquo medi
camento calfaciente simul & attenuatē. Ego verò oleo
quopiam tenuis substantiæ vti assueui, rutā in eo præ
coquens. Quo iniecto, nonnulli ægri paulo post excer
nunt humorem vitreum: atq; ex hoc protinus simul
& à dolore, & ab affectu liberantur. Si dolor ex tenui
acriq; exciteretur humore, qui conuulsiones vehemen
tes etiam inducere solet, si quidem in ventriculo talis
humor consistat, vomitu expellendus est, aqua tepida
propinata: sin autem in intestinis, iniicere per sedem
oportet aliquod medicamen, quod blandē eluere, de
tergereq; eiusmodi humorē possit. Commodissimus
itaq; ad id fuerit cremor ptisanæ. Cibi verò exhiben
di his sunt, qui & boni sint succi, nec facilē corrūpan
tur. Qui ob siccitatem vehementem distenduntur, &
discrutiātur, si curari ii debeant, humectationem desy

derant. Cæterum si affectus is, sit febris occasione con-
tractus, percuratu est difficilis, vel potius curationem
non recipit. Quippe conuulsiones quæ ex plenitudine
neruofarum partium, vel ex humore mordente, vel
deniq; ex ingenti frigore oriunt, curari possunt. Quæ
verò ex neruofarum particularum ariditate proue-
niunt, nullus certè iis ad sanitatem est locus.

Conuulsiones
a plenitudine
quidē orræ, cu-
rari pñt: a ner-
uofarū aut par-
tium ariditate,
minime cura-
tionem admitt-
unt.

G A L E N I P E R G A.
M E N I D E M E D E N D I
methodo. Lib. X I I I.



IN HOC TERTIODECI-
mo commentario acturi de tumori-
bus præter naturam, primo quidem
tractemus de phlegmone, q; hæc &
frequentius incidat, & febres infe-
rat, grauissimaq; iducat symptoma-
ta. Gignitur autem omnis phlegmone ob confluxum
sanguinis, copiosioris scilicet, quam pars postulet: quo
tumore obsessa particula, auctior, quam pro naturali
habitu, calidior, & rubicundior, redditur: tenditurq; ac
tangenti renititur, cum dolore ac pulsatione sensibili.
De phlegmone tamen generatione, varii vario mo-
do opinantur, licet ipsa curandi ratio omnibus comu-
nis existat: nempe vacuatio sanguinis, in particula in-
flammatæ contenti. Cæterum phlegmone quæ etiam
num gignitur, est duplex curationis scopus. Quippe,
quod ex ea generatum iam est, id profligare oportet,
præsidio illius medicinæ partis, quæ morbos curat:
quod verò superest generandum, inhibendū est pror-
sus, beneficio alterius, quam præautricem vocamus.
Porro sanguis copiosior influit, alia quapiam, aliis ue
particulis aliquando eum mittentibus, ac ea quæ phleg

Phlegmone
generatio. 2

Phlegmone
generalis cura-
tio. 3

mone laborare incipit, recipiente: aliquando particula quæ affligitur, ipsum ad se trahente. Sanè quæ mitunt partes, alias vt copia superuacuum, vel qualitate molestum: alias vtroq; nomine succum propellunt.

Quæ attrahunt, ea morbofo calore trahunt. In doloribus, incipit quidem causa ab eo quod affligitur: sed quicqd est phlegmone, id superpositæ partes efficiūt.

4. Tumori præter naturā uarietas pro differentia fluentiū humorum nascitur.

Phlegmonem curaturo quæ sint consideranda.

At uerò tumorum omnium, qui præter naturam sunt, varietas, ex eius quod influit, natura nascit̃. Vbi enī flatulenta materia vberior accessit, flatuosi magis tumores sunt. Phlegmone magis similes, vbi sanguis: sicuti erysipelati, vbi flaua bilis: & œdemati, vbi pituita. Similiter scirrhusi, vbi vel crassus, uel vehementer lentus humor parti fuerit infixus. Cæterum crassus humor quodammodo iam melancholicus est. Lentus autem, ex glutinosus provenit cibis. Vbi igitur particula aliqua, phlegmone vrgeri cœperit, videndum est, an propter calorem aliquem, qui in illa præter naturā sit ortus, an propter dolorem vel ipsius, vel propinquæ alicuius partis, hanc ipsam cōtraxerit: quo scilicet adempta causa, phlegmone non amplius increseat. Dein proximè expendendum est, nūquid vicina aliqua pars sanguinem largius ad particulā phlegmone obsessam transmittat. Postea uerò, num totum corpus plenitudine succorum laboret. Siquidem superuacanea, quæ expelluntur à valentioribus, ea semper in imbecilliores procumbunt. Vnde accidit, vt glandulosa corpora, imbecillima omnium quū sint, facile fluxiones ipsas recipiant, tumoribusq; præter naturam (quos bubones appellant) celerrimè corripiantur: quum alias, tum vel maximè, vbi propter magnam arteriam, aut venam, fuerit vlcus aliquod ortum. Quod si scirrhusior earum partium phlegmone aliquādo fuerit, hæc & curationi renititur, & struma vocatur. Ergo si vel totum corpus plethoricum sit, vel prauo succo redun-

5. Superuacanea expelli semper a fortioribus ad imbecilliores particulas. Glandulæ cut sint maxie obnoxie fluxionibus.

Struma quid. Bubonis curatio.

det, difficilis bubonum curatio redditur. Sin sanū planē sit, facilis. Quippe excalfacere & humectare modicē totum membrum, quo dolor mitigetur, oportet: lana quidem imbuta calente oleo, id circundantes: ipsi autem vlceri tetrapharmacum liquatum oleo rosaceo, calidum, aut etiam Macedonicum pharmacū (quod solo thure tetrapharmacō præstat) ex liniciniō imponentes: atq; insuper calidū cataplasma ex farina vel hordeacea, uel triticea, uel ambabus, aqua & pauxillo olei cōfusus constans, extrinsecus applicātes. Non secus verò, ipsi adeni, qui phlegmone vrgeri cœpit, prima quidē die imponi debet lana oleo calēte madēs, sed citra salē. Cuius postea nōnihil indemus, ubi & tumor per totū membrum remissus fuerit, & vlceris dolor sedatus. At si uel plethoricū corpus sit, vel vitioso succo redūdet, curatio per ea quæ sic calent, fluxionē ad membrū citat: cogimurq; aliās sanguinē mittere, idq; aut vena incisa, aut membris iis, quæ læsa nō sunt, scarificatis. Manu etenim laborante, scarificabis crura. Altero crure malē habente, reliquum. Has nanq; vacuationes indicat ipsa copia: sicuti etiam succorum vitium, redundantis succi purgationem. Sed quæ etiam Græcē dicuntur phymata, glandulis, sicubi fluxio in eas procubuit, citra vlceris occasionem accidunt. Vbi ergo distentæ vehemēter glandulæ sunt, aut alia quæuis particula, quam premit phlegmone, cogimur, toto corpore prius vacuato, ipsam scarificare. Sanē vacuamus totum corpus, etiam quum mediocritatem succorum continet, si morbi magnitudo id suadeat. Siquidem dolor, & membri inflammati calor, etiam si purum ab excrementis sit totum corpus, fluxionis causæ fiunt. Tunc tamen parcius vacuare expedit: idq; habita ratione ætatis, naturæ, anni temporis, regionis, ac deniq; consuetudinis ipsius ægrotantis. At vbi iā phlegmones ipse vuluti feruor subsedit,

Manu laborāte
scarificanda est
se crura.

Crure altero af-
fecto, reliquū
scarificandum
est.

Phymata.

Phlegmone af-
fectas particu-
las qñ sacrifica-
re cogamur.

Vacuare qñ so-
leamus corpus
etiā si medio-
critatem succo-
rum contineat.

Fluxionis cau-
sæ sunt dolor
& membri ca-
lor.

Phlegmone qñ
sit digerenda.

Phlegmones
curationi ad-
uersari dura
medicamenta.
Phlegmonem
suppurantē, nō
esse incidendā
protinus, sed di-
gerendā medi-
camentis ad id
ualentibus,

Abscessus qñ
secandus sit, &
qua in parte.

Sectionis for-
ma qualis esse
debeat in sup-
purante parti-
cula.

Inguinis sup-
purati sectionē
p̄ transversum
esse ducendā.

mitigatoriis emplastris dimissis, ad ea quæ digerunt, paulatim est transeundum. Ac primum cum mitigato-
riis ipsis paulum mellis miscendum. Mox triticea fari-
na in totum est auferenda, contentis hordeacea cum
melle vberiore. Deinde ad aliquod eiusmodi digeren-
tium medicamentorum veniendum, quæ vel humida
consistentia sint, vel cerati specie. A duris autē est ab-
stinendum. Nam & phlegmonarum reliquias contra-
hunt, & rursus phlegmonem in ægra particula exci-
tant. Quod si pus aliquod notabile in suppurante par-
ticula sit contentum, non expedit incidere protinus,
sed digestionem moliri medicamentis ad id ualentib⁹.
Quum autem quod ex phlegmone ipsa relinquit, scir-
rhosum effectum videtur, fidenter iam ualentib⁹ me-
dicamentis vtēris. Si quando ergo ægram partē medi-
camenti acrimonia irritatam videris, mitigabis eā in-
terea fomento, quod per spongiam administrabis. Id
autem aliquando ex aqua dulci esto: aliquando etiā sal-
habente, vbi scilicet scirrhosiores sunt phlegmonæ.
Sin aliquando puris copia medicamenta superet, nec
ea videantur tibi totū digerere posse, quod sic absces-
sit secare, eo potissimum loco oportet, quo est editissi-
mum: obseruata interim effluxus indicatione. Quip-
pe tenuissimam illic etiam cutim inuenies. Post sectio-
nem verò, medicamentum aliquod, eorum quæ sine
morsu siccent, impone. Quod si computruisse portio
aliqua suppurantis partis videbitur, excidi eam est ne-
cesse. Sectio igitur qua vtēmur in suppurante particu-
la, myrti imitetur folium, sitq; planē non magna: qua-
li nos semper contenti fuimus. Cæterum quum in tali
incisione longitudo maior q̄ latitudo sit, esto in ingui-
ne longitudo per transversum ducta: non autē per re-
ctitudinem membri. Quippe ita dum membrum infle-
ctimus, naturaliter cutis sibi applicatur. Post excisam
cutim, medicamento, quod mannam vocāt, affectam

partem implebimus. Est enim ea purgamentum thuris leui astringione prædita. Quo nomine etiam thure ipso ad nonnulla vtior. Thus liquidem, puris tantum mouendi facultatem obtinet: vtpote nullam astringendi vim habens. Magisq; id facit, quod pinguius ex eo est, & magis albicans. Sicuti quod magis est flauum, potentius siccatur. Mannæ verò, etiam corticis thuris paululum est admistum, vnde astringentiam vim habet. Ipse autem cortex thuris, tum astringit, tum siccatur insigniter. Itaque eo solo vtimur ad sanguinis perfusiones. Quin etiam mitigare prius incisam partem oportet: fomentis primum: dein cataplasmate: mox humectante aliquo medicamine, aut non siccante: singulis scilicet extrinsecus impositis. Nam in ipso vlcere tum mannam, tum pus mouentia, dein quæ expurgant, sunt imponenda. Post quæ si cavitatis etiamnum adsit, quæ impleant adhibenda sunt. Sin minus, ea quæ cicatricem inducant: veluti quod ex cadmia conficitur. Vtendum verò medicamentis id genus est, prius quam vlcus ad æqualitatem prorsus impletum fuerit: ne ipsa fortè cicatrix circumposita sit cute eminentior. Porro vbi æquabiliter inter se succi omnes sunt aucti, plethora, siue plenitudo is affectus vocatur. Vbi verò vel flaua bile, vel nigra, vel pituita, vel serosis humoribus refertum corpus iam fuerit, eum habitum cacochymiam vocamus. Ergo plethora, tum sanguinis missione curatur, tum balneo frequenti, tum exercitatione, tum frictione: præterea digerentibus medicamentis, atque etiam inedia. At succorum vitium, purgatione, quæ redundanti succo sit accommodata, corrigitur. Cæterum si iam æger febricitet, nec exercitatione vacuare licet exuperantiam, nec vntione quæ calefaciat, sed nec multa frictione, nec balneo: imò sanguinis missione, vna cum inedia, vel purgatione aliqua. At si non febricitat, omnibus iam dictis vtare, optimū quodque ad id quod

Mannā thuris
buboni secto
spargendā esse.

Thus puri mo
uendo idoneū,
nullā astringen
di vim habet.

Thuris cortex
astringit & sic
cat.

Incisas partes
esse aliquo fo
mento circa in
cisionem leniē
das.

Vlceris in par
te secta relicta
curatio.

Cicatricē indu
centibus medi
camentis uten
dum esse, prius
quam totum vlcus
prorsus imple
tum fuerit.

Plethora quid.
Cacochymia
quid.

Plethoræ cura
tio.

Cacochymiae
correctio.

6.

Crura phlegmone obfessa quomodo sint curanda.

Phlegmone super narum partium quomodo sit curanda.

Reuulsio debet fieri in contrarium earum partium, quae phlegmone urgentur.

Phlegmonis in cipientibus, frigida & astringentia magis quam digerentia conueniunt.

Phlegmone quam sint digerenda.

Phlegmones a punctu morfuue animalis excitatae curatio.

Virus a bestia relictum, qua ratione vacuandum.

instat, diligens. Verum cui crura laborant phlegmone, ambulatione vel cursu exercitandus non est: sed nec stare iubendus. Satiuste quippe est, ut sedens fricetur plurimum: moxque manuum motu exerceatur. At si quae ex supernis partibus urgeri videatur phlegmone, huic motus ex inambulatione aut cursu est admodum salutaris. Similiter & frictio ea tunc potior est, quae cruribus adhibetur, illis quae in supernis partibus administrantur. Siquidem in omnibus talibus reuulsio debet fieri in contrarium. Neque igitur quum vel circa sedem, vel aliquam huic partem vicinam, initium phlegmones incidit, alium deiciet. Neque quum in vesica, vel cole, vel renibus cepta est, pharmaca quae urinas prouocent, bibenda dabis. Nec si mulieri in utero, vel pudendo insedit, menses huic prouocabis, sed ad partes quae maxime longinquae sint, semper reuulsionem molieris: aestimata tum phlegmones magnitudine, tum corporis totius statu. Nam si plurima succorum abundantia sit, nec exercitatione, nec balneo sine periculo utare. Sin exigua sit, licet & per haec vacues. Iam vero, si phlegmone oborta sit ab affectu partis quam vexat, primo quidem affectus ille sanandus est: mox quicquid ex phlegmone est genitum. Quae ambo interim iisdem praesidiis tolluntur. Caeterum ad incipientes phlegmonas, frigidis astringentibusque magis utendum est, quam iis quae digerunt: atque etiamnum magis, ubi crassum quod confluit non est. Sed si sanguis in inflammata particula vehementer impactus fuerit, non est amplius utendum repercutientibus: sed tunc digerere est tempestiuum. Quod si ex animalis punctu, morsuue dolor incidit, a quo exorta sit phlegmone, duplex sanandi doloris ratio est, vel virus ipsum vacuando, vel quod dolorem excitat, alterando. Ac vacuabis sanum id, eorum medicaminum ope, quae vehementer attrahunt. Alterabis iis quae sunt contraria. Vacuant itaque

tum calfaciētia oīa, tū quæ ad se citra calfactionē alli-
ciunt: vt cucurbitulæ, & cornua quædam. Sunt qui &
ore suo virus extrahant. Huc pertinet & cauteriū, &
medicamenta quæ cauteriis similiter escharā efficiūt.
Alterum auxiliorum genus est eorum, quæ qualitatē
per contraria alterant. Variantur autē medicationes,
pro laborantium particularum diuersitate. Vna quip-
pe indicatio ex similaribus sumitur partibus. Altera ex
instrumētariis. At ea quæ ex similaribus sumit, modū
calfaciendi, refrigerādi, siccandi, & humectandi deter-
minat. Quæ verò ex instrumētariis, tum locū ipsum, p-
quem vacuare oportet, tū vacuationis rōnem, tum ve-
rò in similis spēi medicamentorū vsu ipsum pluris mi-
norisq; modū. Porrò vacuationis indicatio in phleg-
mone, refrigerationis indicationē vincit: contra q̄ in
erysipelate. In hoc nāq; refrigerationis indicatio ma-
gis urget, q̄ vacuationis: etsi vbi refrigeratū erysipelas
est, ad ea quæ digerunt medicamenta conuertimur. At
in phlegmone tantisper refrigerandum est, quatenus
& ad incrementum eius sistendum, inhibendumq; est
commodum. Quippe refrigeratio repercutit id quod
affluit, & ex eo quod in laborante continetur particu-
la, aliquid in proximas partes repellit. Simili modo &
quæ modicē excalfaciunt, utraq; interdum rōne pro-
sunt, q̄ & dolorem sedent, & contenta in parte ægra
digerant. Siquidem mitigando dolorem, augeri phle-
gmonas vetant: digerendo, quod earum iam con-
ceptum est, sanant. Si iecur inflammationem con-
trahere cœperit, ac totum corpus egeat inanitione,
virtusq; valida sit, atq; æger pubertatem at-
tigerit (puer enim, quæ per dissectam venam fit,
vacuationem non feret) pariter tum reuellendus,
tū educendus qui ad ipsum fluit sanguis est, interna
in dextro cubito infecta vena: propterea quod & ē
directo, & ampla via, cum vena quæ caua dicitur,

Medicationes
uariari pro la-
borantiū par-
ticularum di-
uersitate.

8.

Erysipelatis
curatio.

Refrigeratio-
nis usus ī phleg-
mone.

Calfacientia
modice dolorē
sedāt, & contē-
ta in parte in-
flamrata dige-
runt.

Hepatis inflam-
mati curatio.
Pueri sectionē
venæ nō ferūt.
Sanguinem ua-
cuari & reuelli
ab hepate, se-
cta interna de-
xtri cubiti ue-
na.

11.

Vena interna non apparēte, mediā, aut humeralē secādam esse.

Reuulsionē eē molendam q̄ longissime a tē tata fluxione particula.

Apophlegmatismos fugendos eē, ubi partes oris sunt in flammatae.

Phlegmone occupate oris particulas, diuertēdum ad nares esse, secandāq; humeralē i manu uenam, aut mediam.

Venae secandae ratio i iecoris, pulmonis, pectoris, cordis, faucium, occipitis, renum, uesciae, pudendi, & uteri affectibus.

societatem habet. Hac non apparente, media secanda est. Quod si nec illa se ostenderit, reliqua & tertia incidenda venit. Ac modum quidem vacuationis, ex redundantiae modo, etate, natura, anni tempore, regione, consuetudineq; atq; ante haec, ipsa laborantis virtute, inuenies. Venae autem secandae electio a parte laborante indicatur. In vniuersum autē, quā longissimē a tentata fluxione parte quod redundat reuellere, nequaquam ad eam trahere cōuenit. Hac ratione, nec si hepar, aut ventriculus, aut intestina phlegmone occupare iam cōeperit, medicamine quod alui deiiciat, uti conueniet. Eandem cum his indicationē & uterus sortitur, sicuti cum urinae vasis pudenda. At vomitu uti pudibundis laborantibus, in diuersa reuellens auxilium est. Eadem ratione in omnibus quae circa caput accidunt, alui subductio, in contrarium auertit. Si quae verò circa fauces, & palatum, aut linguam, aut deniq; in ore phlegmone laborare cōeperint, in his omnibus cauenda sunt, quae pituitam per os euocant: Graeci apophlegmatismos appellant. Satiū nāq; tunc fuerit deriuare ad nares: incidereq; humeralē in manu venam: vel, si ea non cernitur, mediam. Vbi iecur, pectus, pulmo, aut cor sic afficiuntur, internam. In angina primas in manibus: secundas eas quae sub lingua habentur. At iis quae in occipite sunt afflicti, etiam eam quae in cubito est, nec non eam quae habetur in fronte. Renibus verò, & vesica, & pudendo, & utero sic habentibus, eas quae in cruribus sunt sitae, ac potissimum quae sunt circa poplitem. Sin minus, eas quae sunt iuxta malleolum. Ac perpetuò quidem in omnibus, eam quae ē directo est. Vbi iecur phlegmone inuadit, quae in dextra sunt manu: ubi lienem, contra. Itaq; statim prima vacuationis diuersitas pro particularum diuersitate variatur: constatq; communem, q̄ sit vacuandum, indicationem, non magis esse utilitatis q̄ noxae causam.

Porro

Porro ubi pectus, aut ventriculus, aut partes circa col-
lum caput ue laborant phlegmone, etiam excogitatu
est artus vincire. Quippe ipsum quod infestatur phleg-
mone, haudquaquam vincendum est. Sed si in mani-
bus sit phlegmone oborta, crura. Sin in cruribus, ma-
nus. Iam vero nec refrigerare inter initia, aut astringe-
re, citra laborantis particulæ indicationem, vtilitatis
magis quam noxæ sunt causæ. Nam particulis quidem
quæ iuxta artus sunt sitæ, tutò ministrare possis frigi-
dam aliquam fomentationem. Iecinori verò, si phleg-
mone infestari cœperit, non licet inponere actu frigi-
dum, aut fomentum, aut cataplasma. Rursus astringēs
oleum, nec oculis, nec oris partibus admouebis, sicubi
hæc tentari phlegmone cœperint. Auri verò, etiam si
acetum cum rosaceo infundas, nihil offendes. **Victus**
etiam, pro partium ratione variatur. Quippe iis quib⁹
glandulæ, aut aliquid circa artus tentatur phlegmone,
tot & talia exhibenda sunt, quot & qualia facillimè cō-
coquentur. At si iecur ventriculus ue infestetur phleg-
mone (quum munus eorum sit toti animali commune)
victu exquisitissimo est opus: qui videlicet mea-
tus aperiat, detergeatq; citra rosionē: ac breuiter om-
nis tenacitatis sit expers: qualis utiq; in cibis est ptisa-
na, & in pharmacis oxymeli, aqua distemperatū. Cæ-
terum dulcibus omnibus tum iecur, tum lien intume-
scit. Iam verò astringētia omnia mala, iecinoris phleg-
monis sunt incōmoda, præsertim iis, quæ in cauo eius
consistunt. Similiter ea quæ mordēt, phlegmonas quæ
in cauo sunt visceris, q̄ quæ in gibbo consistunt, magis ir-
ritant. Iis quippe quæ in gibbis sunt, mutata iam ve-
niunt quæ assumpta fuerunt: & q̄ prius concocta sint,
& q̄ sanguini, qui in iecinore prius erat, admista. Cauo
autem iecinoris, phlegmone obfesso, protinus etiā ve-
nas quæ in mesenterio sunt, vnā phlegmone laborare
est necesse: quū ex vena portæ exoriantur: protinusq;

Tomus. III.

HHh

Vincula nō es-
se inficienda in
flammatæ par-
ticulæ: sed illi
quæ opposita
est. 12.

Iecinori, si phle-
gmone infesta-
ri cœperit, ni-
hil actu frigi-
dum esse ap-
plicandum.

Auri inflamma-
tæ nihil noce-
bis, uel si ace-
tum cum rosa-
ceo infundas.
Victus p par-
tium ratione
uariatur. 13.

Victus iecori
uentriculoq; in-
flammatō con-
ueniens. 14.

Dulcibus intumescit tū iecur
tum lien.

Cauo hepatis
phlegmone ob-
fesso, uenas
meseraicas si-
militer inflam-
mari.

15.

Iecur phlegmo-
ne obsessū, cur
mediocriter a-
stringendū sit,
per cataplas-
ma mistæ ma-
teriæ.

Hepatis partes
per quas uias,
& quibus pur-
gandæ remediis

Hepati phleg-
mone obfesso
quales clysmi
conueniant.

Scirrho eē op-
portunissimū
hepar lienēq.
Lienis substā-
tiā q̄ hepatis,
esse ratiorem.
Lien crasso nu-
tritū sanguine.
Renes facile
scirrhū con-
trahunt.

16.

etiam, quæcunq; osculis earum incidunt, vim suam ostendere. Porro ubi iecur phlegmone obsessum est, mediocriter astringi per cataplasmata mistæ materiæ debet, q̄ altricis facultatis principii animalibus sit, & venosum ab hoc exoriatu genus. Vt autem iecinoris cauum per aluum purgatur, sic gibba eius, per ea quæ modicè vrinas mouent. Cuius generis apium existit. Procedente autem tempore, ubi phlegmone iam concoquitur, etiam valentioribus uti licet: ut assaro, celtica nardo, phu, petroselino, smyrno, & meo: sicuti etiam per ventrem vacuare, si cauum afficitur, cnico cibis admisto, & vrtica, & mercuriali, & epithymo, & filicula: omnibus præterea quæ modicè aluū deiciunt. Magisq; in remissionibus, tum his ipsis audacius quàm ante utendum: tum verò quæ iis sunt valentiora, partim in ptisana incoctis, partim tunsis, ac in mollissimū puluerem reductis. Exhibenda verò & hæc sunt vel ex ptisana, vel ex aqua. Ego namq; etiam filiculæ aliquid in ptisana aliquando incoxi, & nigriveratri corticem. Sed clystere etiam ipsos vacuare expediet: inter initia quidem, vel sale, vel nitro, vel aphronitro cum multa distemperatis contentis: in remissione verò, potissimumq; si quid scirrhosum relictum è phlegmone est, etiam valentiora medicamenta miscentibus nobis. Quippe hyssopum eo casu aquæ incoquimus, & origanum, & colocynthida, & minus centaurium. Opportunissima namq; ad scirrhū sunt iecur, lienisq; , si quis, parum habita de his ratione, glutinosis cibis utatur. Etenim substantia lienis, tametsi rarior quàm iecinoris sit (est enim illius substantia lutosā) crebrius tamē scirrhosis vitiis affligitur, propter nutrimenti, quo alitur, speciem. Siquidem crasso nutritur sanguine, q̄ veluti litmus purioris est, facillimeq; nigra bilis efficitur. Renes etiam facilè scirrhosis deprehēdi, atq; iccirco nephritidas alias omnino solui non posse, alias ægrè solu-

biles esse, ratio docet: quum & crassa substantia sint, & non careant excrementorū vitio. Quo fit, vt qui crassi succi cibis vescuntur, calculi vitio vexentur. Medicina igitur horum affectuum, ea esse constat, quæ dissecent, dissoluant, & frangant. Quæ uti p̄ ex eorū sunt genere, quæ obstructions eruant, atq; detergent: cæterū viribus valentiora. Curationem aut̄ vnā indicāt, virtus, natura, ætas, anni tempus, regio deniq; cōsuetudo q; Iecinore itaq; laborāte phlegmone, quæ extrinsecus applicant, ea mistæ esse facultatis debent: idq; non in gñatione phlegmones mō, sed etiā quum nec affluit amplius quicq; nec repelli qđ in laborante particula continet, potest. Quo quidē tempore duplex nobis indicatio suggerit: altera quidē à phlegmone, sui euaporationē poscente, nimirū digerentia: altera verò ab affecta parte, quæ per astringētia robur eius seruari iubet. Quare coeuntibus vnā cōtrariis indicationibus, compositū quoq; esse medicamentum oportet: nēpe astringens simul atq; relaxans. Verū tuendi roboris indicatio, in iis tantū partibus est cōis, quarum munus ex v̄su est vniuerso corpori. Igitur nec lienem tantū relaxantibus curare oportet, quū hic quoq; ex iecinore qcqd limosum & melancholicū est expurget, propterea scilicet, q̄ ex eo humore nutritur. Iccirco quoties obstructio aut phlegmone, sed præcipuē scirrhusa, in eū incidit, tum ea quæ obstructions eximāt, tum quæ dissecēt, uehementiora exigit. Nam quale medicamentū iecinori absynthiū est, tale est lieni capparix cortex. Quale rursus iecinori est eupatoriū, tale scolopendrium lieni. Siquidē similia genere medicamenta, quemadmodū & nutrimenta, ambo viscera postulant: cæterū tanto valentiora & acriora, lien, quāto crasfiore utitur alimento. Iamverò quum gibba iecinoris expurgari per renes oporteat, sicuti caua per inferiorem ventrem: lieni sanē per renes nulla admini-

Calculos q̄ so-
leant gignere.
Calculis quæ
medicamenta
congruant.

Hepatis inflā,
mari curatio.

Lien nutrit̄ ex
melancholico
sanguine, quē 17.
expurgat ab
hepate.

Lien obstructū,
aut inflāmatū,
qualia medica-
mēta postulet.
Lien hepatis
similia nutri-
menta & me-
dicamenta re-
quirunt.

Lien crasfiori
utitur alimēto
q̄ hepatis.
Hepar per quā
regionē uacue-
tur.

Lien per inte-
stina uacuatur.

strari potest vacuatio: sed tantummodo per intestina. Proinde ubi phlegmone premitur, deiectionis ipsum medicamentis tum detergemus, tum lacesimus, quo demittat, deponatque superflua. Est autem duplex ratio eiusmodi medicamentorum usus. Nempe, ubi partes superius sitae laborant, per ea quae eduntur, bibunturque. Quum inferiores, per id quod sit per clysterem infusum. Quandoquidem quae eduntur ac bibuntur, eorum vis, antequam ad inferiores partes perueniat, resoluitur. Quae infusa sunt, ea omnino ad ieiunum usque ascendere nequeunt. Porro gula (quae stomachus proprie vocatur) affecta, cataplasmata super dorsi spinam imponimus: non autem in anteriori parte: quod facimus, ubi phlegmone os ventriculi urgetur. Siquidem spinæ gula superiacet, per collum & pectus deorsum usque ad ventriculum exporrecta. Iam quemadmodum lien & iecinoris caua, per intestina: gibba illius, & renes per urinas purgantur: sic pectus, ubi interna eius tentantur phlegmone, per succingentem membranam, aliquid in medium sui pulmonumque spatium transmittit. Id autem expurgari per eandem qua pulmo viam debet. Propinanda igitur iis qui sic affliguntur sunt, quando quidem ipsa inualescit phlegmone, medicamenta quae mediocriter vias aperiant, & crassos humores dissoluant: ut ptisana & mulsa: in exquisita autem declinatione phlegmones, dum educi iam excrementa postulant, quae id valentius moliantur: ut vrticæ semen, & mulsa, in quam fuit coniectum paululum acrium herbarum: quales sunt origanum, hyssopum, calaminthe, pulegium, & illyricæ ireos radix. Oxymeli etiam quod ex marrubio conficitur, crassiora pectoris pulmonisque excrementa incidere potest. In vniuersum autem quae in alto corpore affliguntur phlegmone, ea partes paulo acriora, quam pro phlegmones natura, medicamenta desiderant. Resoluntur siquidem eorum vires, dum

Clysmos non
posse usque ad
ieiunum ascen-
dere.

18. Gula affecta,
cataplasma, ef-
se applicandum
super spinam
dorsi.

Pectus per quam
regionem pure-
getur.

Pectori phleg-
mone obfesso
quae medica-
menta conue-
niant.

19. Inflammationes
altius sitae, cur
paulo acriora
medicamenta
postulent, quam
pro ipsarum ra-
tione.

altè descendunt. Hac ratione & cucurbitula (strenuū planè auxilium) est inuenta, tum vt foras euocentur quæ sunt in alto, tum vt eximantur & eruantur, quæ iam in scirrhum abeunt. Verùm vtendum cucurbita in ipsa parte quæ phlegmone vrgetur, inter initia non est, sed postea q̄ vniuersum corpus vacuaueris, * atq; ex vsu iam esse videatur, eorum quæ in inflàmata particula continentur, aliquid aut vacuare, aut versus exteriora reuellere. Proinde vbi affectus * etiamnum in generatione consistunt, minimè ipsis membris quæ laborare incipiunt, sed iis quæ continua his sunt, cucurbita imponi debet, auellendi in cōtrarium causa. Sic namq; ad mamillas cucurbitas imponimus, quum sanguis ex vtero profluit, defixo maximè in ipsis communibus pectoris & vteri vasis, eius ore. Sic si è naribus sanguis profunditur, præcordiis maximas cucurbitas affigimus. Sic & omne aliud sanguinis profluvium, ad contrarium per communes venas auertimus. Quemadmodum rursum & sanguinem (si ita est opus) attrahimus. Siquidem quum menses euocare in animo est, pubi & inguini cucurbitam affigimus. Ad hæc, in occipite cucurbita defixa, efficax est remedium ad oculorum fluxiones. Vacuari tamen prius totū corpus expedit. Nam si refertum sanguine corpus sit, in quacunque parte capitis cucurbitam defixeris, totum ipsum implebis. Aduerte autem, vbi dicimus astringere incipientem phlegmonem esse opus, nō quodlibet astringens in iis quæ deuoranda sunt, exhibendum esse: sed ea tantum, quibus nulla corruptrix admista vis insit. Nam chalcanthus inter præcipua astringit, sicuti etiā misy, & sori, & chalcitis, & diphriges, & æs vstum, & squama eius, & flos. Verùm hæc medicamenta noxia deuorata sunt. Quocirca stomaticis ea miscere tutum non est. Defluit namq; interdum ex his aliquid ad ventriculum. Sed nec aloen probè miscueris iis medicamentis,

Cucurbitula
quorsū inuēta.

Cucurbitula
qñ utendum.

Cucurbitula
quorsū ad mās
affigi so-
leant.

Cucurbitulas
sanguinem a
parte reuellere
atq; ad ipsam,
si fuerit opus,
attrahere.

Cucurbitulapū
bi affixa, men-
ses euocat:ocu-
lorū aut fluxio-
nes reuellit oc-
cipiti admota.

Cucurbitula
non esse uten-
dum, prius q̄
uniuersum cor-
pus uacuetur.

Aloen miscen-
dam non esse
medicamentis
q̄ gratia phle-
gmones propi-
nātur: nisi aliu
uelimus deici-
cere.

Aluum tuto e.
mollentia.

21.

Lethargus est
affectus cōtra-
rius phrenitidi

Animā rōnalē
cōsistere in ca-
pite.

Principis animę
facultatis sym-
ptomata singu-
la unde profici-
scantur: & qua
ratione sint cu-
randa.

Oxyrhodinū
quibus conue-
niat affectib⁹.
Affectuum qui
cum peruigilio
& delirio infe-
stant, curatio.

quæ phlegmones alicuius causa, quæ intus constiterit, deuoranda sunt. Quando huic quoq; purgandi uis quædam inest. Cæterum ubi phlegmone prorsus inclinauerit, si quis paululum aloes admisceat, deiciendi vëtris gratia, qui prorsus non deiecerit, nihil lædet. Quæquæ satius fuerit mercuriali, aut vrtica, aut cnico, aluū sic laborantium subducere. Admodū itaq; necessaria est indicatio quæ à particulis sumitur. Quæ nec ipsa sat est ad curandos morbos, nisi etiam methodos de medicamentis didiceris. Vt autem ad affectus capitis iam nostra reuocet oratio, oxyrhodinū, quo caput phreniticorum pfundimus, sanē vniuersos redarguit, quicūq; principem animæ partē in corde statuunt. Siquidē per id genus affectus, nō capiti, sed pectori præsidia admo uenda essent. Atqui non in phrenitide modò, sed in lethargo etiā (quod vitium illi contrariū quodāmodo secundum spēm existit) vniuersi applicant ipsa remedia capiti, in quo scilicet princeps animi pars residet. Ergo quum humor qui in capite redundat frigidus est, insensibilitas imobilitasq; hoīem opprimunt: quū uerò calidus est, perpetuus potius motus, vnā cum rōnis noxa. Accidit enim segnitia ex frigore: ex calore imodicus motus: ex humoris verò vitio, dementia. Igit̃ in eiusmodi affectibus, si virtus valida sit, ac nihil aliud prohibeat, vt crudi humoris copia, vel ætas puerilis, uel anni tēpus, vel regio in qua sit extrem⁹ calor, vel frigus, statim ab initio vena tūdenda est. Atq; hoc quidē cōmune utriq; uitio, & ei quod cū sopore, & ei quod cū uigiliis incidit. Cōmune præterea utriusq; est, ut oxyrhodinū in principio admoueas. Nam repellendus à capite humor est, quisquis is fuerit. Quæ sequunt̃, cōtraria sunt. Nā quæ cum uigiliis coniuncta sunt, ea lenire expedit: quæ cū imobilitate, excitare. Iure ergo quū in summo incremēto sunt, iis uitis quæ puigilio & delirio infestāt, perfusiones ex papaueris capitibus appli

rabimus. Odorē quoq; naribus obiiiciemus: ac narium
 alas intus, uel frontē ex similibus medicamentis illine-
 mus. Quippe sopire, ac stupefacere principē facultatē
 oportet: cerebrū scilicet, quod supra modū icalui, re-
 frigerando: in cōtrariis aut uitiis excitare: ac noxii hu-
 moris, q; citra putredinē, & citra febrim, altos sopores
 iuehit, crassitudinē icidere, excofacereq;: Tales nimi-
 rū altos sopores, Græci apoplexias, caros, & catochas
 appellāt. Quod si qñ humor putrescat, utiq; cum febrī
 incidunt ea genera: vocaturq; morbus Græcē lethar-
 gus. Incoquentes igit in aceto thymū, & pulegium, &
 origanū, aliaq; id genus, naribus sic affectoꝝ admoue-
 bimus, quo uapor sublatu ad cerebrū, humoris cras-
 situdinē dissecet. Mox etiā palatum ualentibus & acri-
 bus medicamētis ungemus. Ab his uerō etiā sternuta-
 mētis utemur: cū capiti similes præsidiorū facultates
 imponemus, adaucta semp eorum, etiā ad ipsum vsq;
 sinapi, uehementia, si uitiū diu pseueret. Quinetiā cucur-
 bitis ad utrūq; uitium, si diutinu sit, utemur: itemq; ca-
 storeo: qppe quod ipsum probē cōcoquit, debitē admi-
 nistratū. Quoties aut medicamenti alicui vim exactē
 ad cerebrū descendere uoles, ad coronalē uocatam su-
 turam (cuius plurima diuersitas in hoībus est) id appli-
 cabis. Nā præter reliqua, tenuissimum, & rarissimū eo
 in loco est craniū. Cōmodius etiā fuerit, si & cū infri-
 ctione id facias, aut tōsis capillis, aut etiā planē abrais.
 Quod si humidū sit quod applicandū est, si id ex alto ef-
 fundas, ac ueluti fontis ritu illidas: qppe penitus intrō
 ab ictu magis impellit. Sicuti aut hīc uehementior hu-
 moris casus ꝓducit, ita ī oculis aduersat. In capite nāq;
 insensile os est quod ferit: in oculis mēbranosa quædā
 & ibecilla, maximeq; sensilia corpora. Et ī capite qdē,
 aliud est quod ictū excipit: aliud quod curatur: quodq;
 ut ictum non sentit, ita facultate, quæ ex incussu ad
 ipsum peruenit, fruitur. At in oculo, quod est curan-

Affectuum qui
 cum sopore in-
 uadūt, curatio

Lethargus qd.

Coronati sutu-
 ræ esse appli-
 canda medica-
 menta, quorū
 uim exacte ad
 cerebrū descē-
 dere uolumus.
 Capiti institu-
 ta fomenta hu-
 mida, esse illi-
 cēda ab alto.

HHh iiii

Oculorū phlegmonas iuuat albumen cui.

Oculorū dolor unde exoriat.

Oculorū morbus curatio.

Oculorū inflā-
mationi qñ, &
cur balneū cō-
ducat.

Oculorū distē-
tionis a pleni-
tudine curatio.

Oculorū a fla-
tulenta substā-
tia extensorū
curatio.

Foenigræci decoctū oculorū
tēfioni cōfert.

dum, idem valenter feritur. Quare infundere huic seri-
sim medicamenta, liquata humoribus mitissime facul-
tatis, oportet, attollentes palpebram superiorem blan-
disimè. Meritò autem commendatur ad phlegmonē
oculorū, ex oui humore, id quod tū glutinosum est,
tum minimè mordens. Cæterum quæ terrea corpora
oculariis medicamētis miscenda sunt, ea lænigari ex-
actissimè debent. Dolent porrò vehementer oculi, aut
ex vehementi acris confluentis humoris morfu: aut
q̄ eorum tunicæ plenitudine distendātur: aut propter
crassorum humorum, flatuosiue spiritus extensionē.
At morsum quidem, tum purgantibus medicamētis,
deorsum nempe reuellendo, & vacuando, curare con-
uenit: tum ipsi particulæ oui humore infuso, quo per
eum acris fluxio sine offensa eluatur. Vbi autem con-
cocta iam ipsa phlegmone fuerit, & simul corpus va-
cuatum, tum utiq; lauaciones in balneo his sunt aptis-
simæ. Nam & dolorem statim sedant, & fluxionē quæ
ad oculos fertur, sistunt, maxima quidem eius parte
inter lauandum per totum corpus excreta: reliquo ve-
rò temperato. At distentionem quæ ex repletionē
prouenit partis, missione sanguinis, & alui deiectione,
& infernarum partium frictione, curare conueniet.
Quòd si necessitas aliquando vrgeat, etiā ligandis ar-
tubus: mox fomentis ex aqua dulci modicè calida, la-
boranti particulæ adhibitis. At humorum, vel flatuosi
spiritus extensiones curabimus, vacuato prius in his
quoq; toto corpore: sed & humorum momento auer-
so deorsum. Mox localibus remediis vtendum: nō ta-
men medicamentis iis quæ repercutiant, ac reprimāt,
sed potius iis quæ discutiant. Igitur fœnogræci deco-
ctum iis infundendum est: quòd omnium maximè si-
ne offensa digerat. Verū tum reliquos morbos, tum
phlegmonas, sicubi curas, nullo euaporante auxilio
prius fidenter vtēris, quā totū corpus, aut pars quæ

excrementum transmittit, vacuetur: aut contrariis qualitatibus alteretur, si aliquam intemperantiā fortatur, quæ ipsius fluxionis existat causa. Sic enim diutinas oculorū fluxiones curam⁹, oculis ipsis dimissis, atq; ad capitis custodiam conuersi. Plurimum autē vel frigida intemperies caput vitiat, vel humida: nec dubium est, quin etiam ambæ congregiantur. Rariores sunt, quæ propter calorem, acrem oculis fluxionē imittunt. In quibus oleo crudo & Hispano, & rosaceo, vti expedit: tū frequenti ex aqua dulci in balneo lauatione. Quod si arteriæ, venæ uel quæ iuxta oculos sunt, imbecilliores sint redditæ, adeo ut aliorum vasorū superuacua recipiant, aliqua earum parte excisa, aut etiā totis abundē altè præcis, dura cicatrice quod interest intercipientur. Cæterum in reconditis vasis hoc fieri nequit: ac proinde eorum vitia ægrè curationem recipiunt. Vasa verò conspicua, vel absq; chirurgia, licet corroborare: illitis medicamentis, quæ robur inserāt. Est & quando calidus sanguis, ac vaporum plenus, ad caput ascendit, ac maximè in arteriis redūdat. Cui vitio saluberrimum est remedium, ut eæ incidantur arteriæ, quæ circa caput & calidiores apparent, & maiorem exhibēt pulsum. Quæcūq; verò & paruæ, & prope cutem resident, harum vel si partem aliquam excideris, veluti facere in varicibus crurū solemus, aptius erit. Quod si inter nudandū appareat tibi vas magnū, aut magnum exhibere pulsum, tutius fuerit vinculo id prius excipere: mox quod in medio est, præcidere. Sunt autem eiusmodi vincula ex materia aliqua minimè putrescibili. Potissimum si iis arteriæ sint excipiendæ. Etenim quæ caro in abscisis vasorū partibus coalescit, ea pro operculo est, atq; ipsoꝝ oscula cludit. Quod quidē ubi factum iam cernimus, decidere tunc tutò vincula pōt. Ac sic etiam varices curamus quæ dilatatæ sunt uenę, potissimū circa crura & testiculos.

Digerentibus non esse utendum intrepide prius q̄ uniuerso corpori, aut parti quæ excrementū trāsmittit, consultū fuerit.

Oculis vasa adiacentia præcidenda tūc esse, dum imbecilliores redditæ, aliorum vasorum excrementa recipiunt. Vasa cōspicua posse absque chirurgia corroborari, illitis medicamentis quæ robur inserant.

Vasa excidendi ratio.

Varices quæ ratione curentur,

GALENI PERGA MENI DE MEDENDI methodo. LIB. XIII.

Erysipelas un-
de gignatur.



Erysipelas quō
a phlegmone
differat.

Phlegmones
gñatio & sym-
ptomata.

2. Erysipelas qd.

Phlegmone e-
rysiplatosā.

3. Erysipelas
phlegmonosū.

AVD LONGE' VERO' AB-
est à phlegmone alius morbus erysi-
pelas dictus: qui quidem ex succo bi-
lioso ortus, tumorē caloremq; cum
illa sortitur communem. Dissident
inter se tamen affectus ii, primū ma-
ximeq; colore. Quandoquidem si is ruber sit, vitium
vocatur phlegmone. Sin pallidus, flauus ue, uel ex pal-
lido, flauoq; colore mistus, erysipelas. Præterea pulsa-
tio est magnæ phlegmones proprium symptoma: qp-
pe quæ copioso sanguine in aliquam particulam pro-
cumbente, orta, altè magis in corpus demittit: inibiq;
dolorem pulsatilem, cum tensione & renixu excitat.
Erysipelas uerò in cute potius consistit: ob tenuitatem
ipsius pallidæ bilis. Ac corpore quidē pro naturæ mo-
do se habere, amare bilis succus exhalat insensibiliter.
Vbi uerò is vel lōgē copiosior, vel crassior, q̄ pro mo-
do naturæ, redditus, vniuersus ad cutim cōpulsus fue-
rit, eam tum perurit, tum in tumorem attollit, aliquid
etiam subiectæ partis occupās. Hic itaq; affectus erysi-
pelas nuncupat. Qui quidē interdum cū exulceratione
supremæ cuticulæ accidit: vbi scilicet bilis ipsa crassior
simul atq; acrior existit. Interdum aut sine hac incidit.
Vbi uerò nec planè biliosa, nec sanguinea fluxio est, sed
ex ambabus cōflata: utiq; ab eo quod in miscella exu-
perat, nomē tumori indatur: dicaturq; de eo id quod
præpoller. Sic ut uel phlegmonē erysiplatosam affe-
ctum ipsum vocemus, vel erysipelas phlegmonosum.
Cæterum vbi neutrū vincit, ibi vitiū phlegmones ery-
siplatosq; medium vocet. Ergo oībus qui sic præter
naturam consistunt tumoribus, cōis indicatio vacua-

tio est: quæ nimirum administrat duplex: vna repellentium ad alias partes: altera per halitum digerentium. At quoniam erysipelas non quantitate modò affligit, sed etiam ob vehementem inflammationem qualitate ipsa cruciat, requirit ampliolem refrigerationem quàm phlegmone. Cauendum tamen est interim, ne in princeps aliquod membrum ipsam bilem repellas. Ac proinde, quæadmodum in phlegmones curatione, post totius corporis vacuationem auxillis repellentibus utimur, sic facies in erysipelate: sed pro sanguinis missione, medicamentum quod bilem trahat purgans: ipsam verò afflictam partem refrigerans. Cuius sanè refrigerationis terminus esto ipsa coloris mutatio. Etenim quod purum erysipelas est, statim cum hoc conqescit. Quod non purum, sed quodammodo phlegmonodes, si plusculum refrigeres, liuidam cutim præfert: nigricatque; si magis. Quam ob rem sati fuerit, ubi laborantis particulæ alteratum colorem uideris, à refrigerantibus astringentibusque; ad contraria transire: prius quam uel liuida, uel nigra prorsus fiat. Refrigerant porro solanum, semperuium, portulaca, umbilicus ueneris, psyllium, altercum, lactuca, intybum, palustris lenticula, cerata ex aqua admodum frigida, & alia id genus. Vbi verò inflammatio ægrotantis membris iam desit, cataplasma illi, prius quam liueat, ex hordei farina imponendum. Quod si liuor iam occuparit, id incisa prius cute imponat: perfundendusque; locus plurimum quidem ex aqua calida. Sed & marina aqua, & muria conducet interim. Quin etiam ipsi cataplasmati eiusmodi aqua, uel acetum, uel oxalme miscatur. Nullum autem valenter calfacientium est medela erysipelatis, prius quam id quod mutat, desinat esse quod antea fuerat, atque alterum iam, illique; contrarium, euaserit. Interdum etiam erysipelas miscetur œdemati: diciturque; erysipelas œdematosum: quæadmodum ubi ex nimia refrigeratione durum ægreque; solubile est redditum, erysipelas scirrhusum vocabitur. Quod igitur ad

Euacuatio in tumoribus præter naturam, duplex.

Erysipelatis curatio.

Erysipelatis refrigerandi terminus sit ipsa coloris mutatio.

Erysipelati refrigerando medicamenta idonea.

Erysipelas œdematosum quando accidat.

4.

Oedema est
humor laxus
& indolens, or-
tus a pituita.

Oedematum
curatio.

Alumen oede-
mata discutit.

Glaucium &
diaglauciu, œ-
demata, erysi-
pelata, & phle-
gmonas sanat.
Scin his non
conteniunt me-
dicamenta ue-
hementer cal-
facientia & sic-
cantia.
Calculi quōge-
nerentur.

curationem pertinet, potissimum contra exuperans est pugnandum: non neglecta interim alterius indicatione. Sicuti autem ex biliosa fluxione erysipelas, ita ex pituita constat oedema, existens laxus quidā tumor & indolens. Qui quidem in aquæ inter cutim dispositionibus, nec non in phthoe, solet etiam pedes affigere. In illis tamen affectibus, quū talis tumor symptoma sit, nullam seorsum propriam curationem requirit. Nam satis erit tunc perfricare crura, aliās oxyrhodino, aliās oleo cum sale, aut etiam oxyrhodino sal habente. At si ex pituitoso humore in particulā influente oedema constitit, abundē aliquando satisfacit spongia recens, potabili oxycrato madidata. Deligare verō ipsam debes, ab inferiore parte incipiens, ac supra desinens. Si recentis copia non sit, antiquam detergebis, expurgabisq; nitro, aphronitro, & aqua lixina. Quod si sic oedema non subsidat, vbi rursus deligabis, pusillum aliquid aluminis conicies, ac nouam spongiā admouebis: aut etiā elychnion molle, madensq; ex posca, quæ aluminis nonnihil receperit. Sit autem arctatio mediocris, veluti in ossis fractura. Ac primæ quidē fasciæ iniectiones, quæ scilicet infernè incipiūt, magis arctandæ: quæ deinceps sunt, sensim remittendæ. Idoneum etiam medicamentum ad hæc est glaucium ipsum, liquatum in posca: nostrūq; medicamen, quod ex eo conficitur: quodq; non œdemata modò, verū multo etiam magis tum erysipelata, tū phlegmonas incipientes sanat: ac potissimum calidas. Porro scirrhis affectibus (qui à glutinosis, aut crassis, aut vtriusq; rationis participibus humoribus trahunt ortum) nullum vehementer excalfaciens, siccans ue medicamentum est aptum. Nam quæ eiusmodi sunt, digerunt quidem subtilia: quod verò reliquū est, multo magis impingunt. Qua ratione etiā calculi gignunt in renibus: asso scilicet in his crasso glutinosoq; succo.

Quare ea tantum sunt admoenda tumoribus induratis, quæ molliendo digerere possunt: cuiusmodi sunt, tum ceruina medulla, tum vitulina, tum seuum hircinum, taurinum, & leoninum. Ad hæc, Ammoniacum Thymiam, & bdellium utrumque, sicuti etiam styrax. Sed ex his, humetiora sunt præferenda. His igitur attentus indicationibus, etiam complicatos affectus sanare poteris. **Cæterum** si tendones & ligamenta indurata fuerint, aliquid incidentium emollientibus admiscere oportet: cuiusmodi vel imprimis acetum est. Equidem pyriten lapidem, aut molarem, sed candentem, in aceto quam acerrimo extinguere soleo: dein scirrhum ligamentum, vel tendonem exponere, ut calentem vaporem excipiat, in eoque dimoueat. Postea verò medicamentum quod emolliat impono: oleoque aliquo tenui, à principio curationis, particulam laborantem perfundo. Itaque curatio quæ per acetum administratur, utilis est uitio iam adulto: & quum præparata iam sub mollientibus pars fuerit. Ad ligamenta autem & tendones, nec sæpe, nec inter initia, nec longo tempore, medicamentis quæ ex aceto componuntur utendum est. Quamuis in liene & carnosus musculus partibus tutus eius sit usus. Ac Ammoniacum quidem thymiam liquatum aceto, ad luti scilicet crassitudinem, complures lieni imponunt: idque solum ei curando sæpe fuit satis. Induratis etiam musculis, ubi emolli per alia medicamenta iam fuerint, Ammoniacum aceto liquatum maximum usum præstat. Sufficit autem eo uno altero uel die usos, rursus ad emollientia reuerti. Ego verò medio tempore cataplasmate ex althea sum usus. Cuius radix seuo anserino, aut gallinaceo, aut suillo liquata, salutare ad emolliendos scirrhus medicamentum existit. Siluestris quoque malua, quæ passim nascitur, folia, cum supradictorum aliquo tunsa proficient. Meliora tamē crudis sunt, quæ modicè ante sunt cocta. Variatur itaque cura-

Scirrhis sunt
admoenda,
quæ molliendo
digerere possunt.

Induratos tendones qua ratione oporteat curare.

Aceti usus quæ induratis conferat.

Ammoniacum aceto liquatum lieni indurato conducit: nec aliter induratis musculis. Altheæ radix seuo anserino seuo gallinaceo seuo suillo liquata, salutare ad emolliendos scirrhus medicamentum existit.

Curat'ionis mo-
dus uariatur. p
differentiis par-
ticularum.

6.

Scirrhus quid.

7

Ligamēta esse
insensilia.

Inflatio ab œ-
demate quō
differat.

Inflationū sco-
pi.

Inflationes ui-
scerum quō di-
scutiantur.

Cucurbitula
flatui discutiē-
do est idonea.

Lixiuum ex
spongia appli-
citū, extrema-
rum partiū fla-
tus discutit.
Musculorū cō-
tusioni quę cō-
ferant.

Oesypus.

tionis modus pro differentiis particularum. Quippe laborantibus p̄cordiis œdemate, nemo ex posca frigida applicuerit spongiā: nec absynthium oleo incoquens, genu quisq; perfudit. At iecinori ægrotanti & lieni, cum maxima vtilitate adhibetur. Vocatur igitur scirrhus impræsentiarum tumor durus & indolēs, non tamen omnino absq; sensu. Talis enim non est sanabilis. Reliqui omnes, sicuti ægrius sensilē ipsam partem affectam reddunt, ita omnino insensibilem non efficiunt: vtriq; si sensilis sit natura. Ligamenta nanq; scimus insensilia esse. Sed iam ad inflationes nos cōuertamus: quæ quidem ex flatuoso spiritu in aliqua cavitāte collecto oriuntur. Differt autem inflatio ab œdemate, q̄ ille tumor sit latus & digitis cedens: vtpote a pituita exortus. Inflatio autem maximē renitatur tangenti, sonitumq; veluti tympanum reddat. Scopus autem omnium inflationum communis est, vt quod præter naturam est, vacuetur, in quocūq; id contineatur. Proprius verò, vt tenuissimis & calidis potestate medicamentis. Atq; in ventriculo quidē, inflatisq; visceribus, oleum quod tenuium sit partium, quodq; rutā habeat incoctam, aut semē cumini, aut apii, aut petroselini, id præstabit. Aliquando verò & cucurbita magna bis ter'ue sine incisione medio ventri affixa. At in artubus & musculis, qui sub cute, aut etiam membranis quæ ossa vestiunt, sunt, inflatione orta, si citra dolorem sit, lixiuum noua spongia exceptū, abundē fuerit. Sin dolor quoq; vrgeat, vngenda pars est oleo, qd relaxandi, remittendiq; vim habeat. Musculi verò simul & inflati & dolentes ob cōtusionem, satius est, ut in principio sapa cum vino & aceti pauxillo, medio-criq; olei portione, oibus vnā modicē calfactis, atq; laua succida exceptis, foueant. Quod si succidæ facultas non sit, ipsius œsypus iniiciendus supradictæ miscellæ est. Ceratū etiam quod ex œsypo componit, ad idem

non inidoneū fuerit. Debent enim cōtusi musculi leni
ri medicamento, cui mista facultas sit, quæ simul cōco
quat, digerat, & modicè astringat. Quandoquidem si
nihil astrictionis sortiat, auget aliquñ phlegmonas, præ
cipuè in iis corporibus, quæ sunt plethorica. Igit si do
lor vehemens vrgeat, mitigatiua magis medendī rō
ne vtēris. Sin uerò ille absit, maiori vi cōtra inflationē
instabis, per valentiora medicamēta. Cuiusmodi sunt
lixiuum, acētū, & posthec, vinū. Quoties ergo de mi
tigando nō laboras, illorū plus in misturam coniicies.
Rursus ubi repellere studes, vini nigri, austeriq; plus q̃
ipsorū, immittes. At si digerere malis, lixiui plus ides.
Acetum uerò si his miscebis, ad ambo erit vtile, pro
pterea quòd mistas habet facultates. Quòd si muscul⁹
prorsus sine dolore sit, licet in lixiui penuria, pro illo
aphronitrū imittere, idq; minimè lapidosum, sed spu
mosum magis. Inflationes aut inueteratas, primò qui
dem aliquo ex iis quæ ex lixiuo constant, foueabis. Se
cundò verò strigmentis gymnasiarum feruefactis, &
mox colatis, pollinem calcis viuæ inspergito, vsq; ad
crassitudinē luti: ac tandem cataplasma id, affectæ sedi
admoueto. Salutare etiā his medicamen est, quod ex
sycomoro conficit. Est & alius inflationis affectus, pria
pismus dictus: quo detentis, vel inuitis, pudendū arri
gitur. Etenim quū neruus propriā colis substantiā con
stituens, natura cauernosus existat, vbi halituoso spiri
tu implet, eiusmodi affectū excitat. At halituosus spūs
in animalis corpore gignitur ex succis sensim excalfa
ctis. Imprimis ergo ea vacuatione vniuersum vacuan
dum est corpus, quæ maximè videbit ex vsu fore ægro
tanti. Dein verò imponendum ipsi laboranti particu
læ medicamentum est, si ea calidior sit effecta, quod ad
portionē caloris abundantis refrigeret. Sin aliter, in
ter initia quidem, omnino quod modicè refrigeret:
postea verò, id necessum non est. Pari modo & quæ

Contusis mu
sculis medica
menta qualia
nā esse debeāt

Acetum mistas
facultates for
titur.

Inflationes in
ueteratæ qua
ratione curan
dæ sint.

Priapismus qd

Halituosus spi
ritus gignitur
ex succis sen
sim excalfa
ctis.

Priapismi cura
tio.

Nymphaea.

Viticis semen,
Rutæ semen,

8.

Linguam ma-
xime tumefa-
ctam qua rōne
curarit Galen⁹.

9.

Aversio est mo-
lienda in con-
trarium.
Color tumoris
humorē a quo
est ortus, decla-
rat.Atræ bilis ge-
neratio, & fa-
cultas.

circa lumbos sunt particulæ omnes, eiusdem faculta-
tis medicamento comprehendendæ sunt. Etiam reli-
quus victus exhibendus, qui & flatui aduersetur, & sic-
cet. Equidem quendam adolescentem sic affectum cu-
raui, primū quidem sanguine misso: dein cerato, fa-
cto ex rosaceo simplici, imbutoq; aqua frigida, puden-
do ac lumbis imposito. Simili modo & alium, qui post
missum sanguinem, humido medicamento, quod ex
chamæmelo conficitur, est usus. Porro istis etiā nym-
pheæ aliquid potandum exhibeo, saltem in principio.
Mox viticis semen: ac si traxerit adhuc vitium, rutæ
semen copiose comedendum. Est enim illud cōmune
præceptum oīum fermē, quos vitiosus succus creat,
morborum, quod in fine calfacientibus & siccantibus
sit utendum. Quippe hæc quod reliquū humoris est,
prorsus absumunt. At verò maximē tumefactam cu-
iusdam linguam curauimus, catapotiiis ex aloe, scam-
monia, & colocynthide, vesperi datis, illum purgātes:
lactucæ autem succo ipsam linguam colluentes. Quod
autem in priapismo vomitoriis medicamentis potius
quàm subducentibus sit utendum: in linguæ vitio con-
trariū ex partiū situ indicari perspicuum est. Nā auer-
sionis in contrarium, non à substantia, sed à curandi
membri posito, inuentio præstatur. Porro ex tumo-
ribus rubeus quidem, subesse humorem sanguineum
indicat: sicuti flauus & pallidus, persimilem ipsis bilē.
Subalbidus verò & laxis pituitam. Sunt & alij tumo-
res fusci, liuidi ue, tactui admodum renitentes. Quod
si membrum sortiatur euidentiores venas, exaltatas
eas iuxta hosce tumores à crasso & nigriore quodam
modo sanguine videre licet. Qui humor, vbi incalue-
rit impensius, aut propter putredinē, aut febrē phleg-
monodem, nigram efficit bilem, quam ne mures qui-
dem ipsi gustauerit. Terra quoq; ab ea raditur: ac par-
tes quæ raduntur, omnes attolluntur in altum: voca-
turq;

turq; is affectus tum feruor, tum fermentatio. Est nāq; is humor talis, quale esse acetum docuimus: ī vomitionibusq; non raro percipitur acidus: vt amarus, qui pallida dicitur bilis. Quæ igitur verè dicitur atra bilis, acida certè est, atq; terram fermentans, omniq; animanti inuocunda. Quæ uerò vt talis fiat est apta, ea dicitur melancholicus humor: vel nigra etiam bilis: ita tamen ut distinguatur ab altera quæ ex affatione oritur. De nominibus tamen anxia disceptatione neglecta nonnulli præter naturā tumores, ex eiusmodi naturæ succo proueniunt, cuiusmodi est fæx in vino, & amurca, in oleo. Qui quidem spatio temporis putrescente humore, propterea q̄ sit impactus in vasis, exulcerantur. Atq; huiusmodi sanè affectum communiter omnes cācrum appellant. Quod vitium, perinde vt reliqua omnia, plurimam habet in maioris minorisq; ratione differentiam. Igitur communis canceri curatio, est melancholici succi vacuatio. Mox prohibitio, ne de cætero talis humor colligat in venis: particulæq; , ne amplius redundantem succum recipiat, corroboratio. Soluimus autem melancholicum succum, drachmis quaternis epithymi, ī sero lactis, aut mulla, exhibitis: aut propinato medicamine nostro, quod ex duobus & triginta simplicibus constat. Post purgationem dictum iam de omnibus eiusmodi affectibus est, q̄ uel repellere humorem qui in membrū procubuit oportet: vel ipsum digerere: præterea q̄ in principio quidem, tam in ipso purgationis tempore, q̄ ante id, repellere: vbi iam totum corpus exquisitè purgaueris, digerere. Vbi tamē mediocris tantum purgatio præcesserit, mistum esse quod applicabitur pharmacum, ex repellente digerenteq; facultate conueniet. Cæterum ad discutiendos cācros, mediocrium virium medicamētis est opus: quæ nec propter imbecillitatem vincantur: nec propter effectus vehementiam, ipsum sanguinem crassent. Quia

Fermētatio qd.

Melancholicus
succus.Canceri gene-
ratio.

Canceri curatio

Melancholicū
succum purgā-
tia.

*Metallica me-
dicamenta, san-
nandis incipie-
tibus cancris
idonea.
Cancris per chi-
rurgiam cura-
tio.*

10.

*Carbunculi de-
scriptio.*

*Carbuncosum
absq; febre nō
reperiri.*

*Carbunculi cu-
ratio.*

*Carbuncoso ca-
ta plasmata i-
donea.*

verò ipsius vitii malignitas, ab iis quæ mordent irrita-
tur, & efferatur, ob id utiq; non modò mediocria viri-
bus, sed etiam minimè qualitate mordentia, eiusmodi
affectibus sunt idonea: materia quorum, ex vltis, clo-
tisq; metallicis desumetur. Quippe quæ medicamenta
ex his componuntur, ad sanandos incipientes cæcos,
magnam vim obtinent. Maiores verò sat fuerit, si his
prohibeantur augeri. Cæterum si quando cancrum p
chirurgiam curare audebis, cœpisse quidem ab eua-
cuando per purgationem melancholico humore oport-
tebit. Vbi verò quod vitiatum est, totum prorsus exci-
deris, sic vt nulla supersit radix, fines effluere sangui-
nem: nec propere eum inhibebis: imò premendo po-
tius quæ circum sunt, venas, exprimes ex his crassio-
rem sanguinem: mox aliis vlceribus similiter curabis.
Est aliud vitium, carbunculus appellatus, quod ex hu-
more crasso, feruenteq; nascitur. Incipit hoc plerūq;
à pustula: aliquando verò & sine hac. Cæterum inter
initia, quibus hoc instat, scabūt omnino particulam.
Mox oritur pustula quædatn, modò cineris colorem
referens: modò etiam nigrior: qua rupta, vlcus cum
crusta gignitur. Omnibus præterea his circumposita
caro in summam peruenit inflammationem: colore,
magis q̄ phlegmone, nigricans. Necessariò autem sic af-
fecti febricitant: quare ab incisa vena incipienda cura-
tio est, detrahendusq; sanguis ad animi vsq; deliquiū:
nisi aliud aliquid obstat. Imponi verò sibi ægra parti-
cula, quod ad humorum inflammationem spectat, re-
frigerantia desyderat: pp crassitudinem tñ humoris,
atq; et malitiam, nec fluxionē auertere vnq; poteris:
& si qñ id feceris, aliud quippiam, quod in alto sit cor-
pore, offendes. Atqui nec affluere is permittendus est.
Quin potius inquirenda remedia sunt, quæ cum modi-
cè reprimendo, et digerere possint. Tale profectò est
tum cataplasma quod ex plantagine conficitur: tum

METH. MED. LIB. XIII.

quod ex cocta lente: scilicet miscentibus nobis his teneram micam panis, & miscellanei, & i clibano cocti. Etenim panis omnino puri substantia in cutis meatibus hærere est apta. Furfuraceus autem, crassiorum est partium. Super ipsum verò ulcus valēs aliquod imponendum est medicamen: cuiusmodi est Andronis, Pasionis, vel Polyidæ. Liquariq; id cum vino aliquo dulci ad sordium crassitudinem debet. Quæ autem pharmaca reliquis adhiberi vlceribus solent, nempe quæ concoquant & pus moueant, ea nunc adhibenda non sunt: quando ita particulæ putredinem auxeris. Scarificare etiam eiusmodi tumores post sanguinis missionem alienum non est. Sunt autem incisiones altiores mediocribus, propter iſtantis humoris crassitudinem. Inflammatione cessante, vlcus ad cicatricem similiter reliquis, est perducendum. Atq; hætenus de carbunculis. Nunc verò de strumis differam, quas choeradas Græci vocant: quæq; fiunt, glandulis in scirrhum affectum mutatis. Est autem duplex ipsa glandularum natura. Quippe nonnullæ earum in quorundam vasorum medio, diductorum in varios ramos, ad tuendum eorum robur, sunt constitutæ: quarum haud magnus vsus animantibus est. Aliæ verò, ad excipiendam saliuam, vel lac, vel semen, vel aliquem humorem alium gignendum, sunt fabrefactæ. Atq; harum sanè maior est vsus, nec aliter sanandæ sunt, si contraxerint scirrhum, quàm cæteræ omnes corporis partes. At quæ medium vasorum spatium implent, in iis alia curationis indicatio præstatur: qua simul cum vitio etiam pars ipsa tollitur: idq; dupliciter, vel excisione, vel medicamento quod putrefaciat. Sed tempestiuum mihi iam est, vt nonnihil de abscessu etiam dicam: cuius duplex est genus. Vnum, quum phlegmone in pus versa pus ipsum tanquàm in aliquo est sinu collectum. Alterum, quum

499.
Panis puri substantia in cutis meatibus hæret.

Carbunculos post sanguinis missionem esse scarificandos.

Choeradas.

Strumatum ortu.

Glandularum natura est duplex.

12.
Abscessum duplex genus.

Atheroma.
Steatoma.
Meliceris.

nulla præcedente phlegmone, humor aliquis acris, isq; aliàs specie alius, statim ab initio in aliqua parte colligitur, circumposita corpora excorians. Frequentissima verò huius morbi sunt tria genera: nempe Atheroma, Steatoma, & Meliceris: à similitudine contentarum in tumoribus substantiarum, sic appellata. Est enim aliud eorum veluti seuum, aliud veluti mel, aliud puliculæ, quam atheram vocant, simile. Curationis ipsorum indicationes sunt communes: nempe id quod continetur, vel digerere, vel totum putre reddere, vel excidere. Aliqui igitur eiusmodi tumorū triplicem curationis rationem admittunt: quotquot scilicet ex tenuiore humore constant: vt meliceris. Aliqui duplicem tantum, veluti Atheroma: quippe quod tum excidere, tum putre facere licet. Steatoma verò, sola manuum opera curatur: quum nec putrescere possit, nec digeri. In iis porrò abscessibus, qui in alto corpore delitescunt, ac potissimum in visceribus, medica-

Abscessibus q
in visceribus
delitescunt, me
dicamenta quæ
ex aromatis cõ
ponuntur ma
xime sunt ex
usu.

13. Tumores om
nes præter na
turam, sui abla
tionē indicat.

menta quæ ex aromatis componuntur, maximè sunt ex usu: vtpote quorum vis collectum humorem tum in halitum resoluat, tum digerat. Theriace etiam, Athanasia, Ambrosia, medicamenq; nostrum, ex Cretica calamintha confectum, vnicè commendantur. Quicunq; igitur ex tumoribus toto genere existunt præter naturam, ii sui ablationem indicat: vt exempli gratia, myrmecia, acrochordon, calculus in vesica, hypochyma, & mola in vtero, hoc est, caro quædam in formis. Siquidem omnia eiusmodi summouere in totum contendimus. Quorum verò etiam locus ipse affectus vna quæpiam naturalium est partium, prima indicatio est, ut affectus sanetur. Secunda ab hac, si is insanabilis sit, ut unà cum vitio pars quoq; ipsa excidatur: sicuti in cancro, & ulceribus omnibus, quæ curationem respiciunt. Econtrario verò in suffusione, quod hypochyma vocant, uicti in prima indicatione, ad alium eam

Hypochyma
is, transpositio.

locum, qui minoris sit momenti, transferimus. Non desunt tamen, qui hanc quoque euacuare conentur. Iam verò humor qui in hydrocelis visitur, alienus à corporis substantia, tota natura est: sicuti etiam quæ in ascitis hydropibus continetur aqua. Quarum certè vacuationem vel medicamentis quæ digerant, molimur, vel chirurgia: in hydrocele quidem, immisso siphone: in ascite verò, punctione adhibita. Quemadmodum autem in iis quæ ante comprehensa sunt, cum affectu ipso exciditur etiam affecta pars, sic & in herniosis aliquid peritonæi. Pari modo & columella aliquando vnà cum vitio amputatur: itidemque in cruribus & in testiculis vnà cum varicibus ipsæ venæ. Adhæc tunica in naso cum polypo, & foratus dens cum foramine. Verùm ex his nullum est, quod ad naturalem habitum reduci possit. In columella verò id omnino est conadum: nec properandum ad eam excidendam: sed quando ad locum videtur tenuitatem redacta, tunc auferenda est. Similiter & excrescentias carnis reducere ad mediocritatem oportet. Danda autem in hisce semper opera est, ut tum breui tempore, tum citra dolorem, tum quam tutissimè cures. Verùm ut tutò cures, tribus sis intentus oportet. Vnum primumque est, ut omnino absolutionem operis consequaris. Alterum, ut sicubi hanc non persequaris, saltem cubantem non lædas. Tertium, ut vitium non facilè reuertatur. Ex horum autem consideratione facilè cognitu est, quādo ipsius chirurgiæ, & quando medicamentorum ope pugnandum sit. At chirurgiæ quidem studium, in iis præsertim quæ nunc sunt proposita, ad interemptionem eorum festinat. Quod verò ex medicamentis petitur, primū huc tendit, ut quod præter naturam est, tum uacuet, tum digeratur: aut si per membri naturam, aut rebellionem vitii non licet, ut id tum in pus vertat, tum putrefaciat. **Similem curationem** desyderant iis quæ comprehen-

Hydroceles curatio.

Ascites curatio
Partes, quæ una cum affectu amputentur.

Columella quæ sit excidenda.

Medicis danda opera! esse ut cito citra dolorem, et quæ tutissime curent.

Chirurgiæ studium.

Naturæ opera
quæ.
Obesitatis cu-
ratio.

Extenuandis
corporibus, ui-
sibus articula-
ribus commo-
da medicamē-
ta, quæ sint.
Sal Theriacus
extenuat cor-
pora.
Obesum iuue-
nē qua victus
& medicina
ratio extenu-
avit Galenus.

sa sunt, etiam ea quæ in numero & magnitudine con-
nientem naturæ modum excedunt: quæq; in iis an-
bobus deficiunt. In quibus amputare quidem conue-
niet quod magnitudine redundat vel numero: refice-
re autem & fingere, quod deest: ubi videlicet fieri id li-
cet. Quintum nanq; digitum non licet medico gigne-
re, sed unius naturæ opus sunt omnia talia. Ut autem
à prodigiosa corpulentia curatione auspicemur, si qs
adeo obesus existat, ut nec incedere, nec respirare pos-
sit, ei calidior sicciorq; temperies (quædoquidem hæc
corpus exile reddit) est procuranda: adhibitis nimirum
acutis exercitationibus, tenuate victu, & id genus me-
dicamentis, ac deniq; cogitationib; animi. Porro quæ
ad articularia vitia medicamenta adhibentur, quæ sci-
licet valentem incidendi facultatem habet, iis tu q; q;
quum nimiam obesitatem curabis, utitor. Sunt aut ta-
lia, ruta sylvestris semen, aristolochia rotunda, minus
cetaurium, gentiana, & polium. Præterea ex urina ciē-
tibus, ea quæ pollentes habet vires, ut petroselinum.
Sed & sal quod ex combustis fit viperis, potenter etiā
extenuat. Ego verò iuvenem quēdam quadragenariū,
oppido q̄ obesum percuravi, usus tum antidoto, quæ
adversus articularia vitia est composita: tū sale theria-
co, ipsaq; theriace, ac reliquo extenuante victu, & pro
exercitatione, cursu veloci. Præparavi tamen hominē
ad cursum, perfricando primū linteis asperis, quoad
cutis ruberet: dein statim cū oleo, quod in se digerens
aliquod medicamētum habebat: qualia sunt sylvestris
cucurbitæ radix, althea, gentiana, aristolochia, pana-
cis radix, polium, atq; centarium. Per hyemem autem
etiam à balneo reuixisse hominem iam dicto oleo pro-
fuerit. Verū cibum exhibere nō statim à balneo, sed
interposito somno, expediet. Quod si velit rursus etiā
ante cibum lauari, permittes. Magis etiam ad rem per-
tinebit, si aquæ ipsi digerendi facultas, aut insita, aut

etiam adquisititia insit. Verisimile autem est, aliquādo ex multo simul obito motu febris hominem corripere: quæ tamen ad rem propositā neutiq̃ erit aliena: utiq; si medicus rectè omnia peregerit. Sanè fugere in obesius curandis conveniet vina quæ multum nutriunt: cuius generis crassa sunt: uti uerò, uel aquosis, id est colore albis, & substantia tenuibus: vel quibus aqua marina sit mista. At ubi eos qui extenuati sunt, reficere in animo est, iis vinum exhibebimus crassum, cibum uerò, qui succum efficiat crassum, exercitationes paucas, frictionem mediocrem, ac breuiter omnia iam cōprehensis contraria moliemur. His uerò etiam picari est commodum, * idq; tribus aut quatuor diebus. Hoc quippe ad carnis generationem optimum est præsidium, quum humectet & calfaciat, sanguinis multitudine accita. Ergo nec assiduè picari corpus ægrotans oportet: nec quum oportet, sæpe illinire: uerum in hyeme bis: in æstate semel id fecisse est satis. Itaque quibus cunque particulis bonam habitudinem reddere cupimus, has & fricare, & perfundere, & percutere, & picare oportebit, tantisper dum intumescant. Hoc ubi factum est, protinus desistere convenit, prius quàm digeri cœperint. Etenim quæ calfaciunt omnia, sicuti attrahere, sic sunt etiam digerere apta. Iam uerò, quibus totum corpus est extenuatum, iis lauare quoq; post cibum est congruum: quanquàm timendum sic est, ne iecur eis obstruatur, potissimum propter ciborum speciem: quum nimirū aliter quoq; obstruere soleāt, quæ succum crassum gignunt, si quis his liberalius utatur. Incidit etiam ex tali victu diutius exhibitō, calculi in renibus generatio. Quod si is qui dicto mō cibatur, grauitatis sensum in dextris præcordiis aut circa lumbos percipiat, protinus capparari ex oxymelite in principio curationis, donec p̃stiterit grauitas, dabit. Ad membra uerò quæ agrè reficiebātur, ac plusculū iā refrigerata erāt,

Vina extenuando corpori apta quæ sint.

16.

Extenuata corpora reficiendi ratio.

Picatio macilentis cōducit.

Frictionis terminus, dum reficere est animus, sit tumor partis.

Capparari ex oxymelite cōfert obstructiōni iecinoris.

Ili iiii

Thapsia san-
guinem attra-
hit ad partes q-
bus fuerit ap-
plicata.
Præputii refi-
ciendi ratio:

Præputii in-
staurandi du-
plex ratio chi-
rurgica.

Colobomata.

Angulorū im-
minutiones in
oculis quō sunt
curandæ.

vsus aliquando & thapsia sum: aliàs ea ex melle mem-
brum illinens: aliàs etiam ex cerato. Siquidem attra-
hit ea quoque partibus quibus superposita fuerit, san-
guinis copiam. Quibus autem exiguum aliquid puden-
di præputio de naturali deest quantitate, iis non rarò,
sola tensione debitum modum restitui, membranulā
mollem, firmamq; * ex charta, cuti gummi illitæ ex-
trinsecus circumuoluens. Ex interna tamen parte præ-
putio ipsi rotundum aliquid ac mediocre aut ex plum-
bo, aut ex charta, veluti fulcrum, supponi prius oport-
tebit: quod videlicet, postea q̄ agglutinata membra-
nula fuerit, facile eximias. Porro imminutio præputii,
duplici chirurgiæ rationi subiicitur: interim in super-
na pudendi parte circulo incisa cute: quo videlicet eius
vnitate soluta, eatenus deorsum trahatur, quoad glan-
dem cooperiat: interim verò scalpro ex interna par-
te, qua glandis initium est, excoriata, mox deorsum
tracta: ac deinde molli vinculo deligata. Similiter quæ
in labiis, aut narium alis, aut aure deficiūt (Græci colo-
bomata vocant) curantur: primū quidem excoriata
vtrinq; cute: dein adductis, iunctisq; iter se cutiū oris,
atq; vtriusq; quod callosum est, detractis: mox quæ re-
liqua sunt, assutis, agglutinatissq;. Eiusdē generis sunt,
& quas in maiori oculi angulo rhædas Græci vocant:
vtiq; vel impensius minuto, vel prorsus perduto ipso
angulo. At prorsus quidem perduto eo, omnino insa-
nabile relinquitur vitium. Minuto uerò, iis quæ modi-
cè astringunt curatur, si tamē totum corpus primum
ante purgaueris: dein caput. Sunt mediocriter astring-
gentia medicamenta, quæ ex glaucio componuntur,
& croco, & quæ nardina vocantur: item imprimis &
quæ ex vino sunt confecta. In summa verò, quibus ali-
quid perit substantiæ, maximè quidem curandum est,
ut ei q̄simillima substituatur. Si id fieri nequeat, saltē
aliquid quod eundem præstet vsus machinabimur:

METHO. MED. LIB. XIIII.

nt, exempli gratia, producentes callum pro offe. Por-
rò venas sensibiles regeneratas aliquando vidimus: ve-
rùm has, non tam similes iis quæ antea perierāt, quæ eas-
dem renasci dixeris: veluti in cauis vlceribus carnem.
Cicatrix uerò quæ in hac, calli modo durata, gignitur,
ea cuti quidem est quæsimillima: cutis tamen non est.
Nunc autem ad alia transeamus morborum genera.
Serpens vlcus, qui herpes dicitur, eiusdem est generis
cum exulcerato erysipellate. Ramex uerò (quam sarco-
cele vocant) cum scirrhis. Etenim herpetas biliosus
procreat succus, sub cute hærens. Quo fit, ut eatenus
affectus is, eiusdem sit cum erysipellate generis: atque hu-
ius quoque magis etiam cum eo quod exulceratum est.
Differt autem ab erysipellate, humoris tenuitate. Est
enim admodum tenuis qui herpetem excitat. Ex eo au-
tem quod alter humor altero sit tenuior, crassior uel, vlc-
rum differentia, quæ ex profunditate spectantur, pro-
ueniunt. Huius certè generis est, & quæ phagedæna
Græcè dicitur, & exulcerati cancri. Quorum omnium
communis curatio est, ut inhibeatur primum humo-
ris confluxus: post sanetur vlcus. Propria uerò cuiusque
tum ex membri inuenitur natura: tum ex humoris non
solum specie, sed etiam quantitate. At tenuissimus qui
dem in eiusmodi humoribus est is, qui exulceratum
herpetem excitat: crassissimus, qui cancrum. Proxi-
mum ab his locum occupat, quod ad crassitudinem at-
tinet, qui phagædænas producit. Harum species quæ-
dam sunt, quæ Chironia, & Telephia dicuntur. Si quis
igitur, toto prius purgato corpore, mox quæ influen-
tem humorem reprimant, regerantque, medicamentis
utatur, iam curauerit herpetem. Sin neutrum horum
fecerit, sed tantum ea quæ cicatricem inducunt, adhi-
buerit, utique exulceratam cuticulam sic sanauerit: pro-
ximæ tamen illi, quo minus exulceretur, non consu-
luerit. Postmodum uerò, illa quoque cicatrice inclusa,

Venas sensibi-
les regeneratas
vidit Galenus

Cicatrix adna-
ta vlceri non
est cutis.

17.

Herpes eiusdem
est generis cum
exulcerato ery-
sipellate.
Ramex.
Herpes ab ery-
sipellate quo
differt.

Phagedæna.
Cancro exulce-
rati.

Chironia ulce-
ra.
Telephia vlc-
ra.
Herpetis cura-
tio.

*Herpetis milia
ris descriptio.*

*Humores qui
facilius & qui
agri⁹ vacuent.
Acrochordōes
Myrmeciae.
Venucarū cu-
ratio.*

quæ ipsi continua est, exulceratur: idq; longo spatio, ceu malo ipso serpente, fit, donec humor, vnde oritur, sit inanitus. Vacuandus itaq; est per eiusmodi affectus semper is qui redundat humor: aliquando medicamēto quod flauam purget bilem: sæpe eo quod nigram: modò eo quod miste sit facultatis: quodq; simul bilem & pituitam educat: veluti in miliari herpete: qui non protinus vlcus facit, quemadmodum alter: sed admodum exiguas pustulas, ad speciem milii: quæ ipsa interposito spatio in vlcus etiā degenerāt. Adeò non absq; ratione quibusdam est visum, in eiusmodi vitio bili esse aliquid pituitæ cōmistum. Cæterum ad generationē vlcis, in iis quæ extrinsecus admouentur, exuperare debebunt, quæ repellendi facultatem habent. Vbi verò non amplius confluit in ægrotātem particulā vitiosus humor, quæ digerunt. Siquidem exiguum vitio si humoris etiam si quis ad viscera reprimat leue dānū cōmittet. At si eius quantitas sit momētanea, in princeps aliquod membrum aliquando procumbit. Ac repellunt quidem, non solū ea quæ astringunt, sed etiā quæ sine astrictione refrigerant: digerūt verò, quæ cal faciunt. Porrò flauæ quidem bilis vacuatio est facilis: pituitæ verò, & nigræ bilis, difficilior: quo magis purgantis medicamento ope indigent. In herpete aut, qm̄ tenuis est humor qui ipsum creat, abunde est et aluum soluisse: vel vrinas, per ea quæ id modicè efficiūt, citasse. Quod uerò ad acrochordonas & myrmecias curandas pertinet, non deest Romæ qui eas apprehensas pri moribus dentibus exterat. Sed & scalpro ad myrtacei folii specie formato, & ferramēto qđ scolopomachariō dī, eas facile quispiā excidere possit. Acquē verò & valente aliqua pinna circulo myrmeciae iposita, ipsam educimus. Debet tñ pinnæ fistula esse myrmeciae crassitudini par, ut eam undiq; prorsus constringat. Quæ postea circumacta, ac simul deorsum ipulsa, celerimē ita

myrmeciam totam etiam cum ipsa radice educet. Iam
verò, quæ vehementer attrahentibus sursum myrmecia
velletur, & putrefacientibus enecabitur, ratione ab ali-
quo inuentum est. Quum igitur interdum quædam partes de-
ficient, quæ adesse debuerant: quædam verò redudent,
quorum non erat opus: adimere quidem quod superuaca-
neum est, sanè haud difficile fuerit: aliud verò produce-
re, quod simile ei sit, quod desit, id in quibusdam quidem
est facile: in quibusdam difficile: in aliis planè fieri non po-
test. Si namque carnosum sit quod deest, haud magno ne-
gotio id reficias. Sin os sit, ipsum quidem instaurare non
licet: cæterum aliud pro eo durum efficere. Diximus
autem uidisse nos venas alias sensibilibus generatas. At si
digitus desit, is restitui non potest. Cæterum quæ in na-
so, vel aure, vel labio sunt curta, ea quidem ut refecis-
se non licet, sic decorem aliquem his adiicere licet, si
quis diuisam utrinque cutim, mox in vnum conductam
queat agglutinare. Porro quemadmodum in sinuosis vl-
ceribus generatio carnis, sic in capite & palpebris pro-
ductio pilorum, opus naturæ existit. Etenim ex succis
qui percutim transpirant, quod limosum est, id pilos-
tum à principio gignit, tum de cætero ueluti succe-
scendo auget. Hoc igitur, quoties vel prorsus periit,
vel redditum est vitiosum, toties pilos corrumpi est
necesse. Corruptuntur namque & stirpes ipsæ duplici
de causa: aliàs nutriente succo destitutæ: aliàs non
idoneo usæ. Ac prorsus quidem perditio eo qui pi-
los alat succo, caluities oritur. Eodem vitiato, ophia-
ses & alopecie proueniunt. In quibus & inhibere
quod influit, & absumere, & digerere, quod iam oc-
cupauit languentem locum, conueniet. Ergo ceu in vl-
ceribus illis purgationem nocentis succi primum ad-
hibuisti, eodem modo in pilis ipsis ab hac primùm exor-
dienda curatio est: scilicet æstimato prius cutis colo-
re, cuius cernis corruptos pilos. Nam si is albidior

Carnosa resti-
ci facile.
Os instaurari
non potest.

18.

Naturæ opera
quæ.
Pilorum genera-
ratio unde.

Pilorum corru-
ptela unde ac-
cidat.
Stirpes dupli-
ci de causa cor-
rumpi.
Caluities.
Ophiaxis.
Alopecia.
Pilorum vitii
quomodo suc-
currendum.

Thapsia vte-
batur Galenus
ad alopeciam
curandam.

19.

Pterygii cura-
tio.

Aquularum cu-
ratio.

Chalazij cura-
tio.

Oculorū pus.

Hypopios sa-
nabat Iustus ca-
pitis cōcussio-
ne.

quod pro naturæ habitu sit, pituitosi humoris purgationem molieris: sin pallidior, eiusmodi bilis purgationem: non secus quam si nigrior conspicitur, quæ nigram detrahunt bilem offeres. Quum autem iam planè purum ex purgatione corpus æstimas, eum qui in cute continetur humorem digerentibus medicamentis discuties: sic tamen ut in his caueas, ne adeo calida, acriaque; admoueas, ut cutis exulceretur. Quinetiam ea quæ valenter siccant, cauere conueniet: ne videlicet cum vitiato humore, vtilem etiam absumas. Ego verò iis medicamentis quæ alopeciā sanarent, exiguum thapsiæ admiscui. Cæterum vbi vel tumefactum plusculum, vel exco-riatum ex ipsius usu, pericranium conspexi, illo quidē die, à medicamento abstinui: illeui autem particulam, vel galli, vel anseris liquato seuo: deinde postero die, sin nihil tale apparuerat, rursus eodem medicamento sum usus. Iam eos quibus periire ciliorum pili, simili-
bus genere medicamentis sanabis: nentiq̃ tamen com-
mittes, ut medicamentum intra oculorum tunicas cō-
fluat. Quare sicca longè tutiora existant. Porro ptery-
gium, tametsi à sanitatis habitu sit alienum, non tamē
substantiæ ratione, quemadmodum atheroma & meli-
ceris, à natura alienum existit. Eius verò sanatio, si q-
dem paruum et molle sit, per ea medicamenta quæ de-
tergent, perficitur. Vbi magnum, durumq̃; euasit, chi-
rurgiam postulat. Simili ratione & æquularū quæ ma-
gnæ sunt, chirurgia curabis. Quæ paruæ existunt, sic-
cantibus medicamentis curantur. At chalazion, quum
toto genere sit à natura alienum, auferri postulat. Ad
eundem modum & oculorum pus. Verū id plerunq̃
medicamentis digerit. Hypochyma verò iā incipiens
digeritur: vbi diu constitit, non potest. Iustus medicus
ætate nostra concussione capitis multos hypopios sa-
nauit. Mansit enim horum pus deorsum, propter gra-
uitatem substantiæ. Hypochyma autem leuius quum

fit, nebulæq; similis q̃ pus, haud ita dehiscere potest. Cæterum quod serosioris naturæ est, id punctione ad præsens discutitur: interposito tamen haud longo spatio, ceu vini fæx quædam defertur. At quâdo pus oculorum digerere est animus, collyriis quæ myrrham habent, maximè vtemur. Quæ verò vehementer siccât, ad præsens certè valenter uacuât, sed quod reliquum est, ita cogunt, vt ægrè resolui possit. Multum autem puris vacuabimus, diuisa tunica ceratoide, paulo supra coronam. Sunt præterea ex genere eorum quæ tota substantia præter naturam dicuntur, & ascarides, & elminthes: siue eæ rotundæ sint, siue latæ. Quocirca expelli prorsus eas è corpore expedit. Expelles autè, si prius enecaueris. Enecabis amaris medicamentis. Ac teretes quidem absynthium perimere potest. Latæ vehementiora medicamenta desyderât, sicuti & quæ ascaris Græce vocatur.

Hypochyma
semel discussū
punctione, re-
uertit.

Oculorum pus
colliria ex myr-
rha discutunt.
Pus oculorum
vacuari diuisa
tunica ceratoide
de paulo supra
coronam.

Ascarides.
Elminthes.

Vermes per-
mūtur ab ama-
ris medicamē-
tis.
Teretes.

G A L E N I P E R G A

M E N I D E A R T E C V R A -
T I V A A D G L A V C O -

N E M. L I B E R. I.

C A P. I.



N O N Communem tantum oīum hominum naturam medicū cognoscere oportet, sed etiam vniuscuiusq; propriam. Non tamen proprium singulorum naturam, æquè atq; communem, possibile est scribere. Quum igitur ad rectè medendum plurimum conferre temporis occasio, & quantitas auxiliorum, uideatur, hæc autem propria in vnoquoq; ægro se contemplanda obiciant, nec quicq; proprium possit sermone explicari: ob id nō

Naturā cuiusq;
propriā medi-
cum agnoscere
oportet.

GAL PERGA. DE ART.

mirum quod commune est, scribere cogimur, quis id sit usu secundum. Etenim, quantum quisque à naturali recessit habitu, ad tantam morbus magnitudinem peruenit. Distantiam verò recessus, facile deprehendet is, qui naturalem vniuscuiusque ægri statum exquisitè cognorit. Quod quidem quum nobis non liceat, confugimus ad cōes notiōes: in quibus artifex plus aliquid, quàm inertes, assequitur. Porro qui omnia quæ secundum naturam & præter naturam sunt, diuisione artificiosa complexus fuerit, atque ab iis omnibus, quæ sufficiēter diuisa erūt, indicationes sumpserit, solus is, quantum humanis permittitur uiribus, minimè errabit medendo. Atque illos quidem quorum habebit notitiam, melius curabit, quàm cæteros. Ignotos verò, proximè illis, quoad fieri poterit ad sanitatem perducet. Si quis enim primum distinxerit differentiam ætatum: postea eam quæ secundum temperaturas, potētias, colores, calores, habitudines, pulsum motus, assuetudines, industrias, animique mores habetur: atque his quoque adiunxerit maris fœminæque discrimen, expenderitque regionum, temporū, atque adeo ambientis aeris temperies, hic ad propriam laborātis naturam agnoscendam proximè accedet. Nunc verò de his solum ægrotis dicere proposuimus, quorum natura, ante quàm morbum contraherent, nobis erat exquisitè perspecta. Cum quibus tamen & reliqui omnes intelligentur, qui nobis erant ignoti.

De febribus ephemeris.

Cap. I I.

*Ephemerarū
causæ.*

*Febres cum
bone, si absque
ulcere oriatur,
sunt suspectæ.*

Primò igitur de ephemeris febribus, utpote simplicissimis disseramus: quæ nimis ob lassitudinē, ebrietatem, iram, excandescētiā, mœrorē, atque alias vehementes animi solitudines excitantur. Ex quarum genere sunt, quæ ab inguinum inflammatiōibus trahunt ortū, præter quàm si absque ulcere fiant manifeste. Tunc siquidem & suspectæ sunt, minimeque mites apparent. Vigiliæ plerumque induxerunt simplicem fe-

brem: sicuti frigefactio, & exustio quandoq. Atq. hæc omnes febres solvuntur facillimè, in hunc modum.

Oportet enim ipsos cōfestim ducere ad balnea: deinq. ad cōsuetam victus rationem. Nam qui triduanum terminum absq. cibo expectāt, sæpius acriores febres efficiūt.

Quum igitur ad ægrum accedes, primū à maximis quæ circa ipsum sunt, est cōsideratio linchoanda: deinde & ab aliis: adeò vt nec minimū quicq. omit

tas. Nam ut magis aut minus ei quæ sit ex maximis indicationi credamus, ex aliorum sit adiunctione. Maxima quidem in omnibus febrientibus signa in pulsibus atq. vrinis p̄sistunt. His verò addere oportet, quæcūq.

alia circa faciem scribit Hippocrates: accubitū quoq. & respirationem. Itē ea quæ ab ore excernuntur, atq. alii sedimina: & si quid aliud accidere circa aliquā corporis partē, aut operatiōem videris.

Quæ omnia cōia sunt omnibus febribus. Postq. itaq. ex pulsib. atq. vrinis febris naturam perceperis, quum pulsus nullū inflā

mationis signū habuerit, neq. oīno inæqualitas in aliqua arteriæ cōpulsione se ostenderit, aut si hoc adfuerit, omnino sit imbecille: vrinæ autē, aut prorsus similes iis quæ secundum naturā se habent, aut non multū à naturali statu recesserint: tunc sanè & ad oīa illa, quæ

nuper à nobis exposita sunt, accedere oportet: & quū veluti chorus quidā oīa p̄cinnè loquuntur, tunc certè fidere oportet, ac, si libeat, interrogare, nūquid aliqua manifesta antecesserit causa.

Siquid enim huiusmodi æger fateatur, expectata prima febris solutiōe, statim oportet lauare: quū tūc certior sit tibi facta cognitio, ex ipso solutionis modo.

Nam arteriæ motus in hoc in totū assimilāt ei, q. in sanis deprehendit: quū i nulla alia febre ad naturalē habitū reuertat. Iā nō plurimis ephemerarū humidi qdā vapores, & qbusdā et sudores vtilis p̄spiciunt, accessione cessante.

Quo tpe et vrinæ multo meliores, q. circa febris initia, videbūt: & si ea-

Ephemerarum curatio.

Inedia triduanā ex ephemeris reddit acriores febres.

Signa maxima in omnibus febribus a pulsibus & vrinis petuntur.

Ephemerarum signa.

Pulsus in nullius febris intermissione ad naturalem statum reuerti p̄terquam in ephemeris.

Diarianū solu
tioni quæ ac-
cidant.

Ephemeris ex
tristitia & soli-
tudine indi-
cat extenuatio
corporis.

Mores animæ
ex oculis etiā
in sanis cogno-
sci.

Vigiliarium
notæ.

Cauitas oculo
rū qd indicet.

Ephemeras a
densata cute
discernēdi rō.

pitis aut alteri⁹ partis dolor, simul iuaferit, neq; hic am-
plius p̄sistet. Aegrotantis q̄q; in tolerādo facilitas, ma-
gnū & ipsa signum, febris suauitatē tibi indicabit. Et si
dum lauantur, nec horror aliq; insolitus molestauerit,
nec alia tristitia adfuerit, post balneumq; & deinceps
benē se habere perseueret, tunc ne uerearis offerre ci-
bum, & vinum: adhibito tamen pro tempore modo.
Communiter autem omnibus detentis ephemera, uri-
næ rufæ excernūtur. Adiungitur verò his qui propter
tristitiam febricitant, acritudo potius q̄ abundantia ca-
loris: quemadmodum ē diuerso iis, qui propter furo-
rem. Sed & extenuatio corporis in iis quos tristitia aut
cura vexarunt, cōspectior existit: oculorum præterea
cauitas, & quædam inconsueta decoloratio. Hæc qui-
dem sunt & iis qui quouis modo aliter cogitarunt, cō-
munia. Maximē itaq; ex oculis distinguere oportet.
Nam ex his etiam in sanis animæ mores coniciere pos-
sumus. At eos qui diu vigilarunt, arguit quædam pal-
loris forma, faciesq; subtumens, * nec non ipse ocu-
lorum mor⁹, quo vix palpebras, humore quodam im-
butas, attollere possunt. At qui tristantur, aut cogita-
tionibus detinentur, iis exiccantur palpebræ. Canitas
est commune accidens omnibus, mœrori, vigiliis, co-
gitationibus, non tamen furori. In hoc enim, nec ocu-
lorū cauitas, nec manifestus pallor: & plus caloris atq;
celerius ex imo prorumpit: nec pulsum magnitudo
destruitur, quemadmodum in vigiliis, tristitia, & cogi-
tationibus. Eorum etiam qui ex lassitudine in febrem
inciderunt, cutis est sicciore, q̄ in aliqua alia epheme-
ra. Quæ autem ex densata cute accidunt febres (den-
satur enim aut ex frigore, aut ex aliqua qualitate astri-
gente) hæc quidē, solæ inter omnes febres, passio astri-
cta existunt: ac vel solo tactu noscuntur: tum ob densi-
tatem cutis, tum ob differentiam caloris, qui mitis qui-
dem in primo tactu sentitur, acris autem, si plusculum
tendemus.

CAV. AD GLA V. LIB. I.

tardem⁹. Non tamen & his vrinæ sunt ruffæ: neq; moles corporis concidit: neq; oculi redduntur aut caui, aut aridi: sicuti nec pulsus minores, quemadmodū in mœrorib⁹, curis, vigiliis, aut exercitiis imoderatis.

De febribus ex inflammationibus inguinum. C. III.

Febres quæ ex inguinum inflammatione fiunt, pulsus habent maximos, veloces, atq; frequentes: plurimusq; illis calor inest: ac postq; febris constiterit, statim ex profundo quædam emergit humiditas, calida quidem, sed mitis. Atq; in totum facies rubicunda illis, & magis tumens, vrinæq; subalbida. Communis autem omnibus huiusmodi febribus est pulsus æqualitas. Curare igitur omnes quidem oportet balneis. Cæterum qui ex cutis densitate, aut inguinis inflammatione febricitant, si in aere balnei immorari iusseris, haudquaquam nocebis. Reliquos omnes q̄citisimè oportet ab aere semouere. Si uerò diutius in aqua immorari uoluerint, permittere. Oleo autē multo, & tepido, & manibus mollibus perfricare q̄ plurimum, sed eos præsertim, qui ex labore febricitant. Secundo autem loco, q̄ meatus habent astrictos: at tertio, qui inguinū patiuntur inflammationem: quos nimirum sæpius lauare expedit. Cibum autem cōcoctu facilem assumere qui ex labore febricitant, possunt multoties: nō æquè tamē, qui ex densitate cutis, aut inguinis inflammatione laborant: quorum ēt vtriusq; tenuis victus est utilis. Sed & vinum potare quantum possunt conuincere, sunt permittendi, quibus labor febris occasio extitit. Mensuræ autem ratio, ex uiribus & ætate sumitur ægrotantis: necnon ex naturali temperie, consuetudine, anni tempore, & regione, aliisq; id genus. Qui uerò ex inguinū inflammatione febricitant, arcendi sunt à vini potu, donec inflammationes soluantur. At, qui cutis foramina habent astricta, aut refrigerati sunt, si quidem non multum hoc affectu laborent, nec plenum corpus ha-

Tomus. III.

KKk

513

Ephemeris ex inflammatione inguinū, quæ accidunt.

Ephemeratū 3.
curatio.

Ephemeris uicinus ratio conueniens.

Mensuræ rō in exhibitione alimēti per ephemeris febres, ex quibus sumatur.

Vini potus qui
bus cōueniat
ephemeris.

Ephemerarum
causis, contra-
rias esse admo-
uendas.
Ephemera cū
bubone infe-
stans, ab ulcere
originē duxit.
Febres ex in-
flammatione
sunt sympto-
mata partium
inflammatarū.

Februm putri-
darū differētia.

beant, non sunt à vini potu prohibendi. Qui autem su-
pra modū refrigerati sunt, aut pleniore corpore, pro-
hibere vtile est. Rursus, qui ex vigiliis, aut aliquo ani-
mi affectu febriunt, postq̃ balneaueris, cibo humido ac
boni succi reficere oportet: vinum verò omnibus iis,
qui vigiliam passi sint, intrepidē offerre, nisi capitis do-
lore premantur, aut pulsum venarum in temporibus
sentiāt. Sed & iis qui ex ira aut mœrore aliquo, aut co-
gitatione febricitant, vinum est exhibendum: sicuti et
illis, qui furore perciti fuerunt, quando omnino per-
turbatio fuerit refrigerata: nam prius sanē vsus vini
erit periculosus. Tētare autem oportet semper adfer-
re contrarium ei quod infestat: labori quidem, quietē:
vigiliis somnum: iræ, furori, & tristitiæ, sermonibus,
actionibus, spectaculis, enarrationibus, animi iucundi-
tatem. Sic qui ex cogitatione laborat, omnino ratioci-
nationes omittat. Et qui ex inguinum inflammatione
febricitat, eius curationi intendat: ac multo prius vlce-
ris, vnde originem habuit. Atq̃ hæcenus de epheme-
rarum indiciis, remediisq̃. Reliquæ verò febres, nōnul-
læ ex inflammationibus: nonnullæ ex humoribus ac-
cenduntur. Et quæ ex inflammationibus fiunt, sunt velu-
ti symptomata quædam partium inflammatarum.

De febribus putridis.

Cap. IIII.

AT quæ ex humorum putredine accenduntur fe-
bres, eæ & dicuntur putridæ, & sunt non mor-
borum symptomata, sed ipsæ morbi. Ex his ve-
rò nonnullæ quidem absq̃ accidentibus accidunt, &
mitissimæ sunt: nonnullæ item, cum accidentibus ur-
gent. Earum igitur, quæ accidentibus carent, paucae q̃-
dem ad exactā sui cognitionem, diē quartū desyderāt.

De signis februm intermittentiū.

Cap. V.

PVæ igitur cum rigore inuadunt, non ab re ex
earum esse numero iudicabis, quæ per circui-
tus infestat. Tertianæ enim atq̃ quartanæ,

in totum cum rigore accessiones faciūt. Sed tertianæ quidem in primo insultu cum nimio sæpe rigore incipiunt: quartanam autem non vidimus cum vehementi rigore incipientem, sed procedente tempore magnitudo ei supuenit, præter id, quod nec statim ab initio hæc febris ut plurimum solet inuadere, sed aliis quæ antecesserint, subsequi. Quartana itaque solet errabundis febribus supuenire. Quotidiana verò, rarò accidit absque læsione oris ventriculi. Rursus quartana ex male affecto splene gignitur: ut tertiana ex affectu iecinoris. Quæ verò cum valido rigore incipit, magis febris tertiana, quàm aliqua aliarum febrium fore speratur. Quod si reliqua etiam signa attestentur, hanc dubio procul in prima statim die tertianam esse cognosces. Etenim calor multus & acris adesse debet: pulsus autem magnus, calidi, vehementes, veloces, atque frequentes, omnisque inæqualitatis, præter quàm febrilis, expertes. Rigor porro, veluti si à re aliqua acuta, plius quam frigida, corpus perpungeretur: quum ii qui quartanam aut quotidianam intermittentem patiuntur, potius frigidum rigorem percipiant. Tempus autem anni æstiuum: sicuti & locus, & præsens status calidus. Sit autem & ægrorum natura calidior, & biliosior, & ætas adolescētis: & exercitationes potius quàm ociositas antecesserint: magisque densitio, quàm frigefactio, & parcitas cibi, potius quàm crapulæ. Vigiliæ quoque, mœrores, atque labores, & intensæ cogitationes, ad eundem affectum perducunt. Quod si multos alios eodem tempore laborantes contigerit tertianis corripi febribus, hoc quoque maximum aliquid, præter ea quæ nuper diximus, signum erit. Si igitur hæc omnia adfuerint indicia, aut saltem quæ maxima sunt, & sitis quoque vehemens adiungatur, vomitusque bilis, aut sudor, vel utraqque superuenerint, tunc nulla dubitatio relinquitur. Quod si inter hæc à febre quieuerit homo, hac inquàm quæ ex suo motu

Quartana nō solet ut plurimum statim à principio inuadere, sed aliis subsequi. Intermittentiū singulæ, quarū partium comitentur læsiones.

Febrem tertianam quæ arguatur.

est omnibus nota, propria verò febrium inæqualitas, in arteriarum motu relinquatur, tunc firmiter poteris esse tertianam febrem ostendere, ac si tertio iā die accessionem fecisse videres.

De signis quartanæ.

Cap. VI.

Quartanarum
indicia.

Dum rigent qui quartana tenentur, pulsus habent satis tardos & raros. Quum autem consistit febris, atq; etiam augetur, necesse quidem est, ut veloces fiant, atq; frequentes. Seruatur tamen & tunc propria ipsius tarditas, raritasq; si additam velocitatem atq; frequentiam in accessionibus mediteris. Iam quæ omnibus cōmunis est febribus, in vno pulsu inæqualitatem, in hac manifestissimè licet comprehendere. Multo namq; velocius principium, finemq; motus inuenies, q̄ medium. Præterea æstus, & deustionem, & quendam veluti feruorem, qualis in tertianis videtur, in quartanis haudquā inuenies. Sed & ægrotātis natura inspiciunda est, an atra in ea bilis abundet: & tēpus quoq; anni, an sit autumnus: & præsens status, an inæqualis. Sic verò & loci natura, & morborum peruagantium vulgariter, & an lien intumuerit, febrisq; antecesserit inordinata, & ætas senior q̄ cōsistentium: & an cum sudore febres desinant. In his verò bilis flauæ vomitus minimè expectādus est: quemadmodum nec in quotidianis intermittētib; . Hoc etenim tertianarum est proprium signum. At quum febris cessauerit, si adhuc vestigium febris remāserit, pulsusq; iis, qui secundum naturā, rariores atq; tardiores fuerint, quartana proculdubio erit huiuscemodi febris.

De signis quotidianæ intermittētis. Ca. VII.

Quotidianarū
indicia.

Quotidianæ intermittētis calorem humidiorē cum quadam acrimonia esse oportet: non quum primum manus admouetur, occurrētē, sed per moram. Nam quædam fumosa caliditas cum multo vapore cōmista perspirare videbitur. Sed

& his longè minores sunt pulsus pulsibus quartanarū,
 q̄ istarum pulsus pulsibus tertianarum. Rursus verò tā
 to rariores sunt in quotidianis intermittētibz pul-
 sus, his qui in tertianis, quanto illis pulsus quartanarū.
 At tarditas in vtriscq; eodem modo se habet. Minus ve-
 rò siticulosa hæc febris est: tantumq; eā quartana ex-
 cedit, quantum istam tertiana. Humidissimum etiam
 totum corpus in his febribus est, & vomitus pituitosi.
 Quæcunq; autem excernuntur per ventrem, frigidio-
 ra, humidiora, crudiora, et pituitosiora existunt. Et qui-
 dem ætatibus, naturis, anniq; statibus & temperaturis
 humidioribus hæc febres accidunt. Nam adolescentem
 biliosa & sicca temperatura, nunq̄ vidi quotidiana cor-
 ripi febre. Pueri autem, præsertim minores natu, et ex
 adultis pituitosi, & habitudinis crassæ, atq; ocio pluri-
 mo dediti, necnon crapulis, ebrietatibus, balneis assi-
 duis, post cibum præsertim, vtentes, facile à quotidia-
 nis capiuntur. Loca etiam humidiora, atq; ex anni tē-
 poribus hybernum, ex statibusq; humidiores, hanc p̄-
 cipuè conciliant febrem. Quòd si populariter etiam
 grassetur, hoc quoq; non parum ad eam dignoscendā
 conducet. Non tamen harum febrium declinationes,
 quemadmodum tertianarum & quartanarum, sudori-
 bus terminantur. Quare neq; ad integram quietem,
 exceptis paucis, perueniunt. Quotidianarum vrinæ
 sunt albæ, & tenues, vel crassæ & turbulentæ, vel rubi-
 cundæ. Tertianarum rufæ, vel surrufæ. Quartanarum
 variæ quidem, sed crudæ omnes.

De signis febrium continuarum. Cap. VIII.

Febres autem continuas hinc cognosces, q̄ nullum
 eis adest signum ex iis quæ adesse intermittētibz
 diximus: & q̄ intra quatuor & viginti horas nō ces-
 sent. Si uerò inæquale incrementum habuerint, hoc q̄
 dem, præter alia signa, lōgius etiam tempus ostendit:
 necnon si proprium febrium signum in pulsibus ma-

Quotidianæ
 quos præci-
 pue soleat cor-
 ripere.

Quotidianarū
 declinationes
 non terminant
 sudoribus.
 Vrina intermit-
 tentiū singulis
 propria.

Febrium conti-
 nuarū indicia.

nifestum adsit. Quòd si inordinatio etiam ac inæqualitas ipsis vel inconcinnitas insit, & hoc etiam indicium simul magnitudinis atq; continuitatis. Si verò in hoc statu permanentes, tertio die maiorem accessionem ostenderint, aut excrementa & urinae omnino crudæ apparuerint, non possunt huiuscemodi febres ante septimum diem terminari. Ad hæc si quarta dies tertiæ diei similis fuerit, & febris veluti deurens, nec facies, aut reliquum corpus collabatur quicq; huiuscemodi febris ad longius extendi tempus consuevit. Ac tales quidem sunt differentia earum febrium, quæ accidentibus carent. Curatio autem cuiusq; earum deinceps scribetur: primum tamen intermittentium: dein continuarum. Ex intermittentibus igitur breuissima mitissimaq; est tertiana. Longissima autem, & quantum in ipsa est, haudquaquam periculosa, quartana. Quotidiana verò, & longa, & non sine periculo. Porro * ubi morbi existunt acuti, celeriter q; ad statum perueniunt, & si valde tenuem victum exhibeas, non multum lædes. Vbi verò sunt diuturniores, nisi ab initio cibo vberiore reficias, hominem simul cum morbo perimes: aut intempestiuè victus modum commutabis. Neq; enim oportet statu accedente offerre largiorem cibum quàm prius: sed contrà, potius tenuissimum victum, qui in toto morbo exhibeatur, in statum reseruare. Distinguendum autem est, num exquisita, an minimè exquisita sit febris. Etenim exquisita tertiana, ad maximum, septem circuitibus iudicatur: estq; minimè periculosa. Alteram verò non exquisitam, quandoq; vidi, quum in autumno incepisset, in uere desisse. Quantum autem hæc natura inter se differunt, tantum rationabile est & rationem victus mutare. Ergo si quæ in principio sermonis tertianarum febrium indicia scripsimus, omnia adfuerint, exquisitâ reddunt tertianam. Cuius accessionis tempus breue,

Tertiana est breuissima, mitissimaq;.

Quartana est longissima, mitissimaq; periculosa.

Quotidiana est plura, neq; vacans periculo.

Acuti & veniosissimi morbi, tenuissimâ victus ratione possulant: ubi mori longiores.

Tertiana exquisita ad maximum septem circuitibus iudicatur.

quatuor, aut quinque, aut sex: at longissimum, undecim aut duodecim horas complectitur. Atque huiusmodi febrium urinae, tertio die, aut ad summum quarto, coctionis signum ostendunt. Quibus sane indicibus exquisitam, a non exquisita tertiana distingues. Eadem quoque ratione exquisitam quartanam & quotidianam. Cui enim omnia insunt indicia, quae in quartanis febribus antea descripsimus, haec vera & exquisita est quartana. Cui verò minimè, spuria & non exquisita existit. Quotidiana etiam cui omnia quae diximus insunt, exquisita est: quae autem eam naturam non habet, spuria. * Non igitur quemadmodum exquisitae quotidianae & quartanae, sic etiam non exquisitae, sunt longae. Nam quemadmodum exquisita tertiana est brevis, sic & quotidiana & quartana diuturnae. Ceterum non licet nobis bene praenoscere, nisi quantitatem morbi atque virium accuratè expendamus. Etenim si vires adeo validae fuerint, ut morbum vincere possint, necesse est aegrotum euadere. Sin verò contrà, omnino morietur.

De cura exquisitae tertianae.

Cap. I X.

Exquisitam ergo tertianam, ut quae ex flava bile commota inualescat, quàm maximè fieri potest, refrigerare, atque humectare oportet. Nam contrariorum contraria remedia sunt: quae quidem quod superfluum est, reprimant: quod verò deficit, suppleant. At flavae bilis humor, omnium qui in corpore sunt, aridissimus, calidissimusque existit. Hunc igitur, quum ad ventriculum repit, per vomitum educere oportet. Quum verò vergit ad inferiora, eodem modo per aluum: id quod fieri solet sponte, in exquisitis tertianis. Per urinam quoque & sudores oportet ipsum vacuare. Ac venter quidem, mollibus clysteribus inaniendus est: urina verò, potionibus, in quibus apium, aut anetum maderit, prouocanda. Quod si tibi coctionis signa monstrentur, iam cum fiducia aliquid absynthii exhibebis:

Tertianae exquisitae accessio, duodecim ad summum horas complectitur. Exquisite intermittentes a non exquisitis quomodo distinguantur.

Praecognosce, re illi non licet qui morbi & virium magnitudinem non expendit.

Tertianae exquisitae curatio. Contrariorum contraria remedia sunt. Flava bilisqualis sit humor.

Urinam quae prouocent.

KKk iiii

**Abſinthiu eſſe
remediũ ſum-
mum cõtra bi-
lis moleſtias.
Balnea dulcia
cur tertianę fe-
bri anxiliant.**

**Alterare inua-
leſcentes quali-
tates febriles,
q̃ uacuare, ma-
gis conducit.**

**vinũ correptis
tertiana propi-
nandum nõ eſ-
ſe anteq̃ appa-
reant ſigna co-
ctiõis.**

**Tertianis ex
quĩſitis quæ ui-
tus ratio con-
ueniat.**

**Suum pedes &
cerebra cõfer-
re tertianis nec
non affas por-
celli carnes.**

quod alioqui ſummum eſt remedium, vbi infeſtauerit bilis, ſi præſertim ex ipſius coma, quantum ſit ſatis, accipiens, mellicrato intinxeris. Balnea verò calida, ex aqua potabili profunt: tum quia aliquid bilis educunt: tum quia ſua qualitate & humectant, & potentia refrigerant. At marinæ aquæ ſalfæ, nitroſæ, & ſulphuræ, plus quidem bilis educunt, ſed magis ſua qualitate nocent, quàm euacuationibus iuuent. Sæper autem oportet contrarias qualitates, illis quæ inualuerint præter naturam, opponere: quũ hoc multo plus iuuet, quàm quomodolibet euacuare. Hic itaq̃ in balneis ſcopus ſit, vt corpus madeat, vtq̃ humectetur. Vbi igitur plurimum olei calidi infuderis, ad aquam perducere, ac madefacere oportet. Quòd ſi in ea natære voluerint, quantum id facere poſſunt, permittendum. At qui balneis admodum delectantur, ſi etiam bis in die lauari permiferis, non aberrabis. Sed illud ſemper habeto in memoria, vt tempeſtiuè id faciant. Si verò etiam coctiõis ſigna oſtendantur, ſi ſæpius laueris, nihil deliqueris. A vino autem, ante quàm morbus coquatur, prorſus eſt abſtinendum. Verũ vbi concoqui is cõperit, dandum eſt ab initio tenue, aquaticum, atq̃ paucum. Vbi verò iam prope eſt, vt morbus ſoluatur, amplius eſt offerendum. Cibi autem quicunq̃ humectat, atq̃ refrigerant, omnes vtiles ſunt exquisitis tertianis. Cæterũ quantitas in ipſis ſit tanta, vt bene concoqui poſſint. Ex oleribus quidem, atriplex, blitum, lappathum, malua, lactuca, & cucurbita. Ex aliis verò, priſanæ ſuccus, ſorbitio ex alica, ex piſcibusq̃; ſaxatiles. Ex volatilibus deniq̃ ea, quæ mollibus cõſtant car nibus. Quæ autem talia non ſunt, eorum alæ: teſticle quoq̃ gallorum, & ſuum pedes, & cerebra. Paruorũ uerò ſi etiam dederis carnes affas, nihil nocebis. Sed & oua ad ſorbendum ſunt offerenda: & præſertim vitelli eorum: nam hi facilius quàm pars alba coquuntur.

Ex fructibus aut illos tñ degustent, qui nō sunt oīno
difficiles coctu. Oportet abstinere à melle, sinapi, sali-
tis, & acribus omnibus: sicuti & à vinis satis vetustis &
calidis.

De cura tertianæ nothæ. Cap. X.

IN iis verò quæ non adeò exquisitæ sunt, prouiden-
dum est, ne morbus augeatur: ne uē ægotātis vires
corruant, quæ laborare longiori tempore debent.

Quare operæpretium est scire, ad quantum magnitu-
dinē morbus ipse sit peruēturus: & q̄tæ sint ipsius ægri
vires: ut ad ea īspiciēs quæ mains auxiliū postulant, ine-
dia quidem, in valentioribus utaris viribus, & morbo
cōcoctu difficili: largiori autem cibo, vbi vires sunt in-
firmiores, nec morbus admodum ad concoctionem
contumax. Iam verò in tertianis non exquisitis, nec
statim circa initia balneare expedit: sed quum primum
coctionis signa apparuerint. Nec cibum quotidie offer-
re expedit, sed alternis diebus. Quies verò, & calfactio
circa præcordia iuuant, & sorbitiones quæ concoquū-
tur facili, & clysteria non admodum mollia. Quòd si
sanguinem mittere oporteat, neq; hoc quoq; omittē-
dum est. Sed ab initio statim, tantum sanguinis detra-
hendum est, quantum præsens status exigit. Sit autem
totius victus ratio, non quæ humectet, atq; refrigeret
vniuersum corpus: sed quæ aliquem modum etiam as-
sumat, ad calfaciendum, incidendumq;. Plurimum igi-
tur eos iuuat ptisanæ succ^o pipere adiecto. Adhæc hys-
sopum, vel origanum, vel spicā nardi mulla infundēs,
& decoquens, ad bibendum propina, & quæcunq; alia
prouocantia vrinam, exceptis illis, quæ præter modū
calfaciunt, exiccantq;. Maximè verò post diem se-
ptimam danda eis iugiter est absynthii coma. Et quidē
oxymel potione plurimos iuuat: & aliquid ex iis quæ
molliter ventrem subducunt. Vomitus ē post cibum,
adeò his quibus hæc febris perdurauerit, utilis est, ut
multos sciam solis vomitibus statim fuisse curatos.

Vitelli ouorū
facilius q̄ al-
ba coquūtur.

Tertianæ no-
thæ curatio.

Tertianis no-
this uictus rō
conueniens.

Tertianis ne-
this cōfert plu-
rimū uomitus
puo catus post
cibum.

Quartanas in principio esse tractandas leniter: nullāq; tū moliendā esse fortem euacuatione.

Sanguinis missio i quartanis quatenus celebranda.

Quartanis utilis ratio conueniens.

Diatrion peperon quartanis utile.

Piper cū aqua singulis diebus bibitū, ad quartanas facere.

Quartana de tētis vngēda esse viscera vnguentis, cataplasmatiscq; mollientibus.

Quartanas ab initio mediocriter, ac leniter tractare oportet, nullū forte medicamen, aut euacuationem exhibentes: nisi fortē sanguis vehementer superabundans appareat. Cæterū si vena incisa, is qui fluit, niger & crassus videatur (qualis in iis præcipuē visitur, qui liene laborant) audacius mittendus est. At si flauus, aut tenuis cernatur, subito suppressendus. Venam verò secare oportet, vel anteriorem, vel mediam, quæ est in sinistro cubito. Victū deinceps instituere sine flatibus, ac optimum: ventremq; emolliere, iis quæ vsitata sunt, expedit. Quæ si hæc nihil proficiant clysteribus vtēdum est, à principio quidem mollioribus: postmodum verò acrioribus. Arcendi sunt autē à suillis carnibus, ab oībusq; eduliis, quæ tenacia sunt, & tardum habent exitum, quæq; tum refrigerant, tū siccant corpus. Vino verò vtendum est albo, tenui, & mediocriter calido, & volatilibus quæ boni sunt succi, nec in paludibus degunt. Pisces sunt adhibendi, qui facile concoquantur, ac molles carnibus, nihilq; tenax habentes. Vtendum est autem salsamentis, & sinapi: ac certis diebus medicamen diatrion peperon, vel diosporiticum est assumendum. Quod si quotidie piper tantum cum aqua biberent, rectē etiam facerent. A frictionibus autem, ambulatiōibus, atq; balneis, nō sunt penitus prohibēdi. Quanq̃ si omnino possent à balneo abstinere, solis contenti frictionibus, inde plurimum iuuarentur. Iam si quartana ipsa sit brevis, nec admodum violenta, nihil nocuerit, si diebus interiectis ad cōsueta exercitia se transferant. Hæc igitur ab initio, & vsq; ad statū sunt pagenda. In statu aut subtilior utilis ratio adhibenda est, quā ante, vel post. Statim verò æger continendus in quiete est: ac visceribus prouidendum vnguentis & cataplasmatibus, quæ molliere & laxare possint. Deinde medicamentis vtendum, quæ

C V R. A D G L A V. L I B. I.

ciendi vrinam vim habeant. Vbi verò coctionis signa apparuerint, tunc sanè purgare oportet iis quæ humores atros inaniant, non semel tantum, sed sæpius, si videatur necesse. Utendum autem & vomitibus statim à cibo: & si nihil prohibuerit, elleborum album est exhibendum: primò quidem, permistum radiculis: quòd si nihil profecerit, ipsum per se. Cæterum qui nequeunt euomere, ii uehementius per inferiora purgentur: ac postmodum offeratur eis in potu, medicamen confectum ex viperis: necnon quod succum cyrenaicum recipit. Quicumq; verò ab initio aliquid ex hisce medicamentis exhibuerunt, aut omnino ante statum, quartanam quæ erat simplex, duplicem reddiderunt, aut omnino maiorem, atq; difficiliorem: ex duplici autem triplicem, aut omnino ambas difficiliiores.

De cura quotidianæ.

Cap. XII.

Quotidianam autem quum volueris curare, oxymelite vtor post primos dies: & illis quæ probe possunt vrinam ciere: vniuersumq; totius victus caput sit ad incidendum efficacius. Circa statum verò, de ventriculo est habenda sollicitudo, ac de ipsius ore præsertim. Deinceps iubendum est, ut post radículas & cibos assumptos vomant. His etiam quæ pituitam subducunt, utendum.

De cura febrium continuarum, quæ carent accidentibus.

Cap. XIII.

In continuis autem febribus, quibus non ultra septimum futurus status est, si vires validæ sint, & ætas consentiat, admodum exquisitus & tenuis victus est instituendus. In quibus verò vel status totius morbi longius abest à septimo, vel vires robustæ non fuerint, uberiori cibo ægri sunt reficiendi: quemadmodum prope statum tenuiori. Quum autem iam adest status, tenuissimum victum seruare oportet: deinde rursus semper uberiores. Sanguinem verò mittere

523

Quartana de-
tentos esse plu-
ries purgandos
sed apparenti-
bus iam signis
coctionis.
Quartanis pro-
desse vomitus.

Theriace in
quartanæ prin-
cipio exhibita
quid molietur.

Quotidianæ
curatio.

Febrium con-
tinuarum quæ
solæ citra acci-
dentia infestant
curatio.

oportet, & ob morbi magnitudinem. Quibus autem rubor multo intensior, quam pro naturæ ordine, & maior, quam pro cōsuetudine, totius corporis moles, venæq; eminetes, extensæq; fuerint, iis est auferendus, nisi vires, aut ætas, aut aliquid commemoratorū, prohibuerit. Quod verò humidus victus in febribus acutis omnibus iuuat, rectè iam dictum est. Cremor igitur ptisanæ, iis quibus non acescit, exhibere oportet: & mellicratum quibus non bilescit: & sorbitiones ex alica: & panem ex aqua. Porro in febribus præter modum calidis, vrentibusq; quum primum coctionis signa apparuerint, tunc audacter aquam frigidam propinabis. Modus verò in quantitate seruetur, quemadmodum tempus anni, regio, ætas, natura, consuetudoq; exigunt.

Victus humidus in febribus acutis conducit. Aquam frigidam propinadam esse in ardentibus febribus, quum primum apparuerint signa coctionis.

De curatione febrium cum accidentibus.

Cap.

XIIII.

Febrium cum accidentibus infestantium curatio.

Febribus quæ cum alui fluxu re infestant, non esse alia opus euacuatione.

Quæ febres cum accidentibus vrgent, non æquè simplicem exigunt curationem. Sed pro virib; metiendum est, quanta sit ipsa febris, quantumq; ex accidentibus immineat periculum: atq; ad id quod vehementius fuerit, & difficilius, intendendum: non posthabita omnino etiam alterius cura. Etenim vbi simul cum ipsa febre sentitur circa os ventriculi anxietas, morsus, & imbecillitas, prius sanè vacuandi humores non sunt, quam os ipsum ventris corroboretur: etiam si cruditate aut cacochymia æger ipse laboraret. Sed nec si fuerit febris cum ventris profluuiio, alia est opus euacuatione. Verum hæc sola sufficit, quauis non sit pro ratione ipsius plenitudinis. Iam verò si quis simul & distentione neruorum laborauerit, & sanguinis egerit missione, neq; huic tantum semel mittere oportet, quantum exigit morbus: sed aliquid etiam accidenti est relinquendum, cuius causa sæpe sudores eueniunt, & vigiliæ molestant, & vires ægroti debilitant.

C V R. A D G L A V. L I B. I.

525

Ista etiam si vehementes vigiliæ, aut dolor intensus ægrotum cruciant, cauendæ sunt subitæ euacuationes, ac multæ. Ipsa præterea ambientis aeris temperies, loco accidentis cuiusdam habenda est, dum exquisitè calida & sicca fuerit: qualis est tempore medio inter canis & arcturi ortum. Si etiam valde frigida fuerit, tunc quoque sanguinem mittere formidandum. Ob hæc etiā neque in locis admodū calidis, aut frigidis, sanguinē mittere audemus. Quod si regioni temporis status consentiat, etiam omnino abstinemus: si verò non cōsentiat, euacuamus quidem, sed multo minus, quā si neutrum prohiberet. Tolerantia etiam ægri, ceu quoddā accidens, expendenda venit: nec secus ipsa temperatura. Nam quicunque calidi & sicci natura sunt, hi omnes faciliè ab integris euacuationibus offenduntur. Cōsuetudo quoque non parui momenti est, quum ad omnia alia, tum præcipuè ad euacuationis indicationem. Quidā enim nūquam prius fuere vacuati, & multis cibis sunt usi. Nōnulli contra, nec multis cibis sunt usi, & euacuationibus assueuerunt. Hos igitur intrepidè euacuare oportet, si reliqua etiam consentiant: alios verò, ne si reliqua omnia id suaserint. Eodem pariter modo & corporis habitus considerandus. Nam qui densa & solida carne constant, non offenduntur faciliè. Quare non oportet vereri ipsos vacuare ex toto, si quidem & alia id iubent. At qui mollem, & tenellam, & diffuentē carnē sortiuntur, ii mirum in modum sunt ad patiendum habiles. Quare vel si reliqua omnia sanguinem esse mittendū suadeant, non tamen id facere audendum est, sed vten dum aliis euacuationibus moderatè. Eodem modo & in iis qui supra modum crassi aut macilenti sunt, ab incidenda vena supersedendum, cæterasque integras euacuationes vereri oportet. His et ætas annumeranda est, veluti quoddam symptoma, quod prohibendi integram uacuationē vim habet. Neque enim pueri, neque se-

Euacuationes subitæ ac multæ, quando cauendæ sunt.

Sanguinis missionem prohibet aeris constitutio impese calida aut frigida.

Calidi & sicci offenduntur ab immodicis uacuationibus. Cōsuetudinē plurimū posse ad uacuationis indicationem.

Habitudines corporum quæ nam facile missionem sanguinis ferant, & quæ difficulter.

Pueri, senesq;
integras uacua
tiones nō ferūt.

niores hanc sine noxa tolerant. Hosce igitur omnes, si dispositiones hortentur, nō semel nec ex toto, sed paulatim oportet vacuare, inediis moderatis, frictionib⁹, clysteribus mollibus, perfusioibus, atq; balneis. Quōd si duo contraria symptomata, aut morbi, coeant, aduersus id quod magis urgeat instandum: nec interim alterum negligendum. Eas verō quæ habentur ex accidentibus & morbis indicationes, non simpliciter, sed secundum causam à qua singula fiunt, cōsiderare oportet: qualia sunt defectus animi, & exolutio: quæ duo nōia de vnica re dicuntur, cuius plures existūt causæ. Siquidem nō solum per varios affectus corporis, sed etiam

Animi vehementissimi a
fectus, senes p
cipue atq; im
becillos exo
luunt.

in vehementissimis perturbationibus animi, nonnulli exoluti fuerunt: precipueq; senes, & natura imbecilli. Etenim plures eorum trīstati, aut lætati, aut irati, animo defecerunt. Qui autē magis robusti sunt corpore, ex immodicis euacuationibus idem patiuntur. Iā verō si abscessus quispiā rūpatur, vires vehementer lædit, ac tū precipue, quum materia simul tota ad ventriculū, vel ipsius os, aut thoracem defluerit. Quōd si qñ etiā nos abscessus secantes, totum simul emittere pus voluerimus, animi defectum subsequi est necessariū. Nec verō laborantibus aqua iter cutē, tota simul humiditas (quis ea pter naturam sit) potest sine noxa vacuari: sed tunc quoq; necessum est, hominem deficere animo. Ex dolore etiam vehementia, similiter dissolutiones accidunt. Quin et nervus percussus, & musculi caput, & maligna in articulis vlcera, & imoderata quædā frigiditas, aut caliditas, vitalisq; roboris exolutio, pterea insignis cruditas, obstructioq; aut inflamatio alicuius p̄cipuæ partis, aut os v̄triculi malè affectū, aut improbæ euacuationes, aut deniq; alia multa, de quibus postea dicemus, inferre possunt defectum animi. Quæ sanè causæ singulæ propriam curationē desyderāt. Porro eos qui ex choleris, & alui profluio, & aliis tū largē, tū vno ipse-

Pus perfectio
nes abscessuū,
si totum simul
vacuetur, vires
deicit.
Hydropis a
quam nō pos
se totum simul
vacuari absq;
deliquio ani
mi.

Dolor vehemens vires ex
oluit.

tu factis euacuationibus dissoluuntur, frigida spargere oportet, & nares comprehendere, & os ventriculi perficere, iubereque ut vomat, stomachum irritando digito vel penae immissione, ac denique alligare pedes & manus. Oportet autem nexus fieri, plures quidem, ac fortiores, circa manus, quam per inferiorem partem sunt euacuationes. Nam si vacuatio per superiora fiat, plures ac vehementiores ligaturae cruribus admolenda sunt. Situm quoque aliquem parti fluxionem patienti expedit inuenire, in aduersum tendentem, sed moderatum. Nam si nimium tendat, atque ex hoc fatigetur, nihilominus irritat, quam si inclinaret ad eundem. In vniuersum autem, aut ad cetera membrorum patientibus in aduersum trahere oportet: aut ad ea in quibus est fluxionis origo. Atque ideo vehementes euacuationes quae ex matricibus sunt, cucurbitulae iuxta mammillas appositae, statim sedant. Quae vero ex naribus, hepatis, ac spleni, secundum nares patientem. Quae si ex ambabus naribus simul plurimus sanguis effluat, utriusque visceri applicanda sunt. Vinum est a qua frigida temperatum, curat eas, quae ex magnis sunt euacuationibus, dissolutiones: ac tunc praesertim, quando humores fluunt ad ventriculum. Ceterum si aliquid viscus sit inflammatum, aut caput doleat vehementius, aut aliqua alienatio animi affuerit, aut febris ardens in morbo crudo: magna & penitus insanabilia ex potu vini, huiusmodi affectibus nocumenta proueniunt. Iam vero, quae frigidum potare non sunt assueti, aut manifeste ex ipso laedunt, quaeque natura sunt frigidiores, & qui in extrema sunt senectute, & loco degunt natura frigidiori, & tempore hyberno, cauere a potione frigida debent. At qui contrario modo se habent, his intrepidum illam offerre licet. Sit autem vinum, in fluxionibus quae ad ventriculum sunt, calidum simul & tenue, quale Lesbium. In sanguinis vero fluxibus, crassum, & nigrum, & acerbum. Ipsis autem locis imponere oportet, veluti ventriculo, matrici, stomacho, & thoraci, quae corroborandi vim habent: capiti autem & fronti, propter haec, illa est quae refrigerent. Et quibus

Deliquiū animi quod inducat.
Deliqui ij animi ab immodica vacuatione curatio.

Profluua matricie sedant cucurbitulae iuxta mammillas appositae. Sanguinis fluxum e naribus cucurbitula per cordis admodum compescit. Vinum frigida temperatum, vires exolutas ob immodicas euacuationes instaurat. Vinum quibus non dandum. Frigida potio quibus conueniat minime, & quibus sit propinanda. Partes per quas sit fluxus, corroborandas. Caput esse refrigerandum, ubi sanguis fluit per nares.

Deliquit ani-
mi ob sudores
curatio.

Exoluti a ple-
nitudine quō
sunt curandi.

Vteri suffoca-
tionis curatio.

Exolutiois ob
ventriculi im-
becillitatem,
curatio.

Ventriculum
roborantia.

vel in superficie, vel in naribus, vena aliqua disrupta est, medicamen aliquod, ex iis quæ sanguinem supprime-
re possunt, est imponendum. Porro balneæ in fluxioni-
bus ad ventriculum quidem aptissimæ sunt: ac sangui-
nis fluxum acriter irritant. Et quicumq; ob sudoris co-
piam animi defectum patiuntur, his etiam plurimum
nocent: vt quas potius astringere oporteat, atq; refri-
gerare. His etiam vinum frigidum exhibendum est: ac
nihil omnino calidum. Sed nec etiam artus ipsorum li-
gare oportet, neq; cogere ad vomitum, neq; ullo mo-
do mouere. At ventis refrigeratibus aditum præparare:
aerem quoq; domus alterare frigida & acida qualita-
te, myrtorum frondibus, & vitium capreolis, ac rosis
pauimentum conseruentes. Nihil verò horum confert,
vbi fluxiones ad ventriculum fiunt. At qui exoluuntur
ob plenitudinem, eorum artus quæ plurimum perfricare
oportet, calfacere, ac deligare. A vino verò & cibis
sunt abstinendi, & a balneis, si febriant. Sufficit autem,
si eis dederimus mellicrati potum, in quo ebullierit thy-
mus, vel origanum, vel pulegium, vel hyssopus. Con-
uenit quoq; oxymel. Quæ ex matrice laborant, atq;
exoluuntur, non aliter sunt curandæ, excepto oxyme-
lite. Fricare autem ac deligare magis earum crura opor-
tet, quam manus. At quibus vterus aut sursum, aut ad
latus reuellit, inguinibus & coxis cucurbitulas appli-
camus: & naribus quidē, ea quæ foetidissimū hñt odo-
rem: matricibus autem odorata, & ea quæ laxare, calface-
req; possunt, medicamenta offeremus. Si verò ob imbecil-
litatem ventriculi, animi sequat deliquitū, ea quæ roborā-
di vim habet oportet emplastra adhibere, quale est quod
fit ex palinulis, vino, farina hordei, croco, aloe, & ma-
stiche. Madefacere autem iis quæ constant ex absinthio,
oleo melino, & mastichino: necnon nardo, uino, &
cænæthe. Quod si exuratur, miscere ex refrigeratibus
aliquid conuenit, veluti cucurbitæ, lactucæ, portula-
cæ, solani,

ex, solani, intybi, atq; vuae acerbæ succū. Aqua etiam frigida plerunq; iuuat malè affectos stomacho, si tempestiuè, hoc est in declinatione, exhibeat. Alioqui plurimum obest. Atq; his qui os ventriculi imbecillum habent, vinum calidū exhibere oportet, si nihil prohibeat. Plurimum verò iuuat eos qui sic laborant, etiam frictio extremorum. Quòd si ex iis remediis nihil melius se habuerint, eos quidem qui adusti sunt, quamprimum ad balneas ducere oportet. Qui verò aliquid frigoris sentiunt, medicamē diatrion pepereon, ipsumq; piper solum, atq; etiam absynthiū bibant. At qui exitiosis humoribus os ventriculi mordicātibus exoluntur, hos post aquæ calidæ, aut hydrolei potum, fac vomere. Vacuatis humoribus, partē læsam oportet modis omnibus roborare: partim iis quæ admouent extrinsecus: partim absynthii potione. Ceterum si humores adhuc in ventre consistent, minimè sanè astringere, sed tantum concalfacere oportet. Vbi verò multa pituita in ore ventriculi acervata fuerit, fouere quidē plurimum oleo, in quo ebullierit absynthium: postea mellicratum exhibere, in quo hyssopum, vel quid simile infusum fuerit: item oxymeli, & piper, & diatrion pepereon, & diospoliticon medicamē. Victus ratio in summa, incidendi vini habeat. Quæ verò ex nimia frigiditate enuiunt exolutiones, eodem modo curandæ sunt, quo bulimi, oimodo calefacientibus. Vinum igitur eis exhibere oportet, calida temperatum: ac cibos qui calfaciendi naturam habeant: fricareq; & calfacere ad ignem simul. Quæ ex calore nimio accidunt deliquia animi, iis quæ refrigerandi & roborandi vim habent, curant. Statim igitur ipsos corroborabis, si aqua frigida sparseris, & flabellaueris, & os ventriculi perfricaueris, & agitaueris, vinoq; & cibo refeceris. At quæ ob inflammationis magnitudinem, aut vehementis febris malignitatem, animi defectū patiuntur, & in prin-

Tomus. III.

LLI

Vinum calidū
propinandum
imbecillo uen-
triculo.

Exoluti obpra-
uos succos, uen-
tris os infestan-
tes, quò sint cu-
randi.

Exolutiōis ob
refrigerationē
curatio.

Exolutionis a
calore ortæ cu-
ratio.

Exolutiōis ob
febris, aut phle-
gmones ma-
gnitudinē, cu-
ratio.

Exolutiois ob
siccitate futu-
re, præcautio:

Exolutiois
præter expecta-
tionem abortu
curatio.

Exolutiois ob
membri præci-
pui obstructio-
nem factæ, cu-
ratio.

Exolutiois ex
immodica pu-
ris, aut aquæ in-
ter cutem eua-
cuatione, cura-
tio.

Exolutiois ob
animi affectus
ortæ, curatio.

cipiis accessionum refrigerantur, iis artus fricare for-
titer, & calfacere, cruraq; ac man^{us} alligare, & vigilias,
cibiq; & potus omnimodam abstinentioniam præcipere
oportet. Optimum verò in his, quid futurum sit, præ-
cognoscere. Eos etiam qui ex siccitate in principiis ac-
cessionum, defectum animi sunt incurfuri, optimū est
prævidere. Nam si duabus aut tribus horis ante acces-
sionem exhibito cibo, concoctu facili, manus ac pedes
constringi iusseris, non interibunt. Quòd si magnū im-
minere periculum suspicatus fueris, vinum in alican-
elixam infusum, dare anticipabis: aut panem quoq; ex
alica. At si mediocris expectatur defectus animi, par-
cendum est vino: sed sufficit tunc mala punica, aut pi-
ra, cibis ipsis miscere. Iis qui præter expectationem in
periculum inciderunt, vinum calidum, & panis est ex-
hibendus: parumq; aliquid cum eo alicæ calidæ. Qui
ob præcipui membri obstructionem linquuntur ani-
mo, iis oxymel dare oportet, atq; ex hyssopo, origa-
no, pulegio, & melle potum: cibosq; incidendi naturā
habentes. Sed nec deterius fuerit artus perfricare, deli-
gareq;. Prodest etiam hisce potibus uti, qui vrinam
ciendi vim habent: veluti qui anethum, fœniculum,
apium, petroselinum, ammi, daucum, & spicam nardi
recipiunt. Quæ ubi manifestè iuuerint, iam vino al-
bo, & tenui, nec admodum antiquo, est utendū. Fiunt
verò & in huiusmodi dispositionibus, quum vehe-
mentes fuerint, pulsus inæquales, intercidentesq;. Qui
ex abscessus disruptione, aut sectione exoluntur, aut
ex superflua aquæ inter cutim inanitione, ii quidē con-
festim optimis odoribus sunt fouēdi. Paulo autē post,
sorbitionibus concoctu facilibus, sunt reficiendi. Si ve-
rò ob tristitiā, aut gaudium, aut timorē, aut iram, aut
terrorem exolui videant, odoribus, & narium appre-
hensionibus reuocandi sunt: cogendiq; ad vomitum.
Eodem pariter modo, qui ex vulneribus, aut purgatio-

nibus, aut doloribus qui in articulis, nervis, & musculorum chordis eueniunt, exoluuntur, reuocandi statim ab eo affectu sunt: postmodum verò, cōueniens passioni cura afferenda. Defectus animi qui ex intestini laxioris doloribus, aut ilei, aut similibus cruciatibus fiūt, ex patientium locorū calefactione, frictioneq; extremorum curantur. At, quæ ex propria imbecillitate uiriū, quæ regunt corpus, eueniunt exolutiones, ex intēperie videlicet orræ, partium à quibus vires profisciscuntur, contrariis intemperaturis curadæ sunt. Virtus ergo vitalis, quæ ex corde nascitur, ex pulsum imbecillitate cognoscitur. At quæ ex hepate oritur, & naturalis dicitur, ex sanguineis egestionibus, ab initio aquosis atq; tenuib⁹: postmodum uerò crassis, ad modum fecis. Quæ ex cerebro originē ducit, quā animalē appellant, ex motuū voluntarioꝝ imbecillitate deprehenditur.

De cura capitis à variis occasionib⁹ læsi. Cap. XV.

IGITUR symptomatum causæ, congruam curationem ostendunt. Veluti si quis doleat caput, simulq; fastidiat cibos, ex fameq; sentiat mordicationem, iubendus est, vt euomat: nam vel bilem vomet, vel pituitam, vel utrūq;. Porro qui cum grauitate dolores capitis fiunt, multitudinem indicant. Qui autem cum mordicatione, vaporis humoris'ue acritudinem. Cum pulsu verò, inflammationem. At cum tensione, si quidem sine grauitate ac pulsu, spiritus flatulenti & crudi multitudinem. Si verò cum pulsu, inflammationem corporis mēbranosi. At si adsit grauitas, multitudo intra mēbranas contenta significatur. Quum igitur oīa distinxeris, causam ex qua horū singula fiunt, confyderare oportebit. Veluti si multitudo vaporis atque humoris contineatur, aduertere oportet, nunquid ob magnitudinē febriū humores diffusi, ac veluti efferuescentes, ad caput ascēderint: aut propter ei⁹ partis imbecillitatē: aut ob totius corporis plenitudinē. Hæc enim

Exolutiōis ob dolores intestini, curatio.

Exolutionis orræ a uiriū imbecillitate, curatio.

Facultas uitalis, naturalis, & animalis unde profisciscuntur, & ex quibus dignosci earū imbecillitas possit.

Capitis dolentis per consensum curatio.

Capitis doloris species uariæ.

Capitis dolo-
ris ob imbecil-
litatem contra-
cti, curatio.
Reuulsiois mo-
di diuersi.

Repellere hu-
mores a capi-
te, quæ cōmo-
de possint.

Vacuare discu-
tereque capitis
humores q̄ cō-
mode possint.

Capitis dolo-
ris ex magni-
tudine febris
ortī, curatio.

totius corporis euacuationibus haud difficulter cura-
bis. Eam verò quæ ex partis imbecillitate contingit,
partim quidem in cōtrarium trahendo per totū cor-
pus: partim ipsi capiti remedia adhibendo. Atq̄ in con-
trarium quidem trahes, clysteribus acribus, nexibus,
frictionibus plurimis infernarum partium, & si expe-
diat, sanguinis aliquantula detractio ne. Partem autem
sanabis eo tempore quo ad vniuersum corpus retra-
his, iis vtens asperginibus, quæ à capite vim repellendi
habent: ac dein euacuantibus: postremò deniq̄ corro-
borantibus. Repellit autem oleum quod immaturum
dicitur, ac tum oxyrhodinum, tum rosaceū, & quæ-
cunq̄ ex capitibus papaueris, & teneris oliuæ germi-
nibus, & hederæ corymbis, menthaq̄; viridi, & sisym-
briō fiunt. Utendum verò ipsis, in multitudine crudio-
ri & frigidiore, tepidis: in calidiori autem & biliosio-
ri, frigidis. Euacuat etiam, dissoluitq̄; oleum calidum,
ipsum per sese: & magis si antiquū fuerit, & sicconiū,
aut anethum feruefactum in ipso fuerit. Quod si spon-
dylion, vel serpillum, vel pulegii comam, vel calamin-
thæ, vel menthæ, vel sisymbrii, intus decoxeris, ita etiā
crasiores succos vacuaueris. Hæc uerò ipsa, viriū etiā
aliquid membro imbecillo adiiciunt. Quod si etiam ex
vfu videatur, per nares atq̄ palatum expurgatio mo-
lienda est, sternutamentumq̄; excitandum. Si ad bal-
neas hominem duxeris, siccis sindonibus caput est per-
fricandum, salq̄; & nitrum, & synapi, sine oleo impo-
nendum. Hæ itaq̄ sunt ex particulæ imbecillitate, do-
loris capitis medicinæ. At quando ex magnitudine fe-
bris accidit, & medicamenta adhibere conuenit, frigi-
dæ qualitates ac vires, & quæ ex hydrelgeo & oxyrho-
dino, & papaueris capitulis perfusiones constant, expe-
diunt. In dolore autem capitis, qui sanguinis fluxum,
aut vomitum decretorium significat, remedia inuesti-
ganda non sunt: quum nō accidens, sed talis dolor bo-

CVR. AD GLAV. LIB. I.

num existat signum. Siquidem ubi natura excretionē aliquam, ac præcipuē vomitum, aut sanguinis per nares fluxum molitur, horum inseparabile indicium est capitis dolor. Considerandæ igitur ad cognoscendam crisin, primū quidem sunt febrium species, an calidæ sint, * atq; vrentes: nam hæ per excretionem iudicari cōsueuerunt: quēadmodum quæ molliores sunt, ac veluti * fumigantes, diu durant, & sæpius in abscessus contendunt. Secūdo loco, an morbus sit salutaris. Nam quis obsecro bonam crisin in morbo pernicioso expectauerit? Tertiō ad hæc totius morbi tempus considerandum. Nam si principii vel augmenti adsit signum, minimē autem status, nec concoctionis signa in vrinis, vel sputis, vel alui excrementis cernantur, non est quod bonam speres crisin. Porro difficilis tolerantia antecedere omnem crisin solet. Quæ quidem si in die accidat, crisis sequetur noctu. Si autem noctu, in die. Si igitur tale aliquid videas, cōsiderandum est, quotus sit ægritudinis dies. Etenim septimus dies, etiā ex paruo naturæ apparatu, ad crisin per excretionē mouetur. Sextus verò, magno apparatu indiget: & sæpe neq; vlla in eo fit crisis, nec sine periculo, nec fideliter accidit. Ergo si dolor capitis statim ab initio nō inuasit, sicuti quoddam ipsius morbi symptoma, sed * in ipsa ante crisin perturbatione: dein si collum etiā aliquid condoleat, & præcordia retracta sint, aut repente superuenerit difficilis respiratio, pulsusq; in tumore subito elati, non reciderint in paruitatem, neq; debiles fuerint, statim crisis per sanguinis fluxum ē naris, expectanda est. Si verò non modò non deciderit, sed etiam in altum attollantur, & vehementiā assumpserint, faciem iam ægrotantis inspicere oportet. Nā si quod in ea membrum * palpitet, aut venæ quæ sunt in temporibus pulsant, aut malum, vel nasus, vel oculus rubidior sit factus, magis etiam talis crisis est expe-

LLI iii

539

Capitis dolor,
quæ excretio
num sit signū
inseparabile.

Ardentes fe-
bres consueue-
runt iudicari
excretionem.

Crisin omne
præcedit diffi-
cilis tolerantia.

Septimi diei
natura.
Sexti diei na-
tura.

Sanguinis cre-
ticam excretio-
nem per nares,
quæ indicent.

standa. Quod si etiam inuiti illachryment, vel imaginentur se splendores cernere, ac nares ipsas scalpant, tunc non iam fluxurū, sed iam fluentē conspicias sanguinem. Nec verò ex his perterrearis, si hominē desipientem, aut resilientē videris. Nam & hæc humorum repentium ad partes supernas indicia sunt. Præterea si ægrotus sit adolescens, aut alioqui natura calidus, aut multo sanguine abundans, magis adhuc de hoc sperandum erit. Quod si sæpius etiā antea illi sanguis è naribus fluere est visus, hoc vel solū sufficit fluxus sanguinis spem confirmare. Si verò & tempus anni æstas sit, vel calidus cœli status, & si plures eo tēpore crism ex sanguinis fluxu habuerint, ægriq; corpus plenum extiterit, & consuetæ excretionēs retentæ, hæc inquā omnia spem vehementius augebunt. Has itaq; & alias excretionēs omnes prænoscere licet, si hæc duo tantū explorauerimus, & vnde naturæ motus agatur, & in quam partem. Siquidem quæ deficiunt adiuuabimus, & quæ immoderatē feruntur, coercēbimus, si ista noverimus. Veluti confestim sanguinis fluxus ex splene magnæ cucurbitæ sinistris præcordiis superpositæ, facile retrahunt. At qui ab hepate proficiscitur, dextris. Qui ab aliis membris, eadem ratione.

Excretionēs
prænoscet faci-
le, qui unde na-
turæ motus a-
gatur, & in quā
partem inuesti-
garit.

Sanguinē fluen-
tem ab hepate
& ab splene, cu-
cubitulæ illis
admotæ visce-
ribus, retrahūt.

G A L E N I P E R G A

M E N I, D E A R T E C V-
ratiua ad Glauconem. Lib. II.

C A P. I.



E I I S A V T E M Q V A E
in singulis corporis partibus sūt pas-
sionibus, deinceps sumus dicturi, ab
inflāmate auspiciati: q; sæpius hæc
accidat, plurimæq; ipsius sint differē-
tiæ, ex quarum singulis solēt febres

CVR. AD GLAV. LIB. II.

oriri. Cōmunis igitur in omnibus est immoderata caliditas, & veluti quādam efferuescentia, vnde & phlegmones nomen de ipsis efferre veteres consueuerunt. Propriam aut quādam in singulis differentiam inuenies, ex qua eius speciem agnosces, & conuenientē assequeris medelam. Porro prima inflammationis differentia est secundum quā, hanc quidem humidam, illam verò esse siccam contingit. Humidam quidē, quæ ex calida fluxione membrum occupante accidit. Siccam verò, quando nullo humore influente, calor naturalis efferuescit. Hæc autem, vsq; ad aliquid quidē, veluti febris est membri. Quum verò iam ad immoderatam caliditatem ac siccitatem peruenerit, corruptio atq; extinctio omnimoda sit. Rursus illius differentia quæ cum humorum affluxu accidit, multæ species existunt. Nam fluente sanguine, altera: flaua bile, altera: ambo bus simul, alia tertia. Et quidem in eorum singulis, vel iam putruit id quod influxit: vel in membro impactum putrescit. Præterea vel crassum est, vel tenue, vel optimum, vel deniq; acre. Sanguine igitur optimo ac mediocriter crasso ad particulam aliquam confluente, atq; ob multitudinem conculcato, vehemens dolor arripit hominem, nisi hebetis sensus ipsa fuerit particula: pulsusq; in profundo permolestus sentitur, tendiq; omnino & contundi membrum apparet, cum vehementi incendio, rententia, & rubore. Quæ sanè passio totius generis nomen recipit, inflammatioq; vocatur, ex omni ferè occasione proueniens. Quippe vulneribus, distentionibus, disruptionibus, contusionibus, scissionibus, exercitiorum laboribus, exarticulationibus, ac præterea fracturis, & spontaneis vlceribus aduenit. Quin etiam, si quando immodicam plenitudinem venæ ipsæ contrahant, tunc id quod superfluum est, effundunt ad aliquam partem, quæcunq;

LLI iiii

535

Inflammationibus omnib; est cōis caliditas

Inflammationis prima differentia.

Inflammationis quæ cum affluxu humorum infestat, multiplex differentia.

Inflammationis ortæ a sanguine indicia.

Inflammationis causæ.

Recipientes su
peruacua parti
culæ quales ne
cessario eẽ de
beant.

Regii morbi, p
ductio.

Herpetis gene
ratio.

Herpes exedens
unde accidat.

Herpes milia
ris unde exo
riatur.

Erysipelas un
de signatur.

Erysipelas
phlegmono
des quando ac
cidat.

Phlegmone e
rysipelatodes
quando fiat.

Erysipelas so
lius cutis est
passio.

eo tempore fuerit aptior ad recipiendum. Eadem nãq
erit reliquis omnibus imbecillior, vel rarior, vel ad
motum procliuior, vel minus nobilis. Flaua verò bi
lis, quando propriam naturam seruans, vnà cum san
guine per totū corpus defertur, morbum regiū pro
ducit. Quum autem secernitur sola, in aliquamq; de
cumbit partem, herpetem gignit. Cæterum si sit consi
stentia crassa, totam exulcerat cutim, vsq; ad carnem
subiectam: qui affectus herpes exedens vocatur. Si ve
rò tenuior fuerit, id quod in superficie est tantum, ve
luti deurit: quæ species generis sortitur appellationē,
quum simpliciter herpes dicatur. Nam ex reliquis spe
ciebus duabus, * illa quidem cuius nuper mentionem
fecimus, vocatur herpes exedens: altera verò, milia
ris, q̃ in ea pustulæ parua ac multæ, per summam cu
tem, similes milio, excitentur. Fit autem herpes huius
modi etiam ex bile quidem, sed minus calida & acri, q̃
* illæ species priores. Quod si ex sanguine & flaua bi
le calidioribus quàm oporteat, mista ipsa fluxio fue
rit: aut ex sanguine quidem, sed feruido, & substantia
tenuissimo: erysipelas hic affectus vocatur, multo in
flammatione calidior, magisq; flauum colorem refe
rens. Non dolet tamen affectus hic, quemadmodū in
flammatiō: nec vt aliqua inflammationis species pul
sum, aut compressionem, aut similem inuehit tensio
nem. Cæterum interdum miscetur inflammatio cum
erysipelate. Si igitur in miscella ipsa exuperet propria
erysipelatis accidentia, affectus is erysipelas inflamma
tionis particeps nominatur. Si verò inflammationis
accidentia præpolleant, dicitur inflammatio erysipela
todes. At si accidentia vtriusq; esse appareant equalia,
tunc erysipelas & inflammatio ex æquo misceri dicun
tur. Exquisitum itaq; erysipelas, cutis solius est passio.
Non tamen ipsa inflammatio pertinet tantum ad cuti
subiectas partes: sed ad has quidem præcipuè: nonnn

quam verò etiam ad cutim. At verò, si sanguis influens calidus sufficienter fuerit & crassus, quodcumque membrum inuaserit, hoc exurendo, vlcus cum crusta excitat: quicquid autem circumiacet, in inflammationem at tollit efferuescentem, grauiusque dolentem: qui affectus carbo appellatur. Similiter etiam, si sanguis influens niger extiterit, crassusque & fœculentus, & feruens: simul autem & saniem quandam tenuem admistam habuerit, pustulas per summam cutis excitat, similes iis quæ ex igne fiunt. Quibus disruptis, crustosum sub ipsis vlcus inuenitur. Qui affectus etiam est carbo. Phlegmone itaque in hæc species vniuersales distinguit, ad quas nimirum referuntur alię omnes particulares. Etenim bubo, phyma, & phygethlon, glandularum affectiões existunt: bubo quidem, inflammatio: phyma, quod statim augetur, atque ad suppurationem festinat. Phygethlon autem erysipelas particeps inflammationis, aut inflammatio erysipelatis particeps nominatur. Sic etiam & ophthalmia, eius membrana quæ corneæ inhæret, est inflammatio. Pleuritis verò, costas succingentis membrana. Quemadmodum & synanche gutturis: atque peripneumonia, pulmonis. Eas igitur quæ in partibus apparentibus cōspiciuntur inflammationes, promptum est quidē cognoscere. Quæ verò in occultis, & febres omnino afferunt, non æquē discerni possunt.

De causis inflammationum. Cap. II.

EST autem vna quædam apparentium inflammationum causa, eaque non vsquadeò occulta, quæ fluxio appellatur: nisi quandoque eis coniungatur, quæ alia qua alia ex causa euidente, facta videtur. Quum enim nulla ex his præcedente, repente membrum inflammationem patitur, ea quæ hunc affectum gignit causa, fluxio vocatur. Affectus autem ipse, dispositio rheumatica. In curatione cuius, duo magni committuntur errores, vbi statim in ipsis auspiciis, vel nulla de toto cor-

Carbunculi
generatio.

Bubo quid.

Phyma quid.

Phygethlon.

Ophthalmia
quid,
Pleuritis quid.
Synanche.
Peripneumonia.

Inflammationis
causa una est
fluxio.

538
Inflammationis
curatio.

GAL. PERG. DE AR.

Euacuatur
corpus q̄ sint
prius consyde
randa.

Genu inflāma.
ti curatio.

Reuulsionē flū
tium humoū,
esse in contra
rium moliedā.
Genu inflāma
to emplastrum
commodum.
Genu inflāma
ti dolorem ma
gnū leniētia,
hyeme quidem
calida: æstate
sunt admouen
da frigida.
Repercussientia
esse applicāda
paulo supra pa
tientes particu
las.

pore prouidentia habetur: vel ipsum calfit, atq; hūe
statur membrum. At qui rōnem simul & experiētiā
sequuntur, n̄ totum imprimis corpus vacuare quibus
cūq; euacuationibus consulunt: ipsam verò inflāmā
tam partē, perfundere, ac superlinire eis, quæ id quod
influxit repellendi vim habent: ac deniq; quod in mem
bro patiente continetur, educere: vimq; ac robur ad
iungere iis quæ iam affectæ sunt partibus. Verūm vt
recte quis vacuatione vtatur, ætatem, anni tempus, re
gionem, præsentem aeris statum, robur eius qui affi
citur, habitumq; & consuetudinē, nec non ipsius mor
bi naturam oportet consyderare. Ex his nāq; quando
vacuandū sit, aut minimē: & vnde, & quomodo, inue
nitur. Si igitur ad genu fluxio feratur, atq; id plurimū
attollatur: præterea totum corpus sanguine plenū ap
pareat, & valida laborantis vis, tempusq; anni sit ver
, & temperata regio: æger verò sit adolescens, aut iuue
nis: is sanguinis euacuatione ex superioribus partibus
indiget: oportetq; eius incidere in cubito venam, aut
scilicet interiorem, aut mediam: quū semper fluxionis
motum ad contrarium renellere oporteat. Ipsi autem
laboranti particulæ, si quidem non admodum doleat,
emplastrū ex semperuiuo, & corticibus punicorū ma
lorum in vino decoctis, & rhu, & farina hordei con
stans, est admouēdum. Hoc si quidem repellit quod in
fluxit, atq; id quod continetur exiccat, & circūiacentia
membra corroborat. Cum magno autem dolore flu
xu incidente, sufficit vehemētiam doloris lenire, cum
aliquo ex iis, quæ ex vino dulci, oleo rosaceo, & pauca
cera, in vtroq; liquata, constant. Oportet aut hęc la
nis excipere pinguibus, quæ plurimū habeant œsypi:
& æstate quidem, frigida: hyeme autem tepida appo
nere. Sic etiam cataplasmata ex arnoglossō, lente, pa
ne, & rosaceo oleo adhibere: paulo verò supra patien
tes particulas admoovere spongiā vino austero intin

Etiam, aut aqua frigida, cui mistum parum aceti fuerit. Quod si ex hac medendi rōne magnus vsus sentiatur, nec alicubi pus se oñdat, mollibus medicamētis ad fluxiones vtendū. Optima verò ex his sunt, quæ exiccan di & repellēdi quod fluit, sine dolore vim habent. Quæ admodū ea quæ vehementer contendunt, atq; iccirco dolorem afferunt, plus doloribus obsunt, q̄ exiccādo proficiant. Tale igit sit medicamen, quale est quod ex chalcitide constat, remissum oleo rosaceo. Si verò lannam mundā vino acerbo humectaueris, apposuerisq; , plus iuueris. Quod si pus se in particula ostēderit, cataplasma offerre oportet semel aut bis. Plus verò ad pñs iuuat farina hordeacea. Adiungendum tñ aliquid vel aceti, vel vini. At postq̄ secueris, & pus euacuaueris, ca uendum est deinceps, ne oleum, aut aquam imponas. Quod si qñ vulnus abluere oporteat, mellicrato, vel oxycrato, & vino, & mulso est vtendū. Superponen dum verò, si adhuc inflammet, ex lente cataplasma. Si verò absq; inflāmatione fuerit, aliqd ex iis medicamē tis, quæ emplastica nominant: & præcipuē qđ ex chal citide constat. Imponenda aut super hæc extrinsecus, spōgia, aut lana vino acerbo infusa: ad quæ quidē op portunū est, quod aquā marinam recipit. Vulneri aut, nullū ex pinguibus medicamētis est admouendū: qñ quidem exquisitē exiccare expedit. Ac sic sanē sanare oportet inflammations ex fluxione ortas. Quæ verò alia de causa fiūt, humectare, calfacereq; , nihil prohi bet. Quas quidē si perducere ad suppurationem volue ris, cataplasma ex farina triticea, quæ in oleo, & aqua ebullierit, est apponendū. Quod si qñ scarificare opor teat, ne hoc quidē verendū est. Si verò eas quæ ex flu xionibus fiunt inflāmationes scarificaueris, magnū adferes malum: ac per initia præsertim. Quæcunq; autem ex ipsis iam inueteratæ existentes, post totius corporis euacuationem, quasdam durities atque ni-

Fluxioni discen tiendæ quæ me dicamenta cō ueniant.

Vlcus, eiectio pure, quibꝰ sit abluendum.

Suppuratæ in flāmationi con gruere cata plasma ex fari na triticea quæ in oleo & aqua ebullierit.

Inflāmationes qñ scarificandæ.

Herpetis cura-
tio.

grities retinent, ab his per scarificationem sanguinem auferre nil prohibet: & emplastrum ex farina hordeacea, & ceratum, & aliud aliquod medicamen ex discutientibus admoovere. Non tamē ex vena in talibus sanguis necessario mittendus est: sed ventrem tantummodo expurgare sufficit, medicamine quod bilē flauam educat: vel solo clysteri acri, si affectus ipse sit parvus. Quæ verò ex vlceribus sunt erysipelata, & quæcunque adeò manifestas causas sortiuntur, si statim volueris cataplasma apponere ex farina hordeacea, & præsertim si ante scarificaueris, nihil nocebis. At inflammationibus quæ cum erypelate sunt coniunctæ, & erysipelatis cum inflammatione, adhibenda mista curatio est: semperq; illi, quod magis præpollet, resistendum. Herpetes autem, quantum ad totius corporis euacuationem attinet, vt erysipelata curare oportet: quantum verò ad * eam quæ patienti debetur particulæ, non oibus similis cura adhibetur. Nam qui exedentes sunt, refrigerari quidem desyderant, quemadmodum alii herpetes, & erysipelata: non tamen ea ferunt medicamēta, quæ præter id quod refrigerant, humectare etiā sunt apta: sed sola admittūt refrigeratiā, quæ maximē exicare possunt. Quare supimponere ipsis oportet, ab initio quidem ex vite capreolos, & folia rubi, & rubi canini, & plantaginis. Post hæc verò & lentem adiungere oportet, & aliquādo mel, & hordeaceam farinam, quodq; antea scripsimus ad inflāmationes quæ ex fluxione eueniunt cataplasma, dempto ab eo semper uiuo. Ipsas verò partes exulceratas inunge medicamentis, quæ ad herpetas in pharmaceuticis libris descripta sunt: quæ quidem, vbi vti volueris, ex vino dulci, aut tenui & albo, & subaustero, minimē tñ acri, liquefacere oportet. Quòd si posca aquosa vice horum aliquando vsus fueris, nihil deterius feceris. At in longū tempus protractis vlceribus, ad id vina sufficienter austera

conueniunt: præcipuè verò nigra. Quo tempore ipsis etiam medicamenta cōgruunt, quæ ad Polyidam, Passionem, Musam, & Andronem relata extant. Herpetas verò qui summa tantummodo exulcerant, nisi diu perdurauerint, nullo horum inungere oportet (adurunt enim fortiter, & vehementer exiccant) verum istis sufficiunt, quæcunq; vim glaucii habent medicamenta. Quæ quidem aqua diluenda sunt: vel aceto, si nil ex aqua profecerint. Quòd si etiā solani succo intinxeris, vel arnaglossi, plus etiā conferes. In summa verò, omne vlcus exiccari poscit, idq; medicamēto ne utiquam irritate, nisi vbi malignum, putrilaginosumq; ipsum vlcus fuerit. Talia siquidē, acriora medicamina postulant, & quæ igneas vircis possideant: quale est misy, chalcitis, arsenicum, calx, atq; sandaracha. Sæpe verò vbi ista cesserint, admouemus ignem. Eadem ratione uocatis carbonibus, super ipsam crustam, huiusce modi medicamentorum est natura conueniens. Non tamen loca circūiacentia tangere expedit: alioqui dissolues ea, exulcerans quæ minimè expedit. Sed Andronis trochiscis potius vtendum est. Si quando verò inualuerit rubor, plurimaq; inflammatio, medicamentum ipsum dulci diluendum est, vel succo plantaginis: quemadmodum si magnus tumor simul infestet, vino quidem acerbo in principio: postmodum verò & aceto. Cataplasma etiā ex orobi farina & oxymelite confectum est apponendum: atq; ante hæc omnia, statim ab initio tantum sanguinis auferendum, quantum sit satis, nisi quid aliud prohibuerit. Hæc itaq; sunt passionum per genera curationes, quæ pro naturæ instrumentorum patientium varietate mutantur. Quatuor autē ab his indicationes sumuntur: ab eorum nempe temperie, à formatione, à situ, ac deniq; à facultate. Oportetq; in curationibus intentionem habere ad membri naturam. Hæc enim, quousq; infrigidandum, aut exic-

Vlcus omne
exiccari possu-
lat.

Vlcera mali-
gna qualia me-
dicamenta po-
stulent.

Carbonib⁹ qua-
lia medicamē-
ta conueniant.
Andronis tro-
chisci.

Indicationes,
quatuor sumi
ab affectis par-
tibus.

Natura partis
affectæ qd in-
dicet.

Partiū, inflāma-
tarum quēnam
magis, & quā
min⁹ sint exic-
candæ.

Temperaturæ
partiū curatio-
nes affectuū va-
riant.

Formationes
particularum
quomodo cura-
tiones uariant.
Situs partis af-
fectæ quā indi-
cationem exhi-
beat.

Reuulsio ē flu-
entiu humorū
medela: ut deri-
uatio, eorū qui
iam obsederūt
partem.

Reuulsio & de-
riuatō a matri-
ce quibus fiat
modis.

candum sit, docet. Nam si carnosæ partes inflāmati-
nem patiantur, paulū sunt exiccandæ. Venosæ quoq;
quāuis sint carnosæ longē sicciores, nō tamen & ipsæ
multum exiccari desyderant. Sed quæcūq; natura ar-
teriosæ sunt, magis venosis sunt exiccandæ: atq; his am-
plius nervosæ: & multo magis chartilaginosa, ossæq;
Etenim prius q̄ ad propriam naturā particula redeat,
nōdum curationi est impositus finis. Porro siccio-
rem temperaturam inducunt, quæ siccissima sunt: & frigi-
diorem quæ frigidissima: & secundum alias qualitates
eodem modo. Ad mediocrem verò habitum referūt,
quæ sunt in vnaquaq; mediocria. Ac sic sanè partium
temperaturæ curationes affectuū variant. At forma-
tiones hoc modo. Nam quædam intra sese habent ca-
uitates: quædam extrinsecus: quædam vtrobiq;: quæ-
dam neutra in parte. Quæ igitur neutra ex parte caui-
tates possident, in quas fluxio recipi possit, eas partes
fortiter exiccare oportet, vel si nō fuerint natura sic-
ciores: vt nervos, & præcipuè qui in artubus sunt. At
quæ intus & extra relaxare aliquid possunt inflamma-
tionis, non multum huiuscemodi fortiter exiccanti-
bus egent: si præsertim laxam carnē habuerint, quē
admodum pulmo. Indicatio autē ex positu, loca per
quæ sit vacuandum, & quo pacto, demonstrat. Fluen-
tium ergo humorū, reuulsio medela est: deriuatio au-
tem, eorum quæ iam obsederunt membrum. Vtrūq;
autem euacuationis genus per communes venas mo-
liendum est. Siquidem à matrice reuelles, si eam quæ
in cubito est, venam secueris: aut * iuxta mamillas cu-
curbitas admoueris: vel manus concalfeceris, fricue-
ris, deligaueris. Deriuabis autem, si eas quæ in popliti-
bus sunt, aut in talis, venas diuiseris: & * foeminibus
cucurbitas admoueris, & crura calfeceris, perfricaue-
ris, atq; vinculo exceperis. Et si quidē in parte dextra
matricis ipse affectus consistat, à dextra manu, vel eru-

re sanguis est detrahendus. Sin verò in sinistra, à membris quæ illi è directo sunt. Cæterum interiores venas tunc incidere oportet: quòd viciniore, magisq; è directo sint patientibus membris. Similiter si liene inflàmato sanguinè vis detrahere, interiores in manu sinistra venas secato: vt si hepate, eadem ratione in dextra. Si quid verò ex superioribus inflammationem patiat, veluti in ophthalmia, & angina, in cæterisq; infestantibus caput, eas quæ extrinsecus sunt, atq; è directo, pertundito. Si verò artus patiant, à * coniugatis mēbris sanguis detrahendus est, siue reuellere, siue deriuare sit animus: præter quàm vbi passio fuerit iueterata. Tunc quippe à membro ipso patiente detrahimus. Sic ergo in angina eas quæ sub lingua sunt venas incidimus, vbi totum corpus vacuum quum sit, * producit ipse affectus. Sic hepatis, spleniq; cucurbitulas applicamus. Sic aliud quodcunq; membrum affectum scarificamus, si non amplius humores influant (tunc enim magis irritaueris, ipsumq; duplicaueris malum) verum vbi vniuersum corpus iam expurgatū fuerit, neque quicq; præterea influit, sed quod prius influxerat, iā hæret in mēbro impactum. Et quidem laborantibus conuexis hepatis partibus, quod per vrinam trahere oporteat: concauis autem, per subductionem alui, situs ipsius visceris indicat. Atq; etiā thoracem, pulmonēq; per tusses expurgari debere: ventriculum & stomachum, per vomitum: intestina per deiectiones: quemadmodum per vrinas & splenem, & renes: matricem autem, per mēstrua: cerebrum atq; eius membranas, per palatum, gargareonem, nares, & aures. Sed & quæ in superficie sunt partibus, talia medicamenta apponere oporteat, qualibus eget passio: iis autem quæ in profundo sunt sitæ, & quas per multa interposita debent eorum virtutes attingere, non qualia nūc sint, sed qualia futura sint, ex situ membrorum agno-

Liene inflàmato interiores in sinistra manu venas secandas esse: ut in dextra, si hepar affectum fuerit.

Supernis partibus inflàmatis, externas venas directas illis secandas esse. Artubus inflàmatis, a coniugatis esse mittendum sanguinem: nisi passio fuerit inueterata.

Angina protta hæte, venas sub lingua secandas esse.

Scarificatione quā utendum.

Vacuari in quē modum singule partes debeant.

Altius reconditi affectus valentiora medicamenta postulant, q̄ si in superficie consistere.

Ventriculo stomachoq; affectis, solis talia exhibent, quæ ab affectibus exigunt. Partium differentia.

scimus. Tantum quippe aduentitii roboris adiungere oportet medicamentis, quantum in transitu exsoluitur: ut quod relinquitur, æquale remaneat ei, quod tactu iuuat. Ob id igitur in thoracis inflammationibus, quæ in superficie consistunt, ea quæ solum laxare possunt, sufficiunt: intrinsecus autem, sicuti in costis cingente membrana, requiruntur acriora. In universis autem visceribus eadem habenda est ratio. Sæpius enim ex medicamentis impositis vlceratur cutis, quâuis durior, minusq; ad patiendum habilis sit, quàm viscera. Quod si ipsis visceribus medicamenta applicare possimus, quibus frequenter indigent, tanto molliora oporteret esse, quanto ipsorum natura, ut afficiatur, est promptior. Quia verò hoc neutiquam nobis datur, ob id nimirum, quæ eduntur ac bibuntur medicamenta, conferentia affectibus viscerum, ea multo acriora & potentiora esse conuenit iis, quibus indigent ipsæ partes affectæ: exceptis tamē illis, quæ ventriculo, stomachoq; auxiliantur. Hæc si quidem sola talia exhibentur, qualia à passionibus exiguntur. Reliqua verò omnia, acriora & fortiora sunt, & præsertim quæ vel renum, vel pulmonis occasione sumuntur. Sed indicatio quæ à facultate sumitur, etiam curationem immutat. Nam ex partibus corporis nonnullæ ab influentibus virtutibus gubernantur: quædam verò à propriis atq; natiuis. Atq; ex iis ipsis, quædā sibi ipsis dūtaxat: quædam etiam aliis fons & origo sunt facultatum. Et aliæ quidem opus peculiare habēt: aliæ autem commune. Permutare itaq; opus est curationis formam, pro ratione harum omnium differentiarum. Nam pleraq; ex remediis dictis, morbum quidem finiunt, sed natiuas membrorum facultates offendunt: quæ quidem offensio ad totum pueniet corpus: idq; ratione duplici: vel quia membrum est alicuius virtutis origo omnibus partibus cōmunicatæ: vel quia ipsius opus vniuerso corpori

pori est utile. Etenim hepar, cor, cerebrū, atq; testes, communiter vniuerso corpori principia sunt facultatum. At ventriculo, matriciq; propriæ facultates insunt, nulli alteri parti communes. Opus tamē ventris quidem, toti corpori confert: matricis autem nequam. Quæ igitur immodicè laxant, exoluunt robur, quare & facultatem particulæ. Quæ autem supra modum refrigerant, natiuū calorem extinguunt, qui fortassis substantia facultatum existit: aut certè primū & maximè necessarium instrumentū ipsarum. Nonnullæ etiam aliæ qualitates * immoderate, facultates exolvere possunt. Ad hanc autem indicationem quispiam referre posset & facilem & difficilem sensum. Etenim quæ faciliē sentiunt partes, acria medicamenta non tolerant, sicuti neq; acres humores. Ob idq; os ventriculi, atq; eo magis oculus, infestatur ab erodentibus medicamentis. At quæ sensum obtusum habent, cataplasmata grauiā sustinent, atq; medicamenta mordacia. Qui igitur secundum solam, nudamq; intemperiem absq; humorum affluxu sunt morbi, per contrarias qualitates curantur. Vt exempli gratia, calida intemperies, per refrigerantia, siue primò, siue ex accidenti refrigerent. Perfusio siquidem frigidæ, calfacit ex accidenti, vbi caloris reuocationem fecerit: calidūq; refrigerat, vbi calorem naturalē discussit. At quæ ob materiæ influxum laborant, si quidē fuerint optimè temperata, solam euacuationem desyderant: si verò distemperata sint, vnā cum euacuatione, per contrarias qualitates alterationem postulant. Sed iam dicamus de œdemate.

De œdemate.

Cap. III.

OEDEMA est mollis quidam tumor, atq; doloris expers, ex pituitosa substantia, vel spiritu vaporoso ortus: qualis in cadaueribus, & pedibus hydropicorum & tabidorū plerūq; cernitur. In hisce tamen

Tomus. III.

MMm

Principia facultatum uniuerso corpori sunt hepar, cor, cerebrum, atq; testes. Laxantia immodice, exoluunt robur, atq; facultatem particulæ. Calor natiuus quid.

Sensu acutissimo prædita, acria medicamenta non tolerant: ut ea quibus sensus obtusus inest.

Intemperies simplices per contrarias qualitates curantur.

Frigidæ perfusio calfacit ex accidenti. Calidum ex accidenti refrigerat.

Oedema quid;

Oedema in quibus symptomata existat.

Oedematis ex influxu orti, curatio.

Scirrhus quid.

Scirrhus insensibilis, minime curationem recipit.

Scirrhus unde contrahatur.

Scirrhus quomodo ob ineptam curationem gignatur.

Induratis qualia medicamenta conveniant.

Medulla ceruina.

morbis oedema symptoma est, propria curatione non indigens. Sola quippe frictio ex oxyrhodino, aut ex sale & oleo, compescit ipsum. Quum verò propter influxum pituitæ in aliquam partem gignitur is affectus, spongia recenti, imbuta oxycrato (quod possit bibi) eum sedat. Quòd si ex his non discutiatur oedema, aluminis parum est adiiciendum. Si verò in aliquo artuum tale fuerit oedema, inchoanda ligatura est ab imis partibus; finienda verò in altioribus; uniuersam iniectionem & compressionem facientibus nobis, veluti in fracturis. Quòd si morbus dictis remediis non cedat, aliquid fortiorum medicaminum adicere oportet, cui discutiendi simul & constringendi facultas insit.

De scirrho. Cap. III.

EXquisitus scirrhus est tumor præter naturam, insensatus, durusque. Non exquisitus verò, non omnino insensibilis est: difficulter tamen omnino sentit. Porro insensibilis scirrhus minime curationem recipit. Qui verò cum difficultate sentit, nec incurabilis est, nec facilem curationem admittit. Fit autem ex humore viscido & crasso * tenacissime partibus induratis infixo. Scirrhus itaque interdum ab initio concreuit, atque augetur paulatim. Crebrius verò inscitia medicorum paratur, ubi vehementer erysipelata & inflammationes astringunt, refrigerantque. Quòd si quis fortiter discutientia induratis medicamenta adhibeat, digeret quædam tenuiora: quod verò reliquum est, compactum, lapidis instar, relinquet. Non igitur curandæ sunt induratae particulae medicamento siccante immodicè, sed emollienti, quodque calorem possideat tepidum, humiditatem verò, nec multam, nec omnino minimam. Siquidem quod superfluum humorem habet, nihil omnino dissoluit: quòd verò minimum, plus quam oportet exiccat. Ergo medicamenta idonea scirrhis sunt omnes medullae atque adipēs. Ex medullis primas partes obtinet cer-

uina: dein vitulina. Ex adipibus, anserinus, leoninusq;. At verò qui ex gallina sumitur, anserinum: qui ex par- do, leoninum sequitur: postea verò vrsinum, atq; tau- rinum. Cæterum qui ex capris accipitur, & crassior, & siccior prædictis est: idq; magis, si ab hirco capiatur. Porro tendonibus induratis oportet vnà cum præsi- diis iis quæ simul & emolliunt, & digerūt. (Cuiusmodi sunt, bdellium, ammoniacum thymiana, solutum in q̄acerrimo aceto, opopanax, chalbanumq;) etiam pyritem lapidem candentē, aut (si eius copia non sit) molarem, acerrimo aceto aspergere: ac dein super ip- sum dimouere partem affectā, vt à vapore sursum ela- to, scirrhus dissolui possit.

De splene iecoreq; induratis. Cap. V.

INDVRA TVM splenem, non tantū foris, for- tibus medicamentis curare conuenit: sed intus etiā potionibus vehementissimis: nam eas sine molestia to- lerat. Inter quæ sanè primas sibi vendicant partes, cor- tices radicum capparis, & scolopēdrii, & myricæ tum radix, tum germina, omnia videlicet hæc in aceto & oxymelite cocta. At sæpenumero splen, quum tangit, reniti videtur, non ob scirrhum, sed ob flatulentū tu- morem. Tunc igitur vbi ipsum absynthii decocto fo- ueris, aliquod cataplasma mistis facultatibus præditū, superipones: quale est, quod ex sulfure & alumine con- stat. Verum vbi lien in scirrhum obduruit, præpollere vim digerentem oportet: parum autem eius quod a- stringendi possidet facultatem, est admiscēdum. Me- ritò igitur salis flos induratos splenes sanat, si extrinse- cus ipsis in vesica apponatur. Porro hepatis scirrhum, initio quidem sanauimus: inueteratū autem, neq; ipse potui sanare, neq; alium vidi qui posset. Quippe omni- bus ita affectis omnino aqua inter cutem subsequitur. Nec verò perfert hoc viscus fortia medicamenta, vt splene. Quare si sit induratum, augere oportet ea quæ

Medulla uitu-
lina.

Adipis dissere-
tig.

Induratorū tē-
donū curatio.

Lien uehemen-
tissimas potio-
nes tolerat.
Lien indura-
to congruentia
remedia.

Lienis ob fla-
tum disenti cu-
ratio.

Salis flos i uesi-
ca appositus in-
duratos lienes
sanat.

Hepatis scir-
rhū inuetera-
tus est insana-
bilis: quum ei
subsequat ne-
cessario hy-
drops.

Hepatis indu-
rati curatio.

6. Flatulenti tu-
moris curatio.

Natura pacien-
tium particula-
rum, auxiliorū
materias indi-
cat.

Doloris a cras-
so spiritu inue-
tre oborti, cu-
ratio.

Flatus discutiē-
tia medicamē-
ta.

Dolores uētris
mediocres uei
extrinseca tan-
tum calfactiōe
sedantur.

Cucurbitula
umbilico ad-
mota uētris do-
lores sedat.

ratione inflammationis illius apponuntur, in mistu-
ra emollientium: adhibita etiam congruente victus
ratione, vnā cum potionibus & dissipantibus, & ab-
stergentibus eum, qui in viscere continetur, humo-
rem. Admiscere autem oportet, & ex iis quæ ciere
possunt urinam, aliquid. Iam verò in omni flatulen-
to tumore, astrictum corpus est relaxandum: exte-
nuandus autem ipse crassus spiritus. Si igitur subtilio-
ri aliquo medicamine anodynoq; , ubi dolor adfit, cal-
feceris, id quidem quod densatum est, rarefacies: ex-
tenuabis verò, quod crassius est redditum. At pacien-
tium particularum natura, coindicabit couenientem
auxiliorum materiam: in ipsaq; , maioris minorisq;
rationem. Ac secundum differentiam earundem, ma-
teria etiam curationis variatur, intenditurq; atq; re-
mittitur. Si igitur à crasso spiritu oboriatur dolor in
ventre inferiore, subtile oleum per ima, vnā cum me-
dicamentis quæ in ipso ebullierint, per clysterem ini-
ciens, statim dolorem sedabis. Quæ verò debent bul-
lire in oleo medicamenta, cum partium tenuitate cal-
facientia, sunt cyminum, apii, petroselinum, mara-
thri, synonis, anesi, libystici, seseleos, dauci, atque
spondylii semen. Quòd si coniectura comprehende-
ris frigidam esse dolentium partium dispositionem, ru-
tam & marathrum, & grana lauri intus decoques:
miscabisq; asphaltum, ipsumq; oleum laurinum, &
si quæ similiter calfaciunt. At si inflammationem do-
lori adiunctam putaueris, auferes ea quæ admodum
acria sunt, quæq; calfaciunt impensius: ad relaxantia
verò, quæ vires illas mediocres possident, transibis.
In oleo itaq; anethum coques, miscabisq; adipem an-
serinum, vel gallinaceum. At verò mediocres dolo-
res extrinseca tantum calfactione iuuantur: ea præ-
cipuè quæ ex milijs fit, vel ex sale calfacto, vel ex li-
ni semine crudo. Cucurbita etiam magna cum multa

flamma absq; cutis scarificatione, sæpius statim dolorem amouit, vmbilico admota. Quod si etiam tum dolores permanserint, vti medicamentis ex opio ne dubites, quale est quod ad Philonē refertur. Sic enim hominem liberaueris à cruciatu, & sequentibus diebus noxam ex opio contractam, corriges. Auferunt enim id genus medicamenta dolorem, non tamē dispositiones sanant, sed vim sentiendi quodammodo stupefaciunt. Vti autem oportet Philonis medicamentum, omnibusq; ex opio confectis, non statim, sed post tempus compositionis annuū, aut omnino semestrem. Non modica verò sit virtutis distributio, & ex ebibitis ad inferiores intestinorum partes, dum afficiuntur: & ex iis quæ iniiciuntur per sedem, ad superiores, vbi dolore cruciantur. Porro discutiendo flatui in partibus carnosus collecto (qui & nonnunq; vacat dolore, & longiori tēpore durat) ea medicamenta congruūt, quæ insigniter subtili constant substantia: cū quibus misceri debent, quæ molliendi facultatem sortiuntur.

De abscessibus.

Cap. VII.

DISPOSITIONES in quibus à se inuicē distant, quæ prius se contingebant corpora, communiter abscessus vocantur. Spatium igitur vacuum in medio fieri oportet, quod aliquam substantiam spirituosam, aut humidam, aut mistam ex vtriusq; comprehendat. Quæ substantiæ vbi diutius hærent, varias alterationes suscipiunt. Nam & lapidibus, & arenis, & testis, & lignis, & carbonibus, & limo, & amurcæ, & permultis aliis id genus similia in abscessibus corpora sæpe contineri inueniuntur. Transeunt verò in abscessum inflammationes quedam, atq; erysipelatosæ phlegmones, sicuti & erysipelata phlegmonosa non pauca: nimirum ab vno loco humoribus translatis in alteram. Quæ igitur per summa, sub cute consistunt, facillè dignosci possunt, neq; est sanatio ipsorum difficilis:

M M m iii

Opium recipientia medicamenta dolorem tollunt, ipsam tamen dispositionem relinquunt.

Opio constantibus esse utendum post tempus compositionis ad minimum semestrem.

Intestinorum dolores ubicunq; sint, iuuari a bibitis, & per se de iniectione medicamentis.

Abscessus qd.

Abscessibus qualia soleant inesse corpora

**Abscessuū cu-
ratio.**

**Scarificatiōes
profundiores
quā conueniāt.
Emplastū ex
caricis.**

**Farina triticea
quidem, maxi-
me ad suppurati-
ones promo-
uet: hordeacea
uero discutit.**

quum solis medicamentis quæ extrinsecus applicant, curentur: nec medicamentis intro assumptis indigeant, veluti quæ in visceribus accidunt. Curatio igit earum quæ in superficie cutis abscedunt inflammationū, fit, incipiente quidem iam abscessu, per ea quæ dolorem sedant, relaxantq;: procedēte verò tempore, ad ea quæ concoquendi, suppurandiq; vim habere dicuntur, transferri oportet. Statim igitur aqua abundanti in qua fuerint decoctæ altheæ radices, perfundere, atq; oleo calido partem inflammata[m] conspergere, nec non ex farina triticea, quæ in aqua & oleo moderatè ebullierit, cataplasma imponere oportet. Si autem suppurationē prohibere sit animus, panem in oleo & aqua plurimū ebullire permittito: postea verò subigens admoneto. Sit tamen aquæ ad oleum proportio multiplex. Plus autem quàm hoc suppurationem prohibet hordeacea farina, similiter præparata. Si verò per summa cutis in parte inflammata tensio valida fuerit, multis ac mediocribus scarificationibus in superficie incidere oportet: ac postmodum ex farina hordeacea (ut diximus) elixata, cataplasma apponere. Cæterum in quibus difficulter ad suppurationem peruenit, nec faciliè discutitur tumor potest, sed suspitio est humores crassiores & tenaciores ibi impactos existere, in iis tantum dispositio[n]ibus conuenit ea quæ fit per profundiores scarificationes curatio. Conuenit etiam id quod ex caricis pinguib[us], dulcibusq; & decoctis, conficitur cataplasma. Quarum sanè decocto, aliquando hordeaceam farinā adiicimus: aliquando panem syncomistum, hoc est miscellaneum: sed qui ex generoso confectus sit tritico. Porro farina triticea maximè ad suppurationem promouet. Hordeacea verò, resoluit plurimum. Si igitur resoluatur tumor, minus tamē q[uam] optes, cū caricis hyssopum & origanum simul coquere oportet. Quod si vehementius exiccare tumore[m] volueris, sal decoctioni

CVR. AD GLAV. LIB. II.

554

adiicias: dein farinam hordeaceam, detracto prius fure, insperge: & postq̃ plurimū ebullierit, appone cataplasma. Si verearis ne tumoris reliquie in scirrhum durecant (quod contingit, vbi quis fortiter exiccantibus vtitur) radicem agrestis cucumeris, aut bryoniæ, aut asari, in aqua decoque: sæpius quidem per se solas: nonnunquam caricas pingues adiciens. Deinde aquæ farinam admisce, iniiciens aliquid adipis anserini, vel gallinacei, vel etiam suilli. Eadem quoq̃ radices, atq̃ etiam quæ producit altheam, si post moderatam decoctionem cum pane & adipe contundantur, huiusmodi discutiunt tumores. Fortior autem hisce omnibus est dracontii radix. Verūm fortiter resoluentibus medicamentis semper sunt miscenda emollientia, ne tumores ipsi in pertinaces scirrhus degenerent.

Tumoris i scirrhum abeuntis curatio.

Discutiētibz fortiter, cur sēper sint miscēda emolliētia.

De tumore suppurato.

Cap. VII.

PORRO vbi suppurandi tumorem amissa spes est, ex farina triticea vtere cataplasmatibus. Dein verò postq̃ suppurata secueris, si videris ea quæ circa sectionem sunt, omnino ab inflammatione libera, emplasticis medicamentis vtitur, sed quibus exiccandi, resoluendiq̃, citra morsum facultas insit. Equidem sæpius in huiusmodi vsus sum medicamēto ex fermento & ostreis combustis cōfecto. Si verò pars aliqua circa sectionem inflammata videatur, quod ex chalcitide constat, liquabis oleo: atq̃ vbi sensim refrigeratū fuerit, infundēs vinum, in mortario emolles & subiges: ac deniq̃ vsui accommodabis. Vbi verò cutis per suppurationes plus q̃ par sit, colliquata & veluti lacerata fuerit, non facillē subiectis corporibus agglutinatur: quare necessum est, vt per linicina latiora vulnus ipsum curetur.

Tumoris suppurati curatio.

De sinu.

Cap. VIII.

SIN autem amplius agglutinandi cutim subiectis partibus creuerit difficultas (qui sanè affectus vocatur)

MMm iiii

Sinus quid.

Sinus curatio.

Medicamē ex
charta combu-
sta.

Sinui curando
utilia medica-
menta q̄ sint.

Metallica oīa
fortiri maiore
vim exiccandi,
ubi plusculum
ebullierint.

Effluxui puris
esse fac.ēdam
sectionē aptā.

catur sinus) satius est fistulam directē perforatam, uel
ex aere, uel ex cornu factam, habere in promptu: aut
etiam aliquod ex iis instrumentis, quibus pus extrahi
consuevit, quod foramē latissimum habeat: ac per id,
exiguum medicamenti nostri, quod ex charta com-
busta constat, liquatum oleo rosaceo in ipsum sinum
infundere: ac deniq; linamento concepto, ipsius os
claudere. Ceterū quæ sic liquantur medicamen-
ta, oportet ut sint acriora, quā quæ linamentis ex-
cepta illinuntur: qualia nimirum sunt quæ omnibus
sunt in usu, colore viridi. Nam quum hæc ipsa oleo
rosaceo non paucō soluere expediat, ut iniici possint
in sinum, necessariō certē ipsorum virtus exoluitur.
*Quæcūq; igitur medicamenta exquisitē emplasti-
ca, quale est Machæionis, Epigoni, & quod Isis co-
gnominatur, ubi ad emmotorum vsum perducun-
tur, cerati indigent admittione, eadem etiam ad cu-
randos sinus sunt commoda. Siquidem qua ratione
ipsis ceratum miscetur (nempe quōd vires morda-
ces haberent, si per se sola liquefcerent) eadem sunt
ad sinus utilia. Vbi verō sinus mediocriter fuerit op-
pletus carne, tunc agglutinantia medicamenta ap-
ponere oportet: veluti si recenti, & sanguinolento
vulneri medicareris. Sciendum autem est interim,
omnia metallica medicamenta, subtiliorum partium
existere: sortiriq; maiorem vim exiccandi, ubi plus-
culum ebullierint. Quanto verō subtiliora medica-
menta fuerint, habuerintq; maiorem vim exiccandi,
tanto plus in sinum operabuntur. Porro quum ad su-
periolem locum ipse sinus extenditur, facili per os
humor vitiatus elabatur. Si verō ad ima declinet, quū
retineatur intus, partem aliquam continuam erodit.
Quare in huiusmodi sinibus, nisi prius ad effluxum
sectionem feceris, nihil proficies: nec quum carnem
gignere, nec quum agglutinare volueris. In aliis ve-

non est opus sectione, si modò convenientem figuram in patiente parte seruaueris. Ex qua figura potes aliquando sinum ad partem superiorem vergentem, facere vt deorsum inclinet: sicuti & vergentem ad ima, conuerrere ad superiora. Aduerte autē mellicratum esse aptum ad conglutinandas penitiores ipsius sinus particulas. Post cuius vsum, prius quàm aliud glutinans medicamen adhibeam, aliquando vino solo, aliquando vino mulso, ipsum soleo sinū abluere. Etenim ad abstergendam, expurgandamq; adhaerentem saniem, mellicratum est præstantius: ad conglutinandum verò, vinum est melius, & efficacius: præcipuè quod in medio dulcis & austeri consistit. Et quidem post medicamenti agglutinantis appositionem, spongia recens ex mulso, aut vino, circumciatur, quàm mollissimè fieri possit. Atque alligatio quidem incipiat à fundo sinus: desinat autem ad os. Linteorum verò circumductiones, constringantur quidem in fundo sinus, sed non ita vt dolorem inferant: paulatim autem laxentur, vsq; ad os sinus: quod quidem habeat laxam alligationem, emplastrumq; quod ei extrinsecus admouetur, adeò discissum forficibus, vt ex ore ipso, humores vitati, si qui excernuntur à sinu, facile effluere possint: paruo aliquo alio ipsi imposito emplastro, vsque ad solutionem: quam tertia quaq; die faciens, auferes hoc ipsum, quod veluti operculum hæret: id quod per totum sinum circumiectum est medicamentum relinquens. Iam verò, ex quantitate, & qualitate emanantis humoris, præterea ex dolore, vel indolentia, tumore, vel depressione partis affectæ, cognosces nū pars ipsius sinus profunda sit probè cōglutinata. Siquidem si neq; in ipso sinu dolor sentiat, neq; tumor appareat, sed totus loc⁹ depressus, siccus, atq; expers doloris existat, uiderisq; ad osculum pus exactè concoctū, nec non quātitate pau-

Mellicratū esse aptum sinui conglutinādo. Sinus qñ abluendus ex uino.

Vinum sinus glutinat.

Sinus quō deligandus.

Sinum glutinatum iri ex quibus signis colligi possit,

Medicamenta
sinui circūlinē
da, esse debēt
uehemēter sic-
cantia.

Cutis lacerae i
abscessib^{us} me-
dicatio.

cūm, bene sperandum est, de sinus glutinatione. Si autē contraria se ostendant, nondum sinus conglutinetur. Sit verò medicamentum quod circūlinetur sinui, vehemēter siccans, citra tamē mordacitatem: quale utiq; nostrum existit, sine cera confectum ex metallicis medicamentis elixatis, & oleo cicino, & aceto. Quod nimirum vulnera cruenta conglutinat, sinusq; sine molestia siccet, si lixio prius sordes abluta fuerint. Porro vbi qui abscesserunt tumores tardē facti fuerint, cutis ipsa admodum extenuatur, redditurq; lacerae vel si persimilis. Quo tempore vtendum medicamentis est, substantia quidem humidis: potentia autem siccis: quale est quod cōstat ex lithargyro, & suillo adipe antiquo, & chalcitide, quibus additum sit vetustissimum oleum. Confert etiam in lacera cute non minus mel, si vsq; ad consistentiam emplastri elixetur. Satiū tamen fuerit ei myrrhā subtiliter tritam, aut aloē, aut thus, aut aliquod ex his, vel omnia simul aspergere: tū præcipuē, quum linteo inunctum humidius apparet. Vfus etiam sum aliquando & tenui centauro, quod mirum est ad eiusmodi medicamen. Post ipsum verò & symphytum vtile est: deinde ireos illyricæ radix. Postea farina ex orobis: omnia hæc & per cribrū subtile transmissa, & inspersa melli, dum ab igne amouetur.

De gangræna.

Cap. IX.

Gangræna qd

Membru mor-
tificatum, qua-
ten sit abscin-
dendum.

NVNC verò opportunum videtur de gangrænis aliquid dicere. Sic enim vocant mortificationes eas, quæ ex magnitudine inflammationum fiunt, nondum tamen absolutè sunt factæ. Etenim quum ita membrum effectum est mortuum, vt nec punctiōe, nec sectionem, nec etiam vñionem sentiat, statim ipsam recidere oportet, qua vicinam sanam partem attingit. Ceterum quod sic affectū est, denigratur. Quod verò in medio consistit, vt ad mortem proficiscatur,

appellatur gangræna. Curatur autem, euacuantibus quidem nobis plurimū sanguinis, qui in patiente membro compingitur (cuius causa mortificationes fiunt) reliquo autem, exhibentibus transpirationem. Igitur aut cutem vniuersam multis sectionibus profundis secare oportet, vnā cum subiecta substantia : aut plurimis scarificationib⁹ profundis incidere. Vbi verò sanguinem effluere permiseris, imponendū aliquod medicamen est, ex iis quæ ad putrescentia conducunt: cuiusmodi est ex oxymelite farina orobi, loliiue. Si verò talia non adsint, fabarum farinam adhibe, atq; ipsum oxymel solum. Quod si fortius medicamen apponere vis, adice sal, aut ex trochiscis aliquem exquisitissimè tritum, qualis Andronis, & Polyidæ, & Pasionis, & Musæ existit. Verū qui duras natura carnes sortiuntur, ii fortissima medicamenta desyderant: mollia verò, qui teneras. Ad maiorem autem securitatem, quando abscindis aut circūcidis id quod iam putruit, satius est ipsius mali radicem, parti sang coniunctā, adurere, vti sæpius consueuimus in pudendis facere: nonnunq̃ ipsis affectis partibus admoventes cauteria: nonnunq̃ linamentum interponentes. Facta verò aduisione soleamus vti succo porri, aut, si is nō adsit, recitatis trochiscis. Ad detrahendam autem crustā, medicamento dicto Cephalico, ex melle vtere: aut pane ex hydrelæo decocto. Iuuat etiam hordeacea farina similiter præparata, aut cum ipsa triticea mista, illitaq; . Præterea, tetrastachmum, & Macedonicum nominatum, sunt crustarum suppurationibus, atq; earū excidentis accommodatissima: & quæcunq; vim habent perducendi ad suppurationem. Panis etiam cum apio, vel ocy-mo tusus, optimè crustas disrumpit, & à sanis partibus eximit. Ex simplicibus autem medicamentis, iris, vel radix panacis, vel aristolochiæ, vel acori ex melle. In mollibus verò corporibus sat est farina orobi, cum

Gangræne cū
ratio.

Putrescentibus
apta medica-
menta quæ.

Adurendā esse
radicem putre-
scents partis
tæ.

Escharam quæ
detrahant.

melle, vel thure. Aufert etiam crustas Machæionis medicamentum. Quum verò exciderint crustæ, atq; huiusmodi vlcera idoneis medicamentis carne repleta fuerint, debet induci cicatrix.

De cancris.

Cap. X.

Cancris ubi & ex quo humore gignantur.

Atra bilis expurgatur a lie, quem alit.

Atra bilis quos morbos exciter.

Cancris duplex curatio.

Cancris medicatio periculosa.

CARCINOSI tumores in omnibus consueverunt fieri corporis partibus, sed præcipuè in mammillis mulierum, * quæcûq; naturali sua purgatione priuantur. * Nam quâdiu hæc, ut oportet, adfuerit, tandiu mulier integra sanitate fruetur. Hi verò tumores omnes ex atræ bilis recremento gignantur. Qui humor feci vinariæ similis, dum sanguis in hepate fit, ab splene expurgatur, cui est nimirum nutriendo. Quum igitur naturalis temperatura hunc humorem paucum genuerit, optimaq; victus ratio præcesserit, & ex ipso qui generatur, splen abundè satis attraxerit, nulla huiusmodi superfluitas coaceruatur in venis. Si verò contraria accidunt, tunc succus is melancholicus multiplicatur in venis, à quibus nonnunquam, facultate expellendi extranea præditis, per hæmorrhoidas excernitur. Sæpius autem & ad varices decumbit. Quandoq; ad cutim vniuersam expellit, vbi gignit elephantiasim. Est quum ad alias corporis partes, quæ cæteris ibecilliores sunt, humor iste decumbit. Quo tempore euidenter apparêt quæ in loco affecto sunt veng, crasso & nigro sanguine ibutæ. Qui quidè quâto crassior fuerit & nigrior, tãto deterior est passio. In mammillis autem sæpe vidimus tumorem figura animali cancro persimilem. Hunc igitur morbum per sui initia sæpe sanauimus, medicamentis quæ atræ bilem educerent. Vbi verò in molem insignem attollitur, curari sine chirurgia non potest. At scopus in huiusmodi curatione est, totum qui circûstat tumorem præter naturâ, qua partibus sanis adhæret, abscindere: ob vasorum tamen magnitudinem, præsertim si fuerint arteriæ, profluuii san-

guinis statim periculum imminet. Quòd si laqueis ipsa excipias, *per consensum afficientur continuæ particulæ. Si verò radices morbi exurere animus sit, neque huic rei maximum periculū deest, *si prope loca principalia insignis adustio fiat. Porro in Alexandria, plurimi, ob crassam victus rationem, atq; regionis feruorē, elephantiasī corripuntur. At in Germania & Mysia, rarissima hæc passio videtur: & apud Scythas lactis potatores, nunquā ferè apparuit. Huic igitur morbo melancholici succi conferunt purgationes. Quòd si ætas atq; virtus pmiserint, sanguis prius mittendus est. Sed neq; in cācris inutile est, vbi nihil prohibet, primò sanguinem mittere, ac dein purgare: euocareq; mēstrua, si sint mulieres, nec attigerint quinquagesimū annum. Ipsi autē patienti particulæ, succus solani imponat, vel medicamen ex pōpholyge constans, quo vtor ad caneros exulceratos: vel etiam quod ex chalcitide fit, si copia illius non detur. Quod pertinet ad victus rōnē, succus ptisanæ abundanter est exhibendus, & serū lactis: at ex oleribus, malua, attriplex, atq; bletum. Cucurbitis etiam, si occasio ferat, vtendum, & piscibus saxatilibus, auibsq; omnibus, exceptis palustribus.

De elephantiasī.

Cap. XI.

AT IIS qui elephantiasim patiuntur, mirabile auxilium est viperarum esus. Quas quidem, vbi caput, caudamq; , vsq; ad digitos quatuor abscideris, excoriarisq; , ac deniq; interanea exemeris, in olla, prius ablutas coques, donec exquisitè molles reddant. Adiicere tñ debes aquæ, in qua illæ elixantur, porrū, anethumq; , & olei nōnihil. Ipsum etiā medicamentū confectum ex viperis, confert in potu exhibitum, iis qui huiusmodi morbo laborāt: vel cuti etiam illitū. Porro ad sanandas strumas, optima sunt quæ astringere, & exiccare, & pus etiam facere pñt. Ad meliceridas autē, quæ ipsas dissoluendi vim habent, & quæ pus di-

Elephantiasis in Alexandria inualefcit plurimum.

Elephantiasim i Germania reperiri rarissime, falso Galenus affirmat.

Cancris exulcerati remedia.

Cancris victus ratio cōueniens

Elephantiasis conducit viperarum esus. Viperæ cōcinatio.

Theriacē elephantiasis confert, comesta, illitaq;.

Hydropis cu-
rationis scopi
tues.

scutiunt medicamenta. At verò curatio hydropum
ad has tres reducitur intentiones: vt sanemus du-
rum tumorem, quo viscus affligitur: & apponamus
ea quæ humiditatem dissoluant: & pro-
pinemus medicamenta quæ
moneant vrinas.

FINIS.

ILLVSTRISSIMO ET SAPIENTISSIMO

mo Viro, D. D. Ioanni Furtado à Mendoz-

za, apud Venetos Oratori Cæsareo lon-

gè Dignissimo, Andreas Lacuna,

Secobiensis, Doct. Med.

Miles Sancti Petri.

S. P. D.



IX MAXIMAM IN-
gratitudinis notam, aut decli-
nare, aut eluere, semel iniustam,
possem, Vir Illustris. si ex lu-
cubratiunculis meis, sub umbra
Amplitudinis Tuæ ad absolutio-
nem perductis, portionem ali-

quam tibi non impertirer. Nam quum ex mercimo-
niis singulis, quacumq; inter subditos Cæsaris in hac Ve-
netorum Vrbe splendidissima contrahuntur, ad egre-
gium & Consularem Virum Thomam Sornozzam,
uel Cæsareo decreto, nonihil frugis pertineat, q; per-
petuò illis patrocinetur, eorumq; uniuersas lites com-
ponat: multo magis, mea quidem sententia, rationi
consentaneum uidetur, ut optima quæq; ingenia, qui-
bus contigit huc suos labores aduehere, ex meditatio-
nibus suis aliquod Dignationi tuæ literarium etiã tri-
butum pendant, à qua nimirum fouentur, aluntur, lo-
cupletantur: cuiusq; in studiosos omnes patrocini-
um atq; benignitatē sum ipse omnium maximè expertus.
Consilium impræsentiarum est præterire silentiò im-

mortales istas uirtutes tuas, prudentiā, temperantiam,
 continentiam, constantiam, animi magnitudinē, mul-
 tiplicemq; doctrinā, quibus totus splendes: ne aut ea-
 rum sublimitatem claudicante oratione non assequar:
 aut reluctari uidear singulari modestiæ tuæ, quæ ut po-
 pularem semper auram contēpsit, sic nihil magis exo-
 sum habet, quā huiusmodi encomia. Amplissimum
 quippe integritatis tuæ, uel me tacente, argumentum
 est, q̄ Carolus. V. Imperator, te præter expectatio-
 nem uocauerit, ut in hac tam augusta Rep. uices suas
 gereres, grauissimāq; administrares negotia. Quum
 igitur minimè contemnenda artis Medicæ pars, in ua-
 cuatione redundantium consistat: ac uacuatio quidem
 ipsa, partim per uenæ sectionem: partim per purgan-
 tis pharmaci exhibitionem: partim per hirudines, cu-
 curbitulas, atq; scarificationem soleat administrari:
 haud ab re me facturum existimaui, si Galeni tres cō-
 mentarios de phlebotomia, quorum primo titulus est
 de uenæ sectione aduersus Erasistratum: secundo, de
 sectione uenæ aduersus Erasistratæos Romæ degentes;
 tertio, de curandi ratione per uenæ sectionem: ac præ-
 terea alios tres, unum de hirudinibus, cucurbitulis, &
 scarificatione: secundum, de purgantium medicamē-
 torum facultatibus: tertium deniq; in quo docetur,
 quos nam purgare, & quando, qualibusq; medica-
 mentis oporteat, offerrem Amplitudini Tuæ: hisq;
 etiam ueluti auctarium quoddam adiungerem libellum
 de ptisana, consiliumq; à Galeno conscriptum puero
 cuidam epilepsia laboranti. Nihil ergo iam superesse
 uidetur,

uidetur, nisi ut ipse, Pater Obseruandis. hosce octo
commentarios, pusillos quidem, si chartularum tan-
tum ratio habeatur, sed mortalium uitae admodum sa-
lutaes, pignora quaedam officij erga te mei, quam be-
nignissime excipias, munerisq; tenuitatem non asper-
neris, memor eos qui thure carerent, fuisse olim Diis
mola salsa litare solitos. Vale, Musarum ho-
spitium Amplissimum. Venetijs: ex aedibus tuis,
tertio Idus Aprilis, M. D. XLVIII.

GALENI PERGA-
MENI, DE VENAE SE-
ctione aduersus Erasistratum.
Liber vnus.



MIHI QUIDEM
illud inquisitione q̄ diligē-
tissima dignū esse videt̄,
cur nā Erasistratus, quum
cætera quæ ad artem spe-
ctant oia, etiam minima
quæq; satis superstitione
tractarit, de veng tñ sectio-
ne, pñtaneo illo vnicoq;
remedio, & qđ apud uete-

Erasistratus ne
minimum qui-
dem sermonē
fecit de sangui-
nis detractiōe.

res fuit maximi pōderis, ne minimū quidē, nisi obiter
& p̄ transennam, sermonē fecerit. Nam dum ait inflā-
mationes, exempli gr̄a, quæ vulneribus superueniūt,
vacuatione quæ per inēdīam fit, esse curandas, miror
sanē, q̄ auxilio expeditissimo omisso, ad tardissimū,
minimeq; tutum confugiat. Ego verò, quādoquidem

Tomus. III.

NNn

Phlegmonas
uacuari facili-
me promptissi-
meq; p sangui-
nis detractio-
nem.

Inedia, ut eua-
cuat phlegmo-
nem, longū tē-
pus desiderat,
ex æquoq; uni-
uersum corpus
inanit.

Inediis longis
quæ incōmo-
da soleant sup-
uenire.

Inediam uacua-
re, sed lōgo tē-
pore, & cū pe-
riculo.

Natura pluri-
mos morbos
soluit p excre-
tionem sangui-
nis.

Naturam non
esse impediē-
dam, sed iuuan-
dā, monet Hip-
pocrates.

per inflammationes necessariavacuatio est (vel Erasistrati testimonio) eam oīum facillimam, prōtissimamq; venæ sectione p̄fici arbitror: utpote p̄ quam ipsas etiā phlegmonas solas, celerrimè curare possumus: quum ē diuerso inedia, prāter q̄ quod longū tempus regant, æqualiter etiā vniuersum corpus euacuant: id qđ certē nō est expediens: ut interim alia reticeā incōmoda, quæ in dias *lōgas necessariō sequunt: cuiusmodi sunt virtus defatigata, succi biliosiores atq; amarulentiores effecti, morsus cordis frequentes, inquietudines, deiectiones suppressæ, ac breuiter, omnia recrementa *mordaciora & acriora reddita. Quorum Erasistratus nihil animaduertens, cœcorum more, qui amplam, compendiosamq; & planam viam in propinquo habentes, sæpenumero angustā, prolixam, asperamq; errabundi ineunt, & ipse propinquam admodum, satisq; expeditam & amœnam semitam aspernatus, ad impeditam illā, salebrosam, & longam se contulit. Quippe qui hoc tantū considerauerit, num quō ipse contendit, via eō vergat: non autem an compendiosē, & sine periculo ducat. Nam quōd vel inedia ad plenitudinis vacationem conferat, ego non eo inficias: verūm longo tempore, magnoq; cum nocumento, eam efficere id profiteor. Iam verō, quum Erasistratus perpetuō admiretur naturam, ceu artificiosam, prouidamq; animalium gubernatricem, nusquam tamen eam imitatur. Aut cur illā plurimis morbis sanguinis euacuatione medentem cernens, ne in vno quidem, ipse tali præsidio utitur? Itaq; mihi aut modis omnibus demens, aut in naturæ operibus quāminimè versatus esse videtur. At omnium bonorum, quæ ad medicam artem spectant, nobis author Hippocrates, nos monet accuratissimè (id quod etiam Erasistratus nos monere debuisset) ut quādiu natura fortis atq; vegeta existens, sese ad crīsum accingit, nō per-

turbemus qdē motū ipsius perficiamus aut ea, quæ superata morbosarum causarū vehementia, non pōt ad integritatem perducere. Quæ iudicantur, & iudicata sunt (inqt) integrē, nec mouere, nec nouare, sed sinere. Istud quidē habes proprium naturæ integrē mouētis præceptū. Quod verò huic succedit, naturæ & ipsum, verūm diminutē ad crisim mouenti cōgruit: eāq; ob rē ut illi simus auxilio iubens, ait. Quæ ducere oportet, hæc quò maximē natura vergit, per loca conferentia, ducenda sunt. Natura siquidē tum temporis expellere aduersariū conatur: quum autē, præ imbecillitate imponere operi finē non possit, auxiliū nostrum iplo-
rat. Propterea etiā laborantes dolore lateris, iugulum affligente, aut regionē quæ supra præcordia est, secta interna cubiti vena dicit esse vacuandos. Vbi verò dolor sub septo trāsuerso fuerit, vt subducat alius vel nigro ueratro, uel peplio, cōsulit. Similiter in quopiā renum affectu, uenam quæ in poplite est, incidendā censet. Idem etiā, Margei famulam, cui ob contortū ad vertebrae coxarum os uteri, purgatio suppressa erat post partū, atq; inde grauis dolor sequut⁹, restituit, uenam prope malleolū secans: quīs tremores totū corpus iam occupassent. Sed neq; ex iis qui rōnalē, empiricamq; sectā amplexi sunt, quisq; à venæ sectione abstinit. Vt autē naturæ opera producamus, an nō ipsa cūctas mulieres singulis mensibus, q; ob ignauia & otii, multitudinem humorū coaceruent, superfluo sanguine euacuat? An non etiā idem post partū molitur, quā uis foetura ipsa quædā spēs vacationis existat? Ad hæc uerò, postq; foetus æditus est in lucē, lactis gñatio in mammillis nō pua & ipsa euacuatio plenitudini existit. Vna siqdē & lactis & mēstruorū substantia est: amborumq; (vt quispiā dixerit) riuorum fontes cōes, sunt uenæ. Quam ob rem, quibuscunq; per ætatem menses fluere cessarunt, iis neq; in manillis lac amplius gignitur.

Pleuritici quomodo sint uacuandi ex doctrina Hippocratis.

Menstrua cur mulierib⁹ profuant singulis mensibus.

Lactis & menstruorū una substantia est. Lac iis nō gignitur, quibus menses cessarunt.

Lactantes non purgantur.

Lac iis nō ad-
est quæ nō ge-
runt utero.

Menses cui p-
be fiunt mu-
lieribus mor-
bis non infe-
stetur.

Hæmorrhoides
fluētes suppres-
sæq; quorū bo-
norū, atq; ma-
lorum existant
causæ.

Contrariorum
eē cōtraria re-
media.

Bruta sibiipsis
natura ducē,
medentur.

Sanguinis de-
trahendi men-
suram, q̄ aliorū
auxiliorū, mul-
to facilius de-
prehendi.

Quæcūq; etiam purgandi tempora adhuc habēt, atq; interea lactant, eæ non purgantur. Præterea quā lactanti mulieri sanguis per locos erūpit, illico huic lac euanescit. Insuper quæ animalia non gerunt utero, iis neq; lac vnquam adest: rursus quibus id suppetit, illa etiam ad concipiendum idonea sunt. Porro si mulier per excretionem illam menstruam probē expurgetur, nec podagris, nec articulorū doloribus, nec pleuritide, nec peripneumonia, nec aliis deniq; ex plenitudine affectibus infestabitur. At mensuris retentis, eam cuilibet malo implicari facile est: huicq; rursus euacuationes medentur. Ex hominibus etiam, quibuscūq; pro consuetudine superflua per hæmorrhoides uacuantur, ii omnes vitam morbis minimè impeditā agunt: quibus item supprimuntur inanitiones, hi in perniciosissima quæq; labuntur. Ac proinde, quum vel in tremorem, vel in hydropem, vel in alium affectum frigidum, mas quidem ob hæmorrhoidū, mulier verò ob mensium retentionem, inciderit, Hippocrates commendat meritò euacuationem sanguinis, per conuenientia loca: quum nimirum contrariorum contraria remedia existant. Natura quippe (quam ille Vir imitatur) in ediam adiectione, repletiones euacuationibus, frigus calfactionibus, caloresq; refrigerationibus curat. Nam (vt alia multa subteream naturæ miracula) frequenter conspexi canem sese prouocantem ad vomitum. Vidi & auem Aegyptiam, quæ clysinum imitabatur. Grues etiam, aquilasq; prælongo vsq; ad ultimos terrarum fines volatu, partim frigus, partim æstum vitantes, quo contraria cōtrariis propulsent, videre licet. Sectio itaq; venæ (vt eò vnde digressa est, nostra reuocetur oratio) ob causas dictas perperam ab Erasistrato omittitur. Quòd autem mensura in venæ sectione multo facilius deprehēdatur, quàm in cæteris quibusuis auxiliis, hinc declaratur. Nam & colo-

ris mutationem, nunc quidem in ipso fluente sanguine, nunc verò in ægrotantis corpore, dispicere licet. Animi quoque defectio in plurimis affectibus vacuationis terminum obtinet: quemadmodum sanguinis fluentis vigor læguens, & pulsus mutati. Adde quod & medicus huius solius euacuationis liberam habet facultatem sistende, quandoque illi placuerit: aliarum autem nullius, Nam ubi propinandum sit aliquod medicamen, prima exhibitio in tua potestate sita est: cætera verò, fortuna administratrice obtingunt. Ingens præterea in propinationibus pharmacorum periculum est, quum vel non commouetur purgatio, vel quod in aluum attractum est, non facile excernitur, vel cum dolore, torminibus, refrigeratione, pulsum euanescētia, ac defectu animi exprimitur: vel quum corpus vehementer perturbatur, interimque paulum admodum euacuatur, aut euacuatio modum excedit: id quod sæpius, ceu extremum malum, contingit. Neque enim ut venæ incisæ fluxum mox digito superposito sistes, sic sistere alui profluuium poteris. Cibi etiam cuiusque in mensura erratum grauisima incommoda inducit: ut in hominibus extenuatis & imbecillibus constat. In quibus si quid minus, quam par sit, nutriet, virtutem tabidam reddet. Si verò modum exuperet, naturæ potius oneri, quam nutrimento, fuerit, illamque penitus & extinguet, & suffocabit. Ut autem funditus Erasistrati opinionem evertam, solam instituēris inediam, ad euacuandas omnes inflammationes, nemo ignorat, mea quidem sententia, inediam ipsam priuationem quandam existere, ac proinde nec nutrire, nec euacuare posse: quum inter inanitionem & vacuationem sit media. Nec verò existimandum est, aliquem unquam periisse ob inopiam ciborum: alioqui animantia delitescētia in latebris sine ciborum copia, perdurare nequaquam possent, quem admodum certe perdurant: quia nutrimento non in-

Sanguinis euacuationis sistende, medicus habet liberam potestatem: aliarum autem nequaquam. Purgationi superuenientia discrimina.

Cibi in mensura erratum, grauisima incommoda, inducit.

Inedia, priuationis quum sit, nec nutrire, nec inanire potest.

Lætētia absque cibo durare,

Interiisse ob ci-
borū inopiam,
neminē absq̃
ea raritas cutis
euacuat.

digent : quandoquidem ob desidiam atq; torporem,
in quo versantur, necnon ob astrictam cutem, nihil
ab eorum corpore exhalat, quod cibo istaurari postu-
let. Itaq; non inedia, sed raritas cutis euacuat: quam si
frigore & quiete densaueris, quid commodi fuerit ex
fame expectandum? Cæterum dum Erasistratus cuiq;
instituere inediam contendit, videtur mihi ipsemet af-
fectuum qui inedia opus habeant, author & promo-
tor existere.

GALENI PERGA

MENI DE VENAE SE-

ctione aduersus Erasistratæos Ro-
mæ degentes. Liber vnus.



VVM ROMAM INITIO
venissem, incidi in medicos quosdā,
qui à venæ sectione tātōpere abhor-
rebant, vt quum aliquando æger q̃s-
piam propter plenitudinē iam præ-
focaretur, ne tum quidem hoc auxi-
lio vti vellent: idq; secuti Erasistratum, qui nusquā ve-
næ sectionem probans, omneis inflānationes sola in-
edia euacuandas esse censebat. Quā in re quantopere
vir ille hallucinatus fuerit, quis non cernat. Etenim si
ob id inedias probamus, q̃ vacuatis per eas venis, affe-
ctum minui contingat, multo hercle commodius fue-
rit, vt semel adhibita euacuatione, potissimū quæ per
sectam venam administratur, ab inediis abstineamus:
vt quæ & ægrotos ingenti molestia soleat afficere, &
vigilias, & inquietudines, afflictionemq; oris ventricu-
li, tum corruptionē succorum, necnō alui, atq; inter-
dum vrinæ suppressionem inferant. Quamobrē non-
nulli in Romanavrbē medici, præcipuē qui medebant
mulieribus, quū explorassent infelicē cuiusdam puellæ

Inflānationes
omnes sola in-
edia euacuan-
das esse cense-
bat Erasistrat⁹.

Inedix, quæ n
ducere soleant
symptomata.

ob non sectam venā, successum, in quibus sanguis ferebatur ad superiora, tempore quo eruptio menstruorū expectabatur, venæ sectionē iam vsurpabant. Nec verò quietem, nec inediam eis iniungebant: sed melicratum propinabant: victuq; humectante, ac lauacris affatim vti eis permittebāt. Ab his enim, si vel mediocri quantitate sanguis fuerit detractus, purgationes exoriari confestim solent: præsertim si infra poplitē, aut iuxta talum venæ sectio fiat. Sin autē quis vena secta iniunxerit ipsi mulieri inediam, menses prius fluentes cohibebit, inculpabilesq; reprimet purgationes. Sanguis nanq; ciborum inopia arefcit, ac densior seipso redditur: eamq; ob rem, ad fluxum ineptus euadit. Quæ igitur tum lotæ fuerint, melicratumq; & cibos idoneos sumperint, ac vinum neq; austerum, neq; crassum biberint, his purgationes proculdubio contingent: ob idq; ego inedias post venæ sectionē non frustra tantū, verū etiam adhiberi cum magno damno profiteor. Iam verò quum nostra hac tempestate mulieres quædam Romane frigidissimam ex niue potarēt, ob idq; aut nullo pacto purgarentur, aut diminutæ: eas tamen medici sectione venæ adeò incolumes seruauerunt, vt nec sanguinem spuerent, nec pleuritide, peripneumonia, aut angina vnquā corripere. Porro in auspiciis inflammationum, omnis sorbitionum, ciborumq; adiectio subtrahenda est: utendum verò venæ sectione. Siquidem inflammationes quæ febres faciunt, vt plurimum, ex plenitudine fiunt. Quam ob rem si vasa nutrimento impleantur, maiores ac vehementiores ipsæ inflammationes reddentur. Cæterum si adolescentes qui neq; de sanguis detrahēdi mēsurā, nec de venarū secandarum ratione quicquā audiuerint, ad præsidium hoc sese accingant, ægros in exitiū perducant. Plures nanq; ob perperā sectā venā perierunt, q̄ quibus adhibitu id auxiliū nō fuerat. Quippe seniores medici tum

Menses euocant
venæ sectæ in-
fra poplitē, iux-
taq; talum.

Inedias post ve-
næ sectionē cū
magno damno
adhiberi.
Menstrua quibus
suppressa
ob niuis potio-
nem fuerāt, ve-
næ sectiōe suc-
cursum fuisse.
Inflammatio-
num curatio.

Venæ sectione
perperam ad-
ministrata pe-
riisse plures, q̄
quibus adhibi-
tum id auxiliū
non fuerat.

Febres cunctæ
in principio nō
egent uenę se-
ctione.

Peccare qui
plus dicantur.

Inediam & ue-
næ sectionē si-
mul circa unū
eundēq; agrū,
minime eē u-
surpandam.

Plethorici oēs
non egent ue-
næ sectione.

Venæ sectione
pleniq; idigēt,
qui tamen ex-
tra plenitudi-
nem sunt.

temporis uenas secantes, utebantur aliis euacuatoriis auxiliis, quæ idem quod & venæ sectio, verum longiore tempore efficere poterant: nisi q̄ quandoq; ob principem partem affectam, aut ob plenitudinis exuperantiam, æger morte præoccupabat. Verum qui febres cunctas in principio venæ sectione indigere autumāt, non mediocri etiam noxa ægrotos afficiunt. Itaq; minus aberrare eos consentaneum est (vt Plato ait) qui non aggrediuntur illa quæ ignorant, quam qui ea tractant, quæ didicerunt nunquam. Porro q̄ uas aliquod ruptum possit absq; inflammatione coalescere, dummodo nos cætera ritè administrauerimus, sanguinisq; quantum nobis visum fuerit, in tempore euacuauerimus, liquidò constat. Frequenter siquidem vidimus, quum quibusdam pugnantibus singulari certamine, * totum crus brachium ue dissectum esset, coaluisse tamen vulnus, antea quam inflammatio oriretur: quod quidem multo magis cōtinget, si (vt Hippocrates ait) illico sanguis copiosus fluxerit. Sæpius etiā vulnus in cauas thoracis partes illatum, triduo conglutinatum vidimus. Quod autem Erasistratus nusquā fuerit vsus venæ sectione, hinc perdiscere licet, quod in plenitudine omni semper inediam iniungat: id quod neutiq; facturum esset, si eam sanguinis detractione vacuaret: quum minimè consentaneum rationi sit, vt quis circa vnum eundemq; agrum, vtraq; auxilia, nempe inediam, & venæ sectionem, vsurpet. Nec verò existimandum est, plethoricos omnes sanguinis esse detractione vacuandos. Prius si quidem distinguenda natura plenitudinis est: habitudoq; & ætas ægri expendenda: tempus item, regio, & aeris constitutio consideranda: nec non quæcūq; antecesserunt, quæq; ipsum agrum etiamnum infestant symptomata. E conuerso alios plerosq; tibi ob oculos ponam, qui absq; repletionem quā sint, nihilominus venæ sectione opus hñt.

GALENI PERGRATI

MENI DE CVRANDI RA-

tione per missionem sanguinis.

Liber vnus.



VI DE SANGVINIS MIS-
sione speculantur, primò quidē inue-
stigare debent, quæ nam corporis af-
fectiones euacuatione indigeāt. Se-
cundò, quæ illa, quæ per sanguinis fit
detractionem. Tertiò, qui innoxie
hanc ferre possint euacuationem. Quartò, quo nam
potissimum tempore ipsa molienda sit. Quintò, quam
ex venis secare oporteat: quum nimirum haud parum
interfit, hanc ne, an illam incidas. Porro hac quoq; cõ-
templatione absoluta, succedit de scopis oratio. Qui-
bus mentem adhibens quis, vacuationis modum faci-
le per coniecturam inuenerit: nec non in quibus semel
auferre præstet: & in quibus repetitam ablationē mo-
liri: tum in quibus nam inanire vsq; ad animi expediat
deliquium: & in quibus id, ceu summum malum, vita-
re. Quum autem per omnē vitam, omnia quæ in que-
stionem veniunt, duo inuentionis organa obtineant,
nempe rationē & experientiam: necesse esse arbitror,
& nunc quoq; me, aut ratione sola, aut sola experien-
tia, aut iunctis ambabus, quæ proposita sunt, scrutari.
Si quis ergo affectiones quæ vacuatione indigent, ve-
lit experientia collectas exponere, sola opus est ad ex-
plicationē memoria. At si via rationali id efficere insti-
tuat, necesse est, vt prius commune ac generale inue-
niat, ex illiusq; deinde in species differētiāsq; sectione
vsq; ad species vltimas, affectuum numerum, vacua-
tionem desyderantiū, inueniat. Etenim ratio ipsa, hæc
quidem, ex communibus tantum progrediens notio-

Sanguinē de-
tracturo cõsy-
deranda.

Inuentionis or-
gana duo, ratio
atq; experien-
tia.

Ratio duplex.

Facultates ani-
mal dispensan-
tes sunt plures.
Elementa qua-
tuor, subiecti princi-
piis generatio-
nis eaque totae
tota misceri.

Plenitudo est
duplex: nempe
iuxta vires, &
iuxta uasa: qua-
rum utraq; eget
euacuatione.

Plenitudo iux-
ta uasa quid
sit.

Plenitudo iux-
ta vires quid

nibus, inuenit & demonstrat: hæc autem, etiam quæ
ex istis inuenta sunt, ad demonstrationem adhibet.
Ac priori sanè ratione, omnes artes, omnesq; ho-
mines uti assolent. Secunda verò, non omnes homi-
nes: nam propriè ad artifices pertinet. Eam igitur nos
impræsentiarum sequuti, utemur multis, quæ in aliis
commentariis, sunt demonstrata. Nempe complures
esse facultates quæ animalia gubernant: quarum alias
naturales, alias animales vocari. Generationis autem
principiis pro materia, quatuor elementa subiici: eaque
tota per sese mutuò misceri: esseq; inuicem in se age-
re nata, idq; per qualitates suas effectrices, calidita-
tem, frigiditatem, humiditatem, & siccitatem: ex
quibus utiq; omnium temperamenta constantur.
Præterea dari duplicem plenitudinem, nempe secun-
dum vasa, & secundum vires: primariasq; actiones, à
similariib⁹ corporibus perfici: ut secundarias ab instru-
mentariis. Quum igitur plenitudo bifariam & fiat, &
dicatur, vno quidem significato, ut ad vires: alterò iux-
ta laxitatem continentium vasorū: utriq; sanè opus
est euacuatione: siue ea in homine valetudinario, siue
etiam in valente contigerit. Voco enim plenitudinem
iuxta vasa, magnam humorū colluuiem, ipsa vasa ten-
dentium: iuxta vires autē, eam quæ vel si minimè va-
sa distendat, vires tamen grauatur, & premit, hominēq;
reddit ad motiones pigrum, & tardum. Quòd si simul
adsit vlcerosus etiā aliquis sensus, ac potissimum dum
mouemur, signum est affectum ipsum vitiosi succi esse
sobolem. Quandoq; aut, & in partibus quibusdā cor-
poris, nō in tota mole, plenitudines adsunt similes iis,
quæ vniuersum corpus solēt opprimere. In omnibus
igitur id genus affectibus, maximè ex usu sunt vacua-
tiones humorum, aut vaporum, aut spirituum peccan-
tium: minimè tamē semper sectio venæ desyderatur:
sed sufficit interdum purgatio, frictio, balneum, inun-

Actio igitur ex aliquo digerente medicamento. Quæ autem affectiones venæ sectione indigeant, deinceps dicemus. Non solum nutrimentum animantis partibus præstat sanguis, sed calorem etiam naturalem cōseruat. Itaque ipsius cordis calor interdum quidem, seipso minor efficitur, aut propter sanguinis copiam, à qua nimirum extinguitur, aut propter ingentem inopiam, aut propter frigidam qualitatem: interim verò maior, aut propter calidam sanguinis qualitatem: aut propter exiguam inopiam. Quicquid autem cor in caliditate frigiditateque perpetitur, eius quoque & aliæ corporis partes protinus participes fiunt. At, quæ membratim accidunt caliditates, aut frigiditates, eas quæ parti quidam affectus vicinæ sunt, vnà alterant: in totum tamen extendi corpus, prius quam cor immutent, non possunt. Cæterum quandoquidem omnia simul calida & humida * citissime computrescunt, sanè si quod nutrimentum suggeritur à ventriculo ad hepar, à natura non superetur, inque probum sanguinem non conuertatur, aliàs aliam perpetietur putredinem. Quum autem quæ ex materia putrescunt calida, quam antea calidiora reddantur, calidior profectò erit ipse sanguis putrescens: ac proinde etiam particula, in qua ei putrefieri contigerit. Quia verò ab insigniter calidis, simul quæ vicina sunt incalescunt, utique calor ille acris & mordax (qualis à putredine oritur) illis quæ vltèrius sunt, communicabitur. Ergo si pars quæ hoc pacto incaluit, insignis sit, aut calorem suum in cor extendere valeat, vnà & ipsum accendet, ut quod natura calidissimum sit. Quòd si semel illud accensum fue rit, facile totum ipsius iam corpus simul exalfiet: qui affectus vocatur febris. Nonnunquam verò, prius quam computrescat sanguis, ingens ipsius vis, decubabit in partem aliquam: quam aut extinguit omnino, ita ut actio ipsius pereat: aut illi certè noxam non con-

Sanguis nō solum alit animal, sed calorem eius naturalem cōseruat.

Cordis calor unde minor atque maior red datur.

Cordis intemperies protinus cæteris partibus cōicantur.

Putrescunt citissime calida & humida.

Putrescētia reddi calidiora quàm antea.

Febris quid.

Apoplexiæ fi-
unt multo san-
guine incūben-
te in animantis
principium.
Phlegmènes
generatio.

Schirrus.
Oedema.
Erysipelas.
Plenitudo iux-
ta vires faci-
le in putredinē
abit.

Sanguinem de
tracturo q̄ sint
prius expēden-
da.

Plenitudinis
utriusq̄ quan-
titas, qualitas,
q̄ q̄bus signis
sit definienda.

temnendam infligit. Hoc siquidem pacto apoplexiæ
proveniunt, multo nimirum sanguine incūbente con-
fertim in animantis principium. Quod si in aliam par-
ticulam ruat, tumorem inibi præter naturam excitat.
Cui⁹ generis phlegmone existit. Verum si crassior sit,
atræ bilisq̄; magis naturam referat is qui decubuit san-
guis, scirrhusior tumor efficitur: sicuti si pituitosior sit
fluxio, laxus: & si biliosus, tumor erysipelas dictus.
Quum itaq̄ plenitudo (quæadmodum exposuimus)
sit duplex, & ex ipsis, ea quidē quæ ad vires refertur,
facile in putredinē abeat, interdumq̄; in partes quas-
dam ingruēs, inibi tumores præter naturam excites:
altera autem, quæ iuxta vasa dicitur, sæpe etiā in par-
tes quasdam decumbat, tumoresq̄; & apoplexias, ve-
narumq̄; ruptiones molitur: utrāq̄ celeriter euacua-
re tentandum, prius quàm aliquam perniciem conci-
liet. Si igitur qui plenitudine grauatur, aut tenditur,
nec puer sit, nec senex, an illi venam secare oporteat,
expendes, præ oculis habēs hosce principales scopos:
plenitudinis nempe tum quantitatem, tum qualitātē:
virium robur, atq̄ earūdem infirmitatem: naturalem
totius corporis habitum, tempus, regionem, antea actā
vitam: tum an cibi potusq̄; copia, & præcipuē affatim
nutrientium, qui sic affectus est, fuerit vsus: ad hæc cō-
suetudinem, & res præter consuetudinem actas: quo-
usq̄ mot⁹ exercuerit, quas excretiones habuerit, aut
præter solitum compescuerit. Præter omnia aut hæc,
num gracilior, aut crassior euaserit. Porro vtriusq̄ ple-
nitudinis quantitas, ex priorum signorū magnitu-
dine definietur. Quanto enim grauior sibi homo vide-
bitur, tantū & plenitudinem quo ad vires creuisse con-
stat. Ad eundem modum, quantum auctus fuerit ten-
sionis sensus, tātum & auctam alteram plenitudinem,
quæ secundum vasa vocatur. At vtriusq̄ plenitudinis
qualitatem, partim ex coloribus iudicabis, memor co-

lorem humorum esse: si quidem ab externo calore vel frigore totum corpus haud immodicè affectum fuerit: partim ex iis, quæ humorū naturæ coniuncta sunt. Etenim calidiores, calidior totius corporis sensus sequitur: ut frigidiores frigidior: tum eos qui in venis quidem aceruantur humores, vasorum tumor atque distensio: qui verò in carne, sensus in ea vel grauitatis, vel tensionis, vel etiam caliditatis. Porro dispensantiū nos facultatū infirmitas atq; robur, propriis indicantur functionibus: voluntariis quidem, illius quæ in nervis cerebroq; consistit: pulsificis autem, eius quæ in corde ac per arterias mouetur. Nam secundum bonam nutritionem aut abolitam, & colorem probum, aut prauum, tertia facultas, quæ nutritrix est, & à iecore proficiscitur, cognoscenda venit. Vbi ergo extantibus plenitudinis signis, valentes facultates extiterint, incidet venam: videlicet, si tensiua quidem sit ipsa affectio, nihil distinguens: magisq; etiam in phlegmonode: sin uerò degrauians sit plenitudo quæ infestat, haud semper sanguinis molienda detractio est. Nam fieri potest, ut crudus p corpus collectus sit humor, à quo talis affectio gignatur. Quem succum sanguinis missio- nevacuare nō expedit, sed frictionibus, vnctionibusq; mediocriter excalfacientibus: nec non potionibus cibisq; & humoris crassitudinem incidentibus, & calfacientibus modicè. Siquidē quæ valenter excalfaciunt, nimis subito vires deiciunt: sæpe etiā vires adaugent. At verò, qui sanguine reiecto ex pectore, in præsens quidem curati, cæterum eam sortiti sunt thoracis pulmonisq; structuram, ut vel pauculo plus collecto sanguine, protinus aut vasis alicuius osculū reseretur, aut ipsum rumpatur, iis, vel si nullum in corpore etiā dum adfuerit symptonia, ineunte tamen verè sanguinem mittere oportet. Similiter in iis qui promptè morbum comitalem, aut apoplexiam, aut peripneumoniā, aut

Color humores indicat.

Facultatū nos dispensantium robur imbecillitasq; ex propriis indicantur functionibus.

Sanguinis detractione quando sit plenitudo uacuanda.

Crudus humor qua ratione uacuandus.

Sanguis detractione quibus sit prospiciendum ineunte uere.

pleuritidem, aut anginam icurrunt, eiusmodi affectus anteuertendi sunt sanguinis detractio. Eodem modo quibus hæmorrhoides retentæ sunt, potissimum si natura sint atrabilia, quiq; quotannis æstate plethoricis morbis corripitur assolent, & hos quoq; veris initio vacuare expedit: nec secus eos, qui ipso etiam vere illiusmodi malis vexantur. Cæterum intemperantes & vinolentos, ventriq; & gulæ deditos, nec purgatione, nec missione sanguinis magnopere iuueris: nam per vitæ intemperantiam rursus crudorum humorum copiam quāocysimè colligunt. Quare iis ne manum quidem admoueas. Eis verò qui præceptis salutaribus obsequuntur, summopere profueris, si principio veris primum quidem euacuaueris: dein aut ad exercitia, salubremq; victus rationem perduxeris. Sed nec tantum ubi adest plenitudo, siue ea secundum vires sit, siue secundum vasa, mirificè prodest venæ sectio: verum etiam citra plenitudinē initio phlegmones, quæ aut propter ictū, aut propter dolorem, aut partium debilitatem prouenit: quippe dolor sanguinem ad se trahit, & sæpe partium debilitas phlegmonem, absq; corporis plenitudine, contrahit: quum videlicet partes fortiores, per venas, ceu per canales quosdam, propria excrementa semper ad imbecilliores expellant: donec tandem ad partem imbecillimā omnium, defluerint, & quæ ex se amplius propellere quod in ipsa redundat, nequeat: id quod accidit illis partibus, quæ vim excretricem vicinis omnibus imbecilliores possident. Quamobrem omnium primæ infirmiores partes corripuntur excrementitiis morbis: quemadmodum glandulæ, quæ sunt fluxionibus excipiendis idoneæ, tum ob substantiæ laxitatē, tum quia inter omnes partes minimè robustas naturales facultates (excepta alteratrice) sortiuntur, sicuti & pinguitudo. Post glandulas sequitur pulmo, fluxioni recipiendæ promptissimus. Nam & hic

Intemperanti-
bus cur meden-
dum non sit.

Phlegmone in-
cipiente, etiam
si plenitudo nō
adlit, expedit
sanguinis mis-
sio.
Dolor sangui-
nem trahit.

Imbecilliores
particulæ a for-
tioribus humo-
res recipiunt.
Imbecilliores
partes cur om-
niū primæ cor-
ripiant excre-
mentitiis mor-
bis.
Glandulæ cur
prompte exci-
piant fluxiones.
Pulmo.

tres facultates infirmas possidet, corpusq; laxum. Deinde est lien. At cerebrū, aut perinde vt illi, aut etiam plus excipiendo fluxui est habile: constructionē tamen habet eiiciendis iis quæ recepit, appositissimā. Quibus ergo carnosio genere Pulmo, Lien, ac Cerebrum, natura sunt robustiora, in iis ad glandulas carnesq; perueniunt fluxiones, vbi totus nimirum habitus infirmus fuerit: veluti in rheumaticis affectibus accidit. Merito igitur in his curandis scopus est, non euacuatio, sed totius corporis roboratio: quamuis tamen curationis initium illis oriatur à misso sanguine: & si excrementa prauam qualitatem habuerint, vnā etiam adhibeatur purgatio. Rectē autem admonemur, in libro de Viſtus ratione in acutis morbis, vt si magnus sit ipse morbus, & æger floreat ætate, adsitq; robur, sanguinem detrahamus. Cæterum principes scopi mittendi sanguinis, sunt duo. nempe magnitudo morbi præsentis, imminētis uē, & cum ea uirium robur: quibus si adicias etiam florentem ætatem, nihil sermoni defuerit: modò sub ætate florente, præcedens sequensq; illam intelligantur, excipianturq; distinctione, tantum senilis atq; puerorum ætas. Quauis ætas senilis in uirium verbo comprehendendi potest, quum eorum nulli adsit robur. Si itaq; magnum fore morbum timemus, aut iam præsens est, aut incipit, venam secabimus, uirium habita rōne, tantumq; ex oratione exemptis pueris. Nec verò vbi tanta humorum crudorum copia accumulata est, vt secandam venam * prohibeat, sermo hic redarguitur: quum ipsis uiriū robur non adsit. Estq; hoc indicium eos haud posse sanguinis missionem perferre, * q; præter colorem totius corporis, degenerantem in ipsis ab eo, qui solet sanguinis copiam ostēdere, etiam ipsorū pulsus inæqualis in vehemētia & magnitudine existit: præpollētibus secundum ipsam inæqualitatē, ibecillis simul & paruis.

Lien.
Cerebrum.

Sanguinis mittendi principes scopi qui sint.

Senes oēs carete robore.

Pueris secandā non esse uenā.

Crudis succis refertos nō admittere uenæ sectionē, quia carent robore.

Vacuationis q̄
titas ex gbus
metienda sit.

Sanguis gbus
sit detrahendus,

Crudos succos
q̄n uacuare o-
perteat, & q̄n
minime.
Crudorum hu-
morū indicia.
Hæmorrhoidi-
bus, aut men-
struis suppres-
sis, sanguinem
detrahendum
esse.

Menstrua esse
euocanda per
crura: reuellan-
da per uenam
i cubito secā.
Scarificatio g-
bus sit adhibē-
da mulieribus:
& quibus se-
ctio uenæ.

Itaq; ex morbo, ætate & viribus minuendus esse san-
guis cognoscitur. At vacuationis quantitas, quum ex
istis, tum etiam ex plethorica vocata syndrome, aeris
nos ambientis temperie (quæ in tempus & regionem
diuiditur) antea facta victus ratione, excretionibusq; fa-
ctis, aut impeditis, commodè deprehenditur. Igitur ad
hæc omnia respiciens, tum podagricis, tum arthreti-
cis, tum morbo comitiali obnoxiiis: præterea melan-
cholicis, quiq; sanguinem antea expuerunt, aut thora-
cis structuram sortiti sunt ad id malum idoneam: ver-
tiginosis etiam, quiq; assidue corripitur solent angina, pe-
ripneumonia, pleuritide, hepatiride, ophthalmia uche-
menti, ac breuiter, morbo aliquo insigni, sanguinem
detrahere consueui. Porro in redundantia melancho-
lici humoris, sanguinem mittere oportet: aut certè me-
dicamento vti expurgante atram bilem. At vbi crudi
succo exuperant, anteq; morbus inuaserit, cautè eua-
cuabis: vbi verò iam corripuerit febris, nequaquam.
Iudicium autem crudorum humorum est color plum-
beus, aut albus pallefcens, omniaq; potius q̄ rubeus:
tum inæqualis pulsus. Verum si ob hæmorrhoides sup-
pressas cumulatius alicui sit sanguis in corpore, auda-
cter venam incidet, etiā si antea expertus grauē mor-
bum non fuerit. Sed nec euacuatio iis proroganda est,
quibus restitit menstrua purgatio. Non tamen necesse
est, illis semper secare venam: quum malleolorum sca-
rificationes quandoq; superfluitati vacuandæ sint sa-
tis. Plenitudines tamē à suppressis mensibus ortas, om-
nino per crura euacuabis, siue venā secare oporteat,
siue etiā scarificare. Sectæ quippe in cubito venæ, mu-
liebrem purgationē reuellunt. Iam verò, quæ ex mu-
lieribus albidiores sunt, aceruare tenuem sanguinem
solent: quocirca scarificationibus malleolorum adhi-
bitis, maximè solent iuuari. At quæ nigriores sunt, eas
vena secta curabis: quum tales crassiorē sanguinem,
ac magis

ac magis melancholicum gignant: præcipue verò, si Venæ quibus
 magnas habere venas appareant: id quod accidit illis, latè, & quibus
 quæ graciliores simul atq; nigriores fuerint. Etenim exigue infint
 carnosæ & candidis parvæ insunt venæ, ac proinde ip Sanguinis eru-
 sis malleolos scarificare, q̃ secare venam, præstiterit. ptionem uenæ
 Porro validam sanguinis eruptionem, venæ sectio so- sectio cōpescit
 let sæpe compescere, tanq̃ reuulsorium auxilium. Se-
 care autem in cubito venam, si ex dextra nare prorū
 pat sanguis, in brachio dextro expedit: sin ex altera, in
 sinistro: minimè tamen vsq; ad lapsum virium detra-
 hendus est sanguis. Simul autem, quum agis, artubus
 vincula iniicito, aut ex lana, aut ex canabe: hypochon Sanguinis eru-
 drio q; directè supposito, cucurbitulā admoueto: quan ptio per nares
 do quidem his remediis semper erumpentem è narib⁹ qua ratioe cu-
 sanguinem compescuimus: quum antea quæ inferunt randa.
 in nares, atq; fronti illinuntur, infirma omnia compe-
 riremus. Nihil autem equè artem medicam in agendo Quantitas re-
 coniecturalem efficit, vt cuiusq; remedii quantitas. Si mediorum præ-
 quidem interdum exploratum habemus quid nam æ- cipue reddit
 gro, quale, & quando sit exhibendum: at quantū exhi artem medicā
 bere oporteat, non nouimus. Hoc tamen summū bo- coniecturalem.
 num in sanguinis missione habetur, quod potes sistere Sanguinis de-
 euacuationem, dum opportunum videtur: ac rursus si tractioni quæ
 quando animus sit, sinere vt fluat: quousq; videbitur commoditas
 tibi rectè se habere negocium: id quod nō licet in pur- insit.
 gantis pharmaci exhibitione. Nam quod semel in ven-
 trem deuoratum est medicamen, quo minus omne sit Purgatīa phar-
 deuoratum, fieri non potest: neq; possibile est, vbi plus maca, vbi de-
 q̃ conueniat, purgetur homo, partem oblatis auferre. uorata semel i
 At verò, dum alicui sanguinem mittimus, nisi quid vr ventrē sunt, re-
 geat, præstat priori missione minus detrahare, iterū q; uocari nō pos-
 illam repetere: immo, si lubet, tertio. Vbi igitur multa se.
 euacuatiōe est opus, sed vires sunt imbecillæ, in iis eua-
 cuationem partiri expedit, vti & me fecisse vidisti, in
 iis quibus crudorum inerat humorum copia. Nam de-
 Euacuationem
 qñ partiri ex-
 pediat.

Sanguinis missio, in quibus adest crudorū humorū copia, quō celebrāda.

Sanguis quando mittendus ad animi vsq; deliquium.

Sanguis dum fluit, pulsus esse explorādos.

Reuulsio per se etiam venā, quę nam sit efficacior.

Sanguinis detrahendi scopi. Vacuandi qui sint liberalius & parcus.

Pueris ante quartūdecimū annū sanguinē non esse mittendum.

Vires robustas quis pulsus in dicet.

tracto pauculo sanguine, protinus exhibeo melicratum, probè coctum, cum incidentium medicaminum quopiam: veluti hyssopo, origano, nepita, pulegio: aut certe cū melicrato oxymeli, aut oxyglycy: ac sic rursum sanguinem minuo, vel ipso eodem nonnunq̃ die: interdum die postero: in quo rursum exhibito propositorum medicaminum quopiam, aliquid de sanguine aufero: ac rursum tertio die similiter bis. Cæterū ubi feruescentis inest sanguinis plenitudo, acutissimam febrem accendens, subito ac simul vacuare expedit, eamq; prius q̃ in principem aliquam partem ingruat, inanire tentandum, uel ad animi vsq; deliquium: viriū tamen inspecto robore. Quare nec per noctem sanguinem detrahere verearis. Vtile autem fuerit, fluente etiamnum sanguine, expēdere pulsum diminutiōes: ne videlicet, nobis nō aduertētibus, pro animi deliquio mors hominem occupet. Quin etiam & reuulsionem, non leue & ipsam auxilium, quodq; sæpe secta adhibetur vena, quanto maiorem in numerum particulares auxeris detractiones, tanto efficaciorē effeceris. Ergo si magnitudo morbi, missionem sanguinis postulet adsitq; virium robur, nulla potest esse tanta crudorū humorum copia, quæ inhibere id auxilium possit. Cæterū quibus amplæ sunt venæ, quiq; modicè graciles sunt, nec candidi, nec tenera carne præditi, eos copiosius vacuabis: contrarios autem parcus: quum exiguū habeant sanguinis, carnemq; facillè transpirabilem. Qua ratione nec pueris pertundes venam, ante quartūdecimū annum: post quem, si multus cōgestus sanguis appareat, tempusq; anni sit uernum, & regio temperata, puerq; natura sanguinea, aut alicuius acuti morbi discriminē impendeat, sanguinem minues, in primis quidem ad cotylā vsq;: quod si postea vires validæ permanere videantur, dimidium eius adicies iterata missione. At uehemens, æqualis, & magnus pul

sus, in corruptum virium robustarum est signum. Quare si in septuagenariis is adsit, affectusq; iubeat, etiam secabis venam. Proinde non tantum annorum numero, sed corporis etiam habitui animus intendendus est.

Adhuc, ubi incisa vena effluit sanguis, mutationem eius, & maximè quàm adest phlegmone, labascensq; fluxionis robur, expèdere oportet: sed potissimùm alteratione pulsum: quibus quidè alterascētibus, aut in magnitudine, aut in quavis inæquabilitate, continuo quiescendum est. In quibus aut iuxta sectam venam phlegmone est ingens, optimum est sanguinis & in colore, & in consistentia expectare permutationem. Id quod sentiens Hippocrates in curatione pleuritidis ait. Secāda verò in cubito vena interna. Nec verearis multum detrahere, donec rubrior, flavior, ue multo effluat: aut pro puro ac rubro liuidus. Vtrunq; enim accidit. etc. Eius si quidem trāsumptionis, qua nōnihil sanguinis à parte phlegmone obfessa rapitur i vulneratā venam, constituit signum, ipsius sanguinis mutationem. Quæ tamen non omni ex parte expectanda est: quàm aliquando, prius q̃ ipsæ sanguis mutetur, cessandum sit: nimirum duplici nomine: vel ob vires infirmas, vel ob malignitatem phlegmones, à qua interdum nihil emittitur, sed inibi fortiter impactus est sanguis. At si ex vacuatione vires minimè resolui videantur (id quod ex pulsu cognosces) æger autem sit ætate florenti, expectanda mutatio sanguinis est, potissimum si ambiens sit temperatus. Minus autem detrahimus, q̃ plenitudo commonet, secundum ætates quidem, in pueris: secundum corporū habitus, in candidis, & carne mollibus, cuiusmodi Galli existunt: secundum tempora verò, sub cane: ac similiter secundum regiones, cōstitutionesq;, in iis quæ calidiores iuxta & sicciore existunt: quum nimirum hæc omnia, q̃ maximè ad resolutionem sint apta. Alia autem ratione in contrariis, hoc est tempo-

Septuagenariis qm mittendus sint sanguis.

Sanguinē fluxū tē p̃ sectā uenā sup primēdū esse, quā alterantur pulsus.

Sanguinē detrahendū p̃ inflammationes esse, donec rubrior, flavior ue, aut liuid⁹ cōspiciat. Sanguinis mutatio post sectā uenā, qm expectanda non sit.

Gallis parum sanguinis detrahendū esse.

Sanguinem esse parcius detrahendum sub cane, & in regionibus calidis simul & siccis ut in frigidis etiam constitutiōib⁹. Sanguinis sex libras tuto detractus fuisse Galenus meminit.

Saluatella vulgo appellata, si diffecet, creditur curare lienem.

Sanguinis eruptiones e directo factae, sunt utiles alioqui non iuuant.

Sanguinis flux⁹ per nares, quo suppressendi.

Lienem afflictum iuari secta vena in sinistra manu iuxta annularem digitum.

Vacuatio quā sit in duos dies partienda.

Pleuriticis esse secunda uenā incubito par- tis affectae.

ribus & regionibus frigidis, largam fugimus vacuationem, propter insequentem refrigerationem. Quare vnum vacuationis modum in dictorum singulis designare non licet. Memini enim quibusdam ad sex vsq³ libras sanguinem fuisse detractum, ita ut febris protinus extingueretur, citra ullam virium iacturam: quibusdam verò sesquilibram tantum, nec id absq³ insigni damno. Porro ex venis quae ad magnos oculorum angulos cōspiciuntur, aut sub lingua, quod certè mentione sit dignum, effluere non solet: sicuti nec si quis summa in manu, aut pede venam secet: quemadmodum putant ii, qui lienem curari aiunt, à sectione venae sitae iuxta secundum ex digitis paruis. Quod verò ad differentiam venarum pertinet, quibuscunq³ ^{κατ'} ^{τῆς} hoc est è directo eruptio sanguinis accidit, summum id commodum laborantibus adfert. Quibus autem contra euenit, nihil iuuat: aut etiam interdum nocet: quod vires scilicet, citra morbi leuamen, deliciat. Ut si liene turgente, dextra nare sanguis efflueret: aut hepate, ex sinistra. Dextra igitur nare sanguis erumpēs, ad dextrum hypochondrium fixa cucurbitula, clarè, celeriterq³ sistitur: sicuti ad sinistrum, si ex sinistra profluat. Similiter si venam reuulsionis studio seces, secundum rectitudinem quidem secta, oppositis sanguinis eruptionibus citissimè cōspiciuam utilitatem adferet. At si contra seces, nihil sanè profuerit. Quare liene afflicto, perinde adiuuerit vena secta in sinistra manu, * iuxta annularem digitum, ac si internā cubiti venam secueris. Plurimum namq³ iuuat afflictum lienem, sanguinis ex sinistra manu interdum vsq³ ad libram vnam, detractio. Praestat autem non semel quantum conueniat, detrachere: sed in duos dies ipsam euacuationem partiri. Pleuriticis etiam, quae è directo laborantis lateris adhibita fuit sanguinis missio, clarissimam saepe utilitatem attulit. Quae verò ex brachio opposito, aut om-

VENAE SEC. LIB.

nino obscuram, aut certè post temporis interuallum. Adhæc, oculorum p̄sæpe dolores grauisimos è directo venæ humeralis sectio, aut medianæ, quæ ab ea deriuata est, intra horæ vnius spatium compescuit. Conari autem in oïbus affectibus p̄stat, post modicā missionē sanguinis, iterato mittere: interim eo die: iterim postridie: nisi quando ad animi vsq; deliquiū, vacuatio nem ducere oporteat. At dolente latere, aut pulmone, aut septo transuerso, aut liene, aut iecore, aut ventriculo, secta vena, quæ per axillas ad cubiti iūcturam pertingit, aut etiam quæ illi & humerali ē communis, luculentam utilitatem adfert. Sunt etenim eæ tres venæ, ex quibus in cubito mittitur sanguis, interior, exterior, & media. Inter quas sanè interior utilis est, in iis quibus inferiores collo partes patiuntur. Exterior verò, in iis, quibus, quæ his superiores sunt, ut facies, aut caput. At media, medio genere ambigit: quum inter vtranq; , versus anteriorem manum, suos ramos producat. Quare si vena quæ parti affectę propria est, aliquando fuerit obscurior, cogarisq; ob id aliquā mediarum incidere, conare vt quæ à propria diducitur, eam potius pertundas. Interdum etiam, eas quæ inferiores flexura cubiti sunt, nempe quæ in vlna p̄sistūt, nihil prohibet venas secare: sed tamen recto tramite particulis affectis correspondētes: idq; vbi venæ quæ in cubito sunt, non appareant. Equidem diuitis cuiusdam œconomi, oculorum maxima inflammatio- ne, atq; fluxione afflictum, quàm ocysime in pristinā sanitatem restitui, detractis primum ex humerali vena, libris sanguinis ternis: ac dein, modico interposito tempore, alia. Qua ratione, soluta phlegmone, postea in palpebris relictam asperitatem absterfi, aliquo ex medicamentis mordacibus, quod neutiq; æger ferre potuisset, nisi fuisset prius* euacuatus. Si quidem acria omnia medicamenta parti cuius admota, nisi vacuū

581

Oculorū dolores cōpesci secta humerali, aut media. Iterandā esse sanguinis de- tractionem.

Venarū cubiti quæ in quibus affectibus sint secandæ.

Venæ in cubito conspiciunt tres, interior, exterior (quæ humeralis est) & media.

Venis cubiti obscuris, posse nos in vlna ab eis diductas secare.

Oculorū maximā inflāmationē quārōne curarit Galenus.

Acria oīa parti cuius admota, fluxionem augent, nisi purum corpus tepererint.

○○○ iii

Malleolorū po-
plitumq; veng
diffectę quarū
partiū affecti-
bus auxiliēti.

Renibus male
affectis, quę ue-
næ secāde sint
Vteri inflāma-
tiones a venis
in crure sectis
iuuantur.

Menstrua sup-
primūtur secta
in cubito uena
Menses promo-
uentur sectis in
cruribus venis
trib⁹ quatuor-
ue diebus an-
te tps consueti
circuitus.

Menses pro-
uocant nepita,
pulegium, saui-
na, dictānūq;.

Hiera picra
menses promo-
uet.

Ischias a san-
guine orta, se-
cta in poplite
vena curatur.

excrementis vniuersum corpus repererint, fluxionē attrahunt, phlegmonemq; producunt. Quemadmo- dum igitur supremæ omnes iam dictæ partes, secta in cubito vena iuantur, sic iis inferiores, incisis quæ per poplites & malleolos decutunt. Sunt autem inferio- res dictis, coxendix, uterus, vesica. At renes, quarum collegio ascribi debeant, ambigūt. Quare misso ex cu- bito sanguini, interdum auscultant: si videlicet & re- cens ipsa phlegmone sit, & copia sanguinis adsit. Vbi verò propria nephritis infestat, eā quæ in poplite est, secare puenit uenam: aut certè, quæ in malleolis sunt. Sed vteri inflammationes, magis etiam quàm renum, à venis i crure sectis iuantur. Nam quæ ex cubito sūt euacuationes, purgationes menstruas reprimunt, san- guinemq; retrahunt ad supernas corporis partes. At quæ fiunt ex cruribus, tantum abest vt retrahant, vt etiam menses promoueant: si tribus quatuor ue die- bus, ante tempus consueti mulieri circuitus, admini- strentur: idq; aut vena incisa, aut scarificatis vnus cru- ris talis, atq; inde exiguo sanguinis euacuato: quod sa- nè postero die in altero crure similiter etiam faciendū est: sic tamen vt in ipsis diebus in quibus vacuas, atq; in aliis ante eos quatuor aut quinq; mulieri extenuā- tem victum instituas. Sed mulieribus abundē menses prouocant nepita, pulegiumq; si redacta in pollinem, cocta q; in melicrato, propinentur. Conuenientissimū autem potui tempus est à balneo, adhuc inuolutis lin- teo. Valentiora medicamenta sunt Sauina, & dicta- mnum: quorum vsus est ante dictis similis. Datur autē hoc tempore & hiera picra, * illa scilicet in cuius cō- positiōe centum aloes drachmis, cuiusq; aliorum me- dicaminum senæ tantū miscentur. Quod sanè medi- camentum optimum est, vbi cinamomum receperit. Porrò ischiadas siue coxendices, vbi nō à frigore, sed impletis sanguine, quæ in coxa sunt venis, proueniūt,

secta in poplite vena curabis. Scarificatio autem nihil perspicue eis prodest. Igitur, vt summam dicam, incipientes phlegmonas reuulsi euacuare oportet: quæ verò iueteratæ iam sunt, ex ipsis, si fieri potest, affectis particulis: aut, si id fieri nequeat, saltem ex vicinis. Etenim in incipientibus, auertere quod influit, expedit: in iueteratis autem, ipsum tantum, quod affectæ parti infixum est, euacuare. At qui euacuabitur optimè per venas diductas ab iis, quæ in partibus ipsis sunt sitæ. Quocirca, quæ in gutture & aspera arteria, graui torquentur inflammatione, iis, in principio quidem, aperta in cubito vena: post principium autem, in ipsa lingua, magnificè prodest: incisis videlicet venis, quæ sub ea sunt, ambabus. Sic induratæ phlegmonarum in oculis reliquæ, incisa quæ ad magnum decurrit angulum vena, exoluntur: sicuti capitis grauitates, & iueteratos in eo dolores ex plenitudine, leuare manifestè solet secta in fronte vena. At incipientes, aut etiam vigentes, per cucurbitam in ceruice procurata retractio: iterim quidem solam: interim cum scarificatione. Cæterum præuacuatum esse corpus vniuersum oportet. Eadem ratione incipientes in occipitio dolores, aut etiam vigentes, incisa frontis vena solatur. Quippe reuulsiones unæ cum euacuatione adhiberi magis debent, in fluxionibus incipientibus: eas verò, quæ sunt ex ipsis affectis partibus, aut illis vicinis, in phlegmonis, quæ veluti scirrhi naturam referunt. In quibus autem corporibus nulla dum particula affecta est, cæterum vacuatione Vere ineunte, anteuertimus: in iis, si quidem talis sit homo, vt quotannis æstiuo tempore corripiatur morbis febrilibus, atq; in eo exundantia euacuare studemus, æquè pars quæuis, vt ex ea detrahatur sanguis, est comoda: quemadmodum etiam, si arthreticus omnibus articulis affligatur. Quibus autem eximiè pars quæpiam, ubi prius euacuati non fuerint, ifestatur, haud pin-

Phlegmonas incipientes, reuulsi: iueteratas ex ipsis affectis partibus euacuare oportet.

Venas sub lingua secandas esse in gutture & aspera arteria inflammationis, post apertam in cubito venâ.

Vena iuxta magnum oculi angulum, & quæ in fronte est, secta, quibus auxiliantur affectibus.

Cucurbitula ceruici admodum, capitis sedat dolores.

Reuulsiones una cum euacuationibus incipientibus fluxionibus humores adhibere sunt. Sanguini detrahendo quæuis pars eque appositâ in iis quæ solius præcautionis gratia vacuatione deseruant: vt in illis qui ex equo omnibus articulis affliguntur.

Podagricos eē
vacuandos ex
cubito.

Epilepsia ob
noxios esse va
cuandos ex cru
ribus.

Hæmorrhoi
des supprimū
tur sectis cubi
ti venis: pro
uocantur autē,
iis quæ i cruri
bus sunt ptusis.

Sanguinē de
tracturo, dierū
aut horarū nu
merus non est
consyderan
dus.

Sanguinē mit
ti debere fe
bres quidē, in
ipsarum decli
natione: per in
flammationes
autē absq̃ fe
bre ortas, dum
magis vrgent
symptomata.
Sanguinē mit
ti debere, vbi
nihil aliud vr
get, aut prohi
bet, mane ha
ud protinusex
somno excitis.
Sanguinis ite
rata vacuatio
quando faciē
da sit.

de licet ex quauis parte euacuationem moliri: verū
sicuti in iis, q̃ pati iā occipiūt. Quāobrem podagricos *
euacuabis ex cubito: comitialibus uerò morbis, ver
tiginibusq̃; obnoxios, poti⁹ ex crurib⁹. At si retetæ hæ
morrhoides mittēdi sanguinis occasione p̃stiterint, si q̃
dē cohibere eas voles, quæ i brachio sunt: sin prouoca
re, quæ in cruribus consistunt venas, secare conuenit.
In iis verò quibus repres̃si sunt menses, semper in cru
ribus. Iam verò ad sanguinis detractiōem, dierū nu
merus consyderandus non est. Siquidem quocunque
die mittendi sanguinis scopus in laborante inueneris
(nempe morbum ingentem, & virium robur, exce
pta ætate puerili, & ambiente admodum calido) auxi
lium illud non prætermittes, vel si is vigesimus à prin
cipio extiterit. Nam exoluitur in plerisq̃ morbis, tem
poris tractu, virtus, ac proinde mittendi sanguinis oc
casio, numero dierum deperditur. Poterit etiam quis
sanguinem mittere, vel quacūq̃ die noctisq̃; hora, sco
pum sibi proponens, in febrientibus quidem, particu
larium (quæ expectanda est) circuituum declinationē:
in quibus autem aut ob oculorum lippitudinem, aut
aliud simile citra febrem, hoc est opus auxilio, magni
tudinem, aut doloris, aut phlegmones, aut totius affe
ctus, i quo secta vena desyderatur. Vbi verò nihil eius
modi aut vrget, aut prohibet, præstat mane venam in
cidere, haud protin⁹ ex somno excitis: sed circiter ho
ram vnā iam antea vigilantibus. Atq̃ iteratæ vacua
tionis tempus, in quibus simpliciter quidem vacuare
conamur, eodem die esto: in quibus autem repellere,
si vel post duos deinceps dies fiat, melius fuerit. Inte
rim tamen animus sit circa laborantis vires intentus:
manu iugiter arteriis illius admota. Consueuerunt eē
medici interdum secare arterias, quæ in temporibus,
& quæ secus aures consistunt, illas quidem, infestanti
bus oculos fluxionibus tum calidis, tū spirituosiss: has

V E N A E S E C. L I B.

§ 85

verò, quæ secundum aures, in vertiginosis maximè,
& iis qui calidis & diuturnis, spirituosusq; capitis dolo-
ribus infestantur. Etenim ubi calidus, spirituosusq; san-
guis in arteriis coaceruatus infestat, illic communibus
parti affectæ sectis arteriis est opus. Vex quia vulnera
te arterie ægrè supprimi possunt, ob id ipsas medici in-
cidere metuunt: quum si quis dum venā secat arteriā
conuulnerit, difficillimè cōpescere eruptionem san-
guinis possit: aut si res optimè cedat, ad cicatricem p-
ducta diuisione, tamen aneurisima contingat. Quanq̃
possumus sanè arteriam vel magnā, absq; aneurisima-
te ad cicatricem perducere, totam transuersim secan-
tes. Ego verò aliquando monitus per quædam insom-
nia, secui dextræ manus arteriam, iter indicem & pol-
licem sitam: permisiq; vt inde fluere sanguis, donec si-
steretur sponte: subitoq; diuturnus mihi extinctus est
dolor, qui in illa maximè parte erat fixus, qua iecur se-
pto transuerso committitur. Minister etiam Dei Per-
gami, à diutino cruciatu lateris, similiter liberatus est,
arteria in summa manu incisa: idq; monitu insomnii.
Porrò alteri, cui ex vulnere in malleolo inflicto, disse-
cta fuerat arteria, sanguinis quidem cursus haud quie-
uit, donec ipse dissecui totā: ac medicamento ex

Arteriæ in quibus secatur af-
fectibus.

Arteriæ vulne-
ratae ægre sup-
primi possunt.

Aneurisima quæ
accidat.

Arteriā inter
indicem polli-
cemq; quum
seculisset Gale-
nus ab insom-
nio monitus, li-
beratus est diu-
turno præcor-
diorū dolore.

Arteria in mal-
leolo dissecta,
diuturnū coxæ
dolorē soluit.

aloe, manna, ouorum albumine, & lepo-
ris pilis imposito vsus, absq; aneuris-
mate vlcus ipsum curauit. Vir

autem ille prorsus sanus

relictus est à coxæ do-

lore, quo iam

diu fuerat

exi-

guis tem-

porum inter-

uallis ve-

xatus.

GALENI PERGA

MENI DE HIRVDINIBVS,

reuulsione, cucurbitula, & scarifica-
tione, libellus.

DE HIRVDINIBVS.

Hirudines as-
seruandi, alēdi,
& applicandi
ratio.



VAE hirudines sunt recens ca-
ptæ, eas diem unum asseruare
oportet, pauculo sanguine in
pastum exhibito. Sic enim pror-
sus earum venenum exprimit.
Pars autem cui iam admoueri
debent, nitro prius perfricetur,
aut vnguibus scalpatur: nam sic

promptius eam apprehendent. Iniiciendæ autem sunt
in aquæ tepidæ vas purum, latiq; oris: deinde spongia
eas comprehendentes, viscositatemq; ab eis detergen-
tes, tandem manu applicabimus. Vbi aut adhæserint,
infundendum particulæ oleum tepidum est, ne scilicet
refrigeretur. At si manibus aut pedibus admouendæ
sint, ipsam partem, aquæ cui insunt sanguisugæ, imer-
gere oportet. Quòd si parum depascantur, forfice cau-
dam præcidito, secundum rectitudinem filamentorū.
Nam effluente semper sanguine trahere nō desistent,
donec salem, aut cinerem, ipsarum ori insperserimus.
Vbi verò deciderint, cucurbita venenum est auellen-
dum, aut pars fouenda ex spongia. Quòd si particula
emorsa lachrymet, cuminum, aut farinam ispergito:
superq; lana madidata oleo pauxillo, iuoluito. Sin san-
guis erumpat, lintea ex aceto iniicito, aut gallam ustā,
aut spongiā liquida pice madentem, posteaq; ustā
imponito. Sciendum autem est, hirudines haud eumq;
in profundo est, sanguinem, sed tantum, quo caro est

Hirudines vt
depascantur,
in explebilitate
præcidendas in
cauda esse.
Hirudines auel-
li, sale aut ci-
nere ipsarum
ori resperfo.
Hirudine iam
delapsa, cucur-
bitulā esse pti
admouendam.

DE REVVLSIONE

587

imbuta, exugere. Vtimur eis pro cucurbitulis: detrahi musq; ipsas, vbi dimidiam sanguinis partem iam ex- tractam coniicimus: prohibemus autem, & nō permit- timus effluere, quousq; quod satis est, euacuetur: quan- doquidem particula tum à sanguisugis ipsis natura fri- gidis, tum ab aere nos ambiente refrigeratur.

Hirudines san- guinē tantum carnis exugē. Hirudines na- tura esse frigi- das.

De reuulsione.

Vehementissimos humorum influxus remediis re- uulsoriis prohibemus. Qualia sunt, incumbente in pectus aut in ventrem humore, ad manus re- tractio. Vomitus, vbi deorsum decumbit. Sicuti in vo- mitu, p acriores clysmos reuulsio. Duo verò hæc mo- menta, quæ ad superiorem inquam vëtre, & inferio- rem vergunt, ad vrinam, sudoresq; reuelles. Quin & vrina, ad sudores, & deiectionem trahitur. Reuulsoriū quoq; auxiliū est, * iuxta mammas cucurbitula admo- ta. Cæterum hypochondriis affixa, sanguinis ad nares impetum reuocat: sicuti & immodicum ex vtero efflu- xum. Porro vergentes ad caput, aut viscera humores, retrahunt acria in sinus imposita medicamina. In sum- ma, reuulsio molienda est, humoribus sursum fluenti- bus, deorsum: deorsum verò, in contrarium. Rursus, itro vergentibus, foras: sicuti si foras ruant, ad interio- ra. Similiter si ad dextram inclinent, ad sinistram: ad si- nistram verò abeuntibus, in partē aduersam. Sic quæ retrò pcedunt, ante: quæ verò ante, retrò reuocabis.

Reuellendi mo- di diuersi.

Cucurbitula hypochondriis affixa, sangui- nis ad nares i- petū reuocat, immodiūq; ex vtero effluxū.

Reuulsionem esse semper in contrariū mo- liendam.

De cucurbitula.

Cucurbitulæ iis qui ante euacuti sunt, cōueniunt. Nam in plethoricis, minimè sanè ipsis vtimur. Eadem ratione neque in cerebri aut meningum phlegmonis incipientibus vtimur cucurbitulis: sicuti nec alia in parte vlla phlegmone obfessa. Verum vbi nihil præterea etiā influat, fueritq; totum corpus an- tea vacuatum, atq; op^o nobis iam sit, aut mouere, aut amoliri, quod in phlegmone obfessa particula infixū

Cucurbitulis vtendum esse vbi corpus est abunde vacua- tum.

Cucurbitulis vtimur dū euel- lere est anim^o quod in partes

phlegmōe ob-
fessa est impa-
tum.

Inflāmatione
incipiente, re-
pellētibz est
vtendum.

Cucurbitæ fa-
cultas.

Scarificare
quas & in quē
usum ptes so-
leamus.

Scarificanda
crura, prius es-
se fouenda per
spongiā calen-
te aqua.

Venam sæpius
in anno inci-
dere, cur non
expedit.

Scarificatio q
bus morbis cō-
ueniat.

est: aut deniq; foras extrahere. Porro dū affectus etiā-
num fiunt, haud in ipsis iā laborare occipientibus par-
tibus, sed in eis quæ illis continuæ sunt, reuulsionis cā-
est cucurbita imponenda: in principio autē, vtendum
repellentibus est. Cucurbitula potest euacuare mate-
riam, dolorem soluere, minuere phlegmonem, infla-
tionem discutere, reuocare appetentiam, ventriculo
infirmo robur recuperare, animi liberare deliquio, ab
alto fluxiones transferre, resiccareq; sanguinis eru-
ptionis cohibere, facultates mensium corruptrices ex-
trahere, ac deniq; menses ipsos leuare.

De scarificatione.

Scarificamus partes corporis aut phlegmone scir-
rho'ue tētatas, aut tensas, aut dolore vexatas, aut
fluxione affectas, sed quæ iam resistit: aut acri im-
butas materia, aut vbi extrinsecus aliqua virulenta fa-
cultas in corpus incidit, aut vbi materiam ex alia par-
te in aliam traducere est animus. Veluti crura scarifi-
camus affecto capite: aut materiam in corpore exun-
dantem minuere statuentes: potissimum vbi exundā-
tia prouenerit à suppressa materia, quæ solenniter eua-
cuari consueuerat. Sic suppressis hæmorrhoidibus sca-
rificamus crura: prius ea per spongiā fouentes cali-
da. Nam sæpius venam incidere in anno, haud
expedire arbitror, quum vnā cum sangui-
ne vitalis exhauriatur spiritus. Pro-
dest autem scarificatio & oculis
diutina fluxione afflictis:

tū capitis affectibus;

quique pectori

atq; dor-

so eueniūt: ad-

hæc angina: atq; im-

pactis humoribus.

G A L E N I P E R G A

M E N I D E P V R G A N T I V M
M E D I C A M E N T O R V M
F A C V L T A T I B V S.
L I B E L L V S.

189



A D E M De causa medici

vetustissimi prauas opiniones re-
liquisse irreprehensas videtur,
qua grauissima etiā delicta anti-
quisimi legum latores impuni
ta siuerunt. Quum enim eo tē-
pore minor esset malitia homi-
num, vt qui nec maxima crimi-

Delicta graui-
sima cur anti-
quisimi legū
latores impuni
ta reliquerint.

na perpetrare aggrediebātur, nec manifestissimis im-
pudenter cōtradecere, quomodo aliquis punitionem
iis quæ nōdum admissa erant, præscriberet, vel redar-
gueret ea quæ nemo prorsus dixisset? At quia tempo-
ris spatio eo creuit hominum prauitas, vt nihil nō aut
facere, aut dicere ausi sint, legum quidem latores mul-
tas punitionum rationes nouas adinueniunt, quibus
facinorosos plectant: veritatis autem studiosi, varias
contra sophistas reprehensionum species excogitant,
quibus ipsos coerceant: id quod nos impræsentiarum
quodammodo facere cogimur, improbaturi eos, qui
medicamentis purgantibus, vim attractricem humo-
rum quos euacuant, in esse negant: mutatricem verò
quandam omnium ex æquo illorum, quæ ipsis appro-
pinquant, eis tribuunt. Qua nimirum facultate aiunt,
medicamentum quod flauam efficit bilem, quemcūq;
humorem contigerit, hunc in propriam sui speciem
mutare: vocariq; medicamē id cholagogum, quod bi-
lem flauam & efficiat, & moueat: aliisq; similiter,

Prauitatē idies
creuisse.

Sanguinis detractione vniuersi humores qui sunt in venis, ex æquo vacuantur. Purgatio purificat sanguinē.

Regii morbi curatio.

Purgantia medicamēta principio quidē, familiarē humorem trahunt: postea vero illum, qui vt sequatur est p̄ior.

medicamentis sua esse indita nomina, non quidem ab humoribus quos naturaliter vacuant, sed ab iis, quos suo contactu efficiunt. Ex cuius sanē opinionis absurditate sequitur, siue bilem ducēs, siue pituitam, siue atrā bilem, siue serosam humiditatem, aliquis medicamentum assumpserit, vniuersos ex venis humores vacuari. Neq; alia ratione purgatio ab huiusmodi medicamento petita, differet à sanguinis euacuatione per venæ sectionem, q̄ q̄ in hac quidē, ille qualis prius erat, excernitur: in purgationibus autem, inalteratur, non colore tantum, sed etiam consistentia: id quod maxime ridiculum est. Siquidem per detractionem sanguinis equaliter omnes, qui in venis sunt, humores vacuantur. Per purgationem verò (quæ scilicet sanguinem ipsum purificat) non æquē omnes: sed vnus aliquis, p̄cipue q; is, ad quem naturaliter educendū medicamentum ipsum est aptum. Atq; hæc sanē existit optima Asclepiadarum sententia: cui etiam ratio simul & experientia patrocinantur. Nam si ex tribus absq; febris laborantibus morbo arquato, vni quidem sanguinem detrahas: alteri autem medicamentum quod atram educit bilem exhibeas: tertio deniq; propines pharmacum eliciens diffusam illam bilem per corp⁹, certē duo illi priores, longē deterius habebunt: tertius autem, cui exhibitū medicamentum fuerit familiaris succi attractiuum, nativū colorē recuperabit. Atqui iuxta illoꝝ insaniam, perinde erit siue missione sanguinis, siue medicamēto quod bilem ducat, arquato morbo laborantem inanias. Idē etiam & in reliquis morbis est ineūdum iudicium. Igitur opinionibus ipsorum valere iussis, singula medicamenta purgantia, initio familiarē humorem trahunt: postea verò illum qui vt sequatur, habilior atq; aptior fuerit. Exempli gratia, medicamentum quod flaua bili ducendæ est, primò quidē illam expurgat: dein aquosam humiditatem: pituitam tertio mox atram bilem:

M E D. F A C V L.

ultimò deniq; sanguinem: q; sit is naturæ familiaris-
mus. Reperiuntur tamen aliqua medicamina, quæ sta-
tim ab initio sanguinem ducāt: cæterum iis nemo vte-
tur: quandoquidem hoc iugulare esset hominem: non
purgare. Siquidem purgantia, hoc nomine talia dicun-
tur, q; repurgent sanguinem ab illis recrementis iam
dictis. Quare inter deleteria, id genus omnia medica-
menta annumerant, quæ sanguinis euacuationem, per
venas ventris, & intestinorum, moliantur.

591
Medicamenta
nonnulla sta-
tim ab initio
sanguinem du-
cere.

G A L E N I P E R G A

M E N I Q V O S P V R G A R E,

qualibus medicamentis, & quando

oporteat.

Liber vnus.

Et ambrosij de Gal. lib. 1. cap. 1.



QU I Sano sunt corpore, purgatio-
nes grauer ferunt. Nam quum pur-
gans medicamentum familiarem si-
bi humorem attrahere desyderet, sa-
nè dum eo destituitur, sanguinem &
carnes eliquat, consumitq; , ut quod
illis proprium est, trahat. Porro qui sani quidem sunt,
verum ægrotaturi, nisi fuerint vacuati, inaniri uere in-
cunte debent: idq; vel sanguinis detractiōe, si pletho-
ricis corripiantur morbis: aut purgatione, si factis ex
corruptione affligantur. At melancholia, cancer,
elephantiasis, cæteri q; id genus affectus, qui ab humo-
re atro proficiscuntur, atræ bilis purgatione indigent:
quam non vere tantum, sed autumno etiam ipse moli-
ri consueui. Iam comitiales morbi, apoplectici, suspi-
riiosi q; , vacuationem pituitæ postulant. Articulares
affectus, qui quidem vnà cum insigni caliditate affli-
gunt, biliosorum: qui autem cum tumoribus frigidis,

Sani cur pur-
gationes gra-
uiter ferant.

Vacuandi qui
sint vere ineun-
te, & quomodo.
Atræ bilis pur-
gatione qui af-
fecti indigeant.
Vacuatione pi-
tuitæ, qui mor-
bi postulent.

Crassos succos
prius tenuan-
dos esse q̄ eua-
cuentur.

Vomitui qua-
liter præpara-
ri egri debeât.

Vomendo in-
epti qui sint.

Flava bilis, per
superiora: pitui-
ta per inferio-
ra maiori ex
parte vacuari
debet: vt atra
bilis semper
per inferiora.

pituitosorum vacuatione inuantur. Quidam æstiuo tē-
pore tertianis febribus semper corripī solitus, iā mul-
tis annis non febricitauit, quòd bilis flauæ purgatione
ad finem veris à nobis administrata, illi prospectum sit.
Sic enim satius est tales vacuare: quemadmodum co-
mitiales, articulares, melancholicos, quicq; ob humo-
res crassos ægrotant, ineunte verè melius vacuan-
tur. Cæterum humores crassos & viscidos prius atte-
nuare & incidere oportet: meatusq; per quos transu-
muntur, atq; trahuntur ii, aperire, ante medicamenta
purgantia, si purgatio modis omnibus optima sit futu-
ra: præsertim in iis qui veratrum assument. At verò q̄
ægrè per superiora purgantur, ii, nisi prius reddantur
habiles, præparenturq; ad vomitū, minimè assument
veratrum. Præparabuntur autem medicamētis nomi-
natis mediocribus: necnon cibo vberiori, & quiete.
Etenim nos radículas ex oxymelite propinauimus, quas
arundine perforatas, ac ramulis veratri albi transfixas,
per totum diem atq; noctem reliquimus. Atq; eiusmo-
di ex elleboro facta purgatio erit imbecilla. Verum q̄
angustum habent pectus, eoq; etiam compressum, ine-
ptissimi ad purgationes existunt, quæ per vomitoria
medicamenta fiūt: ac potissimum per album veratrū.
Siquidem thoracis aliquod vas, ipsis rumpitur. At bi-
lis supra, pituita per inferna vacuari debet. Est quando
contrario modo accadat: si quidem in ventriculo pitui-
tosus: biliosus autem in intestinis humor resideat. Me-
lancholicum verò semper per inferiora vacuare opor-
tet. Sic æstate quidem superiores ventres: hyeme verò
inferiores mouere conuenit: vt author est nobis Hip-
pocrates. Sed regionis etiam, anni temporis, ætatis, cō-
suetudinisq; non exigua ratio est habenda. Siquidem
qui, gratia exempli, uomere soliti sunt, facilius purga-
tiones ferunt p̄ superiora: qui non assueuerunt, haud cū
tra periculum: magisq; ex veratro. Morbi etiam spe-
cies examinanda

cies examinanda est. Nam in hydrope, leucophlegma-
tia, medicamento quod pituitam ducat, egenius: prius
sanè per inferiorem ventrem: dein per vomitum: ter-
tio per apophlegmatismos. Vbi enim id quod redun-
dat, per vniuersum corpus dispersum est, omnes va-
cuationes sumemus. Porro in ascite, medicamentum
aliquod, aquæ ciendæ idoneum, exhibebimus: sicut et
in arcuatis, quod bilem eliciat. Nam & in his etiam bi-
lem multifariam supra & infra, per vrinas, palatum,
& nares, purgare conuenit. Morbi itaq; dispositio &
vacuandum humorem indicat, & locum per quem de-
bet vacuari. Verbi gratia, iis qui in iecore habent inflā-
mationem, vbi tumor concoctus fuerit, eius expurga-
tionem molimur: per inferiorem sanè ventrem, vbi
cauas ipsius partes affectus occupat: per vrinas autem,
quum gibbas. Accedit his omnibus tempus & occasio.
Per initia namq; serosos tennesq; humores vacuabis:
in crassis autem & viscidis, & expectabis coctionem.
Adhæc, in accessionibus quidem, per superiora vacua-
bis: in remissionibus autem, per inferiora. Atq; hæc sa-
nè, si sponte accidunt, iuuant: in accessionibus quidē,
dum multi & vomunt, & per nares sanguinē fundunt:
in remissionibus autem, dum vrinæ deiectionesq; ex-
cernuntur. At tempus dierum accessoriorum & decre-
toriorum, quum infra copiosè purgare aggredieris, ca-
uere oportet. Vbi enim humorū impetus sursum ver-
git, medicamenti purgantis facultas impiedietur. Por-
rò in morbis diuturnis, semper eorum maturatio ex-
pectanda est: in acutis autē, quum turgent, ac pruriunt,
vel per initia vti medicamētis licet. Verum quum om-
nia purgantia medicamenta facultate calida existant:
febris autem sui ratione humectantia & refrigerantia
postulet: certè non ipsius caloris gratia, purgatio à no-
bis administratur, sed humorum causa, qui nimirum
illum accendunt. Igitur vt ii euacuentur, primum sa-

Hydropicæ
euacuandi rō.

Ictericos pur-
gandi ratio.

Hepatis partes
affectæ, qua
sint regione
vacuandæ.

Tenuēs humo-
res statim esse
vacuandos:
crassorū & vi-
scidorum esse
expectandam
coctionem.

Vacuandum in
accessionibus
quidem, per su-
periora, in re-
missionibus autē
p inferiora
Dierum acces-
soriorum, de-
cretoriorumq;
tēpus cauendū
esse, dū p infer-
na purgamus.

Maturatio mor-
bi ad purgatio-
nem qñ sit ex-
pectanda: & qñ
minime.

Purgantia oia facultate esse calida.

Purgationibus inepti qui sint. Humores esse tenues reddendos ad purgationem

Acuti morbi raro per initia indigunt purgatione.

Turgere quoniam humores dicantur.

Humores quoniam vacuandi.

Crises quando accidunt. Naturam adiuvandam esse medicamentis.

Cathartica medicamenta.

nè dispiciendum venit, num æger sit ad eiusmodi purgationem idoneus. Nam qui ex cruditatibus multis, aut viscosis crassis, ut cibis laborant, item quibus præcordia intenta sunt, inflataque, aut supra modum calida & ignea, aut aliqua inflammatione laborant, omnes hi ad purgationes inepti sunt. Proinde hæc abesse, & humores quoniam maximè licet fluidos facere oportet: hoc est tenues, & nullius lætoris participes: meatusque per quos purgatio futura est, adaperptos. In acutis autem morbis raro per initia purgantibus medicamentis egebimus: eo quod nec frequenter noxii humores per initia turgeant, pruriant, ut nec, si hoc detur, æger sit ad purgationem idoneus: ac ne tempus quidem nobis præbeat præparandi idoneum. At humores prurire, seu turgere dicuntur, quum motu vehementiori agitati, & à particulis in particulas transfluentes, per morbi initia molestant hominem dolore afficientes, irritantes, & quiescere non permittentes. Tales igitur euacuare convenit. Particulæ autem alicui infixos, nec alio quodam præsidio mouere oportet, nec medicamentis sollicitare, prius quam fuerint concocti. Tunc siquidem & naturam vacuationi opitulantem habebimus: quippe quæ post coctiones & discernere humores, & superfluum deponere apparet: quo tempore etiam crises accidunt. Quod si natura ipsa absolute moveatur, nihil tunc est opus medicamentis. Vbi verò imbecillius actionem obit, id quod deest, oportet nos per medicamenta adicere. Sciendum autem est, transfluxiones humorum ab una in alteram partem raro accidere: sed maiori ex parte ipsos in unico loco hærere, inibi que per totum morbi tempus ad solutionem usque concoqui. Si non acutus modò sit ipse affectus, sed etiam cum febre vehementissima accidat, medicamentum purgans exhibendum non est: præsertim si quis non habuerit naturam ægri exploratam. At si febris vehemens non fuerit, norisque ægrotantis naturam minimè abhor-

rere à catharticis, elleboro nigro vteris, aut hiera dia
colocynthidos, quæ ellebornm recipit, absq; scammo
nio. Assumpto pharmaco, conducit mox super sorbe-
re cremorem ptisanæ: ut qui id quod in transitu affixū
applicitumq; est, abstergere, & deorsum trahere: qua-
litate verò medicamenti, particulis insidentem, cō-
temperare, & in alterare possit. At vbi purgatio fieri
incipit, ptisanam amplius non dabimus: ne actio medi-
camenti exoluatur. Porro alius nonnunq; medicamē-
to purganti non cedit: vel ob ægri naturæ propieta-
tem, vel ob medicamenti exhibiti paucitatem, vel ob
stercus durum, atq; in aliquo intestinorum impactum,
quod clystere euacuari potuisset, ante pharmaci exhi-
bitionem. Fieri etiam potest, vt natura impetum ad
vrinas faciente, pharmacum nihil proficiat. Ex ipsis au-
tem catharticis quæ sua actione frustrantur, hæc qui-
dem interdum non modò nihil offendunt corpus, sed
alimētum illi etiam fiunt: hæc verò in corruptelā atq;
exitium vertuntur. Quum autem omnia purgātia me-
dicamenta ventriculum vitient, præcipueq; os ipsius,
q; maximè sit neruosum & sensile, odoratorum mistu-
ra commodè excogitata est: ne videlicet sola, ac syn-
tera ipsorum facultas, os ventriculi attingat. Conue-
nit itaq; ea quæ miscentur semina, eiusmodi esse, quæ
& malignitatem possint obtundere, & actionem ipso-
rum non impedire, extenuatoria & incidenti faculta-
te prædita: quia crassos humores dissecant, & vias ipso-
rum aperiant. At purgantia quæ miscentur, sibi inui-
cem congenera esse, & nulla ex parte disfidere oportet.
Disfident autem, non quum aliud bilem, aliud pi-
tuitam euacuat (ambo enim eodē modo vacuari pos-
sunt) verū vbi hoc statim: illud multo postq̃ assum-
ptum est, purgatiōem mouere solet. Ita enim inæqua-
lis sit euacuatio ex illis simul assumptis. Dico inæqua-
lem, quum vna cessante, altera vacuatio incipit.

Pharmaco as-
sumpto esse pti-
sanæ cremorē
sorbendum.

Pharmaco al-
uius cur inter-
dū non cedat.

Odorata com-
mode imisce-
ri pharmacis.

Purgantia quā
mutuo miscen-
tur, congenera
esse oportet.

G A L E N I P E R G A

M E N I C O N S I L I V M

P V E R O C O M I T I A L I

M O R B O L A B O R A N T I.



AMETSI Nec filium tuum viderim, nec ab initio quæ fuerit eius natura ante morbum cognouerim, nec etiamnum, ut in ipso morbo se habeat, mihi compertū sit, Ceciliane charissime, sed id tantū ex te intelligam, comitialibus eum ac-

cessionibus infestari: ut tamen obsecūdem tuis votis, curabo quā dilucidè fieri poterit, eam tibi victus rationem præscribere, qua si (ut par est) utatur puer, tum non parum iuuabitur: tum ab eis etiam quæ sibi inopinatè accidunt, minus lædetur. Etenim nonnunquā necesse est homines in frigus atq; æstum incidere: adhæc inualidiores ventos, vitiosa balnea, alimenta stupefacientia, reuolutiones vertiginosas, coruscationes, tonitrua, vigilias, cruditates, tristitiam, iram, lassitudinem, atq; id genus alia, quæ vehementer commouent atque perturbant corpus: & morbi tum memoriam innouant, tum eius accessionem accersunt. Quare omnia id genus multo ante sunt præcauenda. Quòd si quādo, ubi illa præcesserint, subsequatur dein morbi accessio, tum temporis puer penitus ab omni se motu absteineat: domiq; sese contineat, ac victu valde tenui utatur: quousq; corpus exacerbationis molestia prorsus destituatur. Igitur inter veris initia (tunc enim prope cōtingit eos morbos moueri, qui per in-

Morbi q p in-
terualla redeūt
Vere præcipue
mouentur.

P V E R O . E P I L E P T .

§ 97

ternalla redeunt) puerque purgandum censeo, idque purgatione mediocri. Post purgationem autem, hac victus ratione uter. Mane quidem, ubi est lecto surrexerit, priusquam ad præceptores accedat, modicè inambulet, non admodum tamen citato gressu. Dein verò usque ad palæstræ tempus, disciplinis ex eius more incumbat. Quum primum autem illinc discesserit, ubi rursus inambulauerit modicum, sic ad prudentem pædotribam cōmeet. Quippe totius curationis summa in hisce duobus est sita: nempe usu medicamenti olim tibi à me dati, & idoneis exercitationibus. Reliqua verò, tanquam præparationes quædam ad ista existunt. Cæterum exercitationum scopi, quoad earum modum sunt hi: nempe ut prius quam fatigetur puer, quiescat: utque corpus illius calfiat, necnon moderatè euacuetur. Quòd si ultra hos terminos producatür exercitatio, non nihil iam attingit solida corpora, atque habitudinem ipsam colliquat: in articulis autem potissimum, atque in musculis, colliquationes congregat. Vnde virium infirmitas sequitur: deinde ulcerosus sensus, quando æger conatur aliquam mouere particulam. Atque hoc est, quod lassitudo appellatur. Scopi autem exercitiorum, quo ad qualitatem, in eo præcipuè consistunt, ut inde omnes corporis partes, & caput præsertim, & ventriculus, roborètur: potissimumque illæ partes, quæ ad os ipsius pertinent. Quum igitur vehementes exercitationes caput repleant, ab his illum abstinere præcipio. Quibus si quando sit opus, erecto capite constitutus partes inferiores commoueat, & potissimum crura. Verum à paruis tardisque motibus pædotriba orsus, ad vehementiores & celeriores ipsum puerum conducatur. Sed & frictio exercitatio quædam existit, imbecillioribus præsertim corporibus. Immo nonnunquam si sola ea decenter fuerit administrata, nullis aliis præterea motibus indigent. Proinde primum linteis corpus rube-

Epilepticos esse inter veris initia purgando Epileptico puero uictus ratio conueniens.

Exercitatio excedens modum colliquat corpora.

Lassitudo, quod

Exercitationes vehementes, caput replent.

Frictio est exercitatio, imbecillioribus præsertim corporibus.

PPP iii

Fricandi epile-
pticos ratio.

Epilepticos ef-
se abstinendos
a lauacris.

Fructus epile-
pticis dandi.

facere oportet, à supernis ad inferiora sensim, manus detrahentes: à brachiis manibusq; sumpto initio: ita deinde ad pectus & ventrem est procedendum. Postea verò & crura exactius fricanda sunt, vt aliquid huc à superioribus defluat. Vltimò denique ipsum caput est perfricandum, si absq; aliqua pinguitudine administre- tur frictio. Nam ad ipsum statim accedere, admodum periculosum existit. Si verò oleum in frictiõe admoue- ris, nihil prohibet caput simul cum aliis membris fri- cari: ita vt hic quidem caput fricet: alii verò duo, pe- ctus & ventrem: duo item alii crura: atq; eodem pa- riter modo post exercitationes: immo & tunc magis simul membra omnia fricare conueniet. Nanq; citius hoc pacto conquiescit corpus, & minus refrigeratur: cuius est non leuis habenda cura. A lauacris autem vt plurimum abstinere conuenit: nec palæstrā confestim puer ab exercitatione egrediatur: sed vbi spiritus ex- actè conquieuerit, & quæ exercitationem sequitur p- turbatio prorsus sedata fuerit. Tūc verò caput linteo diutius est confricandum: sæpiusq; pectine vtendum. His sic peractis, ad prandium debet accedere, in quo aliquid olerum ventrem mollientium, aut fassamento- rum, aut ptisanæ, aut oliuarum, vnā cum tertia pa- nis parte ipsi offeratur: in coenam tertias duas partes reliquas cum valentioribus opsoniis reponentibus no- bis. Ex oleribus itaq; nec lactuca, nec malua, nec at- triplici, nec blito, vt prorsus abstineat, iubeo. Verū non semper idem, sed modò hoc, modò illud, mo- deratè sumendum est: nec diutius eorum vsui assue- scendum. Huius autem generis est & beta, & brassica. Nam & hæc modicè degustare opus erit: pariter & porrum, & apium, & smyrnium aliquando conducet attingere. Ita ex autumnalibus etiam fructibus, qui- cunq; nō omnino crudi, & natura coctu difficiles sunt. Igitur mora, & quæ præcocia appellantur, & ficus,

& si qua alia id genus sunt, citra molestiam descendunt: adhæc & sativa cucurbita, nulli mollissimorum olerum est inferior: pari modo & syciopepones. Præterea & vis matoris, & malis, & piris, & palmulis potest vesci nonnunquam puer: parcè tamen, & rarò. Quos fructus & in arbore, & domi maturuisse prius quam edantur, oportet. Pituitosa autem cibaria summo opere illi vitanda sunt. A' fungis etiam ut omnino absteat, consulo: quemadmodum & à rapis, & à reliquis aliis, quorum radix est esculenta. Sunt enim hæc ex iis quæ crassos humores gignunt, & perquam difficulter intra corpus elaborantur: exceptis quibusdam, quæ nonnihil acris & calidi in se ipsis continent: quemadmodum pastinacæ & raphani. Verùm raphanos ex aliquo dierum intervallo degustare non prohibeo: hortor tamen, ut pro viribus à pastinaca absteat: & magis etiam à rapis. At eorum cibariorum copiosus usus, salubris erit, quæcunque acris quippiam atque incidentis obtinent, citra insignem pravi succi notam, aut odorem aliquem, capiti adferre noxam valente. Sunt autem & in hoc genere, quæcunque ob caliditatem caput replent, sicuti vinum, sinapi, petroselinum, pastinaca, cæpa, & smyrnium. Hæc siquidem plus quam par est, excalfaciunt, vitiososque succos producant. At oxymelite audacter utendum est: ex quo etiam capparitis potest sumi: pauxillo olei istillato. Quod si acetum ipsum scilliticum fuerit, oxymeli longè magis iuvabit. Cæterùm si oxymel bibere puer velit, temperetur copiosiori aqua: & hyeme quidem, calidum: æstate autem, frigidum offeratur. Sic siquidem præter cætera, maximè sitim sedat. Permittere autem ei palam & in tēpore convenit, quæcunque non insigni noxa ipsum possint afficere: ne clam atque intempestivè eis potitus, multo magis lædatur. Quippe voracius & largius implètur iis quæ desyderant.

Cibaria epilepti-
cis aptaqua
lia esse debeant

Oxymeli epilepti-
cis dādū.
Capparitis epilepti-
cis con-
gruit.

Acetum scilli-
ticum.

Pueris cur per-
mittendum sit
vesci illis quæ
non insigniter
lædunt.

rarunt, qui palam eis uti prohibentur. Porro à prandio, ubi medicum quid interquieuerit, priusquam ad studia literarum accedat, nonnihil ipsum lentè in ambulare præcipio. A' quibus ubi redierit, rursus ante cœnam deambulet modicè: ac deinceps panis offerantur portiones reliquæ: aliorum verò unumquodque,

Epileptici quibus nesci carnibus debeant.

Verum carnes omnium ferè volatiliū convenient, exceptis iis quæ in stagnis degunt. A' quadrupedum autem omnium carnibus abstinere debet. Quod si &

Suis extremas partes cōferre epilepticis.

quandoq; his opus sit uti, suis quidem domestici extremis, atq; ventre vescatur. Sed sylvestris etiam suis carnib' uti poterit. Hædos etiam gustare licebit, atq;

Condimentum simplex ex quibus constet.

nonnunquam lepores, probè tamen conditos, aut citra nidorem assatos. Simplex condimentum fit ex aqua, quæ anethum, porrum, oleum, atq; salem receperit. Quantum verò ad marina pertinet, omnia testis infecta sunt pernicioſa. Ex piscibus autem, saxatiles cæteris omnibus præstant. Torpedo autem sola ferè ex chartilagineorum genere illi conueniens est.

Legumina cōgruentia epilepticis quæ.

Inter legumina, ptisana quidem primum locum obtinet: deinceps lentes, alica, & pisa conueniunt. Reliqua noxia existunt. In vniuersum autem, quæcunq; glutinosa sunt, & crassi succi, quæq; inflant, & excrementa gignunt, necnon quæ ægrè coquuntur, ea prorsus vitare debet. At verò medicamento confecto ex

Medicamē ex scilla confectū conferre epilepticis.

scilla, post purgationem, quæ aduentante vere molienda est, utetur singulis diebus, prius quam palæstram accedat. Et sanè, nisi valde rebellis sit morbus, spero quadraginta dierum spatium, ipsum, sola eius medicamenti ope, prorsus solutum iri. Post purgationem tamen, ante quam eo medicamento utatur, absinthium & semel, & bis in potu accipere conuenit. Cæterum oxymel, quod acidissimum quidem est, quartam ad mei aceti portionem habet: quod verò dulcissimū, octauam recipit. At crassis & glutinosiss existentibus

Oxymelitos differentia.

P V E R O . E P I L E P .

601

succis, acidiori atq; meraciori est utendum. Sin autem minus sint tales, dilutiori, atq; dulciori. Quo pacto autem ipse scillæ succum excipiam, iam adiciam. Primum vase melitero præparato, in ipsum scillam frustatim manibus comminutam iniicio: deinceps angusto operculo cooperiēs, & extrinsecus corium vniuerso corpori vasis circumducens, & diligenter ligans, in locum omnino ad meridiem conuersum repono: ita tamen ab aquiloniis flatibus communitum, vt nullatenus ab ipsis perfletur. Id autem eo anni tempore efficio, in quo exoritur canicula: nempe ante illius quidē ortum, viginti diebus: postq; ipsum etiam, totidem. Tunc igitur per aliquot dies paulatim situm vasis permuto, vt æquē quacunque sui parte incalescat. Quo tempore exacto, dissoluens vas, in eo scillæ corpus, perinde ac decoctum, inuenio, atq; adhuc ex ea humorem quendam effluere, quem excipiens optimo melle condio. Et huius quotidie plenum cochleare vnum, infantibus quidem paruum: adultis verò magnum exhibeo. Quin etiam quod rotis scillæ corruptulentum superest, exquisitè contundens, & cum melle leuigans, eius quoq; cochleare vnum, vt prædictum est, porrigo: istud tamen viribus est longè inferius. Qui verò scillam in aqua coquentes subigunt, planè illius vires dissoluūt.

Scillæ succum excipendi rō

Scilliticum medicamen optimū epilepticis.

Quemadmodum quicunque ex aceto eam decoquunt, calidum quidē medicamentum abundè efficiūt: at nervis sanè non innoxium.

Scillā aceto in coctā esse non innoxiam nervis.

G A L E N I P E R G A

M E N I D E P T I S A N A

L I B E R V N V S.

Ptisana ex quibus
constet.



Aqua optima
qualis nam et
se debeat.

Elementū nul-
lum esse pror-
sus syncerum.

Aqua quæ sit
leuissima.

Hordeū refri-
gerat, exic-
catq̃.

VANDOQVIDEM composita quædam res est tum ptisana, tum eius cremor (ex hordeo enim probè decorticato, & aqua, & certa quadam coctione conficitur) prius de illius partibus summatim aliquid dicere est animus, quàm de eius compositione atque vlu disseram. In primis igitur ad faciendam ptisanam, aquam optimam deligere oportet: quæ nimirum nec olfactu, nec gustu, ullam extraneam qualitatem referat. Præterea sit pellucida & pura, operæ precium est: minimeq; limola, sed veluti exactè colata. Porro huiusmodi aqua, quoadvsum quidem, satis erit accommodata: natura autem ipsa, neque hoc acto prorsus sincera fuerit, sicuti nec ullum aliud sensibile elementorum. Erit tamen tenuium partium, atque ad concoctionem, distributionemq; prompta: nec tantum à naturali calore alterabitur facile, verumetiam igni externo admota, protinus calefiet: quod etiam testatur Hippocrates, aquam quæ calfit cito, & cito refrigeratur, leuissimam esse existimans: idq; non æstimatam pendere, sed q̃ partium tenuitate præpolleat, facileq; contrarias qualitates, recipiat. Itaq; huiusmodi aqua, frigida & humida, proprièq; omnino aqua censenda est. Hordeum autem ipsum, refrigerat exiccatq; . Habet tamen nonnihil detergentis & flatuosi. Quod si inspiciatur particula-

tim, illius extremus cortex, furfuraceus, & siccior existit, & magis detergendo accommodus. Quod tñerò intus, ceu carnis vicem gerens, atque nutriendo idoneum habetur, deterget quidem & id, sed furfure longè minus: & pariter quippiam flatuosi in se continet. Quamobrem furfure quidem abstergit minus: valentius autem hordeo. At verò, quod hordeū ad ptisanam conficiendam eligimus, esse plenum oportet, nec admodum recens, neq; antiquum valde, & quod omnis ascititiæ qualitatis sit expers: in tumoremq; dum coquitur, attollatur ingentem. Vbi aquā & hordeum delegeris, ipsum hordeum crudū in aqua præmacerato: deinde ita manibus versato, quousq; deglubatur tenuis membrana. Postea rursus valentius etiam manibus eousq; confricato, vt quicquid paleaceum inest, decidat: nisi quis fortè velit eam magis detergentem efficere. Tunc siquidem satius fuerit ipsum vnā cum membrana decoquere. Ipsiū autem decoctio sit talis, vt primū quidem ebulliat plurimum: posterius autem lento igne, quousque abundè in succum vertatur. Hac enim ratione percocta ptisana, quicquid inerat flatuosi, deponit, restinguit sitim, deterget, abluit, facilè coquitur atq; absq; astrictione aliqua humectat. Iam verò quum cætera viscida quo ad gustū nullā sanè suauitatem obtineant, ptisana gustui nescio quid suavis & blandi affert: & præsertim ægrotis. Facilè etiam in thoracis partes descendit: estq; ad deiectionem, atq; distributionem, accommodata. His de causis maximè ex vsu est ardentibus febribus: quòd nimirum eis quacuncq; ex parte obsistat, refrigerans & humectans, necnon putridos humores detergens, & corpori non exiguum nutrimentum suppeditans: eos verò humores qui ex dimidio putrunt concoquens, atque in optimum succum permu-

Hordeū conficiendæ ptisanæ aptū, quale nā esse debeat.

Hordeū decor-
tandi ratio.

Hordeū haud
quāq; decortica-
tum, ptisanā
magis abster-
gentem efficit:

Ptisanae facul-
tas.

Ptisana maxi-
mè ex vsu est
ardentibus fe-
bribus.

*Ptisana quib'
exhibenda nō
sit.*

*Morbi sicci q
dicantur.*

*Siccitates par-
ticulares qui-
bus notis de-
prehendantur.*

*Ptisana cum in
siccis morbis
non danda.*

tans. Præter has itaq; vires omnes, nullam habet aut astrictionem, aut stomachi subuersionem ptisana. Nā astrictio quantum ad ventriculum roborandum idonea est, tantum ad incrassandos humores prompta: at ea humiditas quæ quod crassescat non habet, facile subuersionem molitur. Ptisana sic confectæ, læues, æquales, atq; ex æquo omnes partes continuæ, & unitæ existunt. Cæterum nec eam iis qui in discrimine sunt, porrigere conuenit: nec iis qui venæ sectione, aut purgatione, aut clystere, aut foimento indigent: nec eis qui excrementa plurima in regione ventriculi congefferunt: aut ingenti dolore vexantur. Sed neque in siccissimis etiam morbis eam dare conueniet: quod scilicet valentioribus egeant potionibus quàm sit ptisana, vt humectentur vberius. Tempus sorbitioni opportunum tunc fuerit, quando æqualiter dispositum corpus redditum est: id quod tantum morbo inclinante accidit. Porro morbi sicci sunt, lateris pulmonisq; inflammationes, atque adeo quicumq; morbi in thorace sunt, si nihil per excreatum excernant. At morbi qui circa iecur, & ventriculum, & intestina accidunt, tunc sanè sicci dicuntur, quum nihil excernunt, aut dura, & non vt necesse est, neq; effatu digna. Siccitates verò quæ in venis & arteriis consistunt, ex lingua & exteriori cute noscuntur: pariter & affectus qui in capite sunt, si nihil per palatum excernatur, aut nares. Eadem etiam ratione, & inflammationes & ulcera esse contingit sicca, ex quibus nihil per saniem excernitur. Igitur in huiuscemodi morbis ptisanam minimè propinare conueniet: q̄ satis eos humectare non valeat. At uerò, quando corpus humidius extiterit, aut ex pulmone aliquid excreatur, tunc eis semper sorbitionem augere, atque adicere oportet. Verum neq; ipsam statim ptisanam

DE PTISANA

605

offerre expedit: sed prius sanè eius cremorem so-
lum: aut cremoris quidem plus, ptisanæ autem pa-
rum: mox vtriusque æqualiter: deinceps & solam
ptisanam: idq; non ignorantes, ad corporis ro-
bur & nutritionem, maximè conduce-
re ptisanam: ad facilem verò co-
ctionem, atq; in corpus distri-
butionem, cremo-
rem ipsius.

F I N I S.

SERIES CHARTARVM.

Aaa, Bbb, Ccc, Ddd, Eee, Fff, Ggg,
Hhh, Iii, Kkk, Lll, Mmm, Nnn, Ooo,
Ppp, Qqq, Rrr, Sss, Ttt, Vuu, Xxx,
Yyy, Zzz, AAa, BBb, CCc, DDd, EEc,
FFF, GGg, HHh, Iii, KKK, LLL,
MMm, NNn, OOO, PPP.

Omnes quaterniones.

V E N E T I I S.

Apud Hieronymum Scotum.

1 5 4 8.



